

## تأثير استخدام الماء المتأين (القلوي والحامضي) في وزن الجسم الحي وبعض القياسات

## الجسمية لذبائح فروج اللحم

محمد علي حسين الجنابي      سعد عبد الحسين ناجي      بشرى سعدي رسول زنكنة  
جامعة بغداد - كلية الزراعة      جامعة القادسية - كلية الزراعة      جامعة بغداد - كلية الزراعة

E.mail : proffsaadnaji@yahoo.com

تاريخ نشر البحث : 2015/10/18      تاريخ قبول النشر : 2016/2/1

## الخلاصة

استهدفت التجربة معرفة تأثير استخدام الماء المتأين (القلوي والحامضي) في وزن الجسم الحي ووزن الذبيحة وطول الجسم ومحيط الصدر والفخذ والظهر وطول العظام لذبائح فروج اللحم والمربي لعمر 49 يوم . تم استخدام 300 فرخ من سلالة فروج اللحم Ross308 بعمر يوم واحد وزعت الافراخ على ثلاثة معاملات بواقع 100 فرخ/معاملة وقسمت افراخ كل معاملة الى اربعة مكررات (25فرخ/مكرر) وكانت المعاملات على النحو الاتي: المعاملة الاولى (T1) مجموعة الافراخ التي اعطيت ماء اعتيادي (ماء الاسالة) ذو أس هايدروجيني متعادل (pH=7.1) وأستخدمت كمعاملة للسيطرة Control ، المعاملة الثانية (T2) مجموعة الافراخ التي اعطيت ماء متأين قلوي ذو أس هايدروجيني قاعدي (pH=8.5) ، المعاملة الثالثة (T3) مجموعة الافراخ التي اعطيت ماء متأين حامضي (pH=4.8) .

اظهرت النتائج ان المعاملة (T2) التي شربت افراخها الماء القلوي قد اعطت اعلى وزن للجسم الحي و أعلى وزن ذبيحة الا أن التحليل الاحصائي أشار الى ان الفروقات لم تصل لمستوى المعنوية. شرب الماء القلوي أيضا لم يظهر تحسن معنوي في قيم كل من صفة طول الجسم ومحيط الفخذ ودرجة امتلاء الجسم ، وطول عظمي الفخذ والوصلة الفخذية وعظم القص لذبائح فروج اللحم مقارنة بمعاملة السيطرة (T1) والتي شربت افراخها الماء المتعادل ومعاملة (T2) التي شربت افراخها الماء الحامضي. يستنتج من الدراسة الحالية عدم وجود تأثير معنوي للماء المتأين الحامضي والقاعدي على صفات ومقاييس ذبائح فروج اللحم .

الكلمات المفتاحية : الماء المتأين (قلوي وحامضي)، قياسات الجسم ، فروج اللحم

## المقدمة

تسهم في فقد الخواص الحيوية للماء وتسبب مشاكل صحية مختلفة وتأثيرات ضارة على صحة الانسان (Meredith, 1995) .

ان المياه المتأينة هي مياه وظيفية تظهر وظائف متخصصة وهناك العديد من الطرائق لانتاجها كالتحليل الكهربائي الذي ينتج المياه المؤكسدة التي تنتج بالقرب من القطب الموجب ويطلق عليها مياه Electrolyzed Reduction Water (EOW) او المياه الحامضية لوجود حامض الهايبوكلوريك وغاز الكلور والاوزون وتظهر فعالية تعقيم عالية (Bari, وآخرون 2003) والمياه المختزلة بالقرب من القطب السالب ويطلق عليها مياه Electrolyzed Reduction

لقد ثبت علمياً أن الماء يشكل احد الابعاد الاستراتيجية المهمة في صنع الحياة بشتى اشكالها وضمان ديمومتها وتغطية وتأمين متطلبات كافة الاستخدامات ، حيث يشكل الماء العنصر الرئيس للكائنات الحية بعد الاوكسجين مباشرة ، اذ يكون اكثر المركبات الكيميائية الموجودة في الكائنات الحية ويشكل حوالي 75-95% من الوزن الكلي لمختلف انواع الخلايا ويتخلل اجزاء كل خلية (عبد الخالق، 2000) . ولقد أصبح من الضروري تطوير طرائق معالجة المياه الخام في محطات التنقية لتكون قادرة على ازالة الملوثات التي لاتزال تجري بالطرائق التقليدية التي تعتمد على اضافة بعض المواد الكيميائية (السعدي وآخرون، 1986) التي

الافراخ عشوائياً على ثلاث معاملات وبواقع 100 فرخ لكل معاملة وقسمت افراخ كل معاملة على 4 مكررات (25 فرخ/مكرر) ، وكانت المعاملات كالاتي:- المعاملة الاولى (T1) مجموعة الافراخ التي اعطيت ماء اعتيادي(اسالة) وأستخدمت كمعاملة للسيطرة اما المعاملة الثانية(T2) والثالثة(T3) مجموعة الافراخ التي اعطيت ماء متأين قاعدي وحامضي على التوالي . ربيت الطيور تربية ارضية داخل اكنان بمساحة  $1.8 \times 1.2$  م/كن احتوت كل منها على 25 فرخ ونظمت درجة الحرارة بشكل اوتوماتيكي باستخدام الحاضنات الغازية وساحبات الهواء ثم حفظت درجة الحرارة الحضان تدرجياً من 35 مئوي لحين الوصول الى 22-20م<sup>0</sup> لغاية عمر التسويق . غذيت الطيور تغذية حره على عليقة بادية ونمو تركيبة المنشأ وبشكل اقراص تحتوي على 23 و 20% بروتين خام و 3100 و 3000 كيلو سعرة طاقة ممثلة/كغم علف في كل من عليقة البادية والنمو على التوالي .

تم انتاج الماء المتأين(القلوي والحامضي) باستخدام جهاز Bawell صيني المنشأ الحاوي على عمودين لتأيين الماء يكفي لانتاج 6000 لتر ماء متأين ثم يستبدل بعمود اخر كما ويحتوي على صنوبر يمكن عن طريقة التحكم في شدة المياه الواصلة الى الجهاز والوصول الى الـ pH المطلوب ، حيث هناك 3 ازرار يضغط عليها للحصول على ماء متأين قلوي(alkaline) ذو pH يتراوح بين 8-9 للزر الاول و 9-10 للزر الثاني و 10-14 للزر الثالث ، وهناك زر (acidic strong) يضغط عليه للحصول على ماء حامضي متأين ضعيف ذو pH يتراوح بين 4-6 ، كما وينتج الجهاز ماء متأين حامضي قوي يقتصر عملة على التعقيم والتطهير ويتم التأكد من درجة الحموضة من خلال الفحص بجهاز الـ pH meter ويبقى الماء المتأين المنتج من الجهاز محتفظ بدرجة حموضته لمدة 4 ايام .

تم اخذ اربعة طيور من كل مجموعة بصورة عشوائية ذبحت بعد تصويمها قبل الذبح بـ 4 ساعة وجرى سطمها بدرجة حرارة 54م<sup>0</sup> لمدة دقيقتين ونزع الريش واجريت عملية ازالة الاحشاء الداخلية ، بعد ان تم غسل الذبائح تم قياس كل من طول الجسم باستخدام شريط قياس

Water (ERW) وهي مياه شرب صحية مفيدة وان ألاس الهايدروجيني (pH-) لها 8-10 وهي قلوية طبقاً للصفات الكيموفيزيائية للماء وتكون غنية بجزئية الهيدروجين وان جهد الاكسدة والاختزال لها سلبي وتعمل على ازالة فعالية انواع الاوكسجين النفاغلية(Shirahata واخرون، 2007) .

ان اجهزة التحليل الكهربائي للماء لها الكثير من المزايا مثل كفاءتها العالية و سهولة التشغيل ولكونها رخيصة الثمن وهي ذات تأثير أقل على البيئة والمستخدمين لعدم تطلبها لاي مواد كيميائية استخدام فضلاً عن دورها في ايقاف نشاط المسببات المرضية وتنتج مياه رخيصة وامنة(Abadias واخرون، 2008) ، وان استعمال المياه المتحللة كهربائياً المتعادلة في صناعة الدواجن تعد طريقة جديدة ولها تأثيرات مفيد على الحالة الصحية للطيور(Otleanu واخرون، 2010) ، فقد اشارAsad واخرون(2013) الى ان تقديم ماء شرب قلوي لفروج اللحم يسهم بتحسن معنوي في الزيادة الوزنية، في حين بين الجنابي(2015) ان استخدام ماء شرب قلوي او حامض يحسن من الاداء الانتاجي لفروج اللحم وبالتالي تحسن في نسبة التصافي ووزن قطعة الفخذ (الجنابي، 2015) وفي ضوء ماتقدم ولكون الماء المركب الاكثر اهمية في حياة الطيور من خلال تأثيره على ادائها الانتاجي ولعدم وجود دراسات سابقة تبين دور وتأثير نوعية المياه في بعض المقاييس الجسمية للذبيحة ، لذا يهدف البحث الحالي الى دراسة تأثير الماء القوي (pH أعلى من 7) والماء الحامضي (pH=4-6) في بعض القياسات الجسمية للذبيحة واطوالها لفروج اللحم والمربي لمدة 49 يوم .

### المواد وطرائق العمل

اجريت هذه التجربة في حقل الطيور الداجنة التابع لقسم الثروة الحيوانية في كلية الزراعة - جامعة بغداد للمدة من 1/10 ولغاية 2014/2/27 لمعرفة تأثير استخدام الماء المتأين(القلوي والحامضي) في المقاييس الجسمية للذبيحة واطوالها لفروج اللحم المربي لعمر 49 يوم ، اذ تم استخدام 300 فرخ من فروج اللحم سلالة Ross وبعمر يوم واحد وبمعدل وزن ابتدائي 38غم للفرخ ، وزعت

اذ بلغ وزن الجسم الحي 3625.0 و 3607.5 غم مقارنة بـ 3160.0 غم لطيور معاملة السيطرة ، في حين بلغ وزن الذبيحة 2880.0 و 2747.5 غم لطيور المعاملتين الثانية والثالثة على التوالي مقارنة بـ 2500.0 غم لطيور معاملة السيطرة ، كما وبلغ طول الجسم 23.3 سم و 23.8 سم للمعاملتين الثانية والثالثة على التوالي مقارنة بـ 21.3 سم كطول للجسم لطيور معاملة السيطرة . تتفق هذه النتائج مع ما وجدته Azad وآخرون (2013) في تحسن اداء النمو لفروج اللحم عندما اعطي مياه قلوية ذو pH يتراوح بين 8.1-10.1، واتفقت هذه النتيجة ايضاً مع Khan وآخرون (2013) الذي اشار الى ان تقديم ماء شرب ذو pH 7.5 اسهم بزيادة وزن الجسم لفروج اللحم المربي لعمر 35 يوم ، وذلك لان الماء المتأين قلويًا يعد عاملاً محفزاً على اخذ الكلوكوز من قبل الخلايا العضلية والخلايا الدهنية (Oda وآخرون ، 1999) ويسهم في تحسين عملية التمثيل الغذائي لكل من الكلوكوز والدهن ويزيد من مجال الاستفادة من العناصر الغذائية في العلف (Tsai وآخرون، 2009) كما وان المياه القلوية تعمل على تنظيم التمثيل الغذائي للكلوكوز لانتاج الطاقة ومن ثم تحسين استهلاك العلف وماينعكس بالتالي على معدل نمو الافراخ . من ذلك يمكن ان نستنتج ان الهدف من تقديم المياه المتأينه هو تحسين الحالة الصحية للطيور وتقليل نسبة الهلاكات (Holcroft، 2003) ولقد لوحظ ان شرب الطيور للماء المتأين قد أدى الى تحسن وزن الجسم الحي للافراخ خلال الاسبوع الاول من التربية الذي يقود الى زيادة وزن الجسم الحي لاحقاً وما لذلك من تاثير في زيادة وزن القطيعات الرئيسية ومقاييسها (Lilburn وآخرون ، 1994 ) ، اذ تعبر مقاييس الذبائح عن النمو العام لاجزائها المختلفة وان تدريج الذبائح يعتمد على زيادة درجة تكور وامتلاء الصدر والفخذ للذبائح مما يؤدي الى ارتفاع نسب القطيعات الرئيسية كالفخذ والصدر (البغدادي، 1997) .

خاص مقسم الى اجزاء الملم ، اذ تم اخذ القياس من مؤخرة الرقبة ( بداية عظم الترقوه) الى نهاية الذنب( نهاية الفقرات القطنية) ومحيط الصدر وذلك بلف شريط القياس حول الصدر وبشكل ملائم له من المنطقة التي تقع أعلى الجناحين ومحيط الفخذ من خلال لف شريط القياس حول الفخذ (البغدادي وآخرون ، 1995) ومحيط الظهر من خلال لف شريط القياس حول الظهر من المنطقة بعد اتصال الفخذ بالجسم (السعودي وعيسى ، 1985) ، فضلاً عن قياس طول عظمي الفخذ والوصلة الفخذية وعظم القص باستخدام شريط القياس ، واستخرجت درجة امتلاء الجسم والصدر للذبائح وفقاً للمعادلة التالية التي ذكرها (العلواني ، 2002 ) وكما يلي :

وزن الذبيحة(غم)

درجة امتلاء الجسم = -----

طول الجسم(سم)

محيط الصدر(سم)

درجة امتلاء الصدر = -----

طول الجسم(سم)

استخدم البرنامج الاحصائي الجاهز SAS (2001) وبتطبيق التصميم العشوائي الكامل في تحليل البيانات ، وتم اختبار الفروقات بين المعاملات باستخدام اختبار دنكن Duncan (1955) متعدد المديات لمقارنة الفروقات المعنوية بين المتوسطات للصفات المدروسة .

### النتائج والمناقشة


يوضح الجدول (1) تاثير استخدام الماء المتأين (القلوي والحامضي) في كل من وزن الجسم الحي ووزن الذبيحة وطول الجسم ومحيط الصدر والفخذ والظهر للذبائح فروج اللحم بعمر 49 يوم ، اذ يلاحظ عدم وجود فروق في قيم تلك الصفات الا انه لوحظ وجود تحسن غير معنوي في وزن الجسم الحي ووزن الذبيحة وصفة محيط الفخذ لطيور المعاملة (T2) تلتها المعاملة (T3) مقارنة بمعاملة السيطرة (T1) ،

جدول 1. تأثير استخدام الماء المتأين (القلوي والحامضي) في الوزن الحي ووزن الذبيحة وطول الجسم ومحيط الصدر والفخذ والظهر لذبائح فروج اللحم (المتوسطات  $\pm$  الخطأ القياسي)

الصفات المدروسة						المعاملات (1)
محيط الظهر (سم)	محيط الفخذ (سم)	محيط الصدر (سم)	طول جسم الذبيحة (سم)	وزن الذبيحة (غم)	الوزن الحي (غم)	
0.1 $\pm$ 11.0	1.3 $\pm$ 21.3	0.5 $\pm$ 42.5	0.3 $\pm$ 27.3	120.0 $\pm$ 2500.0	145.0 $\pm$ 3160.0	T1
0.1 $\pm$ 11.1	0.3 $\pm$ 23.8	0.5 $\pm$ 42.5	1.0 $\pm$ 27.5	475.0 $\pm$ 2880.0	340.0 $\pm$ 3625.0	T2
0.1 $\pm$ 11.1	0.8 $\pm$ 23.3	0.5 $\pm$ 42.5	0.8 $\pm$ 27.3	287.5 $\pm$ 2747.5	382.5 $\pm$ 3607.5	T3
N.S	N.S	N.S	N.S	N.S	N.S	مستوى المعنوية


(1) المعاملات التجريبية تشمل ما يلي: T1 / اعطيت ماء اعتيادي (اسالة) ذو pH=7.2 / T2 / اعطيت ماء متأين قلوي ذو pH=8.5 / T3 / اعطيت ماء متأين حامضي ذو pH=4.8 . N.S تعني عدم وجود فروق معنوية

يظهر الشكل (1) و(2) تأثير استخدام الماء المتأين (القلوي والحامضي) في درجة امتلاء الجسم والصدر لذبائح فروج اللحم بعمر 49 يوم ، اذ يلاحظ وجود تحسن غير معنوي في درجة امتلاء الجسم لطيور معاملتي (T2 و T3) مقارنة بمعاملة السيطرة (T1) ، اذ بلغت درجة امتلاء الجسم 104.2 و 100.4 غم/سم مقارنة بـ 91.6 غم/سم على التوالي ، في حين لم يلاحظ اي زيادة في درجة امتلاء الصدر لجميع المعاملات ، ان الزيادة في درجة امتلاء الجسم هي نتيجة طبيعية لزيادة الوزن الحي ووزن الذبيحة لصالح طيور معاملتي استخدام الماء المتأين قلوياً (T2) وحامضياً (T3) وبالتالي زيادة تكور الجسم وامتلاءه والذي يؤثر على احتواء هذه الذبائح على نسبة عالية من القطيعات الممتازة كالفخذ والصدر (البغدادي، 1997) التي تهم المستهلك بدرجة كبيرة الى جانب ذلك يشير امتلاء الجسم الى اكتناز العضلات ذات التكور الجيد وتحسن مظهرها ، وان دراسة صفات ومقاييس الذبائح تعبر عن النمو العام للاجزاء المختلفة لهذه الذبائح ( العلواني ، 2002) ، فقد سبق و اشار الجنابي (2015) الى وجود تحسن غير معنوي في الوزن النسبي لكل من قطعة الفخذ والصدر لفروج اللحم المستخدم الماء المتأين قلوياً وحامضياً مقارنة باستخدام الماء العادي .



شكل (1) تأثير استخدام الماء المتأين (القاعدي والحامضي) في درجة امتلاء الجسم لذبائح فروج اللحم بعمر 49 يوم

المعاملات التجريبية تشمل ما يلي: T1 / اعطيت ماء اعتيادي (اسالة) ذو  $pH=7.2$  / T2 / اعطيت ماء متأين قلوي ذو  $pH=8.5$  / T3 / اعطيت ماء متأين حامضي ذو  $pH=4.8$ .




شكل (2) تأثير استخدام الماء المتأين (القاعدي والحامضي) في درجة امتلاء الصدر لذبائح فروج اللحم بعمر 49 يوم

المعاملات التجريبية تشمل ما يلي: T1 / اعطيت ماء اعتيادي (اسالة) ذو  $pH=7.2$  / T2 / اعطيت ماء متأين قلوي ذو  $pH=8.5$  / T3 / اعطيت ماء متأين حامضي ذو  $pH=4.8$ .

في طول العظام وخاصة للطيور المستخدمة الماء المتأين قلويّاً الى زيادة كمية المعادن كالكالسيوم والمغنيسيوم والبيوتاسيوم المهمة في بناء العظام في الماء القلوي مقارنة بالماء العادي (الجنابي، 2015)، فقد سبق واشارت الباحثة (الهجو، 2005) الى ان زيادة طول العظم يعني زيادة طول العضلات الهيكلية الواقعة عليه ومن ثم زيادة نسبة التصافي للطيور. يستنتج مما تقدم ان معاملي استخدام الماء المتأين قلويّاً وحامضياً لفروج اللحم اسهمت في تحسن بعض قياسات الجسم للذبائح المدروسة.

يوضح الشكل (3) تأثير استخدام الماء المتأين (القلوي والحامضي) في طول عظمي الفخذ والوصلة الفخذية وعظم القص لذبائح فروج اللحم بعمر 49 يوم، اذ يلاحظ وجود تحسن غير معنوي قيم تلك الصفات لطيور معاملي (T2 و T3) مقارنة بمعاملة السيطرة (T1)، اذ بلغ طول عظم الفخذ 13.9 و 13.8 سم مقارنة بـ 13.3 سم على التوالي، في حين بلغ طول عظم الوصلة الفخذية 9.0 و 8.9 سم مقارنة بـ 8.6 سم على التوالي، بينما بلغ طول عظم القص 20.9 و 20.1 سم مقارنة بـ 19.7 سم على التوالي، قد يعود هذا التحسن



شكل (3) تأثير استخدام الماء المتأين (القاعدي والحامضي) في طول عظم الفخذ والوصلة الفخذية والقص لذبائح فروج اللحم بعمر 49 يوم  
المعاملات التجريبية تشمل ما يلي: T1 / اعطيت ماء اعتيادي (اسالة) ذو pH=7.2 / T2 اعطيت ماء متأين قلوي ذو pH=8.5 / T3 اعطيت ماء متأين حامضي ذو pH=4.8

المحلي في العراق . مجلة البحوث الزراعية والموارد المائية . المجلد 4 . العدد 4 . ص: 207-213 .  
العلواني ، محمود احمد حمادي . 2002 . تقييم لحوم الدجاج البياض المسن . رسالة ماجستير . قسم الثروة الحيوانية . كلية الزراعة - جامعة الأنبار .  
الهجو ، نادية نايف عبد . 2005 . تأثير العمر في الاداء الانتاجي والخصائص النوعية والحسية لفروج اللحم المربي باعمار متقدمة مع دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع . أطروحة دكتوراة . قسم الثروة الحيوانية . كلية الزراعة - جامعة بغداد .

عبد الخالق ، علاء الدين . 2000 . المعلومات البيئية والقسم الخلوي . الفصل العاشر .

Abadias , M . , Usall , J . , Oliveria , M . , Alegre , I . and Vinas , I . 2008 . Efficacy of neutral electrolyzed water (NEW) for reducing microbial contamination on minimally-processed vegetables . International of Food Microbiology . 31,123(1-2):151-158 .

## المصادر

البغدادي ، محمد فوزي . 1997 . تأثير معاملات اللحوم قبل الطبخ على التركيب الكيماوي للسائل الناضح والصفات الحسية لقطيعات فروج اللحم . وقائع المؤتمر العلمي الاول . كلية الزراعة - جامعة الأنبار .

البغدادي ، محمد فوزي ، عبد سلطان حسن وطارق فرج شوكت . 1995 . تأثير الخط الوراثي والكثافة في الصفات النوعية والقطيعات لذبائح الذكور خطين من خطوط فروج اللحم (فاوبرو) . مجلة البصرة للعلوم الزراعية . المجلد 8 . العدد 2 . ص: 1-11 .

الجنابي ، محمد علي حسين . 2015 . تأثير استخدام الماء المتأين (القلوي والحامضي) في الاداء الانتاجي وبعض الصفات الفسلجية لفروج اللحم . رسالة ماجستير . قسم الثروة الحيوانية . كلية الزراعة - جامعة بغداد .

السعدي ، حسن علي ، الدهام ، نجم قمر وليث عب الجليل . 1986 . علم البيئة المائية . دار الكتب للطباعة والنشر . مركز بحوث البحار . جامعة الموصل .

السعودي ، خالد عبد العزيز وحاتم عيسى . 1985 . القياسات الجسمية للرومي

- competitive exclusion , probiotics and enhancement of avian intestinal immunity . J . Appl . Poult . Res . 15:341-351 .
- Meredith , Ph.D . 1995 . Extension specialist science and technology education , chlorine and environment , west Virginia University , Pp2-8 .
- Oda , M . , Kusumot, K . Teruya , K . , Hara , T . , Maki , T . , Kabayama , Y . , Katakura , Y . , Otsubo , K . , Morisawa , S . , Hayashi , H . , Ishii, Y .and Shirahata , S . 1999 . Electrolyzed and natural reduced water exhibit insulin-like activity on glucose uptake in to muscle cells and adipocytes ,in :Bernard , A . , Griffiths , B . , Noe , W .&W0-urm , F . (Eds) Animal Cell Technology : Products from Cells, Cells as Products,Pp425-427 (The Netherlands ,Kluwer Academic Publishers) .
- Olteanu , M . , Criste , R . D . , Mircea , E . and Surdu , I . 2010 . Effect of Using Electrolysed Water of Layer Performance . The XIII European Poultry Conference , Tours , Franta , 23-27 august 2010 , Published in World's poultry Science Journal , CD of Proceedings , EISSN no.1743-4777
- SAS . Institute . 2001 . SAS User's Guid :. Statistics Version 6.12 end . , SAS Institute . Inc . Cary . NC , USA .
- Azad , M . , Kikusato , M . , Zulkifi , I . and Toyomizo , M . 2013 . Electrolyzed reduce water decrease reactive oxygen species-induced oxidative damage to skeletal muscle and improves performance in broiler chickens exposed to medium-term chronic heat stress . Br.Poultry Sci.,45(40):503-509 .
- Bari , M . I . , Y . Sabina , S . Isobe , T . Uemura and K . Isshiki . 2003 . Effectiveness of electrolyzed acidic water in killing *Escharichia coli* O157:H71 *Salmonella enteritidis* and *Listeria monocytogenes* on the surface of tomatoes . J . Food Prot 66:542-458 .
- Duncan , D . B . 1955 . Multiple range and multiple F test . Biometrics , 11 : 1-24.
- Holcroft , J . 2003 . Effect of Anolyte on Broiler Performance . Athesis . Livestock Industry Management , Poultry Science . University of Stellenbosch .
- Khan , A . A . , Banday , M . T . , Shahnaz , S . and Syed , T . 2013 . Modderately lower pH of drinking water proves beneficial to poultry . J . of Poultry Sci.and Tech., 1(1):17-19 .
- Lilburn , M . S . 1994 . Skeletal growth of commercial poultry species Poultry Sci . , 73 :897-903 . Revollo, L . , A . J . P . Ferreira and G . C . Mead . 2006 . Prospects in Salmonella control :

Tsai , C . F . , Y . W . Hsu , W . K .  
Chen , W . H . Chang , C . C .  
Yen , Y . C . Ho and F . J .  
Lu.2009 . Hepatoprotective  
effect of electrolyzed reduced  
water against  
carbontetrachlorid-induced  
liver damage in mice .Food  
and Chemical Toxicology.  
47:2031-2036 .

Shirahata , S . , Li , Y . , Hamasaki ,  
T . , Gadek , Z . , Teruya , K .  
, Kabayama , S . 2007 . Redox  
regulation by reduced water as  
active hydrogen donors and  
intracellular ROS scavengers  
for prevention of type 2  
diabetes. In E.Smith(Ed.),  
Cell technology for cell  
products Pp99-101.Dordrecht:  
Springer .

### **The Effect of Ionized Water (Alkaline and Acidic) on Body Conformation For Carcasses of Broiler Chicken**

Mohammed A.H.  
Al-janabi  
College of Agriculture -  
University of Baghdad

Saad A. H. Naji  
College of Agriculture -  
University of Al  
Qadisiyah

Bushra . S . R . Zangana  
College of Agriculture -  
University of Baghdad

#### **Abstract**

This experiment is conducted to investigate the effect of ionized water (alkaline and acidic) on body weight , carcasses weight , body length , circumambient of breast , thighs , back, and length of bon for carcasses of 49 day old broiler chicks. A total of 300 one day old chicks Ross308 strain with 38g initial body weight per chick are randomly allocated into three treatment group of 100 chicks each . Each treatment group are sub-divided into four replicates with twenty five chicks each. Chicks in control group (T1) are drinking tap water( PH=7-1) , whereas chicks in second(T2) and third group(T3) were drinking ionized alkaline(PH=8.5) and acidic water(PH=4.8) respectively. Results show that chicks in (T2) which drink the alkaline water had higher live body weight and carcass weight but the statistical analysis show that these differences are not significant –Alkaline water seems to improve the body length , circumambient of thigh , flier repletion of body ,the length of thigh , drumstick and sternum bones compared with control treatment (T1) and( T3) which their birds received the tap and acidified water respectively, but also the stastical analysis shows that all these differences were not get the significance (P < In conclusion alkaline and acidified ionized water are not significantly affected the carcasses characteristics and measurement of broiler chicks .

**Keywords : Ionized Water (Alkaline & Acidic) , Body Measurement , Broiler Chicken.**