

## **Study on Figures of sex Chromatin in relation to some blood characteristics and prolificacy in Shammi (Damascus) and local does**

### **دراسة أشكال الصبغين الجنسي (Sex Chromatin) وعلاقته ببعض صفات الدم والخصب في إناث المَعْز الشامي والمُحلي**

رويدا عدنان علي

د. هاشم مهدي عبود

فلسفة تكاثر

فلسفة تكاثر

جامعة الفرات الأوسط التقنية / الكلية التقنية / المسيب

Mobile: 07801180381

E-mail: [drhashem48@yahoo.com](mailto:drhashem48@yahoo.com)

البحث مستل من رسالة ماجستير للباحث الثاني

#### **المستخلص :**

أجري البحث لدراسة صفات الصبغين الجنسي في خلايا الدم البيض (العدلات) وعلاقتها بعدد من صفات الدم والخصب في المَعْز الشامي والمُحلي. سُحبَت عينات الدم وخُضرت وفُحصت لتحديد وجود الصبغين الجنسي وأشكاله وقياساته. بینت النتائج أن النسبة المئوية لشكل الصبغين الجنسي من عصا الطبال وبِرُوز بدون ساق ودمعة العين والهراوي بلغت 25.75 و 30.60 و 14.30 و 29.35 % في المَعْز الشامي بالتتابع و 29.00 و 32.00 و 13.00 و 26.00 % في المَعْز المحلي بالتتابع. وجود تأثير عالي المعنوية ( $P < 0.01$ ) لشكل الصبغين الجنسي على البروتين الكلي ومعنويًا على الكوليستيرول في المَعْز الشامي، بينما كان التأثير معنويًا ( $P > 0.05$ ) على نفس الصفات على المَعْز المحلي . وجود تأثير معنوي لأشكال الصبغين الجنسي على الخصب للمَعْز الشامي والمُحلي. بين انحدار الكلوکوز تأثيرًا عالي المعنوية على عدد الفصوص في المَعْز الشامي ومعنويًا على باقي صفات الصبغين الجنسي. بين انحدار البروتين الكلي تأثيرًا عالي المعنوية على البعد العمودي وعدد الفصوص ومساحة الصبغين/مساحة النواة في المَعْز الشامي ، بينما كان الانحدار معنوي على باقي الصفات. أوضح انحدار الكوليستيرول تأثيرًا عالي المعنوية على البعد العمودي ومساحة الصبغين ومساحة الصبغين/مساحة النواة في المَعْز الشامي ومساحة الصبغين/مساحة النواة في المَعْز المحلي ومعنويًا على باقي صفات الصبغين الجنسي. بين انحدار خضاب الدم تأثيرًا عالي المعنوية على البعد الأفقي ومساحة الصبغين/مساحة النواة في المَعْز الشامي وعلى البعد العمودي في المَعْز المحلي ومعنويًا على باقي صفات الصبغين. بين انحدار حجم خلايا الدم المرصوصة تأثيرًا معنويًا على بعض صفات الصبغين الجنسيين للمَعْز الشامي والمُحلي. كما أظهرت النتائج أن عواملات الارتباط بين قياسات الصبغين الجنسي وصفات الدم المدروسة كانت معنوية وغير معنوية، بينما كانت بين المعنوية وعالية المعنوية مع الخصب .

**الكلمات المفتاحية :** الصبغين الجنسي والعدلات وصفات الدم والخصب وإناث المَعْز .

#### **Abstract :**

The present study was undertaken to study sex chromatin (SC) traits in white blood cells (Neutrophiles) and relationship with some blood traits and prolificacy in Shammi (Damascus) and local does. Blood sample were collected, prepared and examined to determine presence of SC and its figures and measurements. The results showed that the percentage of drum stick (D), Sessile nodule (SN), Tear drop (T), and small club (SM) figures were 25.30, 30.60, 14.30 , and 26.60% in Shammi does respectively, while in local does reach to 29.00, 32.00, 31.00 and 26.00% respectively. High significant ( $P < 0.01$ ) effect of SC figures on total protein and significant on cholesterol in Shammi does, while the effect was significant ( $P < 0.05$ ) on some traits in local does . The regression of glucose concentration on number of lobes were highly significant in Shammi does and significant on other traits of SC. The regression of total protein on vertical axes, number of lobes and area SC to area of nucleus in Shammi does, While the regression was significant on the other traits of SC. The regression of cholesterol on vertical axes area of SC, and lobes and area SC to area of nucleus was highly significant in Shammi does and area of SC to area of nucleus in local does and significant on other traits of SC. The regression of blood hemoglobin on horizontal axes and area of SC to area of nucleus in Shammi does and on vertical axes in local does and significant on other traits of SC. The regression of packed corpuscular volume was significant on some traits of SC in Shammi and local does. The results showed that the correlation coefficient between measurement of SC and the blood traits were significant and non-significant, while with prolificacy were significant and highly significant.

**Key words :** sex chromatin , neutrophils, blood traits, prolificacy and does.

**المقدمة :**

إن استعمال المؤشرات الوراثية المختلفة ومنها تواجد الصبغين الجنسي في العديد من الخلايا الجسمية الذي يعكس وبشكل واضح الامكانية التي يمكن الوصول إليها عن طريق دراسة التغيرات في صفات هذا الصبغين واعتماد الأدلة الوراثية للتبؤ بالأداء الإنثاجي والتناسلي قد يكون مجيئاً كطريق للانتخاب مما يسرّع برامج التحسين ويقلل من الجهد والتكاليف في ادارة القطعان (1) وإن شكل الصبغين الجنسي وجوده حالة وراثية ليس للبيئة الخارجية أي دور يُذكر فيها (2 و 3 و 4 و 5). ان اكتشاف وجود مواد صبغينية في بعض الخلايا الجسمية للأناث وعدم العثور عليها في الذكور قد تبّه إلى إمكانية استعمال هذه الصفة في الانتخاب والتي اطلق عليها الصبغين الجنسي او اجسام بار (6 و 7) والتي تبين فيما بعد انها احد الكروموسومات التي فقدت فعاليتها في المراحل المبكرة من التكوين الجنيني واستعملت وسيلة تشخيصية للتعرف على الجنس والاعتلاءات الوراثية (8 و 9) ان تواجد الصبغين الجنسي في العديد من الخلايا الجسمية وكذلك خلايا الدم البيض العدلة على شكل اجسام عصا الطبل ساعد وأوضح الإمكانيات التطبيقية التي يمكن الوصول إليها عن طريق دراسة التغيرات في الصبغين الجنسي (10)، إذ إن التغيرات الحاصلة في أشكال وأبعد هذه المواد الصبغينية المتواجدة في أنوبيه العديد من الخلايا الجسمية لاناث البايان قد دفعت العديد من الباحثين الى محاولة الربط بينها وبين بعض الصفات التناسلية (11) في الأغنام (12) في الإنسان (13) في الابقار (14) في الأغنام وكذلك (16) في الطيور الداجنة. لتحسين الإنتاج وأداء الحيوانات لابد من دراسة بعض العوامل الثابتة مثل نوع الولادة وعدد الولادات وجنس المولود وتأثيرها في الصفات التناسلية او استعمال الانتخاب غير المباشر لتحسين بعض الصفات كقياس بعض الصفات الدموية ذات العلاقة بالتناسل (16 و 17)، إذ إن هنالك بعض الصفات الدموية لها تأثير في التناسل وعن طريقها يمكن تحسين الصفات الاقتصادية، فلابد من استعمالها في الانتخاب لتسرير برامج التحسين الوراثي (18). ونظراً لقلة الدراسات الجارية في العراق بخصوص الصبغين الجنسي وعلاقته بالاداء الانثاجي والتناسلي لدى الماعز. تهدف الدراسة الحالية لتحديد اشكال الصبغين الجنسي وابعاده في خلايا الدم البيض متعددة اشكال النوى(العدلات)، وتحديد تأثيرها في الصفات الدموية والتناسلية واستعمالها كدليل انتخابي.

**المواد وطرق العمل :  
حيوانات التجربة وإدارة القطيع**

نُفذ البحث في حقل أهلي يقع في منطقة مشروع المسبب (50 كم جنوب بغداد) لمدة من تشرين أول 2012 ولغاية آذار 2013 على 40 أنثى (20 من إناث الماعز الشامي و20 من إناث الماعز المحلي) تتراوح أعمارها (4-1) سنة فضلاً عن الإفاده من بيانات المربى بهدف دراسة صفات الصبغين الجنسي وعلاقتها بالأداء. وضعت الماعز في حظائر شبه مفتوحة مخصصة لإيوائها ويقدم لها العلف الأخضر والعلف الخشن، تخضع الحيوانات إلى برنامج صحي وقائي .

**جمع نماذج الدم**  
سحب الدم من 40 أنثى للماعز الشامي والم المحلي من الوريد الوداجي بمقدار (10) ملليلتر لكل عينة وقبل خروج الحيوانات للرعاية باستعمال الإبر المعقمة والمثبتة بالحامل البلاستيكي داخل الأنابيب المفرغة من الهواء (Vacutainer) والحاوية على المادة المانعة للتخثر (EDTA) Ethyl Diaminic Tetra Acetic وتدور الأنبوة مباشرة بعد جمع الدم ولمدة دقيقة واحدة لغرض مزج الدم مع المادة المانعة للتخثر وبعد ذلك ثبت رقم الحيوان على الأنابيب ثم نقلت إلى مختبرات قسم تقنيات الانتاج الحيواني في الكلية التقنية/المسبب وقياس حجم خلايا الدم المرصوصة Packed Corpuscular Volume (PCV) بطريقة الأنبوة الشعرية وقياس خصاب الدم بطريقة ساهلي (Sahli method) capillary tube method (19).

**تحضير المسحات الدموية (20)**

أخذت قطرة صغيرة من الدم ووضعت على شريحة زجاجية ونشرت باستعمال شريحة زجاجية أخرى وجفت المسحة الدموية سريعاً بالهواء من خلال تحريكها ، وثبتت المسحة الدموية وذلك بتقطيعها في وعاء كوبلن حاوٍ على الكحول الميثيلي المطلق ولمدة دقيقةتين وثُرَكت لتتجف في الهواء. وثبتت بمادة كحول الميثانول قبل إضافة الصبغة اللازمة إليها وهي صبغة رايت-كمزا (Wrights – Gimza stain) والتي حففت آنها وذلك بمزج 5 ملليلتر من الصبغة مع كمية متساوية لها من دارئ العمل في أنبوية الاختبار. ووضعت قطرات من محلول المحضر على الشرائح الزجاجية وبشكل يؤدي إلى تغطية المسحة الدموية بشكل كامل. وثُرَكت المسحات الدموية لمدة عشر دقائق لاكتمال التلوين وغسلت بالماء المقطر وجففت في الهواء وثبتت بوضع عدة قطرات من مادة كندا باسم على الشريحة وحفظت الشرائح الزجاجية في صناديق بلاستيكية مُحكمة لحين إجراء الفحص.

**فحص المسحات الدموية وقياسات الصبغين (20)**

فحصت المسحات الدموية المحضرة باستعمال العدسة الزيتية (X100) وعدسة عينية بقوة تكبير X20 لتبلغ قوة التكبير X2000، استعملت في الفحص طريقة القلاع (Meander System)، إذ حسبت 100 خلية عدلة (Neutrophil) في 8 شرائح لكل أنثى لتعين النسبة المئوية للعثور على الصبغين الجنسي في هذه الخلايا والنسبة المئوية لإشكاله المختلفة التي تتضمن بعضاً الطبال وبروز بدون ساق ودمعة العين والهراءوي. قيس البُعد الأفقي والعمودي (Vertical and Horizontal axes) ومساحة الصبغين (Chromatin Area) ومساحة انوية الخلايا (Nuclear Area) عن طريق استبدال إحدى العدسات العينية للمجهر وتنبيط مايكرومتر عيني (Ocular Micrometer) عوضاً عنها وكانت الوحدة المستخدمة لقياس البُعد العمودي والبعد الأفقي هي مايكرون ، فضلاً عن حساب عدد الفصوص لكل نواة ظهر فيها الصبغين الجنسي ، استعملت طريقة (21) في حساب مساحة

## مجلة جامعة كريلاء العلمية – المجلد الثالث عشر- العدد الاول/ علمي / 2015

الصيغين الجنسي وصُورت أشكال الصيغين الجنسي باستعمال كاميرا معدة لهذا الغرض وثبتت على إحدى العدسات العينية للمجهر الضوئي (Sawyer microscope company,China).

### **التحاليل الكيموحيوية:**

بعد عمل المسحة الدموية وضع الدم بجهاز الطرد المركزي (Centrifuge-T-30-Germany) بسرعة 3000 دورة / دقيقة لمدة 15 دقيقة فصل وسحب مصل الدم بوساطة ماصة معقمة وحفظ بدرجة -20 لحين التحليل. خللت المواد الأيضية (الكلوكوز والكوليستيرول والبروتين الكلي) باستعمال العدة التجارية المناسبة والمتوفرة. قيس تركيز الكلوكوز والكوليستيرول باستعمال عدة تجارية من شركة (Cromatest Kit,Spain) من خلال الطريقة الضوئية بوساطة جهاز المطياف الضوئي Spectrophotometer-PD303-Germany (Wavelength 546 و 500 نانومتر بالتتابع، وقيس تركيز البروتين الكلي باستعمال عدة تجارية من شركة (Biomaghreb Kit,Tunis) ومن خلال الطريقة الضوئية وبوساطة جهاز المطياف الضوئي و一波長 540 نانومتر.

### **التحليل الإحصائي**

استعملت طريقة الأنماذج الخطية العام (General Linear Model – GLM) ضمن البرنامج الإحصائي SAS (22) لدراسة تأثير شكل الصيغين الجنسي في الصفات المختلفة، وفُورت الفروق المعنوية بين المتوسطات باختبار Dunn متعدد الحدود (23)، استعمل الانحدار للتتبُّع ببعض الصفات الانتاجية والتسلالية اعتماداً على كل قياس من قياسات الصيغين الجنسي، فضلاً عن معاملات الارتباط البسيط بين المتغيرات المختلفة، كما استعمل اختبار مربع كاي (Chi-square) ضمن نفس البرنامج الإحصائي لمقارنة اختلافات نسب توزيع أشكال الصيغين الجنسي المختلفة في العينة المدروسة.

### **النتائج والمناقشة**





#### **أعداد الصيغين الجنسي ونسب توزيع أشكاله**

يتضح من الجدول (1) أعداد الصيغين الجنسي ونسب توزيع أشكاله لدى عينة إناث المَعْز الشامي والمحلبي المدروسة، وتبيّن أن النسبة المئوية لتواجد الصيغين الجنسي في إناث المَعْز الشامي تباينت معنويًا ( $P<0.05$ ) وبلغت 25.75 و 30.60 و 14.30 و 29.35 % لكل من دماغة العين (الصورة 1) وبروز بدون ساق (الصورة 2) والشكل الهراوي (الصورة 3) عصا الطبال (الصورة 4) بالتتابع، وفي إناث المَعْز المحلبي كانت نسب الأشكال 13.00 و 32.00 و 26.00 و 29.00 % لكل من دماغة العين (الصورة 5) وبروز بدون ساق (الصورة 6) والشكل الهراوي (الصورة 7) وعصا الطبال (الصورة 8) بالتتابع. إن هذه النسب تبيّن تواجد الشكل بروز بدون ساق بنسبة أعلى من بقية أشكال الصيغين الجنسي في إناث المَعْز الشامي والمحلبي، لوحظ وجود أكثر من شكل من أشكال الصيغين الجنسي في خلايا الدم البيض ولكن بأعداد مختلفة، وقد يرجع سبب وجود أكثر من شكل في النواة نفسها إلى احتوائها على عدد غير طبيعي من الكرومومسومات الجنسية أو نتيجة حدوث بعض التغييرات الأيضية أو الهرمونية داخل الجسم (25,24) فضلاً عن ما أشار إليه (26) والذي أفاد بأن النسبة المئوية لتواجد الصيغين الجنسي قد تزداد مع تقدّم عمر الخلايا. اتفقت نتائج الدراسة الحالية مع نتائج (11) في دراسته على الأغنام إذ بلغت نسبة الشكل بروز بدون ساق إلى 35.5 % واتفق مع (13) في دراسته على الأبقار و(12) في الإنسان، في حين أفاد (27) في دراسته على الأغنام بأن النسبة المئوية لعصا الطبال وبروز بدون ساق ودماغة العين والشكل الهراوي كانت 24.37 و 49 و 1.89 و 9.25 و 64.49 و 1.89 % بالتتابع. أما ما يتصل بأدنى نسب أشكال الصيغين الجنسي فقد اتفقت هذه الدراسة مع ما توصلت إليه غالبية الدراسات السابقة بخصوص قلة ظهور الشكل الهراوي في خلايا الدم البيض العدلات في الأغنام 1.58 % (11) و 1.89 % (27)، وقد يعزى السبب في تباين النسب المئوية لإشكال الصيغين الجنسي من دراسة إلى أخرى إلى اختلاف نوع الحيوان والسلالة ونوع التربية وطريقة التزاوج وحجم العينة المدروسة.

**الجدول 1. أعداد الصيغين الجنسي ونسب توزيع أشكاله في خلايا الدم البيض (العدلات) لإناث المَعْز الشامي والمحلبي**


النسل	شكل الصيغين	إناث المَعْز الشامي		إناث المَعْز المحلي	
		العدد	النسبة المئوية (%)	العدد	النسبة المئوية (%)
	عصا الطبال	515	25.75	580	29.00
	بروز بدون ساق	612	30.60	640	32.00
	دماغة العين	286	14.30	260	13.00
	الهراوي	587	29.35	520	26.00
	المجموع	2000	100%	2000	100%
	قيمة مربع كاي ( $\chi^2$ )	--	*5.254	--	*5.408

• ( $P<0.05$ )




الصورة (4) الصبغين الجنسي نوع عصا الطبال في خلايا  
الدم البيض لإناث المَعْز الشامي (X2000)

الصورة (3) الصبغين الجنسي نوع الهراوي في خلايا  
الدم البيض لإناث المَعْز الشامي (X2000)



الصورة (8) الصبغين الجنسي نوع بروز بدون ساق في  
خلايا الدم البيض لإناث المَعْز المحلي (X2000)

الصورة (5) الصبغين الجنسي نوع دمعة العين في خلايا  
خلايا الدم البيض لإناث المَعْز المحلي (X2000)



الصورة (10) الصبغين الجنسي نوع عصا الطلاء في خلايا الدم البيض لإناث المَعْز المحلي (X2000)

الصورة(9) الصبغين الجنسي نوع الهراوي في خلايا الدم البيض لإناث المَعْز المحلي (X2000)

#### المتوسطات العامة للصفات المدروسة

يبين الجدول (2) المعدلات العامة  $\pm$  الخطأ القياسي للصفات المدروسة في إناث المَعْز الشامي والمُحلي. إن هذه المتوسطات العائدة للصبغين الجنسي هي ضمن المديات التي توصل إليها في الأغنام (11 و 12) وتنتائج الدراسة الحالية مقاربة إلى ما أشار إليه (28). كما أنها اقتربت من النتائج التي توصل (14) في الأغنام العواسية المحلية و(1) في الأغنام العواسية التركية، وعليه فان النتائج من خلال دراستنا مؤيدة لما ذكره (29) بان مساحة الصبغين تكون تقريباً ثابتة في اغلب البائعن، وإن كان هناك اختلافات طفيفة فهي ناجمة عن الفروقات في حجم الكروموسوم X (21). أما المتوسطات العامة لصفات الدم فقد كانت في إناث المَعْز الشامي والمُحلي مقاربة لما توصلت اليه (28) فيما يخص الكلوكوز والبروتين الكلي ومستوى الكوليستيرول وحجم الخلايا المرصوصة. إن المتوسطات للصفات المدروسة هي ضمن المدى أو مقاربة لما أورده (30) ، إذ كانت النتائج الحالية أعلى، كما كانت أعلى مما جاء به (31) في تقديرات الكوليستيرول والبروتين الكلي كما ان متوسط حجم الخلايا المرصوصة في الدراسة الحالية كانت قريبة من (32). وإن المستويات الحالية لكل من الكوليستيرول والكلوكوز و حجم الخلايا المرصوصة كانت أقل مما جاء به (33) ، فيما كانت النتائج الحالية مقاربة لما أورده (34) بالنسبة لكل للصفات الدموية المدروسة.

الجدول 2. المتوسط العام  $\pm$  الخطأ القياسي لصفات الصبغين الجنسي ولصفات الدم المدروسة في إناث المَعْز الشامي والمُحلي

الصفات	صفات الصبغين	عدد المشاهدات	المتوسط $\pm$ الخطأ القياسي في إناث المَعْز المحلي	المتوسط $\pm$ الخطأ القياسي في إناث المَعْز الشامي
صفات الصبغين	البعد الأفقي للنواة (مايكرون)	4000	0.53 $\pm$ 7.87	0.70 $\pm$ 8.12
	البعد العمودي للنواة (مايكرون)	4000	0.37 $\pm$ 7.91	0.45 $\pm$ 7.76
	البعد الأفقي للصبغين (مايكرون)	4000	0.011 $\pm$ 1.02	0.004 $\pm$ 1.02
	البعد العمودي للصبغين (مايكرون)	4000	0.014 $\pm$ 0.961	0.015 $\pm$ 0.761
	مساحة النواة (مايكرون مربع)	4000	8.92 $\pm$ 57.42	12.56 $\pm$ 64.73
	مساحة الصبغين (مايكرون مربع)	4000	0.11 $\pm$ 2.37	0.14 $\pm$ 2.50
	مساحة الصبغين/ مساحة النواة %	4000	0.42 $\pm$ 5.00	0.63 $\pm$ 4.36
	عدد الفصوص	4000	0.08 $\pm$ 3.62	0.06 $\pm$ 3.43
الصفات الدموية	الكلوكوز في الدم (ملغم/ديسيلتر)	40	7.41 $\pm$ 88.29	5.39 $\pm$ 81.77
	البروتين الكلي في الدم(ملغم/ديسيلتر)	40	6.62 $\pm$ 58.31	3.73 $\pm$ 46.98
	الكوليستيرول في الدم (ملغم/ديسيلتر)	40	14.57 $\pm$ 117.2	16.42 $\pm$ 141.45
	خضاب الدم Hb ملغم/ديسيلتر	40	0.69 $\pm$ 8.17	0.75 $\pm$ 7.50
	حجم الخلايا المرصوصة- PCV (%)	40	1.37 $\pm$ 22.85	1.69 $\pm$ 22.51

### **تأثير اشكال الصبغين الجنسي في صفات الدم المدروسة**

يتضح من الجدول (3) عدم وجود تأثير معنوي لشكل الصبغين الجنسي في مستوى الكلوكوز في دم الحيوانات المدروسة على الرغم من وجود فروق حسابية لصالح الحيوانات التي يكثر في دمها الشكل الهراوي ( 82.69 ملغم/ديسيلتر ) وعصا الطبال ( 92.15 ملغم/ديسيلتر ) لاث المَعْز الشامي والمحلبي بالتتابع وهذه النتائج لا تتفق مع (28) اذ بينت في دراسة على النعاج العواسية التركية أن مستوى الكلوكوز وصل الى أقصاه عند النعاج التي تميزت بشكل دمعة العين، في حين بلغ ادنى مستوىاته في النعاج التي شاع في دمها الشكل الهراوي. كان هناك تباين عالي المعنوية في البروتين الكلي مع اختلاف شكل الصبغين الجنسي في اث المَعْز الشامي وسجل أقصى مستوى للبروتين عندما كان شكل عصا الطبال شائعا ( 47.63 غ/ديسيلتر ) بينما تأثر مستوى البروتين الكلي في دم اث المَعْز المحلبي بصورة معنوية عندما كان شكل الهراوي سائدا ( 64.74 ) وهذه النتيجة تختلف مع (28) اذ ذكر أن البروتين الكلي لم يتتأثر معنويًا باختلاف شكل الصبغين الجنسي. كما تأثر مستوى الكوليستيرول معنويًا ( $P<0.05$ ) باختلاف شكل الصبغين في كلا النوعين اذ بلغ 142.53 و 137.25 و 139.98 و 151.25 ملغم/ديسيلتر للأشكال عصا الطبال وبروز بدون ساق ودمعة العين والشكل الهراوي بالتتابع وبلغ أقصاه عندما كان شكل دمعة العين سائدا. أما في إث المَعْز المحلبي فقد كان أقصى مستوى للكوليستيرول عندما كان شكل دمعة العين شائعا ( 122.42 ) وهذه النتيجة تتفق مع (28) اذ أوضحت تأثر مستوى الكوليستيرول بصورة معنوية بشكل الصبغين الجنسي وسجل أعلى مستوى له في مجموعة النعاج التي تميزت بتواجد شكل دمعة العين في خلايا الدم البيض (العدلة)، ولم يكن لشكل الصبغين الجنسي تأثيراً معنويًّا في خصاب الدم وحجم الخلايا المرصوصة في إث المَعْز الشامي والمحلبي ولا تتفق هذه النتيجة مع (28) اذ وجدت تأثيراً معنويًّا لشكل الصبغين في حجم خلايا الدم المرصوصة. يمكن الاستفادة من النتائج الحالية في الانتخاب لمثل هذه الصفات الدموية المهمة بتحسينها فعلى سبيل المثال بالنسبة الى تركيز الكوليستيرول فيفضل اث المَعْز الحاملة للصبغين الجنسي نوع دمعة العين.

**الجدول 3. تأثير اشكال الصبغين الجنسي في صفات الدم المدروسة في اث المَعْز الشامي والمحلبي**

إث المَعْز الشامي (العدد 20)						عدد المشاهدات	أشكال الصبغين		
المتوسط ± الخطأ القياسي									
حجم الخلايا المرصوصة %	خضاب الدم	الكوليستيرول (ملغم/ديسيلتر)	البروتين الكلي (غم/ديسيلتر)	الكلوكوز (ملغم/ديسيلتر)					
0.06±22.24 A	0.09 ±7.41 A	AB 2.99±142.53	0.64 ±47.73 A	0.88 ±80.63 A	515	عصا الطبال			
0.25 ±22.39 A	0.08 ±7.44 A	B 2.69 ±139.98	0.57 ±47.01 A	0.81 ±81.72 A	612	بروز بدون ساق			
0.35±23.04 A	0.12 ±7.67 A	A 4.35 ±151.25	0.80±44.49 B	1.04 ±82.00 A	286	دمعة العين			
0.23 ±22.67 A	0.08 ±7.55 A	B 2.79 ±137.28	0.59 ±47.51 A	0.92 ±82.69 A	587	الهراوي			
N.S	N.S	*	**	N.S	---	مستوى المعنوية			
إث المَعْز المحلبي (العدد 20)									
0.57±22.94 A	0.11 ±8.12 A	3.52 ±120.61 A	0.92 ±56.33 AB	2.07 ±92.15 A	580	عصا الطبال			
0.30±22.91 A	0.06± 8.20 A	3.58 ±108.61 B	0.82 ±59.83 A	1.94 ±86.37 A	640	بروز بدون ساق			
0.18±22.79 A	0.08± 8.15 A	3.07 ±122.42 A	0.75 ±52.80 B	1.55 ±86.29 A	260	دمعة العين			
0.49±22.86 A	0.11± 8.20 A	1.64 ±117.60 AB	0.49 ±64.74 A	0.97 ±87.42 A	520	الهراوي			
N.S	N.S	*	*	N.S	---	مستوى المعنوية			

المتوسطات التي تحمل حروفًا مختلفة ضمن العمود الواحد تختلف معنويًا فيما بينها.  
 \*\* ( $P<0.01$ ), \* ( $P<0.05$ ), NS: غير معنوي.

### تأثير اشكال الصبغين الجنسي في معدل الخصب

يبين الجدول (4) أن هنالك تبايناً معنوياً ( $P<0.05$ ) في معدل الخصب باختلاف شكل الصبغين الجنسي، إذ حققت إناث المَعْز الشامي التي شاع في دمها الشكل دمعة العين أقصى معدل للخصب (2.77 مولود/ بطن) تلتها مثيلاتها ذات الشكل الهراوي (2.71 مولود/ بطن)، أما الإناث التي تميزت بصبغين جنسي من نوع بروز بدون ساق أو عصا الطبال فقد حققت خصباً قدره 2.61 و 2.52 مولود/ بطن بالتتابع، أما إناث المَعْز المحلي فيظهر فيه أقصى معدل للخصب (1.72 مولود/ بطن) في الإناث التي شاع في دمها شكل دمعة العين تلتها ذات الشكل عصا الطبال (1.67 مولود/ بطن) أما الإناث التي تميزت بصبغين جنسي من نوع بروز بدون ساق أو الهراوي فقد حققت خصباً قدره 1.52 و 1.48 مولود/ بطن بالتتابع، وهذه النتيجة خالفة ماتوصلت اليه (28) التي بينت معدل الخصب في أعلى مستوىاته لدى النعاج ذات الصبغين الجنسي من نوع بروز بدون ساق (1.46 مولود/ بطن)، كما خالفت ماتوصل اليه (27) بان أعلى معدل للخصب (1.43 مولود للبطن الواحدة) عند النعاج ذات الصبغين الجنسي من نوع بروز بدون ساق في حين كانت النعاج الحاملة للصبغين الجنسي من نوع عصا الطبال الأدنى بمعدل الخصب. تعد صفة الخصب أهم الصفات الاقتصادية وإن تحسينها عن طريق الانتخاب المباشر يُعد بطيئاً وغير مُجدٍ كونها ذات مكافئ وراثي متدين جداً لذا فإن اللجوء إلى الانتخاب غير المباشر هو أحد اهم الوسائل لتحسينها، ومن نتائج هذه الدراسة يمكن اعتماد قياسات الصبغين الجنسي لتحسين معدل الخصب لدى المَعْز. وأن التباين المعنوي بين المَعْز الشامي والمُحلي في صفة الخصب فقد يعزى إلى القابلية الوراثية (التركيب الوراثي) للمَعْز الشامي مقارنة بالمحلي.

الجدول 4. تأثير شكل الصبغين الجنسي في عدد المواليد الناتجة (الخصب عند الميلاد)

إناث المَعْز الشامي(العدد 20)		إناث المَعْز الشامي(العدد 20)		أشكال الصبغين
المتوسط ± الخطأ القياسي للخصب	عدد المشاهدات	المتوسط ± الخطأ القياسي للخصب	عدد المشاهدات	
A $0.03 \pm 1.67$	411	B $0.06 \pm 2.52$	336	عصا الطبال
AB $0.06 \pm 1.52$	443	B $0.05 \pm 2.61$	425	بروز بدون ساق
A $0.06 \pm 1.72$	208	A $0.08 \pm 2.77$	167	دمعة العين
B $0.04 \pm 1.48$	438	A $0.06 \pm 2.71$	426	الهراوي
*	---	*	---	مستوى معنوي
المتوسطات التي تحمل حروفًا مختلفة ضمن العمود تختلف معنويًا فيما بينها * ( $P<0.05$ ).				

### انحدار الصفات الدموية المدروسة على صفات الصبغين الجنسي المقاسة

يبين الجدول (5) معاملات الانحدار لصفة مستوى الكلوكوز على قياسات الصبغين الجنسي، إذ يظهر من الجدول ان معاملات الانحدار على البعد العمودي ومساحة الصبغين سالية وليس لها أي تأثير معنوي، اذ بلغت 20.15- 2.33- 2.33 ملغم/مايكرون مربع لكليهما بالتتابع في إناث المَعْز الشامي، كما كانت سالبة ايضاً وغير معنوية - 2.07- 22.31- 4.56 ملغم/مايكرون و 296.029 ملغم/مايكرون مربع المحلي. ويبلغ معامل الانحدار على البعد الأفقي 4.56 ملغم/مايكرون وعلى مساحة الصبغين/مساحة النواة 3.88 ملغم/مايكرون مربع في إناث المَعْز الشامي، بينما كان الانحدار على الصفتين في إناث المَعْز المحلي 3.88 و 428.582 بالتابع. أما عدد الفصوص فقد كان لها معامل انحدار عالي المعنوية - 6.1 في إناث المَعْز الشامي وبلغ - 4.42 ذو تأثير معنوي عند مستوى معنوية ( $P<0.05$ ) في إناث المَعْز المحلي. هذه النتيجة تتفق مع (28) اذ بينت تأثير مستوى الكلوكوز في النعاج معنويًا بزيادة البعد الأفقي للصبغين الجنسي وكذلك يزيد مستوى السكر في الدم مع زيادة عدد الفصوص في النواة.

الجدول (5) انحدار الكلوكوز على صفات الصبغين الجنسي المقاسة في إناث المَعْز الشامي والمُحلي

معامل التحديد $R^2$	مستوى المعنوية	معادلة الخط المستقيم	معامل الانحدار (b)	الصفات المنحدرة
إناث المَعْز الشامي (العدد 20)				
0.40	*	$Y^a = 54.57 + 4.56(X)$	4.56	بعد الأفقي للصبغين
0.08	Ns	$Y^a = 26.90 - 20.15(X)$	-20.15	بعد العمودي للصبغين
0.73	**	$Y^a = 22.98 - 6.19(X)$	- 6.19	عدد الفصوص
0.20	Ns	$Y^a = 47.12 - 2.33(X)$	- 2.33	مساحة الصبغين
0.04	*	$Y^a = 46.49 + 296.029(X)$	296.029	مساحة الصبغين/مساحة النواة
إناث المَعْز المحلي (العدد 20)				
0.26	*	$Y^a = 47.16 + 3.88(X)$	3.88	بعد الأفقي للصبغين
0.11	Ns	$Y^a = 22.62 - 22.31(X)$	- 22.31	بعد العمودي للصبغين
0.61	*	$Y^a = 28.52 - 4.42(X)$	- 4.42	عدد الفصوص
0.33	Ns	$Y^a = 51.06 - 2.07(X)$	- 2.07	مساحة الصبغين
0.12	*	$Y^a = 42.81 + 428.582(X)$	428.582	مساحة الصبغين/مساحة النواة

\* ( $P<0.05$ ), \*\* ( $P<0.01$ ), Ns: غير معنوي.

## مجلة جامعة كريلاء العلمية – المجلد الثالث عشر - العدد الاول / علمي / 2015

يُظهر الجدول (6) انحدار مستوى البروتين الكلي لدى إناث المَعْز على كل قياسات الصبغين الجنسي المدرسية، وكان الانحدار موجباً وعالياً معنوياً على البعد العمودي للصبغين وعدد الفصوص ومساحة الصبغين / مساحة النواة في حين كان الانحدار معنوياً على البعد الأفقي ومساحة الصبغين أي ان مستوى البروتين الكلي يقل بمقدار 39.20 كلما زادت نسبة مساحة الصبغين/مساحة النواة مائراً واحد. اما بالنسبة لإناث المَعْز المحلي فان معادلات الانحدار كانت معنوية على البعد العمودي والافقي وعدد الفصوص ومساحة الصبغين ونسبة مساحة الصبغين/مساحة النواة. وجاءت النتائج متوافقة مع ماتوصلت اليه (28) إذ بينت أن انحدار البروتين الكلي لدم النعاج على صفات الصبغين الجنسي المقاومة عالية المعونة وكان الانحدار موجباً على جميع صفات الصبغين الجنسي وبمعاملات تحديد متوسطة الى مرتفعة.

**الجدول (6) انحدار البروتين الكلي على صفات الصبغين الجنسي في إناث المَعْز الشامي والمحلبي**

معامل التحديد $R^2$	مستوى المعونة	معادلة الخط المستقيم	معامل الانحدار (b)	الصفات المنحدرة
<b>إناث المَعْز الشامي (العدد 20)</b>				
0.41	*	$Y^8 = 6.77 + 0.526(X)$	0.526 ملغم/مايكرون	البعد الأفقي للصبغين
0.65	**	$Y^8 = 2.83 + 4.302(X)$	4.302 ملغم/مايكرون	البعد العمودي للصبغين
0.74	**	$Y^8 = 3.43 + 0.916(X)$	0.916 ملغم/فص	عدد الفصوص
0.08	*	$Y^8 = 6.62 + 0.533(X)$	0.533 ملغم / مايكرون مربع	مساحة الصبغين
0.04	**	$Y^8 = 6.79 - 39.20 (X)$	- 39.20	مساحة الصبغين/مساحة النواة
<b>إناث المَعْز المحلي (العدد 20)</b>				
0.39	*	$Y^8 = 7.41 + 0.418(X)$	0.418 ملغم/مايكرون	البعد الأفقي للصبغين
0.52	*	$Y^8 = 2.08 + 3.709(X)$	3.709 ملغم/مايكرون	البعد العمودي للصبغين
0.61	*	$Y^8 = 2.85 + 1.067(X)$	1.067 ملغم/فص	عدد الفصوص
0.12	*	$Y^8 = 6.54 + 0.402(X)$	0.402 ملغم/مايكرون مربع	مساحة الصبغين
0.02	*	$Y^8 = 5.91 - 31.96 (X)$	- 31.96	مساحة الصبغين/مساحة النواة

\*. ( $P<0.05$ ), \*\* ( $P<0.01$ ). Ns: غير معنوي.

اما فيما يخص انحدار مستوى الكوليستيرول على قياسات الصبغين في عينات الدراسة فموضحة في الجدول (7)، إذ كان عالي المعونة على البعد العمودي ومساحة الصبغين وعلى نسبة مساحة الصبغين/ مساحة النواة والتي بينت أعلى قيمة بين الصفات الأخرى في حين كان الانحدار معنوياً على عدد الفصوص بينما لم يكن هناك تأثير معنوي للبعد الأفقي في مستوى الكوليستيرول وهذه القيم لم تختلف كثيراً في عينات إناث المَعْز المحلي إذ كانت معاملات الانحدار ذات تأثير معنوي على جميع قياسات الصبغين الجنسي هذه النتيجة تتفق مع (28) اذ ذكرت أن انحدار الكوليستيرول على البعد الافقي والعمودي وعدد الفصوص كان موجباً وعالياً معنوياً.

**الجدول (7) انحدار الكوليستيرول على صفات الصبغين الجنسي في إناث المَعْز الشامي والمحلبي**

معامل التحديد $R^2$	مستوى المعونة	معادلة الخط المستقيم	معامل الانحدار (b)	الصفات المنحدرة
<b>إناث المَعْز الشامي (العدد 20)</b>				
0.10	Ns	$Y^8 = 56.80 - 0.365 (X)$	- 0.365 ملغم/مايكرون	البعد الأفقي للصبغين
0.13	**	$Y^8 = 28.10 - 28.785 (X)$	- 28.785 ملغم/مايكرون	البعد العمودي للصبغين
0.16	*	$Y^8 = 33.48 - 6.11 (X)$	- 6.11 ملغم/فص	عدد الفصوص
0.18	**	$Y^8 = 51.31 - 5.62 (X)$	- 5.62 ملغم/مايكرون مربع	مساحة الصبغين
0.19	**	$Y^8 = 51.19 + 517.17 (X)$	517.17	مساحة الصبغين/مساحة النواة
<b>إناث المَعْز المحلي (العدد 20)</b>				
0.22	Ns	$Y^8 = 59.01 - 0.341 (X)$	- 0.341 ملغم/مايكرون	البعد الأفقي للصبغين
0.08	*	$Y^8 = 25.36 - 22.175 (X)$	- 22.175 ملغم/مايكرون	البعد العمودي للصبغين
0.11	*	$Y^8 = 26.17 - 5.75 (X)$	- 5.75 ملغم/فص	عدد الفصوص
0.07	*	$Y^8 = 54.27 - 5.41 (X)$	- 5.41 ملغم/مايكرون مربع	مساحة الصبغين
0.25	**	$Y^8 = 38.33 + 474.55 (X)$	474.55	مساحة الصبغين/مساحة النواة

\*. ( $P<0.05$ ), \*\* ( $P<0.01$ ). Ns: غير معنوي.

يتضح من الجدول (8) معاملات انحدار صفة خضاب الدم على قياسات الصبغين الجنسي في العينات المدروسة، إذ كان معدل الانحدار لمستوى خضاب الدم على بعد العمودي موجباً وعالي المعنوية لكلا النوعين الشامي 42.703 ملغم/مايكرون والمحلي 44.130 ملغم/مايكرون. بينما كان معامل الانحدار على بعد الأفقي للمعز الشامي 9.919 وللمعز 8.603، ولم يكن عدد الفصوص في خلايا الدم البيضاء أي تأثير معنوي يذكر في إناث المغز الشامي إلا أن التأثير كان معتبراً في إناث المغز المحلي ولبلغ معامل الانحدار -5.674. وبلغ معامل الانحدار لصفة خضاب الدم على مساحة الصبغين 12.608 و 9.539 لإناث المغز الشامي والمحلي بالتتابع. وكان معامل الانحدار على مساحة الصبغين/مساحة النواة موجباً وعالي المعنوية في المغز الشامي إذ بلغ 1568.86 بينما بلغ 977.59 عند مستوى معتبر (P<0.05) لإناث المغز المحلي.

**الجدول (8) انحدار خضاب الدم على صفات الصبغين الجنسي المقاومة في إناث المغز الشامي والمحلي**

معامل التحديد $R^2$	مستوى المعنوية	معادلة الخط المستقيم	معامل الانحدار (b)	الصفات المنحدرة
إناث المغز الشامي (العدد 20)				
0.35	*	$Y^{\wedge} = 139.13 - 9.919(X)$	9.919	بعد الأفقي للصبغين
0.11	**	$Y^{\wedge} = 108.31 - 42.703(X)$	42.703	بعد العمودي للصبغين
0.14	Ns	$Y^{\wedge} = 164.25 + 3.195(X)$	-3.195	عدد الفصوص
0.07	*	$Y^{\wedge} = 138.31 - 12.608(X)$	12.608	مساحة الصبغين
0.14	**	$Y^{\wedge} = 134.2 + 1568.86(X)$	1568.86	مساحة الصبغين/مساحة النواة
إناث المغز المحلي (العدد 20)				
0.26	*	$Y^{\wedge} = 126.62 - 8.603(X)$	8.603	بعد الأفقي للصبغين
0.18	**	$Y^{\wedge} = 93.73 - 44.130(X)$	44.130	بعد العمودي للصبغين
0.07	*	$Y^{\wedge} = 156.07 + 5.674(X)$	5.674	عدد الفصوص
0.08	*	$Y^{\wedge} = 152.91 - 9.539(X)$	9.539	مساحة الصبغين
0.23	*	$Y^{\wedge} = 127.28 + 977.59(X)$	977.59	مساحة الصبغين/مساحة النواة

• \*: (P<0.05)، \*\*: غير معتبر (Ns).

يتضح من الجدول (9) انحدار صفة حجم خلايا الدم المرصوسة PCV على قياسات الصبغين الجنسي، إذ كان هناك انحدار سالب ومعتبر (P<0.05) لحجم خلايا الدم المرصوسة على بعد الأفقي والبعد العمودي إذ بلغت معاملاتها -0.774٪ مايكرون (أي أن حجم الخلايا المرصوسة يقل بمقادير 0.774٪ عند زيادة بعد الأفقي مايكرومتر واحد) و 2.904٪ مايكرون (أي أن حجم خلايا الدم المرصوسة يقل بمقادير 2.904 مل عند زيادة بعد العمودي مايكرون واحد) وانحدار موجب معتبر لحجم الخلايا المرصوسة على مساحة الصبغين/مساحة النواة (أي أن حجم الخلايا المرصوسة يزداد بمقادير 127.27٪ عند زيادة نسبة مساحة الصبغين/مساحة النواة بمقدار واحد) وبمعاملات تحديد بلغت 0.39 و 0.27 و 0.17 وبعد الأفقي والبعد العمودي ومساحة الصبغين/مساحة النواة بالتتابع، ومعاملات التحديد هذه ضعيفة، لكن أفضل معامل تحديد بينها هو بعد الأفقي للصبغين الجنسي والبالغ 0.39 وهذا يعني أن بعد الأفقي للصبغين الجنسي عند اعتماده في برامج الانتخاب لدى وضع استراتيجيات التحسين الوراثي يفسر 39٪ من حجم خلايا الدم المرصوسة، أما انحدار حجم الخلايا المرصوسة على عدد الفصوص فقد كان موجباً وغير معتبر وبلغ معامله 0.034٪/فص، أي أن حجم الخلايا المرصوسة يزداد بمقادير 0.034٪ عند كل فص زيادة على كرية الدم البيضاء الحاملة على الصبغين الجنسي، أما فيما يخص إناث المغز المحلي، فقد كان معامل انحدار صفة حجم خلايا الدم المرصوسة على بعد العمودي وعدد الفصوص ومساحة الصبغين غير معتبر، بينما كانت معاملات الانحدار على بعد الأفقي ومساحة الصبغين/مساحة النواة لها تأثير معتبر . هذه النتيجة متوافقة مع (28) في الأغنام، إذ بينت انحدار حجم خلايا الدم المرصوسة على بعد الأفقي والبعد العمودي ومساحة الصبغين كان على المعنوية وبمعاملات تحديد عالية، بهذه الصفة يمكن اعتماد قياسات الصبغين الجنسي للتنبؤ بحجم الخلايا المرصوسة في دم الماعز.

الجدول (9) انحدار حجم خلايا الدم المرصوصة على صفات الصبغين الجنسي المقاسة في اناث المَعْز الشامي والمحلي

معامل التحديد $R^2$	مستوى المعنوية	معادلة الخط المستقيم	معامل الانحدار (b)	الصفات المنحدرة
اناث المَعْز الشامي (العدد 20)				
0.39	*	$Y^{\wedge} = 33.41 - 0.774 (X)$	- 0.774 /% مایکرون	البعد الأفقي للصبغين
0.27	*	$Y^{\wedge} = 37.06 - 2.904 (X)$	- 2.904 /% مایکرون	البعد العمودي للصبغين
0.10	Ns	$Y^{\wedge} = 29.64 + 0.034 (X)$	0.034 /% فص	عدد الفصوص
0.30	Ns	$Y^{\wedge} = 31.25 - 0.182(X)$	- 0.182 /% مایکرون مربع	مساحة الصبغين
0.17	*	$Y^{\wedge} = 31.47 + 127.27(X)$	127.27	مساحة الصبغين/مساحة النواة
اناث المَعْز المحلي (العدد 20)				
0.22	*	$Y^{\wedge} = 29.62 - 0.551 (X)$	- 0.551 /% مایکرون	البعد الأفقي للصبغين
0.19	Ns	$Y^{\wedge} = 33.19 - 1.328 (X)$	- 1.328 /% مایکرون	البعد العمودي للصبغين
0.17	Ns	$Y^{\wedge} = 30.44 + 0.108 (X)$	0.108 /% فص	عدد الفصوص
0.41	Ns	$Y^{\wedge} = 27.58 - 0.147(X)$	- 0.147 /% مایکرون مربع	مساحة الصبغين
0.09	*	$Y^{\wedge} = 24.27 + 89.55 (X)$	89.55	مساحة الصبغين/مساحة النواة

\* ( $P<0.05$ ) ، \*\* ( $P<0.01$ ) ، Ns: غير معنوي.

#### 4-6 معامل الارتباط

أظهرت نتائج الدراسة الحالية على المَعْز الشامي (الجدول 10) أن الارتباط بين البعد الأفقي للنواة مع كل من البروتين الكلي والكوليستيرول ومعدل الخصب كان معنوياً ( $P<0.05$ ) ، أما البعد العمودي للنواة فقد أرتبط معنويًا مع الكلوكوز والبروتين الكلي والكوليستيرول وسائل عالي المعنوية مع معدل الخصب لذا فالبعد العمودي أهم من الأفقي في حالة الرغبة في اعتماد أحدهما في برامج الانتخاب لتحسين الأداء ولاسيما التناسلي للمَعْز . وكان لمساحة الصبغين أرتباط معنوي ( $P<0.05$ ) مع الكلوكوز والبروتين الكلي والكوليستيرول وخضاب الدم أما ارتباط مساحة الصبغين مع معدل الخصب فقد كان معنويًا، أما ارتباط مساحة الصبغين/مساحة النواة وعدد الفصوص مع معدل الخصب فقد كان معنويًا. أما فيما يخص المَعْز المحلي فقد كان الارتباط بين البعد الأفقي للنواة مع كل من الكلوكوز البروتين الكلي ومعدل الخصب معنويًا ( $P<0.05$ ) ، أما البعد العمودي للنواة فقد أرتبط معنويًا مع الكلوكوز والبروتين الكلي والكوليستيرول وسائل عالي المعنوية مع معدل الخصب. وكان لمساحة الصبغين أرتباط معنوي ( $P<0.05$ ) مع الكلوكوز والبروتين الكلي والكوليستيرول وخضاب الدم وحجم الخلايا المرصوصة، أما ارتباط مساحة الصبغين مع معدل الخصب فقد كان سالبًا وعالي المعنوية ، وكان ارتباط مساحة الصبغين/مساحة النواة وعدد الفصوص مع معدل الخصب معنويًا ، وان صفة عدد الفصوص مهمة في برامج الانتخاب كونها سهلة القياس وبدقّة عالية كما أنها في الوقت نفسه ينجم عن اعتمادها تحسن مهم إحصائيًا في الصفات التناسلية المذكورة أعلاه. وهذه النتائج لانتطابق مع دراسة (14) على النعاج العواسية المحلية اذ كان معامل الارتباط بين الخصب والبعد الأفقي للصبغين (0.59) والبعد العمودي للصبغين (0.08) ومساحة الصبغين الجنسي (0.41) وعدد الفصوص في خلايا الدم البيضاء التي يوجد عليها الصبغين الجنسي(0.18).

الجدول (10) معامل الارتباط بين قياسات الصبغين الجنسي والنواة وكل من الصفات المموية ومعدل الخصب في اناث المَعْز الشامي والمحلي

اناث المَعْز الشامي (العدد 20)						
معامل الخصب	حجم الخلايا المرصوصة	خضاب الدم	الكوليستيرول	البروتين الكلي	الكلوكوز	الصفات
* 0.13 -	0.06 -	0.06 -	* 0.11 -	* 0.10	0.07 -	البعد الأفقي للنواة
** 0.30 -	0.06 -	0.05 -	* 0.09 -	* 0.18	* 0.11 -	البعد العمودي للنواة
0.01 -	0.01 -	0.01 -	0.03 -	0.04	0.01	البعد الأفقي للصبغين
0.05 -	0.01 -	0.01 -	0.04 -	0.01	0.02 -	البعد العمودي للصبغين
0.02 -	0.01	0.02	0.02 -	0.02	0.01	مساحة النواة
* 0.18 -	0.07 -	* 0.09 -	* 0.10 -	* 0.16	* 0.10 -	مساحة الصبغين
* 0.09	0.02	0.02	0.04	0.05 -	0.04	مساحة الصبغين/مساحة النواة
* 0.09 -	0.02	0.02	* 0.19 -	* 0.09	0.07 -	عدد الفصوص

اناث الماعز المحلي (العدد 20)						
* 0.10 -	0.04 -	0.04 -	0.04	*0.14	*0.12 -	البعد الأفقي للنواة
**0.28 -	0.07 -	0.03 -	* 0.11 -	* 0.12	*0.12 -	البعد العمودي للنواة
0.05 -	0.04 -	0.01 -	0.01 -	0.00	0.03	البعد الأفقي للصبغين
0.03 -	0.00	0.04 -	0.07 -	0.03	0.06	البعد العمودي للصبغين
0.04 -	0.05	0.06	0.04 -	0.04-	0.03	مساحة النواة
** 0.33 -	*0.11 -	* 0.11 -	* 0.09 -	* 0.12	* 0.13-	مساحة الصبغين
* 0.11	0.01	0.04	0.02	0.03 -	0.06	مساحة الصبغين / مساحة النواة
* 0.11 -	0.05	0.06	* 0.21 -	* 0.11	0.03 -	عدد الفصوص
(P<0.01) ** (P<0.05) *						

نستنتج من هذه الدراسة بالإمكان تحسين صفة الخصب التي تعد من أهم الصفات الاقتصادية عن طريق الانتخاب غير المباشر واعتماداً على قياسات الصبغين الجنسي ويمكن أيضاً اعتماد قياسات الصبغين الجنسي للتتبؤ بالصفات الدموية .

#### **المصادر :**

- الانباري, نصر نوري والخزرجي, وسن جاسم محمد (2012). دور الصبغين الجنسي في أداء الأغنام العواسية التركية. مجلة الانبار للعلوم البيطرية. المجلد (5). العدد (1).
- القرمة , محمد عبدة قاسم (1999). الخصوبة والخصب لدى الماعز وبعض العوامل المؤثرة فيهما. رسالة ماجستير. كلية الزراعة. جامعة بغداد.
- الجليلي, زهير فخري. وليد عبد الرزاق وعصام احمد عيسى(2001). بعض العوامل غير الوراثية في الخصوبة والخصب لقطيع من الماعز المحلي. المجلة العراقية للعلوم البيطرية. كلية الطب البيطري. جامعة الموصل. المجلد 14. الاصدار (2).(95-106).
- Alexander,G.Aumont,G.Mainaud,J.C, Fleamry, J. and Naves, M. (1999). Productive performance of Guadeloupean Creole goats during the suckling period. Small Rumin. Res. 34: 155-165.
- Crepaldi, P. Corti, M. and Cicogna (1999). Factors affecting on milk production and prolificacy of Alpine goats in Lombardy (Italy).. Small Rumin.Res.32:83-88.
- Reddy, P. L. (2009). Human physiology for dental student. first edition. PP.47
- Dyer, Betsey Dexter. (2009). The basic of Genetics. Wheaton College. I S B N:978-1-4361-6994.
- Strathdee, G., Sim, A. & Brown, R. (2004). Control of gene by expression by CPG island methylation in normal cells. Biochemical Society Transactions, 32 (6): 913-914.
- Okonkwo,J.C.;Omeje,I. S. & Egu, U. N. (2010). Identification of X-chromatin and determination of its incidence in Nigerian goat breeds. Livestock Research for Rural Development, 22.(12).
- Geetha, N. (2009). Text book of physiology for dental student. First Edition. Published by Divyesh arvind kothary for paras medical publisher. I S B N: 978-81-8191-269-5. PP . 45-260.
- زكوه، رائد بنهام (1997). صورة الصبغين الجنسي في الأغنام العواسية. رسالة ماجستير. كلية الطب البيطري. جامعة بغداد.
- الاعرجي، سعد مرزا (2003). دراسات وراثية لسرطان عنق الرحم في النساء. أطروحة دكتوراه. كلية الطب. جامعة بابل.
- العيساوي، مصطفى علي سعود (1998). التغيرات في صفات الكروماتين الجنسي المرافقة لبعض المشاكل التناسلية في الأبقار في العراق. رسالة ماجستير. كلية الطب البيطري. جامعة بغداد.
- العيساوي، علي عبد الامير حمزة (2010). دراسة أشكال وأبعاد الصبغين الجنسي (Sex Chromatin). وعلاقته ببعض الصفات الإنتاجية والتتناسلية للنوع العواسية المحلي. رسالة ماجستير. الكلية التقنية/ المسيب. هيئة التعليم التقني.
- الغازي، مها خالد عبد الكرييم (1999). صورة الصبغين الجنسي في بعض ضروب الدجاج العراقي. رسالة ماجستير. كلية الطب البيطري- جامعة بغداد.
- الخزرجي، عبد الجبار عبد الحميد حمد (1999). الصفات الدمية والكيمياحوية في الماعز المحلي وبعض العوامل المؤثرة فيها وعلاقة تلك الصفات بمظاهر الأداء. أطروحة دكتوراه. كلية الزراعة. جامعة بغداد.
- الشمربي، حيدر رحيم عبيد (2011). التتبؤ بالأداء الإنتاجي والتتناسلي لأبقار الهولشتاين من خلال بعض الصفات الدمية. رسالة ماجستير. الكلية التقنية/ المسيب. هيئة التعليم التقني.
- Mohammad, M. A. (2009). Mineral status in blood serum of new born calves in Assiut Governorate. BS. Vet. Med. J. 19: 51-56.
- Leopold. G. and Koss, M.D. (1968). Diagnostic Cytology and it's Histopathologic basis .2nd edition J.B. Lippincott company. Philadelphia.

20. Nogami, H.; Tsutsuni, H.; Komuro, T. and Mukoyama, R. (2000). Rapid and simple sex determination method from dental pulp by loopmediated isothermal amplification. *Forensic Sci. Int. Genetic.*, 2:349-353.
21. Bhatia, S. and Shanker, V. (1982). Sex chromatin types in leucocytes of Alpines Beetals and their cross breed goat. *Anim. Breed Abst.*, 50 (10):5612.
22. SAS (2010). SAS/STAT User's Guide for Personal Computer. Ver. 9.1 SAS Institute Inc., Cary, NC, USA.
23. Duncan, D. B. (1955). Multiple Range and Multiple Test. *Biometrics*. 11:1-42.
24. Bain, B. J. (2004). A beginners Guide to Blood Cells. 2<sup>nd</sup> Edition. Library of Congress. I.S.B.N: 1-4051-2175.
25. Chhabra, V., Siddiqui, M. S.; Singh, U., Srivastava, A.N., Sahal A. and Sharma, P.K. (2002). Sex Chromatin and primary Amenorrhoea -A correlation study. *J. Anat. Soc. India* 51(2): 145-147.
26. Mittwoch, U. (1974). Sex chromatin in the cell in medical, Beck. F. and Loyed, J. (ed). Academic press, New York, pp.:169-199.
27. الريبيعي، هاشم مهدي عبود والاتباري، نصر نوري والعيساوي، علي عبد الامير حمزه (2011). صفات الكروماتين الجنسي (SexChromatin) . وعلاقتها بالاداء الإنتاجي والتسلسي في الأغنام العواسية. مجلة بابل للعلوم الزراعية. المجلد (21). العدد (9).
28. الخزرجي، وسن جاسم محمد (2011). دور الصبغين الجنسي والوراثة الساينتوبلازمية في أداء الأغنام العواسية التركية. اطروحة دكتوراه. كلية الزراعة. جامعة بغداد.
29. Onuma, H. (1964). Morphological sex-differences in neutrophileucocytes of cattle, horses, swine, goats and rabbits. *Bull. Nat. Inst. Anim. Ind.* 7:29.
30. شبر، عبدالله محمد وعبد الكريم، طلال انور وعيدان، ساجدة مهدي وبنانة، حسام جاسم (2010). القيم الفسلجية الطبيعية لأنواع مختلفة من الحيوانات. نشرة علمية. كلية الزراعة/جامعة بغداد.
31. Miresan V. (2003). evaluation of the main blood indices in signal fattening sheep. *Journal of Central European Agriculture (online)*, Vol. 4, No 4: 405-410.
32. Tambuwal FW, Aggaie BM and Bangara (2002). hematological and biochemical values of healthy apparently healthy fed sokoto goats, proceeding of 22<sup>nd</sup> Conf. Nigerian Soc. Anim. Prod., March, 17-21.
33. Ahmed, N. and Noakes, D.E. (1996). Sexual maturaty in British breeds of goats kids. *British Veterinary Journal*, 152: 93-103.
34. Ganong, W.F. (2003). Review of medical physiology. 21<sup>st</sup> ed., Lange-nor walk Connecticut, Los Angles. 214-217.