



Formation of Genetically Transformed Hair Roots of Chamomile (*Matricaria chamomilla* L.,) Plants By Ri-Plasmid Vector of *Agrobacterium rhizogenes* ATCC 15834 Molecular

Aala Moath Ibrahim⁽¹⁾ , Amjad Abdul-Hadi Mohammed⁽²⁾ 

^(1,2) Department of Biology, College of Science, University of Mosul, Mosul, Iraq.

Article information

Article history:

Received: March 30, 2024

Accepted: July 16, 2024

Available online: September 01, 2024

Keywords:

Chamomile Plant
Genetic Transformation
Plasmid Vector Ri
PCR.

Correspondence:

Aala Moath Ibrahim

aalaa.23scp147@student.uomosul.edu.iq

Abstract

This study succeeded in developing hairy roots from the hypocotyledonous stems of chamomile *Matricaria chamomilla* L. plant seedlings by Ri plasmid isolated from *Agrobacterium rhizogenes* ATCC 15834 using direct injection technology, and exceeding the concentration 1214.32 In encouraging the development of hair roots by 80% after 7 day. After isolating the hair roots from their places of formation and placing them individually or as tufts on solid Murashige and Skoog (MS) medium, typical cultures were produced and required subcultured every 25 One day, the hair roots were characterized by being white, branched, and growing negative geotropism. The results of electrophoresis on an agarose gel of the isolated polymerase chain reaction (PCR) product, which included the amplification of deoxyribonucleic acid (DNA), showed the appearance of a single band with a molecular size of 248 bp, which is similar to the molecular size of the specific primer of the *rol A* gene, and this is evidence of the success of the transformation. Genetic analysis by transferring T-DNA genes from plasmids and inserting them into the cell genome of seedlings of the chamomile plant.

DOI: [10.33899/edusj.2024.148175.1436](https://doi.org/10.33899/edusj.2024.148175.1436), ©Authors, 2024, College of Education for Pure Science, University of Mosul.

This is an open access article under the CC BY 4.0 license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

1. المقدمة

يقصد بالتحول الوراثي تضمين جين جديد داخل جينوم كائن حي آخر [1]، لإحداث تغيير مطلوب في صفاته الوراثية والبيولوجية. يعد التحول الوراثي استراتيجية مهمة لتعزيز الكتلة الحيوية النباتية أو المقاومة لاستجابةً للبيئات المعاكسة [2]. وهناك العديد من طرق التحول الوراثي في النبات أهمها استخدام الاكروبيكتريوم *Agrobacterium* [3] هي بكتريا سالبة لصبغة كرام، تعيش في التربة، عسوية الشكل، غير مكونة للسبورات، تمتلك اسواطاً ومتحركة، عضوية التغذية، تتراوح درجة حرارة نموها المثلى بين 25-29 سيليزية PH من 6-8 [4]

وتعود بكتريا الاكروبيكتريوم الى عائلة Rhizobiaceae والتي تضم نوعين مهمين في مجال التحول الوراثي، الاول هو *A. rhizogene*: المسؤول عن تكوين الجذور الشعرية hairy root لامتلاكها الناقل البلازميدي Ri (Root- inducing plasmid) [5] والثاني *A. tumefaciens* والمسؤول عن تكوين العقد التاجية Crown galls التي تكون بشكل اورام لوجود الناقل البلازميدي Ti (Tumor inducing plasmids) [6] يحتوي الناقل البلازميدي Ri منطقة Transffer –DNA (T-DNA) والتي تحوي جميع الجينات المسؤولة عن احداث عملية التحول الوراثي للنباتات بانتقالها طبيعياً الى الخلية النباتية المجروحة واندماجها داخل جينومها ثم التعبير الجيني لها وظهور اعراض الاصابة بظهور الجذور الشعرية [8] [7] هذه العملية تنتشط ببعض المواد الفينولية المفروزة مثل Acetosyrigone [9]. ويتميز التحول الوراثي باستخدام بكتريا الاكروبيكتريوم بسهولة اجرائها ونجاحها على أنواع مختلفة من النباتات كالبروكلي *Brassica oleracea* var *italica* [10]، زهرة الشمس *Helianthus annuus* L. [11]، فول الصويا *Soy bean* [12]، الفجل *Raphanus sativus* [13]. ونجحت الدراسة التي قام بها الباحثون في احداث التحول الوراثي لنبات البابونج الالمانى ببكتريا *Agrobacterium rhizogenes*، وأبدت الجذور الشعرية وكالسها المحولة وراثياً توفراً في تراكيز المركبات الثانوية المهمة للنباتات عن تلك غير المحولة [14].

يعود نبات البابونج *Matricaria chamomilla* L. الى العائلة النجمية Asteraceae [15]، وهو نبات عشبي حولي ارتفاعه 50-60 سم. وتعود الاهمية الطبية لنبات البابونج إلى وجود بعض المركبات النشطة في أنسجته والتي لها تأثير معين على جسم الإنسان والحيوان، ويحوي زيتة خصائص مضادة للالتهابات،

مضادات للتشنج، مضادات للاكسدة، [16] أن الجزء الفعال من نبات الباونج هي الأزهار [17]. تهدف الدراسة الحالية الى إخضاع نبات الباونج *Matricaria chamomilla L.* لنظام التحول الوراثي بواسطة *A. rhizogenes ATCC 15834* بطريقة التلقيح بالحقن المباشر باستخدام *needle* دقيقة (insulin syring) وإنتاج مزارع الجذور الشعرية والتأكد من نجاحه جزئياً.

2. مواد العمل وطرقه

إنتاج بادرات الباونج *Matricaria chamomilla L.* :

جهزت بذور الباونج *Matricaria chamomilla L.* من الاسواق المحلية لمدينة الموصل العراق و عقت سطحياً بغمرها في محلول الكحول الايثيلي 96% لمدة دقيقتين مع التحريك المستمر. ثم غمرت في 2% من محلول هيبوكلورات الصوديوم NaOCI (الفاصر التجاري) لمدة 5 دقائق. وغسلت بالماء المعقم ثلاث مرات \ دقيقة ووضعت على ورق الترشيح لغرض التجفيف . وضعت البذور في قنار سعة 100 مل تحتوي 30 مل من وسط MS الصلب بمعدل 4-5 بذور [14]. وغلفت فواتها بواسطة رقائق الألمنيوم ثم حفظت العينات في غرفة الزرع Culture room بطوروف الظلام بدرجة حرارة 24 ± 2 سيليزية وبعد انبات البذور (ظهور الجذير والرويشة) الذي استغرق أربعة ايام نقلت الى ظروف التعاقب الضوئي 16 ساعة ضوء 8/ ساعات ظلام اضاءة شدة 400 لوكس.

تحضير لقاح الناقل البكتيري *Agrobacterium rhizogenes ATCC 15834* :

جهزت السلالة البكتيرية *Agrobacterium rhizogenes ATCC 15834* من مختبر زراعة الانسجة النباتية في قسم علوم الحياة/ كلية العلوم/ جامعة الموصل والمجهزة اساساً من (Prof.Dr.Jutta Ludwig-Mueller, Technical University Dresden, Germany) واخذت مستعمرة بكتيرية منفردة منها لقح منها 20 مل من الوسط Yeast Extract Beef medium (YEB) السائل ضمن قنار معقمة وحضنت العينات في الحاضنة الهزازة (New Brunswick Scientific So., INC. Edison, N.G. USA) في الظلام في درجة 28 سيليزية وسرعة 130 دورة / دقيقة لمدة 24, 48, 72 ساعة كل منها في قنينة منفردة. نبتت كل منها باستخدام جهاز الطرد المركزي (Centrifuge, Labnet international, Inc. Glopal. USA) لمدة 15 دقيقة وسرعة 1500 دورة / دقيقة. أهمل الراشح واضيف حجم من وسط YEB السائل الى البكتريا المترسية. واخذ 1.5 مل من كل مزرعة بكتيرية سائلة ومن الوسط السائل لتصفير الجهاز. ثم قيست الكثافة الضوئية O.D عند الطول الموجي 600 نانو متر باستخدام المطياف الضوئي (Rad, USA Smartspece 300 Spectrophotometer, Bio) لكل منهما وكانت كثافتهما في المليلتر واحد (1.111، 1.241، 0.952 خلية/ مل) على التوالي [18] واستخدمت هذه المزارع لاحقاً في عملية عزل البلازميدات. حيث تم عزل بلازميدات pRi- DNA من السلالة البكتيرية *A. rhizogenes ATCC15834* بأخذ 1.5 مل من المزارع البكتيرية *A. rhizogenes ATCC15834* السائلة والتي تم تحضيرها مسبقاً للفترة 24, 48, 72 ساعة ووضعت بصورة منفردة في أنبوبة ايندروف وأجريت خطوات عزل البلازميد بالاعتماد على الطريقة المتبعة من قبل [19]. تم الكشف عن تراكيزه بواسطة جهاز النانودروب (Spectrophotometer, Bio drop, England) بطول موجي 206-280 نانومتر [20] والتي كانت 1159.24, 1214.32, 1113.12 نانوغرام مايكرووليتز⁻¹ على التوالي. ومن ثم حفظ البلازميد في ظروف 4 درجة سيليزية لحين الاستعمال.

تلقيح قطع السيقان تحت الفلقية للباونج

أخذت بادرات الباونج النامية وقطع سيقانها 25 يوم بطول 1.5 سم تقريبا ولقحت بالحقن المباشر باستخدام *needle* دقيقة (insulin syring) التي سبق وان غمرت قمتها بالمعلق البلازميدي , ووخزت قطع السيقان عند النهايات العليا وجوانبها. ولقحت عينات المقارنة بالماء المقطر المعقم ثم غمرت قواعدها بشكل قائم داخل وسط MS الصلب وحضنت جميع العينات في حاضنة النمو تحت ظروف اضاءة خفيفة 400 لوكس وبدرجة حرارة 24 ± 2 سيليزية.

انتاج مزارع الجذور الشعرية :

استؤصلت الجذور الشعرية المتكونة في مواقع التلقيح ونقلت منفردة او بشكل خصل بطول 3-4 سم ووضعت في أطباق بتري تحوي 20 مل من وسط MSO الصلب. ثم وضعت في غرفة الزرع وبنفس الظروف السابقة.

اثبات التحول الوراثي بدلالة التفاعل التسلسلي البوليميرازي (PCR) :

تضمنت استخلاص الحمض DNA من انسجة الجذور الشعرية المتوقع تحولها الوراثي بواسطة الناقل البلازميدي Ri المعزول ذات التركيز 1214.32 نانوغرام مايكرووليتز⁻¹ اتبعها قياس تركيزه ونقاوته باستخدام جهاز النانودروب ومن ثم الترحيل الكهربائي للعينات في الاكاروز (Agarose, LE, Analytical %1) Grade, promega, USA) وحاوي على صبغة (safe Gel stain Dye, Add bio, Korea) وبظروف تيار كهربائي ذي فرق جهد 80 فولت لمدة ساعة. اتبعها تصوير الهلامية بجهاز Geldo cumetation (Bio Rad, USA) Gel Doc EZ Imager) لرؤية الحزم المفصولة، وضخم DNA بواسطة التفاعل التسلسلي البوليميرازي باستخدام البادئ المتخصص للجين *rol A* ذي الحجم الجزيئي 248bp وذي التسلسل: 3'-CGTTGTGCGAATGGCCAGACC-5', R=5- CGTAGGTCTGAATATTCCGGTCC-3. بأعتماد البروتوكول المتبع [21] والمتكونة من ثلاث مراحل: الاولى: المسخ عند درجة حرارة 95 ° سيليزية لمدة 15 دقيقة، الثانية: 35 دورة رئيسية لكل منها ثلاث مراحل ثانوية (الاولى: المسخ عند 95 ° سيليزية لمدة دقيقة واحدة ، الثانية: الارتباط عند 55 ° سيليزية لمدة دقيقة والثالثة: الامتداد عند 72 ° سيليزية لمدة دقيقة واحدة)، الثالثة: الرئيسية هي الاستطالة النهائي عند 72 ° سيليزية لمدة 15 دقيقة. ومن ثم اتباع الخطوات السابقة من الترحيل الكهربائي والتصوير.

3. النتائج والمناقشة

انتاج البادرات المعقمة :


أبدت طريقة التعقيم السطحي لبذور الباونج نجاحها بدلالة الحصول على بذور معقمة بنسبة انبات وصلت 90% منتجة بادرات سليمة خالية من الملوثات عند زراعتها في وسط MS الصلب الخالي من منظمات النمو. وغالبا ما تقاس كفاءة تعقيم البذور من عدم تلوثها بعد زراعتها على الوسط الغذائي وانباتها بادرات ذات حيوية جيدة لاستخدامها لاحقا [22].

نشوء استحثاث الجذور الشعرية من قطع السيقان تحت الفلقية لبادرات نبات الباونج *Matricaria chamomilla L.* الملحقة بالناقل البلازميدي pRi أظهرت النتائج كفاءة الناقل البلازميدي Ri المعزول من بكتريا *A. rhizogenes ATCC15834* في تشجيع تكوين الجذور الشعرية من قطع السيقان تحت الفلقية عند حقنها المباشر وبنسب متباينة بالاعتماد على اختلاف تراكيز البلازميد المستخدم (الجدول، 1).

الجدول (1): نشوء استحثاث الجذور الشعرية من قطع السيقان تحت الفلقة المفصولة من بادرات البابونج *Matricaria chamomilla* L. الملقة بالناقل البلازميدي Ri لبكتريا *A.rhizogenes* ATCC15834 بعد 28 يوم

فترة تكوين الجذور الشعرية (يوم)	عدد الجذور الشعرية/ قطعة	تكوين الجذور الشعرية (%)	اعداد قطع السيقان الفلقة الملقة/ المستجيبة	تركيز الناقل البلازميدي Ri (نانوغرام مايكروليتر ⁻¹)
7	18	80	72\90	1214.32
20	12	50	45\90	1159.24
28	5	35.55	32\90	1043.12
0	0	0	0\40	D.W (المقارنة)

وتظهر بيانات الجدول أعلاه تفوق التركيز 1214.32 نانوغرام مايكروليتر⁻¹ في استحثاث الجذور الشعرية من قطع السيقان تحت الفلقة للبادرات بنسبة 80% بعد 7 أيام من التلقيح بدأت بظهور بروزات بيضاء صغيرة في أماكن التلقيح ثم بزوغ الجذور الشعرية (الشكل، A-1) والتي تطورت لاحقاً بالنمو والتفرعات وبشكل كبير رافقها تكوين أفرع خضرية (الشكل، B-1) بأعداد بلغت معدلها لكل قطعة ساق ملقة 11 ويطول 3.2 سم بعد 25 يوم من التلقيح. ثم يليه تراكيز الناقل البلازميدي 1159.24 و 1043.12 نانوغرام مايكروليتر⁻¹ في تحفيز للجذور الشعرية وصلت 50%، 48% على التوالي.



الشكل(1): نشوء الجذور الشعرية من سيقان وأوراق التحت الفلقة للبادرات نبات البابونج *Matricaria chamomilla* L. الملقة بالناقل البلازميدي Ri لبكتريا *A.rhizogenes* ATCC15834 بتركيز 1214.32 نانوغرام مايكروليتر⁻¹.

- A- استحثاث الجذور الشعرية بعد 7 أيام من التلقيح.
B- تطور الجذور الشعرية بكثافة وظهور الأفرع الخضرية بعد 25 يوم من التلقيح.

ويعود نجاح التحول الوراثي في النبات الى نجاح انتقال البلازميدات وتحمل أنسجة نبات البابونج لعملية التلقيح [23]. وبعد ظهور الجذور الشعرية اولى علامات التحول الوراثي وبدورها تشير الى نجاح انتقال جينات T-DNA من الناقل البلازميدي لبكتريا الاكروبيكتريوم الى الخلية النباتية ومن ثم تضمينه داخل جينومها ونجاح التعبير الجيني الى مظاهر المرض النباتي وهو الجذور البيضاء. وعادة تبدأ مراحل مهاجمة بكتريا *A. rhizogenes* للخلايا النباتية المجروحة والأخيرة تفرز مركب الأسيتوسيرنجون Acetosyringone وبعض الجزيئات السكرية التي تعمل على تنشيط تشفير مجموعة جينات *vir* إلى بروتينات متعددة تكون لها المسؤولية عن خطوات التحول الوراثي، إذ تتبنى فصل جزيئة T-DNA من بلازميدات Ri وانتقالها إلى الخلايا النباتية ومن ثم تضمينها داخل جينومها [9] [3].

ويُعد أحداث الجرح في الخلايا النباتية مفتاحاً للبدء بعملية التحول الوراثي، وتعتبر طريقة الحقن المباشر احد طرقها المتبعة مختبرياً والتي أثبتت نجاحها في التحول الوراثي مع اغلب الانواع النباتية ومنها البنجر السكري[24]، الجزر[25]، اللهانة [25]، البروكلي [26]. ان الاختلال الهرموني الذي تسببه الجينات المحمولة على جزيئة T-DNA والتي من المرجح ان يستمر تعبيرها الجيني ربما هي السبب في تكوين الافرع الخضرية من امكان التلقيح وكذلك الى التعبير للجينات المسؤولة عن بناء الساييتوكاينينات *tmr* [27][28].

إنتاج مزارع الجذور الشعرية :

نجحت الجذور الشعرية المتكونة على قطع السيقان تحت الفلقية نتيجة تلقحها بتركيز 1214.32 نانوغرام مايكروليتر⁻¹ من بلازميدات Ri عند استئصالها ووضعها منفردة او بهيئة خصل على سطح وسط MS الصلب في استمرار نموها وزيادة تفرعاتها وسليبيتها للانتحاء الارضي وتكوينها مزارع من الجذور الشعرية والتي تطلبت اعادة زراعتها كل 25 يوماً.




الشكل(2): إنتاج مزارع الجذور الشعرية المفصولة من قطع السيقان تحت الفلقية لبادرات البابونج *Matricaria chamomilla L.* الملقحة بتركيز 1214.32 نانوغرام مايكروليتر⁻¹ بالنائل البلازميدي Ri لبكتريا *A.rhizogenes ATCC15834* بعد 25 يوم.

ان استمرار نمو الجذور الشعرية المحولة وراثياً بعد وضعها على وسط MS الصلب قد يُعزى الى طول اجزائها المرستيمية وزيادة معدلات انقسامها [29]. او الى الاختلاف في مجاميع الخلايا المصابة والاعداد المستجيبة ومدى التداخل الناجح بين الجزء النباتي وتوافقها مع تركيز اللقاح البلازميدي [30].

الدليل الجزيئي لنجاح التحول الوراثي للجذور الشعرية الناتجة بالنائل البلازميدي Ri:

تشير النتائج إلى أن تركيز الحمض النووي الكروموسومي المستخلص من الجذور الشعرية بلغ 423 وبنقاوة 1.7, واثبت صورة الترحيل الكهربائي لنتائج PCR ظهور حزمة واحدة (الشكل، 3) بلغ حجمها الجزيئي 248pb وهو مماثل للحجم الجزيئي للبادئ المستخدم لجين *rol A* وهذا يعد دليلاً على نجاح التحول الوراثي بفعل انتقال الجين من البكتريا الى أنسجة البابونج ونجاح التعبير الجيني لها مما أدى إلى ظهور الجذور الشعرية وإحداث تقلبات المتمثل بزيادة نموها وإنتاج الافرع الخضرية [31]. إن اعتماد اختبار PCR على مستوى الجينات وتواجدها في جينوم النبات يعطي دلالة جزيئية على تواجدها. وهذا وجد في عدد من النباتات ومنها الجزر [25]، البروكلي [10] ، الحلبة [32]، الفجل [13].



الشكل(3): الترحيل الكهربائي لنتائج التفاعل التسلسلي البليميرازي للحمض النووي الضخم والمعزول من الجذور الشعرية المحولة وراثيا لنبات البابونج *Matricaria chamomilla* L. ببلازميدات Ri لبكتريا *A. rhizogenes* ATCC15834 في هلام الاكاروز 1% في هلام الاكاروز 1%

الاستنتاجات

- نجاح تضمين جينات T-DNA في جينوم خلايا نبات البابونج باستخدام الحقن المباشر لبلازميدات Ri بدلا من البكتريا الكاملة
- الحصول على الجذور الشعرية محولة وراثياً دليل نجاح التحول الوراثي واثباتها جزيئياً باستخدام PCR
- وفر استخدام البلازميدات المعزولة ذاتها لاحداث التحول الوراثي غياب التلوث في المزارع النسيجية
- أحتفاظ الجذور الشعرية بجينات rol

شكر وتقدير

يتقدم الباحثون بالشكر والامتنان لجامعة الموصل\ كلية العلوم على التسهيلات المتوفرة والتي ساعدت على انجاز هذا البحث.

المصادر

- [1] Wilson, R.H.C. and Coverley, D "Transformation-induced changes in the DNA-nuclear matrix interface, revealed by high-throughput analysis of DNA halos". Sci. Repts., 7 (1): 1-7, 2017.
- [2] Varasteh-Shams, M.; Nazarian-firouzabadi, F. and Ismaili A. "The direct and indirect transformation methods on expressing a recombinant dermaseptin peptide in tobacco transgenic hairy root clones". Curr. Plant Biol., 24: 100177 ,2020 .
- [3] Keshavareddy, G. ; Kumar, A.R.V. and Ramu, V.S.." Methods of Plant transformation- A review". Int. J. Curr. Microbiol. App. Sci., 7(7): 2656-2668,2018.
- [4] Flores-Félix, J. D. ; Menéndez, E.; Peix, A. ; García-Fraile, P. and Velázquez, E.." History and current taxonomic status of genus *Agrobacterium*. Systematic and Appl". Microbiol., 43(1): 126046, 2020.
- [5] Lee, S.Y. ; Kim, S.G ; Song, W.S. ; Kim, Y.K. ; Park, N. I. and Park, S.." Influence of different strains of *Agrobacterium rhizogenes* on hairy root induction and production of alixarin and purpurin in *Rubia okana nakai*". Roman. Biotech. Lett., 15: 5405-5409, 2010.
- [6] Gohlke, J. and Deeken, R.." Plant responses to *Agrobacterium tumefaciens* and crown gall development", Frontiers in Plant Sci., 5: 155, 2014.
- [7] Niazian, M; Belzile, F; and Torkamaneh, D.. "CRISPR/Cas9 in Planta Hairy Root Transformation: A Powerful Platform for functional analysis of root traits in soybean". Plants., 11(8), 1044, 2022.
- [8] Bahari, Z. ; Sazegari, S. ; Niazi, A. and Afsharifar, A. ,"The application of an *Agrobacterium*-mediated in planta transformation system in a *Catharanthus roseus* medicinal plant. Czech J. Genet. Plant.Breed., 56(1): 34-41 BMC Plant Biology 23 (1), 659, 2020.
- [9] Gelvin, S.B." *Agrobacterium* in the genomics age", Plant Physiol., 50: 1665-1676, 2009.

- [10] AL-Hadidy, S.J.S. , "Genetic transformation of broccoli plant with via Ri plasmids isolated from two strains of *Agrobacterium rhizogenes* and its Reflection in sulforaphane compound levels" , MSc. Thesis/ Department of Biology/ College of Science/ University of Mosul/ Iraq, 2020.
- [11] AL-Sinjiri ,A.M.H., " Efficiency the *Helianthus annuus* plant tissues which genetically transformed with *Agrobacterium rhizogenes* ATCC 15834 in phytoremediation.M.Sc", thesis, Department of Biology/ College of Science/ University of Mosul, 2022.
- [12] Fan, Y. L. ; Zhang, X. H. ; Zhong, L. J. ; Wang, X. Y. ; Jin, L. S. and Lyu, S. H. , "One-step generation of composite soybean plants with transgenic roots by *Agrobacterium rhizogenes*-mediated transformation", BMC plant Biol., 20(1): 1-11, 2020.
- [13] Mohammed, A.A., "Efficiency the hairy roots of radish (*Raphanus sativus*) plant which genetic transformed by *Agrobacterium rhizogenes* ATCC 15834 for anthocyanin production. Eurasia", J. Biosci., 14: 6437-6441, 2020.
- [14] Yuling, T. ; Jie, Z. ; Youhui, C. ; Yi, Y. ; Honggang, W. ; Luyao, Y. ; Shuangshuang, L. ; Lu, Y. and Yifan, J. , "Establishment and validation of a callus tissue transformation system for German chamomile (*Matricaria chamomilla* L.)" BMC Plant Biol 23, 659. <https://doi.org/10.1186/s12870-023-04680-3>, 2023.
- [15] Shams, A.; Abadian, H.; Akbari, G.; Koliai, A.; Zeinali, H. , "Effect of organic and chemical fertilizers on Amount of Essence, biological yield and harvest index of *Matricaria chamomile*". Ann. Biol. Res., 3(8): 3856- 3860, 2012.
- [16] Riona Kimura, Jonathan Schwartz and Elliott Bennett9 , "Guerrero Journal Herbal Medicine", 100714, 2023.
- [17] Astin, J.A; Pelletier, K.R. ; Marie, A. and Haskell, W.L., "Complementary and Alternative medicine use among elderly persons: One year analysis of Blue Shield medicare supplement", J. Gerontol., 55:M4–M9, 2000 .
- [18] Atlas, R. M.; Brown, A. E. and Parks, L. C. , "Laboratory Manual, Experimental Microbiology". Mosby-Year Book, Inc, USA, 1995.
- [19] Sambrook, J.; Fritschi, E.F. and Maniatis, T., " Molecular Cloning: A Laboratory Manual", Cold Spring Harbor Laboratory Press, New York, USA, 1989.
- [20] Dhahi, S.J. ; Al-Assie, A.H. and Omeear, H.A., " Application of the randomly amplified polymorphic DNA (RAPD) marker to analyze the genetic variability in species of the fungus *Alternaria*", Raf. J. Sci., 22(1): 1-16, 2011.
- [21] Rahimi, K.; Haghbeen, K.; Marefatjo, J.; Jazii, F.R. and Sheikhani, R., " Successful production of hairy root of *Valeriana sisymbriifolium* by *Agrobacterium rhizogenes*" Biotech., 7(2): 200-204, 2008.
- [22] Sen, M. K.; Jamal, M. A. H. and Nasrin, S. "Sterilization factors affect seed germination and proliferation of *Achyranthes aspera* cultured *in vitro*", Environmental and Experimental Biology, 11, 119-123, 2013.
- [23] Clement, W.K.F.; Lai, K.S.; Wong, M.Y. and Maziah, M. , "Heat and hydrolytic enzymes treatment improved the *Agrobacterium*-mediated transformation of recalcitrant indica rice (*Oryza sativa* L.)" Plant Cell, Tiss. Org. Cult., 125(1): 183–190, 2016.
- [24] Al-Mallah, M. K. and Al-Nema, Q. S. , "Putative genetically modified callus derived from transformed hairy roots induced on sugarbeet (*Beta vulgaris*) explants by *Agrobacterium rhizogenes* 1601 harbouring Riplasmid", Iraqi J. Biotech., 11(2), 4, 2016.
- [25] Al-Mallah and M K and Amjad Abdel Hadi , "A new method for genetic exploration of marine plants using the vector *Agrobacterium rhizogenes* R1601". Patent No.: 5641, Central Organization for Quality Standardization, Baghdad, Iraq, 2019.
- [26] Sultan, S. J. and Mohammed, A. A. "Genetic sultformation of broccoli (*Brassica oleracea* Var. *italica*) plant by plasmids of *A. rhizogenes* R1601 and their molecular detection". Biochem. Cell. Arch., Accepted, 2020.
- [27] Faiss, M.; Zalubilová, J.; Strnad, M. and Schmülling, T. "Conditional transgenic expression of the *ipt* gene indicates a function for cytokinins in paracrine signaling in whole tobacco plants" The Plant J., 12(2), 401-415, 1997.
- [28] Jordi, W.; Schapendonk, A. H.; Davelaar, E.; Stoop, G. M.; Pot, C. S.; De Visser, R. and Amasino, R. M. "Increased cytokinin levels in transgenic PSAG12–IPT tobacco plants have large direct and indirect effects on leaf senescence, photosynthesis and N partitioning", Plant, Cell and Environment, 23(3), 279-289, 2000.
- [29] Meyer, A.D.; Tempé, J. and Costantino, P. "Hairy root: A molecular overview". Plant Microbe Inter., 5: 1-39, 2000.
- [30] Hu, Z.B and Du, M. "Hairy root and its application in plant genetic engineering". J. Integrative Plant Biol., 48, 121–127, 2006.
- [31] Ткаченко, А. А.; Додуева, И. Е.; Творогова, В. Е.; Предеус, А. В.; Правдина, О. Ю.; Кузнецова, К. А. and Лутова, Л. А. "Plant Genetics, Genomics, Bioinformatics, and Biotechnology (Plant Gen2021): The 6th International Scientific Conference (June 14–18, 2021, Novosibirsk, Russia); In Plant Genetics, Genomics, Bioinformatics, and Biotechnology: The 6th International Scientific Conference, 2021.
- [32] Mohammed, A. A. ; Masyab, H. M. "Genetic transformation of *Nigella sativa* L. plants with *Agrobacterium rhizogenes* 35S *GUS* R1000 and estimation of Thymoquinone level in transformed hairy roots cultures". Plant Archives, 20 (Supplement 1): 3649-3652, 2020.

التحول الوراثي لنبات البابونج *Matricaria chamomilla* L. بالناقل البلازميدي Ri لبكتريا *Agrobacterium rhizogenes* ATCC 15834 والتحري عنه جزئياً

الاء معاذ ابراهيم يونس¹ ، امجد عبد الهادي محمد²

^{1,2} قسم علوم الحياة, كلية العلوم, جامعة الموصل, العراق

الخلاصة

نجحت هذه الدراسة في استحداث الجذور الشعرية من قطع السيقان تحت الفلقية لبادرات نبات البابونج *Matricaria chamomilla* L. بالناقل البلازميدي Ri المعزول من *Agrobacterium rhizogenes* ATCC 15834 (طرق) ببقانة الحقن المباشر، وتكون التركيز 1214.32 نانوغرام مايكروليتر¹ في تشجيعه استحداث الجذور الشعرية بنسبة 80% بعد 7 ايام. وبعد فصل الجذور الشعرية من اماكن تكويتها ووضعها منفردة أو بهيئة خصل على وسط Murashige and Skoog (MS) الصلب انتجت مزارع نموذجية وتطلبت اعادة زراعتها كل 25 يوماً وتميزت الجذور الشعرية بأنها بيضاء اللون متفرعة وتنمو ضد الجاذبية الارضية. أظهرت نتائج الترحيل الكهربائي في هلام الاكاروز لنتائج التفاعل التسلسلي البوليميرازي Polymerase chain reaction (PCR) المتضمنة تضخيم الحمض النووي الكروموسومي (DNA) Deoxyribonucleic acid (DNA) المعزولة ظهور حزمة مفردة حجمها 248 bp وهو مماثل حجم اللبادئ المتخصص لجين *rol A*، وهذا يعد دليل نجاح التحول الوراثي عن طريق نقل جينات T-DNA من البلازميدات وادخالها في جينوم الخلايا لبادرات نبات البابونج *Matricaria chamomilla* L.