

## **Improvement of rooting in cuttings of two varieties of *Nerium oleander* L.**

### **تحسين استجابة تجذير عقل صنفين من الدفله**

ابراهيم مرضي راضي  
جامعة بابل/ كلية العلوم / قسم علوم الحياة

عبدالله ابراهيم شهيد  
جامعة بابل/ كلية العلوم / قسم علوم الحياة

#### **المستخلص :**

اجريت تجارب هذا البحث في ظلة و مختبرات كلية العلوم /جامعة بابل ، وذلك لتحسين استجابة تجذير صنفين من الدفله (دفله ابيض ودفله وردي) 0 حيث تمت دراسة ثمانية عشر معامله من افضل النتائج الايجابيه التي تم الحصول عليها من الدراسات السابقة وكانت معدلات النسبة المئويه للعقل المجدزه في الصنف الابيض (7.41%) والصنف الوردي (22.59%) 0 كما اشارت النتائج الى صعوبة مطافه في تجذير الدفله صنف ابيض عن غياب الاوكسين المجهز من الخارج حيث كانت النسبة المئويه للعقل المجدزه 0.00% وصعوبه محدوده في تجذير الصنف الوردي (6.76%) ،وان اعلى نسبة مئويه للتجذير للصنفين الابيض والوردي كانت مع التوليفه IBA+O-coumaric acid حيث كانت 33.33% و 60.00% على التوالي 0

اثبت الفحص الحيوي Bioassay (الكشف الاحيائي لعقل الماش[1]) لمفرزات عقل الدفله الابيض والوردي ان مفرزات عقل الدفله الابيض تحتوي على المثبطات من خلال خفض استجابة تجذير عقل الماش الى النصف حيث كشفت (8.40) جذر مقارنة بالسيطره (15.50) جذر 0 اما عقل الماش المعامله بمفرزات عقل الدفله الوردي فقد كانت استجابتها (16.80) جذر مساويه تماما للسيطره من الناحيه الاحصائيه 0 وللتقليل او منع تأثير المثبط الموجود في مفرزات العقل فقد تم تجهيز الاوكسين IBA ضمن توليفه مع مفرزات الدفله الوردي والابيض، حيث كشفت عقل الماش المعامله بـ(مفرزات الدفله الابيض + IBA+) تقريبا نصف عدد الجذور (37.50) مقارنة بالسيطره اي الاوكسين لوحده (71.10) جذر، بينما كشفت مع توليفه (مفرزات الدفله الوردي + IBA+) (58.50) جذر وهو الى حد ما مساوي الى (82.20%) من السيطره 0

#### **Abstract:**

Research experiments were performed in the Lath and laboratories of Faculty of Science / University of Babylon, to improve rooting response of White and pink oleander . Eighteen treatments were used depending on the best positive results that have been obtained from previous studies.The percentage of rooted cuttings of white oleander (7.41%) and pink oleander (22.59%) . Results also indicated that absolute difficulty in rooting of white oleander in the absence of supplied IBA ( 0.00%) ,while a limited difficulty rooting in pink oleander (6.76% ) .However the highest percentage of rooting for the two varieties white and pink with combination ( IBA + O-coumaric acid) were 33.33% and 60.00% respectively.

The bioassay of white and pink oleander exudates proved that , the exudate of white oleander contain inhibitors by reducing rooting response of mung bean to half ( 8.40 )roots compared to control (15.50) root . Whereas, the mung bean cuttings treatment with pink oleander exudate was developed( 16.80) roots which equal statistically to control .Moreover, to reduce or prevent inhibitors effects that present in cuttings exudate the later has been supplied with IBA within combination with exudate of pink and white oleander. The cuttings of mung bean that treated with (white oleander exudate + IBA) developed almost half the number of roots (37.50) compared to control with auxin alone (71.10) root,whereas with a combination (pink oleander exudate + IBA) developed( 58.50) roots which was somewhat equivalent to ( 82.2%) of the control.

**Key words :** cuttings , difficult-to-root cuttings, exudates , mung bean, oleander , ornamental, rooting response .

**المقدمة :**

بعد التكاثر الخضري للنباتات بالعقل احد المفاتيح المركزية في الممارسات الزراعية والبستانية على النطاقين التطبيقي والاكاديمي مما يجعل هذه الممارسات ذات قدره هائله على انتاج نباتات ذات تركيب وراثي متجانس ومنحدره من اصل نباتي واحد منتخب [2] وقد اصبحت هذه الممارسة واحدة من اكبر الممارسات القياسية لتكثير الكاكاو في جميع جزر الهند الغربية وغرب افريقيا وكذلك الفهود في كل من الهند وجاوه وافريقيا وامريكا الاتينيه قبل الخمسينيات من القرن الماضي [3] 0 ومن اهداف التكاثر الخضري للنباتات بالعقل هي المحافظه على النقاوه الوراثيه (Genetic purity) للنبات الاصل المنتخب [4] 0 اذ ان النباتات الناتجه تكون ذات صفات وراثيه متجانسه مقارنه بالطريقه الجنسيه التي تكون نباتات خليطة التركيب نتيجه لحصول تغيرات على المدى البعيد [5] ومن فوائد التكاثر الخضري الاخر هي التغلب على ظاهره العقم والحصول على انتاج كمي ونوعيه عاليه بزيادة على تكثير بعض النباتات عديمه البذور والت Barker في الحال ومقاومة بعض الامراض[6] 0

ومن الملاحظ ان عقل الكثير من النباتات التي يصعب طبيعيا تجذير عقلها لاستجيب الى المعامله الاوكسجينيه المستحبه، مثال على ذلك النفاخ والبلبل الانكليزي (English ivy) (Conifers) والعديد من المخروطيات (Conifers) والبعض الاخر يستجيب بنسبة ضئيله جدا [7] 0 قد يعود السبب في صعوبة تجذير بعض النباتات الى الاسباب التاليه :

**أ)- غياب او قلة بعض المواد الازمه لعملية التجذير منها:**

1- الاوكسجين الداخلي (IAA) : ويتمكن التغلب على هذه الحاله باضافه او تجهيز الاوكسجينه المستحبه بالمره مثل على ذلك عقل البرتقالي 0 ولكن يبدو ان بعض النباتات لا تستجيب عقلها لمثل هذه المعامله الاوكسجينيه المستحبه بالمره مثل على ذلك عقل اللالنكي (NAA) مع Citrus reticulate L (IBA) مع Citrus sinensis L (NAA, IBA) مع Citrus grandis L (NAA, IAA) 0 ان هذا قد يعود الى عوامل اخرى غير اووكسجينيه كالعوامل المرافقه في التجذير 0 2- العوامل المرافقه في التجذير Rooting Co-factors والتي تتكون بشكل خاص في الاوراق [9] والبراعم [10] والفلق [11]، بعضها مشخص وبعضها الاخر غير مشخص 0

ويمكن التغلب ميدانيا على نقص العوامل المرافقه للتجذير بطرقين: الاولى / تجهيز العوامل المرافقه المشخصه لوحدها او مع الاوكسجين 0

الثانيه / تجهيز العوامل المرافقه غير المشخصه على هيئة مستخلصات مائيه لاجزاء بعض النباتات سهلة التجذير من خلال مبدأ احتواها على نسبة عاليه من هذه العوامل [12]، حيث استخدم الاخيران مستخلصات الينسون (Pimpinella anisum) والجنبيه (Cardaria draba) لتحسين عقل النارنج (Citrus aurantium) تمثلت بزياده تساوي 200 % عن عينة السيطره 0

ب)- المعوقات التشريحيه Anatomical barriers: وتشمل وجود حزم سكلرنكيميه Sclerenchyma bands وقنوات Resin canals افرازيه Secretary canals، تعيق ظهور الجذور حتى في حالة نشوئها ويمكن معالجه هذه الحاله باستخدام اسلوب التجريح Wounding ( ) بهدف كسر الحلقه السكلرنكيميه في موقع التجريح وبالتالي تسهيل ظهور الجذور من هذه المواقع حيث اشارت الدراسات التي قام بها [13] و [14] و [15] الى ان ضعف قابلية التجذير في النباتات الخشبيه صعبه التجذير يعود الى وجود الحلقه السكلرنكيميه 0

ج) - وجود بعض المواد المتبشه للتجذير في قواعد العقل، حيث وجد [15] ان مستخلص عقل البيكان الساقيه الخشبيه يحتوي على مواد مثبطه للتجذير 0

د) - قد تعرض العقل اثناء المعامله الاوكسجينيه المستحبه للاجهاد التاكسدي مما يشجع العقل على تحفيز الميكانيكيات الدفاعيه المضاده للاكسده بنوعيها الانزيميه واللانزيميه 0

**المواد وطرائق العمل :**

**1- مصدر العقل Source of cuttings**

اختارت عقل الدفله بتاريخ 17/2/2014 من اشجار الامهات الخاليه من الامراض والحشرات المزروعة في مشتل الطهماري التابع لمديرية بلدية بابل بطول 12-15 سم وقطر يتراوح بين (1.0-0.5) سم تحتوي على زوج من الاوراق (بعد ازالة النصف الطليق من كل ورقه) وعلى الاقل عقتان مع برعم ورقي ثابت عند كل عقه [16] وقطعت من الاسفل تحت العقد مباشرة ومن الاعلى قطع مائل، فضلا عن معاملة العقل بالماء المشجعه للتجذير بعد قطعها مباشرة لمدة 24 ساعه في cabinet 0 [17]

**2- زراعة العقل Cultivation of cuttings**

زرعت العقل بعد معاملتها بالمحاليل لمدة 24 ساعه في صناديق بلاستيكية سوداء اللون متبقيه بابعاد (25×17×8 سم) ومبطنه ببنابلون متبقي من الاسفل ايضا (لترشيح الماء الفائض) تحتوي على بيت موس وزميج نهري بنسبة 1:1 وعوامل وسط النمو بمبيده فطري روبن 5% بمعدل (50-25) غم/م<sup>2</sup> لمنع تعفن قواعد العقل، ووضعت الصناديق في الظله الخشبيه التابعه الى كلية العلوم / جامعة بابل بعد ريها ريه كافيه واعيد الري كل ثلاثة ايام طيلة مدة التجربه [18] ، تم انهاء التجربه بتاريخ 0 2014/5/17

### **3-تجريح العقل Cuttings Wounding**

عمل 4 شقوق في الجزء القاعدي من العقله وبطول 3 سم من الاعلى الى الاسفل خارج منطقة الخشب ثم غطست قواعد العقل المجرحة بطول 3 سم في محلول الاختبار لمدة 24 ساعه 0

### **5- تحضير المحاليل : Preparation of Solutions**

- محلول الاوكسين (IBA) Indol butyric acid : استخدم محلول الاوكسين الصناعي Synthetic Indole Butyric Acid (IBA) [19] في كمية قليلة من الكحول الاثيلي المطلق Absolute Alcohol بحيث يكون تركيز الكحول النهائي 2% . إن هذا التركيز من الكحول غير مؤثر في عملية تكوين الجذور العرضية [20] ويكمي الحجم النهائي للخزین إلى 200 مل ماء مقطر ( تركيز الاوكسين  $10^{-2}M$  )، بعدها حضرت تراكيز IBA المطلوبه من الخزین وهي  $5 \times 10^{-4}M$  (عندما يجهز بشكل منفرد ) و  $M \times 10^{-3}$  اي  $[2 \times (5 \times 10^{-4})]$  عندما يجهز ضمن توليفه ثلاثيه 0
- محلول حامض الابسيسيك اسيد ABA : استخدم محلول الابسيسيك اسيد بتركيز  $10^{-4} \times 5$  مولر اثناء المعامله [21] حيث يذاب 0.2643 غم من ABA باضافة كمية قليله من الكحول الاثيلي ويكمي حجم الخزین الى 1000 مل ماء مقطر ك محلول اساس ( تركيز  $10^{-3}$  ) ، ثم حضرت التراكيز المطلوبة من الخزین [22] . وهي  $5 \times 10^{-4}M$  للمعاملات المنفردة و  $[2 \times (5 \times 10^{-4})]$  اي  $10^{-3}$  للتوليفه المزدوجه 0
- محلول O-coumaric acid : استخدم محلول O-Coumaric acid بعد اذابة 0.0821 غم من الماده المذكوره باضافة كمية قليله من الكحول الاثيلي ويكمي الحجم للخزین الى 50 مل ماء مقطر لتحضير  $10^{-2}M$  كخزین 0 ثم حضرت التراكيز المطلوبه وهي  $M \times 10^{-3}$  للمعاملات المنفردة و  $M \times 10^{-3}$   $2 \times 10^{-3}$  للمعاملات المزدوجه من محلول الاساس 0
- محلول Cysteine : استخدم محلول Cysteine وذلك باذابة 0.303 غم من الـ Cystein في الماء المقطر ويكمي الحجم للخزین الى 250 مل ماء مقطر لتحضير  $10^{-2}M$  كخزین ، ثم حضرت التراكيز المطلوبه وهي  $M \times 10^{-3}$   $5 \times 10^{-4}M$  للمعاملات المنفردة و  $M \times 10^{-3}$   $2 \times 10^{-3}$  للتوليفات المزدوجه 0
- محلولSucrose : استخدم محلول السكروز بتركيز 6 % (w/v) حيث اذيب 6 غرام سكروز بالماء المقطر ويكمي الحجم الى 100 مل ماء مقطر واستخدم للمعاملات المنفردة وبتركيز 12 % للمعاملات المزدوجه حيث اذيب 12 غم في 100 مل ماء مقطر [23] 0
- محلول Ascorbic acid : استخدم محلول Ascorbic acid بتركيز 750ppm وذلك باذابة 0.375gm من الماده المذكوره في الماء المقطر واكمي الحجم الى 250 مل ماء مقطر لتحضير محلول الاساس بتركيز (1500 PPm) ، ثم حضرت التراكيز المطلوب للتلويه المزدوجه بتركيز (1500ppm) وللمعامله المنفرده بتركيز ( 750ppm ) [24] 0
- تحضير المستخلصات المائية: تم استخدام بذور نبات الجنبيه ( Whitetop ) و يسمى ايضا ( hoary cress ) الاسم العلمي ( Cardaria L.) يعود الى العائله الصليبيه ( Brassicaceae ) و رايزيومات نبات الزنجبيل(Ginger)الاسم العلمي ( Zingiber officinale Roscoe ) مصدرها لتحضير المستخلصات المائية على النحو التالي:  
أخذ 1 غم من الاجزاء النباتيه المذكوره اعلاه الحاويه على المواد الفعاله 0 طحنت هذه الاجزاء بمطحنه كهربائيه واكمي الجم النهائي الى 100 مل من الماء المقطر اذ يكون التركيز النهائي 1 غم ماده جافه/ 100 مل ماء مقطر ( w/v %1 ) . ثم وضعت في خلاط كهربائي لغرض اذابة المركبات في الماء المقطر . وبعدها رشحت من خلال ثلاث طبقات من الشاش cloth Cheese . ينقل الرشاح الى قمع بخنر ويرشح من خلال ورق الترشيح Whatmann,No,1 باستخدام مفرغ هوائي Vacuum للحصول على مستخلص بالتركيز اعلاه كخزین Stock ثم خف لتحضير التراكيز المطلوبه ( 0.02 % ) من الجنبيه [12] و الزنجبيل المفعول ( رايزيومات الزنجبيل  $(NH_4)_2SO_4$  + 0.02 % ) [23] 0 رايزيومات الزنجبيل المفعول كيميائيا:  
تم تفعيل مستخلص رايزيومات الزنجبيل تركيز 0.02 % وذلك من خلال اضافة مركبات نتروجينيه مثل كبريتات الامنيوم  $(NH_4)_2SO_4$  { بتركيز 0.05 % } [23] .
- ملاحظه : في التوليفات المزدوجه يضاعف التركيز ويختزل الحجم الى النصف لكل ماده قبل المزج 0 بينما في التوليفات الثلاثيه يضاعف التركيز 3 مرات مع اختزال الحجم الى الثلث لكل ماده قبل المزج 0

## **6- معاملة قوا عد العقل *Cutting basal treatments***

عولمت الأجزاء القاعدية للعقل بمحاليل الاختبار وذلك بوضع عقل كل معامله ( 15 عقله ) في بيكر زجاجي حجم 500 مل يحتوي على محلول الاختبار وحفظت لمدة 24 ساعه تحت ظروف قياسيه في growth cabinet ( ضوء مستمر ذات شده ضوئيه تساوي 1500-1800 لوكن ودرجة حراره 25\_+1م° ورطوبه نسبيه 60-70% )

7- تم جمع مفرزات عقل الدفله الابيض والوردي في او عيه بلاستيكه حجم 500 مل حاویه على الماء المقطر او IBA ارتفاع 3 سم خلال 24 ساعه في ال Growth cabinet ، ثم اخذ 30 مل من المفرزات بعدها جهزت المفرزات الى عقل الماش لمدة 24 ساعه ثم نقلت العقل الى وسط التجذير (حامض البوريك تركيز 0.005 غم /لترا) وبعد 6 يوم من المعامله تم حساب عدد الجذور ولمعرفة الفعالیه الحيويه التجفيفيه او الشبيطيه لهذه المفرزات تم استخدام عقل الماش كطريقه للفحص الحيوي Bioassay بدلاًه تكونين الجذور العرضيه من عقل الماش [1] باعتبارها سهلة وسريعة 0

### **النتائج والمناقشه**

يشير الجدول (1) الى تاثير المعاملات الفيزيو-كيميائيه المختلفه في النسبة المئويه للعقل المجذره لصنفي الدفلة الابيض والوردي 0 حيث تبين ان عقل الدفله من الصنف الابيض غير مجذره بالكامل عند غياب الاوكسجين المجهز من الخارج (المعامله بالماء المقطر وهي السيطره) حيث كانت النسبة المئويه للعقل المجذره 0.00 % بينما كانت النسبة المئويه للتتجذير في عقل الدفله من الصنف الوردي 6.67 % مما تشير النتائج اعلاه الى صعوبة مطلقه في تجذير الدفله /الصنف الابيض والصعوبه المحدوده في تجذير الدفله /الصنف الوردي 0 وبهدف كسر الصعوبه المطلقه لعقل الدفله في الصنف الابيض وكذلك الصعوبه المحدوده في الصنف الوردي وتحسين القابليه على التجذير تم استخدام ثمانية عشر معامله من افضل النتائج الايجابيه التي تم الحصول عليها من الدراسات السابقة والمتعلقه باستجابة التجذير في عقل الماش الطريه والمعمره حيث ان فهم اسباب ظاهره التعمير(عدم/ قلة الاستجابه للاوكسجينات ) والسيطره عليها بالطرق الفيزيائيه والكيميائيه يعد مفتاحاً لمعرفة اسباب عدم او صعوبة تجذير بعض الانواع النباتيه وخصوصاً الخشبيه منها[25]

ومن خلال ما هو معروف عن اولوية الاوكسجينات في استحثاثها لتكوين الجذور العرضيه في العقل ، بين الجدول اعلاه ان تجهيز الاوكسجين IBA لعقل صنفي الدفله قد تسبب في استجابة التجذير بدلاًه النسبة المئويه الى 6.67 % في الصنف الابيض وحفر 33.33 % في الصنف الوردي اما بقية المواد التي جهزت للعقل كانت على هيئة -أ- عوامل مرافقه مشخصه ذات طبيعة

مختلفه شملت Sucrose و Ascorbic acid و Cystiene و O-Coumaric acid و ABA و 0

ب- عوامل مرافقه غير مشخصه جهزت على هيئة مستخلصات مائيه شملت مستخلص الجنيره (Whitetop extract) ومستخلص الزنجبيل المفعول كيميائيا ( Activated ginger )- استخدام الطريقه ذات الطابع الفيزيائي وهي عملية التجريح (Wounding )- توليفات من جميع المواد اعلاه مع IBA و كانت النتائج المتعلقة بالصنف الابيض صعب التجذير كالاتي :- المعاملات التي لم تستحث استجابة للتتجذير على الاطلاق تمثلت بالممواد التاليه: O-Coumaric و Sucrose و ABA و 0 و Wounding acid فضلا عن التوليفات المكونه من IBA مع Sucrose ABA والـ (Wounding ) حيث كانت الاستجابه 0.00 % اما المعاملات التي استحثت بالحد الادنى ( 6.67 % ) تمثلت بالاتي :- Cysteine ، مستخلص الجنيره ، مستخلص الزنجبيل المفعول والتوليفات من IBA مع (الزنجبيل المفعول و Cysteine و AsA ) و ما هو جدير بالذكر، فإن المعاملات التي تسببت في استحثاث عالي وعلى درجه من المعنويه (على مستوى 5% ) ووصلت الى حد مقبول على المستوى الاقتصادي او ما يسمى بتحسين استجابة التجذير وبنسبة تساوي ( 33.33 % ) تمثلت بالـ AsA لوحده اضافة الى التوليفه المشكله من ( O-Coumaric acid + IBA ) فضلا عن نسبة اقل من ذلك ( 20.00 % ) تمثلت بالتوليفه (مستخلص الجنيره + 0) (IBA +

هذا ومن جانب اخر ، فان النتائج المتعلقة بالصنف الوردي فكانت جميع المعاملات محفزه باستثناء ABA و- O- coumaric acid حيث كانت الاستجابه 0.00 % ، ولكنها بدرجات متفاوتة ما بين 6.67 % لـ AsA و Sucrose و مستخلص الجنيره وكذلك الـ Wounding و 20.00 % للتوليفات المتمثله بالـ (IBA + ABA ) و (IBA + Cysteine ) و (IBA+ ASA ) و 26.67 % و 33.33 % لمستخلص الزنجبيل المفعول والتوليفه (IBA+ مستخلص الجنيره ) و 40.00 % للتوليفه (IBA + Sucrose ) او (IBA + Wounding ) و 46.67 % للتوليفه (IBA + الزنجبيل المفعول ) فضلا عن اعلى درجه من الاستحثاث 60.00 % والمتمثله بالتوليفه (O-Coumaric acid + IBA ) 0

ومن جانب اخر،فإن افضل العوامل المساهمه للتتجذير والتي جهزت بمفردتها لعقل الصنف الوردي كانت هي Activated ginger حيث حفز نسبة تجذير 33.33 % وهي مساویه بالضبط للاستجابه لـ IBA تليها 26.67 % لـ Cysteine ، بينما زادت من استجابة تجذير العقل عندما جهزت ضمن توليفات مع IBA وصلت اقصاها مع O-Coumaric acid 40.00 % مع Sucrose و 46.67 % مع الـ Activated ginger و 60.00 % واقل من ذلك 0.00 % مع ABA . حيث كانت نسبة التجذير هي 46.67 % مع الـ Activated ginger و 33.33 % مع مستخلص الجنيره و مع الـ Wounding من اخرى فضلا عن تحقيق 33.33 % مع مستخلص الجنيره 0

ان صعوبة تجذير عقل الدفله قد يعود الى عدة اسباب منها اولا ) : وجود المثبطة [15] التي لونت الماء ومحاليل الاوكسجين باللون الاصفر الفاتح -الذهبي خلال معاملة العقل بمحاليل الاختبار ( لمدة 24 ساعه ) والتي تم الكشف عن تثبيطها لنشوء الجذور العرضيه في عقل الماش (جدول 0/2) ثانيا ) – المعوقات التشريحيه Anatomical barriers والتي قد تكون بهيئة حلقة سكليرنكميه او قنوات افرازيه او راتنجيه , تعيق تكشاف الجذور حتى في حالة نشوء ها [13] و [14] و [15] والتي سيتم الكشف عنها في البحث اللاحقه 0 ثالثا ) : فلة المحتوى الاوكسجيني [25], حيث تم التاكد من انخفاض مستوى IAA الحر (Free) وكذلك المرتبط (Bond) في اوراق وسيقان اشجار الامهات للصنف دفله ابيض مقارنة بزيادة مستوى IAA في الصنف الوردي , حيث تزامن ذلك مع زيادة فعاليه انزيم IAA-O في اوراق وسيقان الامهات للصنف الابيض مقارنة بانخفاضها في الصنف الوردي (نتائج غير معروضه) الا ان المعامله التي جهز فيها الاوكسجين (IBA) قد حفظت النسبة المؤovie للتجذير الى 33.33% في الصنف الوردي (سهله التجذير) بينما لم يتسبب في استحثاثها التجذير سوى 6.67 % فقط في الصنف الابيض (صعب التجذير) مما يؤكذ صعوبة التجذير قد تعود الى سبب اخر غير الاوكسجين ولو جزيئيا وهو العوامل المرافقه 0 رابعا ) : فلة العوامل المرافقه للتجذير Rooting co- factors والتي تكون على نوعين بعضها مشخص والآخر غير مشخص وماهو معروف من المشخص كالاحماض الامينيه والمركيبات الفينولييه والـ Polyamin وذات الطبيعة المعدنيه كالـ  $\text{Ca}^{++}$  وذات الطبيعة الهرمونيه كالـ ABA , الا ان مااستخدم في هذه التجربه لم يكن مؤثرا في استحثاث التجذير كالـ Sucrose و O-Coumaric acid 0 اما غير المشخص والذي جهز بهيئة مستخلصات مائيه كالجنبيره والزنجبيل المفعول , فقد كان منها الزنجبيل المفعول لوحده عند التركيز 0.01 % او ضمن توليفه (الزنجبيل + IBA) قد تسبب في استحثاث 6.67 % في الحالتين في عقل الدفله الابيض بينما كانت 33.33 % في الصنف الوردي للزنجبيل المفعول لوحده او حتى توليفه مع ABA وعلى الرغم من ان افضل الاستجابات قد تمثلت بالـ AsA لوحده (33%) في الصنف الابيض وكذلك بالتوليفات المتشكله من الـ IBA مع O-Coumaric acid مره 33.33% او مع الجنبيه مره اخري (20.00%) والتي تسببت في زياده النسبة المؤovie للتجذير 399 % 399% على التوالى عن السيطره ( IBA لوحده ) 0 انها جميعا اي التوليفات اعلاه قد حفظت معنويا زياده عن الاستجابة للاوكسجين IBA عندما يجهز بمفرده 0 مما يؤكذ انه على الرغم من اولويه الاوكسجين IBA على عملية تكوين الجذور العرضيه الا انه لايعمل لوحده اي بغياب Co-factor في العقل صعبه التجذير 0 وان الزيادة المعنويه الناتجه عن اضافة الـ O-Coumaric acid و AsA او الجنبيه مع الاوكسجين في ان واحد ماهي الا عوامل مرافقه للتجذير بعضها غير مشخص (كما في الجنبيه ) او بعضها الاخر كعوامل مضاده للاكسده كما في AsA و O-coumaric acid 0 و كذلك الحال مع Cysteine Glutathione من خلال تحوله الى GSH (GSH-AsA Cycle [26]) دوره كمضاد اكسده لانزيمي في الميكانيكيه الدفاعيه المضاده للاكسده وخصوصا GSH-AsA Cycle بالاضافه الى ماقدم , فقد بيانت الدراسه الحاليه انخفاض مستوى AsA وكذلك البرولين في اوراق اشجار امهات الصنف الابيض مقارنة بالوردي باعتبارها من مضادات الاكسده اللا-انزيميه(نتائج غير معروضه) 0

جدول ( 1 ) : تأثير المعاملات الفيزيو- كيميائيه في النسبة المؤovie للعقل المجدره لصنفي الدفله الابيض والوردي (%) 0

Treatments	Species		Means
	White Oleander	Pink Oleander	
Water	0.00	6.67	3.33
IBA , $5 \times 10^{-4}\text{M}$	6.67	33.33	20.00
ABA , $5 \times 10^{-4}\text{M}$	0.00	0.00	0.00
O-Coumaric acid, $10^{-3}\text{M}$	0.00	0.00	0.00
Cysteine , $5 \times 10^{-3}\text{M}$	6.67	26.67	16.67
Sucrose , 6%	0.00	6.67	3.33
Ascorbic acid , 750 ppm	33.33	6.67	20.00
Whitetope extract ,0.02%	6.67	6.67	6.67
Activated ginger ,0.02%	6.67	33.33	20.00
Wounding	0.00	6.67	3.33
IBA( $5 \times 10^{-4}\text{M}$ ) +ABA( $5 \times 10^{-4}\text{M}$ )	0.00	20.00	10.00
IBA( $5 \times 10^{-4}\text{M}$ )+O-Coumaric acid( $10^{-3}\text{M}$ )	33.33	60.00	46.67
IBA( $5 \times 10^{-4}\text{M}$ )+Cysteine( $5 \times 10^{-3}\text{M}$ )	6.67	20.00	13.34
IBA( $5 \times 10^{-4}\text{M}$ )+Sucrose(6%)	0.00	40.00	20.00
IBA( $5 \times 10^{-4}\text{M}$ )+Ascorbic acid(750ppm)	6.67	20.00	13.34
IBA( $5 \times 10^{-4}\text{M}$ ) +Whitetop(0.02)	20.00	33.33	26.67
IBA( $5 \times 10^{-4}\text{M}$ ) +Activated ginger(0.02%)	6.67	46.67	26.67
IBA( $5 \times 10^{-4}\text{M}$ ) +wonding	0.00	40.00	20.00
Means	7.41	22.59	
L.S.D. 5%	1.475	4.424	

يشير الجدول (2) الى الفحص الحيوي Bioassay لمفرزات عقل الدفله الابيض والوردي من خلل تاثيرها في استجابة تجذير عقل الماش (Mung bean bioassay) [1] حيث تبين ان عقل الماش المعامله بالماء المقطر قد كشفت 15.50 جذر في العقله الواحد وهذا يعزى للاوكسجين الداخلي IAA بينما الاوكسجين المجهز من الخارج IBA فقد استحوت اربعة اضعاف ونصف عدد الجذور (71.10) مقارنة بمعاملة السيطره 0

ومن جانب اخر ، فان معاملة عقل الماش بمفرزات عقل الدفله الابيض (على هيئة مستخلص مائي ناتج من حفظ عقل الدفله في الماء المقطر لمدة 24 ساعه) قد خفض استجابة التجذير الى النصف اي بما يقرب من اختزالها الى 50 % حيث كشفت 8.40 جذر مقارنة بالسيطره (0) اما عقل الماش المعامله بمفرزات عقل الدفله الوردي فقد كانت استجابتها 16.80 جذر مساويه تماما للسيطره (15.50) جذر من الناحيه الاحصائية وبعبارة اخري لم تتأثر بمفرزات عقل الدفله الوردي وكاستنتاج فان عقل الدفله الوردي على مايبدو لم تتضمن مفرزاتها مواد مثبطة كما هو عليه في عقل الدفله الابيض 0

ولتنقلي او منع تاثير المثبط الموجود في مفرزات العقل فقد تم تجهيز الاوكسجين IBA ضمن توليفه مع مفرزات الدفله الوردي والابيض (اي حفظ عقل الدفله بالـ IBA اثناء تحرر المفرزات ) وتبيين ان عقل الماش قد خفضت استجابتها الى النصف عند التوليفه المتكونه من الـ IBA مع مفرزات الدفله الابيض حيث كشفت عقل الماش تقريبا نصف عدد الجذور (37.50) مقارنة بالسيطره اي الاوكسجين IBA لوحده (71.10) جذر 0 بينما توليفه IBA مع مفرزات الدفله الوردي لم تتأثر معنويآ قد خفضت 17.80 % من الاستجابه (وبعبارة اخري قد تشير الى نسبة تواجد المثبطات في الدفله وردي ) حيث كشفت عقل الماش (58.50) جذر وهو الى حد ما مساوي الى 82.20 % من السيطره (الاوكسجين لوحده = 71.10) ، وما هو ملفت للنظر فان هذه النتائج قد توکد وجود المثبطات في مفرزات عقل الدفله الابيض اثرت في عمل الاوكسجين (كمحفز) لتكوين الجذور العرضيه في عقل الماش 0 ان التاثير التثبيطي لمفرزات الدفله الابيض بدلالة خفض الاستجابه الى النصف تقريبا قد يعزى الى عدة احتمالات منها:

1 - وجود المثبطات في المفرزات العائده لعقل الدفله الابيض مما خفضت استجابة عقل الماش الى النصف (في حالة عدم تجهيز IBA اي ان تاثيرها كان داخل عقل الماش بعد حصول Uptake للمثبطات الموجوده في مفرزات عقل الدفله الابيض 0 مما قد يشير الى منع انتقال IAA المخلق في الاوراق للجزء القاعدي بعد حصول الـ Uptake او منع تخليق IAA في الاوراق قبل انتقاله قاعديا)

2- تجهيز عقل الماش بتوليفه من IBA مع مفرزات الدفله الابيض قد خفض استجابة عقل الماش الى النصف تقريبا مما يشير الى حصول اعاقه لامتصاص IBA من قبل المثبطات (خارج العقل) او كبديل حصول حالة تضاد Antagonism بين المثبطات الموجودة في المفرزات و IBA المجهز بعد حصول Uptake لكليهما 0

3- قد يعزى الى حصول Conjugation بين المثبطات والـ IBA مما خفض من تاثير IBA 4- قد يعزى الى حصول منافسه بين المثبطات والـ IBA على مستلمات الاوكسجين (Auxin – receptor) الموجوده في غشاء البلازمما مما خفض من تاثير الـ IBA 0 وبالتالي سيكون الاستنتاج النهائي هو ان صعوبة تجذير عقل الدفله الابيض قد يعود ولو جزئيا، الى وجود المثبطات Inhibitors والتي تتحرر على هيئة مفرزات Exudates الى الخارج من الجزء القاعدي للعقل بينما عقل الدفله الوردي لاتحتوي (او تحتوي على كميه قليله) مفرزاتها على مواد مثبطة لذلك تكون سهلة التجذير 0

جدول (2): تاثير مفرزات عقل الدفله (الابيض) و(الوردي) بوجود وغياب الاوكسجين IBA في استجابة تجذير عقل الماش 0

Treatments	Mean Roots number / cutting
Distilled water	15.50
White oleander exudate	8.40
Pink oleander exudate	16.80
IBA , $10^{-4} M$	71.10
IBA+ White oleander exudate	37.50
IBA+Pink oleander exudate	58.50
L.S.D.5 %	5.78

تم جمع مفرزات عقل الدفله الابيض والوردي في اوعيه بلاستيكية حجم 500 مل حاويه على الماء المقطر ارتفاع 3 سم خلال 24 ساعه في الـ Growth cabinet، ثم اخذ 30 مل من المفرزات بعدها جهزت المفرزات الى عقل الماش لمدة 24 ساعه ثم نقلت العقل الى وسط التجذير (حامض البوريك تركيز 0.005 غم /لتر) وبعد 6 يوم من المعامله تم حساب عدد الجذور 0

**المصادر: References**

- 1-Hess, C.E.(1961). The mung bean bioassay for detection of root promoting substances. *Plant Physiol.*,36(1):suppl. 21.
- 2-شهيد, عبدالله ابراهيم (1980) الفعل المتبادل بين الاوكسجين والسياتوكينين ودورهما في نشوء ونمو الجذور العرضية والبراعم في عقل نبات الفاصوليا *phaseolus vulgaris L.* رسالة ماجستير 0 جامعة بغداد 0
- 3-Fiester, D.R.(1975).Revision de literature sobre propagation a sexual De cafeperestacas.Turrialba.7:57.(Cited by Van Overbeek).
- 4-Hansen , J.(1975).Light dependent promotion and inhibition of root formation by gibberellic acid .*Planta*, 123:203-205.
- 5-Salisbury, F. B., & Ross, C. (1985). Plant Physiology . 3<sup>rd</sup> ed. Wads Warth Publishing Co. Inc. Belmont. California.P.157.U.S.A.
- 6-Chaturvedi ,O.P.;Th ,N.A and Das, D.K.(1996).Vegetative propagation of *Acacia auriculiformis* by stem cuttings Forst far.Comm.Tree- Resea,Repor.,1:2-6.
- 7-Geneve R.L.(1990).Root formation in cuttings of English ivy treated with paclobutrazol or uniconazole .*Hort Scienc e* 25(6):709.
- 8- Khudairi , A .K. and Thewaini ,A . J .(1957).Rooting of cuttings and Content of Iraqi Citrus.*Proc.Iraqi Sci. Soc.*,1:31-36.
- 9-Weaver, R.J.(1972). Rooting and propagation .In Plant Growth Substances in Agriculture .W.H.Freeman Co. , SanFrancisco , California. Chap.5.
- 10-Jacob, W .P.(1979) .Plant hormones and plant development. Cambridge University press.U.K.,PP:64-71 .
- 11-Borisjuk ,L .;Rolletschek H ;Wobus,U.and Weber ,H.(2003).Different- itiation of legume cotyledons as related to metabolic gradients and assimilate transport in seeds .*Plant Bio.* ,6:375-386 .
- 12-شهيد, عبدالله ابراهيم , عباس خضير م gio (2005) استعمال المستخلصات المائية Plant extracts والتغريج في تحسين استجابة التجذير في عقل النارنج *Citrus aurantuim L* مؤتمر كلية العلوم 0 جامعة كربلاء 0 العراق 0
- 13-Goodwin ,J.J. (1965).Anatomical changes associated with juvenile mature growth phase transition in hedra .*Nature* ,London, 208 :504-505.
- 14- Thomas, M.B. & Edward,R.A. (1980).Observation on physical barrier to root formation in cuttings.*The Plant Propagator*, 26:6-8.
- 15-Wally, Y.A. , El-Hamady,M.M. , Boulos ,S.T. and Salama,M.A. (1980). Physiology and anatomical studies on pecan hardwood cuttings .*Egypt . J.*,8(1):89-100 .
- 16- Pivetta ,Kathia Fernandes Lopes ; Denise Renata Pedrinho ;Silvio Favero and Renata Mazzini Bachin. (2012) .Collection time and IBA on rooting of cuttings of oleander (*Nerium oleander L.*).*Tree Rev.Tree* vol.36 no.1.Vicos. Jan.Brazil .
- 17-Anyasi R. O..(2011).The effect of Indole butyric acid on rooting of *Chromolaena odorata*.*Int.J.Med.Arom.Plants*, issn 2249-4340. 1(3): 212-218.South Africa
- 18- Abbass, J.A. ; Ali , M.A.; Alhadi , S.A.(2005).Effect of growth regulators on responsible rooting for two varieties cuttings of *Nerium oleander L* .*J .Baghdad Sci.*2:(2).
- 19- Shaheed, A.I.(1987). The control of adventitious root development in cuttings of *Phaseolus aureus*.*Roxb. Ph.D.Thesis.University of Sheffield, U.K.*
- 20-Middleton,W.(1978).Root development in cuttings of *Phaseolus aureus* R0xb.*Ph.D.Thesis .Univ. of Sheffield ,UK.*
- 21- Yasmin ,Shamsa; Basir Ahmed and Rashida Soomro .( 2003).Influence of ABA, Gibberellin and Kinetin on IAA induced adventitious root development on hypocotyl cuttings of Mung bean .*Biotechnology*, 2: 37-43.
- 22-Chin ,T.V. ; Meyer .M.M Jr .and Beevers , L.(1969). Abscisic acid stimutated rooting of stem cuttings.*Planta*, 88:192-196.
- 23-ابو التمن,وسن مصر. (2003).التفعيل الكيمياوي والحفظ الفزياوي لفعالية المستخلصات النباتية ودورها في السيطره على ظاهرة التعمير في عقل الماش المعمره 0 رسالة ماجستير .جامعة بابل.العراق 0
- 24-Shalata,A. and Neumann,P.M. (2002). Exogenous ascorbic acid (vitamin C) increases resistance to salt stress and reduces lipid peroxidation. *J. Exp. Bot.*, 52: 2207-2211 .
- 25- Hartmann ,H. T.,D.E.Kester and J. R.Davies.(1991).Plant Propagation , Principle and Practices. Prentic -Hall International, Eaglewood cliffs editions,New Jersey.5<sup>th</sup> ed.,pp.214-257.
- 26- Sharma ,P.,Jhu,A.B.,Dubey,R.S.and Pessarakli,M. (2012). Reactive oxygen species, oxidative damage, and antioxidative defense mechanism in plants under stressful conditions. Review Article, *Journal of Botany*, Article ID 217037, 26 pages 26.