

EFFECT OF WHOLE CRUSHED BLACK SEED POWDER (*NIGELLA SATIVA*) AND OIL EXTRACTED PROPOOILS WITH THEIR SYNERGISM ON THE IMMUNE SYSTEM OF BROILERS.

**تأثير مسحوق بذور الحبة السوداء والمستخلص الزيتي للبروبولس وتأثيرهما في
الحالة المناعية لفروج اللحم**

م.م. حيدر فلاح عوده العميدى
الكلية التقنية المسيب

أ.م. مجید علی فهد
الكلية التقنية المسيب
الباحث الثاني

الجزء من رسالة الماجستير للباحث الثاني

المستخلص :

أجري البحث بهدف دراسة تأثير مسحوق الحبة السوداء والمستخلص الزيتي للبروبولس وتأثيرهما التآزرى فى مستوى المعيار الحجمي للأجسام المضاده الموجهه ضد مرض انفلونزا الطيور ومرض التهاب الشعب الهوائي المعدى ومرض النيوکاسل ومرض الكمبورو فى فروج اللحم .

استخدم في البحث 320 فرخاً من افراخ اللحم سلاله روز بعمر يوم واحد غير مجنسه، وزعت الافراخ على ثمان معاملات متساوية وبشكل عشوائى، كل معاملة تحتوت على 40 فرخاً وكل معامله احتوت على مكربين متساوين بعدد الافراخ. غذيت الافراخ في المعاملات الثمانية على علانق مختلفة منذ اليوم الاول من عمر الافراخ فالمعاملة الاولى غذيت على علائقه اعتيادية بدون أي أضافة وعدت كمعاملة سيطرة أما المعاملات الثانية والثالثة والرابعة فقد غذيت على نفس علائقه السيطرة بعد أضافة المستخلص الزيتي للبروبولس لها وبنسب 100، 200 و300 ملغم / كغم علف على التوالى . وغذيت الافراخ في المعاملة الخامسة على نفس علائقه المعاملة الاولى ولكن أضيف اليها مسحوق الحبة السوداء بنسبة 1% في حين غذيت الافراخ في المعاملة السادسة والسابعة والثامنة على نفس علائق المعاملات الثانية والثالثة والرابعة على التوالى بعد أضافة مسحوق الحبة السوداء لكل منها وبنسبة 1%. نتائج البحث اشارت الى التأثير التآزرى لمسحوق الحبة السوداء والمستخلص الزيتي للبروبولس وبشكل عالي المعنوية ($P<0.01$) في مستوى المعيار الحجمي للأجسام المضاده الموجهه ضد مرض انفلونزا الطيور ومرض التهاب الشعب الهوائي المعدى ومرض النيوکاسل ومرض الكمبورو عند 21 و 42 يوماً من عمر الفروج .

Abstract:

The research was conducted to investigate the effect of black seeds powder and oil extracted propoils with their synergistic effect on the level of the antibody titers of Avian influenza (AI) , Infections bronchitis (IB), Newcastle Disease (ND)GD) in broilers.A total of 320 , one day old chicks were used (and Gumobro Diseasein the experiment , those chicks were randomly allocated in to 8 equal treatment and each treatment included 2 equal replicates . chickens in all treatments were fed on different rations . the first treatment were fed on an ordinary ration with out any addition (control) where as , T2, T3 and T4 were fed on the same ordinary ration after addition of oil extracted propoils 100 ,200 and 300 mg/ kg for each respectively. T5 were fed on the same ordinary diet after addition of black seeds powder 1% T6 , T7 and T8 were fed on the same diet of T2 ,T3 and T4 respectively after addition of black seeds powder 1% for each of them . Results indicated that synergistic effect of black seeds powder with oil extracted propoils led to a high significant effect ($P<0.01$) on antibody titers against AI , IB , ND , and GD at 21 and 42 days of chicks ages .

المقدمة

استعملت المضادات الحيوية كمحفزات لنمو الطيور الداجنة كأضافات علفية ولزمن طويل واثبنت فعاليتها في تحسن كفاءة الطيور اضافة الى فعاليتها في منع نمو البكتيريا المرضية وتکاثرها في امعاء الطيور (1) . ولكن في مطلع العام 2006 أتخذت المجموعة الاوربية بناءً على الطلب المقدم من منظمة الصحة العالمية ومستهلكي منتجات الدواجن قراراً بمنع استعمال المضادات الحيوية في غذاء الحيوان والدواجن ومنتجاتها كمحفزات للنمو بسبب التأثير التراكمي لهذه المضادات الحيوية في لحوم الدواجن ومنتجاتها مما يؤدي الى تأثير سئ في الصحة العامة اضافة الى المقاومة التي تبديها جميع انواع البكتيريا ضد المضادات الحيوية من جراء استعمالها المستمر (2) . أن قراراً يمنع استعمال المضادات الحيوية كمحفزات لنمو الطيور شجع العديد من الباحثين بالتفكير في ايجاد بدائل للمضادات الحيوية واستعمالها كمحفزات للنمو ، وقد اشارت العديد من الدراسات للأعتماد على المنتجات الطبيعية المتمثلة بالمستخلصات النباتية والتي يمكن استعمالها طوال مدة تربية الطيور وعدم الحاجة الى تقدير بقائهاها في منتجات الدواجن وعدم تأثيرها على الصحة العامة ، ولعل من هذه المنتجات الطبيعية هي الحبة السوداء (*Nigella sativa*) والتي تحتوي على العديد من المركبات الفعالة مثل النجلون (*Nigellone*) والثايوموكونين (*Thymoguinone*) والكلوتاثيون (*Glutathione*) وجميع هذه المركبات تؤدي دوراً هاماً في معالجة أضطرابات الجهاز المناعي والعمل على تحفيزه ورفع مناعة الجسم في الطيور (3) . وبعد البروبولس (*Propolis*) أحد المنتجات الطبيعية الأخرى التي يجمعه نحل العسل من رحيق الأزهار وبراعم الأشجار ويستعمل لطلاء السطوح الداخلية للخلايا لغرض منع دخول المسببات المرضية الى داخل الخلايا (4). يحتوي البروبولس (العكبر) على العديد من المركبات الكيميائية الغنية بالفالفونيدات (*flavonoids*) والفالفونات (*flavones*) والأحماض الأمينية والفيتامينات والعناصر النادرة (5). ويتميز البروبولس بالعديد من الفعاليات الحيوية والتي من أهمها فعاليته ضد البكتيريا والفيروسات والطفيليات وله تأثير مهم آخر هو فعاليته في تعزيز المناعة الجسمية (Immunomodulatory) ومضاد للأكسدة والأجهاد (6). أستهدفت الدراسة الحالية لمعرفة التأثير التازري لمسحوق الحبة السوداء والمستخلص الزيتي للبروبولس في مستوى المعيار الحجمي للأضداد والموجهه ضد مرض انفلونزا الطيور ومرض التهاب الشعب الهوائية المعدى ومرض التنيوكاسل والكمبورو في فروج اللحم .

المواد وطرق العمل :

أجري البحث في حقل الطيور الداجنة التابع لقسم تقنيات الإنتاج الحيواني في الكلية التقنية/ المسبب للفترة من 10/29 ولغاية 10/12 للعام 2011م . استعمل في البحث 320 فرخاً من أفراخ اللحم بعمر يوم واحد من سلالة Ross غير مجنسة ، وزعت الأفراخ عشوائياً بالتساوي على ثمان معاملات كل معاملة احتوت على 40 فرخاً ، كما وزعت الأفراخ في كل معاملة على مكررين متساوين بواقع 20 فرخاً لكل مكرر ، غذيت الأفراخ في جميع المعاملات على علقيتي البادي والعليقية النهائية وحسب المعاملات التالية :

المعاملة الأولى : غذيت الأفراخ في هذه المعاملة على علقة أساسية بدون اضافة الحبة السوداء او مستخلص البروبولس وعدت معاملة سيطرة .

المعاملة الثانية : غذيت الأفراخ في هذه المعاملة على علقة أساسية مضافاً اليها مستخلص البروبولس الزيتي بنسبة 100 ملغم / كغم علف .

المعاملة الثالثة : غذيت الأفراخ في هذه المعاملة على علقة أساسية مضافاً إليها مستخلص البروبولس الزيتي بنسبة 200 ملغم / كغم علف .

المعاملة الرابعة : غذيت الأفراخ في هذه المعاملة على علقة أساسية مضافاً اليها مستخلص البروبولس الزيتي بنسبة 300 ملغم / كغم علف .

المعاملة الخامسة : غذيت الأفراخ في هذه المعاملة على علقة أساسية مضافاً اليها الحبة السوداء بنسبة 1% .

المعاملة السادسة : غذيت الأفراخ في هذه المعاملة على علقة أساسية مضافاً اليها الحبة السوداء بنسبة 1% ومستخلص البروبولس الزيتي بنسبة 100 ملغم / كغم علف .

المعاملة السابعة : غذيت الأفراخ في هذه المعاملة على علقة أساسية مضافاً اليها الحبة السوداء بنسبة 1% ومستخلص البروبولس الزيتي بنسبة 200 ملغم / كغم علف .

المعاملة الثامنة : غذيت الأفراخ في هذه المعاملة على علقة أساسية مضافاً اليها الحبة السوداء بنسبة 1% ومستخلص البروبولس الزيتي بنسبة 300 ملغم / كغم علف .

ويمكن توضيح تركيب علقيتي البادي والنهائية المستعمله في البحث في الجدول (1) .

جدول (1): يبين التركيب الكيميائي لعلقي البادي والنهاية المستخدمة في التجربة .

العلقة النهاية _ 21 _ 42 يوماً	العلقة البادي _ 1 _ 21 يوماً	المادة العافية %
30	30	الذرة الصفراء
20	28	كسبة فول الصويا
35.5	27.7	حنطة
10	10	مركز بروتيني حيواني*
3	3	زيت نباتي
0.3	0.3	ملح طعام
1.2	1	حجر الكلس
100	100	المجموع
التركيب الغذائي العام المحسوب		
3125.2	3078	
الطاقة الممثلة كيلوسعره / كغم		
20.16	22.74	
بروتين الخام %		
155.07	135.35	
نسبة الطاقة الى البروتين		
1.0	0.97	
الكالسيوم %		
0.48	0.41	
الفسفور الحيوبي %		
0.75	0.83	
ميثايونين + سيستن		
0.95	1.02	
لايسين		

*مركز البروتين الحيواني نوع Brocom-5 شركة الوافي يحتوي على بروتين خام 40% و دهن 5% ولياف خام 2% وطاقة ممثلة 2150 كـ ج و مثيونين 3,07 % ولايسين 3,85 % وكالسيوم 5,6 % وفوسفور متاح 4,65 %

تم حساب التركيب الكيميائي تبعاً لتحليل المواد في العلقة الواردة في NRC (1994). تم الحصول على البروبولس الخام من الأسواق المحلية وأعتمدت الطريقة المذكورة من قبل (7) في تحضير المستخلص الذي ينتمي للبروبولس . كما تم الحصول على الجبة السوداء من الأسواق المحلية وجرشت بأسعمال طاحونة خاصة بحيث أصبحت مسحوق . لفتح الأفراخ في جميع المعاملات ضد مرض النيوكاسل وأنفلونزا الطيور ومرض التهاب الشعب الهوائية المعدى ومرض الكلبورو وحسب برنامج صحي خاص اعتمد لهذا الغرض . جمعت عينات دم من الوريد العضدي للأفراخ بعمر 21 و 42 يوماً وتم الحصول على مصل الدم لغرض تقدير مستوى المعيار الحجمي للأضداد الموجه ضد الامراض المذكورة بأسعمال اختبار الانزيم المناعي الممترز غير المباشر (Enzyme Linked Immuno sorbant Assay , ELISA) و حسب ما أشار إليه (8). استعمل التصميم العشوائي الكامل (CRD Completely Randomized Design) في التحليل الإحصائي للبيانات ضمن البرنامج الإحصائي (9) لدراسة تأثير المعاملات المختلفة في الصفات المدروسة، وقارنت الفروق المعنوية بين المتوسطات باختبار (10) متعدد الحدود .

النتائج والمناقشة :

يتضح من الجدول (2) تأثير المعاملات المدروسة في المعيار الحجمي للأجسام المضادة للأمراض الفايروسية عند عمر 21 يوماً من عمر الأفراخ إذ كان التباين عالي المعنوية ($P<0.01$) للمعيار الحجمي للأجسام المضادة لمرض أنفلونزا الطيور (Avian Influenza, AI) على التوالي ، في حين تلتها المعاملتان الخامسة والرابعة وبواقع 810 و 790 على التوالي ومن ثم المعاملة الثالثة التي سجلت 705 بينما كانت القيم أدنى من ذلك للمعاملتين الثانية وبلغت 645 والمعاملة الأولى (السيطرة) وبلغت 597 . وفيما يخص المعيار الحجمي للأجسام المضادة الموجه ضد مرض التهاب الشعب الهوائية المعدى (Infectious Bronchitis, IB) فقد أظهرت الدراسة الحالية أن هناك تأثيراً عالي المعنوية ($P<0.01$) للمعاملات المدروسة في المعيار الحجمي للأجسام المضادة ضد مرض (IB) وحققت المعاملات الثامنة والسابعة أعلى القيم وبلغت 1052.5 و 1005.0 على التوالي في حين جاءت المعاملة الأولى والثانية بأقل قيم وبلغت 710 و 752.5 على التوالي . ويتبين من الجدول نفسه أن للمعاملة تأثيراً عالي المعنوية ($P<0.01$) بالنسبة للمعيار الحجمي للأجسام المضادة الموجه ضد مرض النيوكاسل (P <0.01) في المعاملة السابعة في حين كان هذا المعيار أدنى من ذلك لدى الأفراخ في المعاملات الأخرى لاسيما المعاملة الاولى (السيطرة) والمعاملة السابعة في حين كان هذا المعيار أدنى من ذلك لدى الأفراخ في المعاملات الأخرى لاسيما المعاملة الاولى (السيطرة) والذي بلغ 707.50 . وبالنسبة للمعيار الحجمي للأجسام المضادة الموجه ضد مرض الكلبورو فقد كان للمعاملة تأثير عالي المعنوية ($P<0.01$) إذ بلغ أقصى القيم في المعاملات الثامنة والسابعة والصادسة 1150 ، 1102.5 ، 1037.5 على التوالي في حين جاءت المعاملتان الاولى والثانية بأدنى القيم وببلغت 830 و 832.50 على التوالي.

وتشير النتائج الموضحة في الجدول (2) إلى تفوق عالي المعنوية ($P<0.01$) في المعيار الحجمي للأجسام المضادة الموجه ضد مرض إنفلونزا الطيور عند عمر 42 يوماً من عمر الفروج فقد حققت المعاملة الثامنة (300 ملغم/كغم مستخلص البروبولس و 1% مسحوق الحبة السوداء) أعلى معدل للأجسام المضادة الموجه ضد مرض إنفلونزا الطيور وبواقع 847.5 تلتها المعاملة السابعة (200 ملغم/كغم مستخلص البروبولس و 1% مسحوق الحبة السوداء) وبلغ 777.5 بينما كان أدنى معيار حجمي للأجسام المضادة الموجه ضد مرض (AI) كان لدى الأفراخ في المعاملة الأولى (السيطرة) وببلغ 517.5 . كما كانت نتائج المعيار الحجمي للأجسام المضادة الموجه ضد مرض التهاب الشعب الهوائية المعدى عند عمر 42 يوماً من عمر الفروج وكان للمعاملة تأثير عالي المعنوية ($P<0.01$) لهذه الصفة إذ بلغ المعيار الحجمي للأجسام المضادة الموجه ضد مرض التهاب الشعب الهوائية 890 في المعاملة الثامنة وتلتها المعاملة السابعة (830) بينما جاءت المعاملة الأولى (السيطرة) بأقل معيار حجمي لمرض IB وبلغ 510 .

الجدول (2) : تأثير المعاملات المدروسة في المعيار الحجمي للأجسام المضادة للأمراض بعد 21 يوماً من التجربة .

المعيار الحجمي للأجسام المضادة (المتوسط ± الخطأ القياسي)				المعاملات	
مرض الكبورو	مرض التيوكاسل	مرض التهاب الشعب الهوائية	مرض إنفلونزا الطيور		
830.00d ± 14.72	707.50e ± 8.54	710.00e ± 13.53	597.50d ± 35.91	سيطرة	1
832.50d ± 13.76	740.00e ± 15.81	752.50 e ± 12.50	645.00d ± 21.02	بروبولس 100 ملغم/كغم	2
885.00cd ± 6.45	792.50e ± 8.54	810.00d ± 14.71	705.00c ± 6.45	بروبولس 200 ملغم/كغم	3
937.50c ± 11.09	940.00cd ± 19.57	858.50 cd ± 33.26	790.00b ± 10.80	بروبولس 300 ملغم/كغم	4
927.50c ± 8.54	812.50 de ± 11.09	885.00bc ± 13.23	810.00b ± 14.72	الحبة السوداء (%)	5
1037.50b ± 24.28	1000.00c ± 38.51	937.50b ± 20.56	845.00 ab ± 15.54	بروبولس 100 ملغم/كغم + الحبة السوداء (%)	6
1102.50 ab ± 35.44	1175.00b ± 47.87	1005.00a ± 6.45	877.50a ± 11.09	بروبولس 200 ملغم/كغم + الحبة السوداء (%)	7
1150.00a ± 54.01	1425.00a ± 103.08	1052.50a ± 19.31	872.50a ± 11.09	بروبولس 300 ملغم/كغم + الحبة السوداء (%)	8
**	**	**	**	مستوى المعنوية	

* المتوسطات التي تحمل حروفًا مختلفة ضمن العمود الواحد تختلف معنوياً فيما بينها على مستوى ($P<0.01$).

اما نتائج المعيار الحجمي الموجه ضد مرض التيوكاسل بعمر 42 يوماً من عمر الأفراخ فقد تقوّت بشكل عالي المعنوية($P<0.01$) في المعاملة الثامنة والسابعة وبواقع 1475 و 1172.5 عن باقي المعاملات لاسيما المعاملة الأولى (السيطرة) والتي بلغ عندها المعيار الحجمي للأجسام الموجه ضد مرض التيوكاسل 755 . ويلاحظ من النتائج الموضحة في الجدول المذكور أن للمعاملة تأثيراً عالي المعنوية ($P<0.01$) في المعيار الحجمي للأجسام المضادة الموجه ضد مرض الكبورو وعند عمر 42 يوماً من عمر الفروج وقد استمر التفوق لصالح المعاملات الثامنة والسابعة والسادسة (887.5 ، 925 ، 850 على التوالي) فـي حين جاءت أدنى قيم للمعيار الحجمي للأجسام المضادة الموجه ضد مرض الكبورو قد سجلت في المعاملة الأولى السيطرة وببلغ 695 .

مجلة جامعة كريلاء العلمية – المجلد الثالث عشر - العدد الاول / علمي / 2015

الجدول (3) : تأثير المعاملات المدروسة في المعيار الحجمي للأجسام المضادة للأمراض بعد 42 يوماً من التجربة.

المعيار الحجمي للأجسام المضادة (المتوسط ± الخطأ القياسي)					المعاملات	
مرض الكمبورو	مرض النيوكاسل	مرض التهاب الشعب الهوائية	مرض انفلونزا الطيور		سيطرة	1
830.00d ± 14.72	707.50e ± 8.54	710.00e ± 13.53	597.50d ± 35.91		بروبولس 100 ملغم/كغم	2
832.50d ± 13.76	740.00e ± 15.81	752.50 e ± 12.50	645.00d ± 21.02		بروبولس 200 ملغم/كغم	3
885.00cd ± 6.45	792.50e ± 8.54	810.00d ± 14.71	705.00c ± 6.45		بروبولس 300 ملغم/كغم	4
937.50c ± 11.09	940.00cd ± 19.57	858.50 cd ± 33.26	790.00b ± 10.80		الحبة السوداء (%)	5
927.50c ± 8.54	812.50 de ± 11.09	885.00bc ± 13.23	810.00b ± 14.72		بروبولس 100 ملغم/كغم + الحبة السوداء (%)	6
1037.50b ± 24.28	1000.00c ± 38.51	937.50b ± 20.56	845.00 ab ± 15.54		بروبولس 200 ملغم/كغم + الحبة السوداء (%)	7
1102.50 ab ± 35.44	1175.00b ± 47.87	1005.00a ± 6.45	877.50a ± 11.09		بروبولس 300 ملغم/كغم + الحبة السوداء (%)	8
1150.00a ± 54.01	1425.00a ± 103.08	1052.50a ± 19.31	872.50a ± 11.09		مستوى المعونة	
**	**	**	**			

* * المتوسطات التي تحمل حروفًا مختلفة ضمن العمود الواحد تختلف معنويًا فيما بينها على مستوى ($P < 0.01$).

إن ارتفاع مستوى الأجسام المناعية المضادة لمرض أنفلونزا الطيور ومرض التهاب الشعب الهوائية المعدى ومرض النيوكاسل ومرض الكمبورو في كلتا الفترتين من عمر الفروج قد يكون بسبب فعالية البروبولس المحفزة للمناعة الخلطية والخلوية من خلال زيادة إنتاج الكلوبوبولينات المناعية (Immunoglobulines) من نوع IgM وتحفيز خلايا البلعم الكبير (Macrophage) لإنتاج الأنترافيرون والسايتوكتينات وتکاثر الخلايا اللمفية الثانية (11). تتفق النتائج مع الباحث (12) الذي ذكر أن البروبولس له القدرة على تحسين الاستجابة المناعية في الطيور وذلك بتحفيز الأنسجة اللمفية للجهاز الهضمي بالإضافة إلى الدور الأيجابي الذي يؤديه البروبولس في تأثيره على المحتوى المايكروبى للأمعاء والذي يؤدي إلى تحسن الهضم والأمتصاص. وفي نفس السياق وجد (13) أن إضافة البروبولس مع العسل بنسبة 0.5 ، 1.0 و 1.5 % إلى علبة فروج اللحم قد حسنت وبصورة معنوية ($P < 0.05$) من الوزن النسبي للأعضاء المفاوية (الطحال ، غدة التوتة وغدة فابريشيا) وكذلك حسنت من اعداد خلايا الدم البيض الكلي (الخلايا المفاوية والخلايا الأحادية والمتغيرة والحامضية والقادعية) وأرتفاع في المعيار الحجمي للأجسام المضادة الموجهه ضد لقاح فايروس مرض النيوكاسل . وكذلك وجد الباحث (14) أن فروج اللحم المضاف إلى علائقها البروبولس بتركيز 400 ، 700 و 1000 ملغم بروبوليـس / كغم علف كانت هناك فروق معنوية ($P < 0.05$) بين المعيار الحجمي للأجسام المضادة الموجودة في مصل الدم ضد أنفلونزا الطيور والنيوكاسل والكمبورو وأن تركيز الأجسام المضادة يزداد مع زيادة تركيز البروبولس في العليقة . النتائج أيضاً تتفق مع ما توصل اليه الباحث (7) الذي أفاد أن إضافة المستخلص الزيتي للبروبولس بتركيز 40 ، 70 ، 100 ملغم/كغم علف في علائق فروج اللحم أدى إلى زيادة المعيار الحجمي للأجسام المضادة لمرض النيوكاسل. وفي الوقت الحاضر هناك دراسات عديدة أشارت إلى وجود فعالities مختلفة للبروبولس على الجهاز المناعي مثل زيادة فعالية خلايا البلعم الكبير (Macrophage activity) وزيادة الانترلوكين 1 (Interlukine1) و الانترلوكين 2 والانترلوكين 3 (15) (16) (17). إن زيادة الاستجابة المناعية نتيجة أستعمال البروبولس ربما تكون بسبب أن الجهاز المناعي المتمثل بالخلايا المفاوية البائية (B-Lymphocytes) يمكن أن يحفز بوساطة السايتوكينات ويقود ذلك إلى إنتاج خلايا بلازمية

تقوم بتكوين أجسام مناعية (18) (19) (20). يعد البروبولس من المواد التي لها فعل مضاد للأكسدة والالتهاب وهذه المواد تقود إلى تثبيط تصنيع البروستوكلاندين (Prostaglandin Synthesis) بأعتبارها مواد مضررة للمناعة والنتيجة الحصول على أفضل استجابة مناعية (20). وفي نفس السياق وجد (21) أن إضافة 3 غم بروبولس / كغم علف إلى فروج اللحم أدى إلى زيادة في مستوى الأجسام المضادة ووجد كذلك ارتفاعاً معنوياً ($P < 0.05$) في مستوى IgG و IgM المصلى بالمقارنة مع مجموعة السيطرة وعزا ذلك إلى المركيبات الفعالة الموجودة في البروبولس والتي تنشط من فعالية خلايا البلعم الكبير (Macrophage activity) والتي بدورها تحفز على إفراز السايتوكتينات (Cytokines) والتي تحفز الخلايا المفاوية البائية (B-Lymphocyte) ومن ثم ارتفاع مستوى IgG و IgM.

إن ارتفاع مستوى الأجسام المضادة للأمراض المدروسة قد يعزى إلى احتواء البروبولس على الفلافونيدات التي تحفز خلايا المتفحة لإنتاج مادة الأنترافيرون (Interferone) إذ تنشط خلايا الدم البيض والخلايا المتفحة لإنتاج الأنترافيرون وهذه المادة تحظى بمقاومة هائلة لمختلف أنواع العدو عند وجودها في الجسم وهذا اتفاق مع (22) الذي وجد ظهور تفوق عالي المعنوية ($p < 0.01$) للمعيار الحجمي للأجسام المضادة الموجهة ضد مرض النيوكاسل والكمبورو وإنفلونزا الطيور والتهاب الشعب الهوائي المعدى عند الأسبوعين الثالث وال السادس من عمر الأفراخ في المعاملات التي أحتوت على 300 ملغم / كغم بروبولس. لاحظ الباحث (23) حصول ارتفاع معنوي ($P < 0.05$) للمعيار الحجمي للأجسام المضادة الموجهة ضد مرض النيوكاسل عند زيادة نسبة البروبولس في علية فروج اللحم إلى 3 ملغم / كغم وعزا ذلك إلى أن البروبولس له تأثير على الجهاز المناعي بوساطة زيادة خلايا البلعم الكبير (Macrophage activity) وتغير المجتمع المايكروبى في المعدة والأمعاء الدقيقة وتحفيز الأنسجة المفاوية وكذلك فإن البروبولس يعد من المواد المضادة للأكسدة والالتهاب وبذلك فإن للبروبولس تأثيراً معنوياً في الجهاز المناعي. النتائج لا تتفق مع ما وجد (24) الذي بين عدم وجود فروق معنوية ($P < 0.05$) واضحة للمستخلص الكحولي للبروبولس بتركيز 150 ، 300 ، 450 و 600 ملغم / كغم علف على الجهاز المناعي لفروج اللحم وكذلك عدم وجود فروقات واضحة في كل من عدد خلايا الدم البيض وخلايا المتغيرة (Heterophiles) والخلايا الخامضية (Eosinophils) والفاعدية (Basophils) تبع ذلك انخفاض في الخلايا المفاوية والخلايا وحيدة النواة (Monocyte) بالمقارنة مع مجموعة السيطرة.

أن ارتفاع المعيار الحجمي للأضداد الموجهة ضد الأمراض المدروسة قد يكون بسبب أضافة الحبة السوداء حيث يلاحظ من الجدول (3) ارتفاع مستوى المعيار الحجمي للأجسام المضادة للأمراض الفايروسية عند أضافة الحبة السوداء وهذه النتائج تتفق مع الكثير من الدراسات التي بيّنت أن للحبة السوداء تأثير مذهل في تقوية الجهاز المناعي للجسم عن طريق تطوير النسبة بين خلايا T المساعدة (Th) وخلايا T المثبطة (Ts) بكميات معنوية وتعزز أيضاً نشاط الخلايا الطبيعية القاتلة-EL(25). ومنهم الباحث (26) الذي أشار بأن زيادة مستوى الحبة السوداء في معاملات التجربة أدت إلى تحسن وظهور فروق معنوية عالية ملحوظة للمعيار الحجمي للأجسام المضادة. أن المركيبات الفعالة في زيت الحبة السوداء مثل Thymoquinoline و Dithyminquinone تلعب دوراً هاماً في تحفيز الجهاز المناعي ، وهذا التحفيز يتم عن طريق زيادة إنتاج بعض المكورات المتفحة (Cytokines) من الخلايا المتفحة وأن السايتوكتينات والهرمونات تتنجان طبيعياً في الجسم وتقومان بتعزيز المناعة الجسمية لذلك يدعان من محورات الاستجابة البيولوجية في معالجة الأمراض بنفس أسلوب العلاج بالعقاقير التي هي من أصل كيميائي (27). قام (28) بدراسة تأثير أضافة مستويات مختلفة من زيت الحبة السوداء إلى العلية في الاستجابة المناعية حيث لاحظ ارتفاع المعيار الحجمي للأجسام المضادة ضد فايروس النيوكاسل والكمبورو للمجاميع المعاملة بالحبة السوداء، وقد أعزى سبب ذلك إلى دور زيت الحبة السوداء ومركياته الفعالة وليس لمحتواه الغذائي من الأحماض الدهنية المشبعة وغير مشبعة . كما وجد (29) أن أضافة الحبة السوداء بنسبة 0.25 ، 0.5 ، 1 و 2 % إلى علية فروج اللحم أدى ذلك إلى زيادة مستوى الأجهزة المناعية ، وان ارتفاع المعيار الحجمي للأجسام المضادة ربما يعود إلى التأثير التآزرى لمسحوق الحبة السوداء والمستخلص الزيتى للبروبولس . وجد الباحث (30) أن أضافة مستويات مختلفة من المستخلص الزيتى للبروبولس بنسبة 50 ، 100 ، 150 ، 200 و 250 ملغم / كغم على علية فروج اللحم أدى ذلك إلى حصول إرتفاع معنوي ($P < 0.05$) للمعيار الحجمي للأجسام المضادة ضد مرض النيوكاسل . كما وجد (31) ، ارتفاعاً معنويأ ($P < 0.05$) للمعيار الحجمي للأجسام المضادة ضد مرض النيوكاسل والكمبورو في مجاميع فروج اللحم المضاف إلى علقيتها الحبة السوداء بنسبة 40 غم / كغم علف وعزا ذلك إلى أن الحبة السوداء لها فعل كمضاد فايروسي (antiviral activity) ضد فايروس مرض النيوكاسل والكمبورو . تتفق نتائج الدراسة الحالية مع متوصى إليه (32) ، اللذان أفاداً أن زيت الحبة السوداء له قابلية على زيادة فعالية الخلايا المناعية .

يسنترج من البحث أن مسحوق الحبة السوداء ومستخلص البروبولس كان لهما تأثيراً تازرياً في تحسن الحالة المناعية لفروج اللحم

المصادر :

- 1- Anonymous .2005. Ban on antibiotics as growth promoter in animal feed enters into effect. <http://www.extension.iastate.edu/nutrition/supplements/classification.php>.
- 2- Gunal, M. ;Yayli, G. Kaya,O. ; Karahan, N.; Sulak,O. 2006. The effects of antibiotic growth promoter ,probiotic or Organic acid Supple-mention on performance intestinal microflora and tissue of broilers . Int . J. poult .Sci . 5: 149 – 155.
- 3- العقابي، عامر رسام علي . 2004. تأثير إضافة مسحوق بذور الحبة السوداء المحلية *Nigella sativa* إلى العلبة في الاستجابة المناعية لمرض نيوكايل وبعض الصفات الفسلجية في دجاج اللحم. رسالة ماجستير. كلية الطب البيطري. جامعة بغداد.
- 4- الحداد، محمد خليل تراب.2009.تأثير العكير في تثبيط نمو جرثومة الملوية البوابية *Helicobacter Pylori* ودوره في علاج القرحة الهضمية. رسالة ماجستير. كلية الطب البيطري. جامعة بغداد. ص 131.
- 5-Abdul-Hadi, F.K. and Hegzi, A.G. 2002. Egyptian Propolis: composition, Antiviral and Antimicrobial activity . Z.Naturforech.57:386-394.
- 6-Graham,J.M.1992 .The hive &the honey bee.Dadent and Sons.Hamilton. Illios USA. pp1324 .
- 7- Ziaran, H. R.; Rahmani, H. R. and Pourreza, J. 2005.Effect of oil extract of propolis on immune response and broiler performance.Pakistan. J.of Biological sciences.8(10):1485-490.
- 8-Synder,B.D.;Marquardt,W.W.;Mallinson,E.T.;Savage,P.K.and Allen,D.1984. Rapid serological profiling by Enzyme-linked Immunosorbent Assay ,III.Simulataneous measurement of antibody titer to Infectious Bronchitis,Infectious Bursal Disease and Newcastle Disease in a single serum dilution.Avian Disease .28:12-24 .
- 9- SAS .2004. SAS Users Guide :Statistics version .7.00 end ., SAS Institute . Inc .Cary , Nc.
- 10- Duncan , D.D. 1955. Multiple range and multiple F-test. Biometrics. 11:1-42.
- 11- Takagi,Y.; Choy, I; Yamashita, T.; Nakamura, T.; Suzuki, I; Hasegawa, T.; Oshima, N. and Gu, Y.2005 Immune activation and radioproduction of Propolis. Amarican Journal of Chinese Medicine . 33 (2) : 231-240.
- 12- Scheller,S.;Gazda,G.;Pietz, G. and Gabrys, J. 1988. The ability of ethanol extract of propolis to stimulate plaque formation in immunized mouse spleen cells.Pharmacol. Res. Commun. 20: 323-328.
- 13- المحظار, حسين عبد الرحمن. 2008. تأثير استعمال العسل والعكير على المؤشرات المناعية والإدارية في افراخ الرحم. رسالة ماجستير. كلية العلوم. جامعة الملك عبد العزيز.
- 14- Taheri, H. R.; Rahmani, H. R. and Pourreza, J.2005. Humoral immunity of broilers is affected by Oil Extracted Propolis (OEP) in the diet. International Journal of Poult. Sci. 4 (6): 414-417 .
- 15- Dimov,V.;Ivanovska,N;Bankova,V.andPopv,S.1992.Immunomodulatory action of propolis :IV. Prophylactic activity against gram negative infection and adjuvant effect of the water soluble derivative.Vaccine. 10:817-823.
- 16-Orsolic, N.; Sver, L.; Terzic, S.; Tadic, Z. and Basic, I.2003. Inhibitory effect of water-soluble derivative of propolis and its poliphenolic compounds on tumor growth and metastasizing ability: Apossible mode of antitumor action.Nutrition and Cancer.47(2):156-163.
- 17- Park. , J.; Lee; J.; Kim, H.2004. Immunomodulatory effect of caffic acid in mice. Int. Immune.4(3) :429-436.
- 18- Nagie, T., Inoue, R., Inoue, H., Suzuki, N. 2003. Prepartion and antioxidant properties of water extract of propolis. Food Chem. 80, 29–33 .
- 19- Kumazawa, S., T. Hamaska and T. Nakayama, 2004. Antioxidant activity of propolis of various geographic origins. Food Chem. 84: 329-339.
- 20- Borrelli, F., P. Maffia, L. Pinto, A. Ianaro, A. Russo, F. Capasso and A.Ialenti.2002. Phytochemical compounds involved in the anti-inflammatory effect of propolis extract. Fitoterapia. 73: 353-363
- 21- Cetin, E. ; Silici, S. ; Cetin, N. and Guclu, B. K. 2010. Effects of diets containing different concentrations of propolis on hematological and immunological variables in Laying hens. Poult. Sci. 89 : 1703-1708.

مجلة جامعة كربلاء العلمية – المجلد الثالث عشر- العدد الاول / علمي / 2015

- 22- ماميثة، علي رضا عبد. 2011. تأثير استخدام مستويات مختلفة من مستخلص البروبوليس في الأداء الإنتاجي والمناعة لفروج اللحم. رسالة ماجستير، الكلية التقنية/المسيب، هيئة التعليم التقني.
- 23- Khezri , M and Tater, A .2010. effects of different dietary levels of propolis on performance , carcass characteristics and immunity response of broilers chickens.European poultry conference .
- 24- Shahryar , H. Aghdam ; Namvari , M ; Nourollahi , H ; Tili A. Shaddel . 2011 . Effect of Alcoholic Extract Propolis on Immune System in broiler chickens . *J. Basic. Appl. Sci. Res.* 1(11)2094-2097.
- 25- El-Sayed, M. and El. Hashem.2000. Effect of *Nigella Sativa* on the immune
- 26- Shewita R.S and Taha A . E . 2011 . Effect of dietary supplementation of different levels of black seed (*Nigella Sativa L.*) on growth performance , Immunological , Hematological and Carcass Parameters of broilers chicks . World Academy of Science. Engineering and Technology 77(788-794).
- 27- Bashandy, S . A . E . 1996 . Effect of *Nigella sativa* oil on liver and kidney function of adult and senile . Egyption . J . Pharmaceutical . sci. 37: 313- 327.
- 28- العبيدي ، اياد شهاب . 2005. تأثير اضافة مستويات مختلفة من مسحوق الحبة السوداء *Nigella sativa* وتقليلها الى الطيقة في بعض الصفات الإنتاجية والمناعية والتثبيت المعوي لفروج اللحم ، أطروحة دكتوراه. كلية الزراعة . جامعة بغداد .
- 29- الحذيفي ، شايف عبد الله حسن. 2010 . تأثير اضافة مستويات مختلفة من بنور الحبة البركة على أداء أفراخ اللحم . رسالة ماجستير . كلية الزراعة . جامعة صنعاء .
- 30- Roodsari, M.H ; Mehdizadeh , M ; Mosavi , F and Abolghasemi, A.H .2004 . Effect of oil extracted propoils on the performance of broilers chicks . *Agricultr .Sci . Technol.* . 18 : 57-65.
- 31- Durrani, F. R.; Chand, N.; Zaka, K.; Sultan, A.; Khattak, F. M. and Durrani, Z 2007. Effect of different levels of feed added Black seed (*Nigella sativa L.*) on the performance of broiler chicks. *Pakistan Journal of Biological Sciences.* 10(22): 4164-4167.
- 32- Swamy, S.M. and Tan, B.K. 2000. Cytotoxic and imunopotentiating effect of ethanolic extract of *Nigella sativa* seeds. *J. Ethnopharmacot.* 70 (1) : 1-7.