

Histological study of urinary bladder in the local Mature goats in abbotoir of boly of Karbala government .

دراسة نسجية للمثانة البولية في الماعز المحلي البالغ في مجزرة محافظة كربلاء المقدسة.

م.م خمائل عبد الباري عقلة

جامعة كربلاء/كلية العلوم الطبية التطبيقية

م. دلال عبد الحسين كاظم

جامعة الكوفة

م. اشواق كاظم عبيد

جامعة كربلاء /كلية التربية للعلوم الصرفة

م.م نصیر مرزا حمزه

جامعة كربلاء /كلية التربية للعلوم الصرفة

المستخلص:-

اجريت الدراسة الحالية على (20) مثانية بولية لذكور ماعز محلي بعمر (سنة ونصف) من مجزرة محافظة كربلاء المقدسة . اظهرت الدراسة الحالية نسيجاً ان المثانة البولية تتالف من ثلاث طبقات نسجية ، الطبقة الداخلية المخاطية مبطنة بنسيج ظهاري انتقالى يستند الى الصفيحة الاصلية ، تمت منها عدد من الطيات المخاطية، والطبقة الوسطى هي الطبقة العضلية التي تتالف من حزم الالياف العضلية المسماة تبدو مرتبة بشكل دائري ، اما الطبقة النسجية الثالثة للمثانة البولية فتمثلت بالطبقة البرانية (الخارجية) والتي تتكون من حزم من نسيج ضام ليفي مطاط يكمن معظم الطبقة الخارجية للمثانة البولية ، لوحظ من الدراسة الحالية ان جدار المثانة البولية في الماعز المحلي البالغ له تركيب نسجي متماثل مع الحيوانات الاخرى وهي تتالف من نسيج ظهاري متتحول الى الداخل يستند الى الصفيحة الاصلية محاطة بطبقة من نسيج عضلي والتي تحاط بالطبقة البرانية .

Abstract

The present study was conducted on(20) of mature male goats (one year and half old) from ablotoir of boly of Karbala government . The present study was revealed that the urinary bladder composed of three histological layers, Mucosa lined by transitional epithelium supported by lamina propria , from the mucosal layer, many folds which extended , the second layer was muscular layer, consist of smooth muscle fibers bundles, arrangement in circular form. So the third histological layer of goat urinary bladder was represent by adventitia that consist of collagenous and elastic fibers bundles ,that form outer layer of urinary bladder , the present study was revealed that the urinary bladder wall in local goats that histological examination that are homologous in all investigated by internal layer of transitional epithelium supported by lamina propria and muscular layer surrounded by tunica adventitia.

المقدمة

تمثل المثانة البولية جزءاً من الجهاز البولي وهو عضو عضلي مجوف عرمومطي الشكل يقع في منطقة الحوض . يتكون جدارها من ثلاث طبقات من الخلايا العضلية المسماة smooth muscle ومبطنة بنوع خاص من الطهارة تعرف بالظهارة الانقالية Transitional epithelia وتختلف من الخارج بطبقة مصلية Serosal layer , تقوم المثانة باستلام البول من الحالبين وتخزينه لحين افراغه اثناء التبول (1). يشكل جدار المثانة من طبقة مخاطية mucosa تتكون من نسيج انتقالى يرتكز على طبقة من نسيج ضام رخو, تقع الى خارجها طبقة عضلية muscularis externa بينها طبقة البرانية adventitia تغطي بنسيج دهنی (2). يمتلك جدار المثانة التركيب النسجي نفسه لجدار الحالب اذ يتكون من ثلاث طبقات رئيسية تشمل الطبقة المخاطية والعضلية والبرانية ، تبطن المثانة بنسيج ظهاري متتحول مسند بالصفيحة القاعدية وبلغ سماكة النسيج الظهاري المتتحول في المثانة الحالية من البول بحدود من (6-8) طبقات خلوية وتكون الخلايا السطحية كروية وتصبح بحدود (2-3) طبقات خلوية في المثانة المملوأة بالبول (3). وأشار الباحث (4). الى ان المثانة البولية في الجمل مؤلفة من (3-4) طبقات في اغلب الاحيان ، كما بين ان اكبر هي طبقات الخلايا الظهارية المبطنة للمثانة كما في الحصان واقفها كان في مثانة القطط والكلاب (5). وقد اشار السلامي (6) ان الطبقة المخاطية في جدار مثانة الجمل تتكون من ظهارة انتقالية بسمك (4-5) صفوف من الخلايا تكون مسندة بالصفيحة الاصلية والتي تتكون من نسيج رابط ليفي مفك مع امكانية ملاحظة الطبقة تحت المخاطية اذ ظهر النسيج الضام فيها اكثر تفككاً من نسيج الصفيحة الاصلية كما ذكر الباحثان (7) . الى امتلاك مثانة الحصان طبقة عضلية مخاطية جيدة التكوين لايمكن ملاحظتها في الجمل, في حين تكون الطبقة المصلية Serosal layer سميكه في جدار مثانة الحصان والكلب والابقار ، وان الطبقة العضلية في مثانة الجمل تتكون من ثلاثة صفوف من الالياف العضلية المسماة الداخلية والخارجية منها طولية الترتيب ، اما الوسطى فتتكون دائيرية غير منتظمة في ترتيبها وتقسماها مناطق واسعة من النسيج الرابط المفك Loose connective tissue (8). ان المثانة البولية في الجمل تكون صغيرة في كلا الجنسين مقارنة بحجم الحيوان وهي بيضاوية وذات نهاية مستدقّة في حالة القلس(9). تظهر القيمة التكيفية للمثانات البولية في رباعية الاقدام في قدرتها على حزن الماء الذي قد تحتاجه (في اثناء الطقس


الجاف) اذا يحصل اعادة امتصاص للماء من المثانة بشكل فعال وتتوقف الحيوانات عن طرح البول في المناطق الجافة اذا يكون الاحتفاظ بالماء ذا قيمة غذائية (10). وفي بعض السلاحف يوجد زوج من المثانات البولية الاضافية المتصلة بالمجمع التي تمتلك بالماء وتسخدم في ترتيب التربة وفي اثناء وضع البيض كما في اناث السلاحف (1). وان هدف الدراسة هو معرفة التركيب النسجي للمثانة البولية في ذكور الماعز المحلي وتحديد الطبقات النسجية المكونة له.

المواد وطرق العمل :- Material and Methods


استعملت في الدراسة الحالية 20 مثانة بولية لذكور ماعز محلي بالغة وخالية من الامراض وترواحت معدل اعمرها(12-24) شهر ولغرض الدراسة النسجية ثبتت نماذج المثانة البولية بالكامل في محلول فورما لين تركيز 10% وكانت مدة التثبيت (48) ساعة وبعد التثبيت اجريت على النماذج النسجية العمليات الروتينية انكاراً بسلسة متقدمة من الكحول الايثيلي ابتداء من 70% وانتهاء 100% ، والتزويق باستعمال الزاييلول بمرحلتين ثم عمل قوالب شمعية للنماذج النسجية . بعدها قطعت النماذج بسمك 4-6 ميكرومتر باستعمال المقاطع الدوار (Rotatory micrometer) ولونت المقاطع النسجية باستعمال ملون الهيماوكسيلين - ايوسين (H&E) اعتماداً على طريقة (12)، بعدها تم فحصها تحت المجهر الضوئي لمعرفة البناء النسجي للمثانة البولية في الماعز المحلي البالغ.

النتائج والمناقشة :- Results and discussion


نستنتج من الدراسة الحالية ان التركيب النسجي للمثانة البولية في الماعز المحظى البالغ تتكون من ثلاثة طبقات ، تترتب من الداخل للخارج ، الطبقة المخاطية (mucosa) والتي تتكون من نسيج ظهاري انتقالى و تستند هذه الطبقة من النسيج الظهاري الى الصفيحة الاصيلة (lamina properia) كما في صورة رقم 1 والطبقة الوسطى هي الطبقة العضلية muscularis التي تتالف من ثلاثة طبقات من الياف عضلية ملساء (صورة رقم 2) تليها الطبقة الخارجية adventitia هي الطبقة البرانية و تتكون من نسيج ضام ليفي Fiberous connective tissue يكون معظم الطبقة الخارجية للمثانة (صورة 3). وجاءت نتائج الدراسة الحالية تؤكد ما وجده الباحثين (13). عند دراستهم التركيب النسجي للمثانة البولية في الفقريات الى انها تتالف من طبقة داخلية تتمثل بنسيج ظهاري انتقالى Transitional & epithelium Tissue ، تستند خلاياه الى الصفيحة الاصيلة المؤلفة من نسيج ضام رخوا ، اما الطبقة العضلية فأنه تتالف من الياف عضلية ملساء تبدو مرتبة دائري وتحاط الطبقة العضلية بالطبقة البرانية التي تتكون من نسيج ضام ليفي ، ان المثانة البولية تتخد نفس البناء النسجي في جميع الفقريات وهذا ربما يعود الى طبيعة عملها كثيرة التغير في حجمها (14). وبالتالي تتوافق نتائج الدراسة الحالية مع نتائج الدراسات السابقة (3).بان جدار المثانة يتكون من ثلاثة طبقات رئيسية تشمل الطبقة المخاطية (mucosa) والطبقة العضلية (muscularis) والطبقة البرانية (adventitia) ، تبطن المثانة بنسيج ظهاري مت Hollow مسند بالصفيحة الاصيلة، وجاءت نتائج الدراسة الحالية في صورة رقم (1). تؤكد ما وجده الباحث (7). اذا اشار الى ان الطبقة المخاطية للمثانة البولية في الانسان مبطنة بطبقة ظهارية انتقالية تبرز على هيئة عدد كبير من الطيات لكن هذه الطيات اقل وضوها عند مقارنتها مع الطبقة المخاطية للمثانة البولية في الارنب والفار والتي تمتلك عدد من الطيات المبطنة بظاهرة انتقالية(16,15). نستنتج من الدراسة الحالية ان (20) من المثانة البولية لذكور الماعز المحلي البالغ تتكون من ثلاثة طبقات هي هي الطبقة المخاطية (mucosa) والطبقة العضلية(muscularis) والطبقة الخارجية(adventitia)



صورة رقم (1) مقطع مستعرض للمثانة البولية لذكور الماعز المحلي البالغ توضح طبقة الاصيلة
Transitional Epithelia ، والصفيحة
Lamina properia
تصبغ بصبغة (H&E). 10X



صورة رقم (2) مقطع مستعرض للمثانة البولية لذكر الماعز المحلي البالغ توضح طبقة العضلية (ML) Muscularis layer تصطحب بصبغة H&E 40X. ↔



صورة رقم (3) مقطع مستعرض للمثانة البولية لذكر الماعز المحلي البالغ تصطحب بصبغة H&E 40 X. ↔
 1- طبقة النسيج الظهاري الانقلي TE
 2- الطبقة العضلية ML
 3- الطبقة البرانية TA

المصادر

- 1- ذنون، خير الدين محي الدين، يوسف ، وليد حميد ، علم الفسلجة البيطرية . الطبعة الاولى. الموصى ، العراق: مديرية دار الكتب للطباعة والنشر جامعة الموصى 1987، ص 290
- 2- المختار، كواكب عبد القادر. الحاوي، عبد الحكيم احمد(2000). علم النسج الخلية والنسيج الابتدائي – كلية التربية. جامعة بغداد.
- 3- Stacy, T. Tanaka; Kenichiro, Ishii; Romano, T. Demarco; John , C. Pope; John, W. Brock and Simon, W. Hayward (2010). Endodermal origin of bladder trigone inferred from mesenchymal - epithelial interaction. *J. urol.*, 183(1): 386
- 4- Hicks, R.M. (2006). The Mammalian urinary bladder an accomm- odating organ. *Bio. Rev.*, 50: 215-246.
- 5- Moore, R.D. and Calhorn, L. (2009). comparative histology of bladder and proximal urethra of domestic animal (Abstract). *Anat. Rec.*, 127:338.
- 6- السلامي، نجاة مطر عرببي (2000). دراسة مجهرية لبعض أجزاء الجهاز البولي في الجمل ذي السنام الواحد *Camelus dromedarius* مع التأكيد على الكلية: دراسة نسبية. رسالة ماجستير ، كلية العلوم، جامعة بغداد.
- 7- Dellmann, H.D. and brown, E.M.(1976). Textbook of veterinary and histology. Lea and Febiger. Philadelphia.
- 8- Lesson, T.S.; Lesson, G.R. and Paparo, A.A.(2005). Text 4 Atlas of histology. (5th ed). Lgakushoin Saunders: 409-431.
- 9- Tayeb, M.A.F.(2010). Urinary system of the camel. *J. Am. Vet. Med. Association*, 113: 568-572.
- 10- Khalifa, S.A.; Zeinb, M.A.; Afaf M. , El- Said Fahmy and Yasmin, M. Tag (2011). comparative studies on the Renal Structural aspect of the Mammalian *J. Amer . Sci*, 7(4) : 556-565.
- 11- Jeanette, Wyneken (2001). The Anatomy of sea Turtles NOAA. USA: 1-52.
- 12-Luna, G. (1968). Manual of histological Staining Method of armed forced institute of pathology. 3rded MC. GRAW Hill book co. Newyork
- 13- Bacha, W.J. and Bacha, L.M. (2000). Color atlas of veterinary histology, (2nd ed). Lippincott William and Wilkins, London.
- 14-Kardong, K.V. (2006). Vertebrates, comparative anatomy, function, evolution. (2nd ed). McGraw Hill, New York.
- 15-Hoochoi,S.,Byun,Y.and Lee,G.(2009). Expression of uroplakin in the Mouse urinary bladder with cyclophosphamide induced cystitis.*J.korean Med.Sci.*,24(4):684-689.
- 16-Joao,L.A., Karina,T.(2005).Structural alterations of the bladder induced by detrusor instability : Experimental study in Rabbit.