



استخدام المربعات الصغرى والمربعات الصغرى المقيدة

في تقدير معلمة الانحدار الذاتي من الدرجة الأولى

(دراسة محاكاة) AR(1)

م. د. محمد جاسم محمد

كلية الإدارة والاقتصاد- جامعة بغداد

قسم الإحصاء

المؤلف

بعد أسلوب تحليل السلسل الزمنية من الأساليب الإحصائية التي تهتم بدراسة البيانات عبر فترات زمنية منتظمة، ويطلب هذا التحليل تحديد الأنماذج المناسب الذي يصف العلاقة بين هذه البيانات ومن هذه النماذج أنماذج الانحدار الذاتي Autoregressive الذي يستخدم في الكثير من المجالات التطبيقية، وبما أن هنالك قيود متباعدة على الأنماذج لتحقيق الاستقرارية لذلك تم في هذا البحث استخدام طريقتين للتقدير في حالة وجود قيود متباعدة ومقارنتها بطريقة المربعات الصغرى التقليدية في تقدير معلمة أنماذج الانحدار الذاتي من الدرجة الأولى. واستخدمت المحاكاة لبيان أفضلية هذه الطرائق، ومن خلال تجارب المحاكاة تبين أن طريقة OLS كانت تعطي أقل متوسط مربعات خطأ لتقدير معلمة الأنماذج وتاليها طريقة ME عند جميع قيم ϕ_1 ولجميع أحجام العينات ما عدا عندما تأخذ $(\pm 0.1) = \phi_1$ فكانت طريقة ME تعطي أقل متوسط مربعات خطأ لتقدير معلمة الأنماذج عند حجم العينة 50 و100 وعند باقي أحجام العينة المدروسة كانت طريقة OLS تعطي أقل قيم ولجميع التوزيعات المدروسة، ما عدا عندما يتوزع الخطأ التوزيع اللوغاريتمي الطبيعي إذ منحت طريقة OLS قيمًا أصغر عندما تكون $(-0.5, -0.9) = \phi_1$ وكانت طريقة ME تمنح قيمًا أصغر عند جميع أحجام العينات وعندما تكون $(\pm 0.1) = \phi_1$ كانت طريقة TG عند جميع أحجام العينات.

1. المقدمة: Introduction:

يعد أسلوب تحليل السلسل الزمنية من الأساليب الإحصائية التي تهتم بدراسة البيانات عبر فترات زمنية منتظمة مثل يوم أو أسبوع أو شهر وهكذا، ويطلب هذا التحليل تحديد الأنماذج المناسب الذي يصف العلاقة بين هذه البيانات وثم تقدير معلمات هذا الأنماذج باستخدام طرائق التقدير المناسبة. ومن هذه النماذج أنماذج الانحدار الذاتي Autoregressive الذي يستخدم في الكثير من المجالات التطبيقية، وتستخدم طريقة المربيعات الصغرى التقليدية وطرائق أخرى في تقدير معلمات هذا الأنماذج، وبما أن هناك قيود متباعدة على الأنماذج لتحقيق الاستقرارية لذلك تم في هذا البحث استخدام طرفيتين للتقدير في حالة وجود قيود متباعدة ومقارنتها بطريقة المربيعات الصغرى التقليدية في تقدير معلمة أنماذج الانحدار الذاتي من الدرجة الأولى ومن خلال تجارب المحاكاة تبين أن طريقة المربيعات الصغرى التقليدية تعطي أفضل النتائج.

2. أنماذج الانحدار الذاتي من الدرجة الأولى (7)First Order Autoregressive Model:
يعد الباحث Yule⁽⁶⁾ أول من وضع فكرة الانحدار الذاتي وذلك في العام 1927، إذ صاغ أنماذج لغاية الدرجة الرابعة، وفي العام 1931 طور الباحث Walker⁽⁶⁾ الأنماذج ليصل به إلى الدرجة (P) الذي يكون بالمعادلة الآتية:

$$Z_t = \phi_1 Z_{t-1} + \phi_2 Z_{t-2} + \dots + \phi_p Z_{t-p} + a_t \quad \dots (1)$$

حيث أن $t = p+1, p+2, \dots$ و a_t الخطأ العشوائي الذي يتبع التوزيع الطبيعي Gaussian بوسط حسابي يساوي صفر وتبين σ^2 ، أو توزيع آخر و ϕ_i تمثل معلمات الأنماذج $p, 1, 2, \dots, p$. يلاحظ من المعادلة (1) أن القيمة الحالية للسلسلة الزمنية يعبر عنها بدالة المجموع الموزون للقيم السابقة نفسها مضافة إليه الخطأ العشوائي . ويمكن كتابة أنماذج الانحدار الذاتي من الدرجة الأولى بعد التعويض عن قيمة $P=1$ في المعادلة رقم (1) لنحصل على المعادلة الآتية:

$$Z_t = \phi_1 Z_{t-1} + a_t \quad \dots (2)$$

ويمكن كتابة الأنماذج باستخدام عامل الارتداد الخلفي (B) بالمعادلة الآتية:

$$\phi(B)Z_t = a_t \quad \dots (3)$$

وتتحقق الاستقرارية لأنماذج عندما تكون جذور المعادلة $= 0$ $(B - \phi)$ خارج الدائرة التي نصف قطرها يساوي واحد $[|B| > 1]$ وبمعنى آخر $1 < |\phi|$.

ويدعى الأنماذج من الدرجة الأولى بعملية ماركوف Markov Process أيضاً وذلك لأن قيمة Z_t تحدد بال تماماً بالاعتماد على المعلومات الخاصة بـ Z_{t-1} . ولتقدير معلمة الأنماذج ϕ تستخدم طريقة المربيعات الصغرى الاعتيادية Ordinary Least Squares وكما في المعادلة الآتية:

$$\hat{\phi}_1 = \frac{\sum_{t=1}^n Z_t Z_{t-1}}{\sum_{t=1}^n Z_{t-1}^2} \quad \dots (4)$$

3. التقدير بوجود القيود المتباينة:

في انموذج الانحدار الذاتي من الرتبة الأولى هناك قيد متباين على معلمة الانموذج لتحقيق الاستقرارية، وهذا القيد هو $\phi_1 < 1$ – وهو يمثل معلومات حول معلمة الانموذج ويمكن الاستفادة منها في تقدير هذه المعلمة، وسيتم استخدام طريقتان لتقدير معلمة الانموذج في حالة وجود قيد متباين واحد وهاتان الطريقتان هما.

3.1 طريقة ثيل وكولووبرجر :⁽¹⁾ Theil-Goldbreger Method

تستخدم هذه الطريقة في حالة وجود قيد متباين واحد فقط، ويمكن تلخيص هذه الطريقة بالخطوات الآتية:

- نفرض توفر القيد المتباين حول معلمة الانموذج $a \leq \phi_1 \leq b$ حيث أن a يمثل الحد الأدنى للقيد و b يمثل الحد الأعلى للقيد.

إن احتمال وقوع ϕ_1 خارج المجال يساوي صفر في حين أن احتمال وقوع ϕ_1 داخل المجال يساوي واحد، عليه ينبغي وضع احتمال لوقوع ϕ_1 داخل المجال، وبفرض أن توزيع ϕ_1 داخل المجال هو التوزيع المنتظم المستمر Continuous Uniform Distribution معرف بالصيغ الآتية:

$$\phi_1 = \frac{a+b}{2} + u$$

$$u = \phi_1 - \frac{a+b}{2} \quad \dots(5)$$

$$E(u) = 0$$

$$Var(u) = \frac{(a+b)^2}{12}$$

- يتم توسيع العينة المدروسة بإضافة المشاهدة $(n+1)$ إلى المتغير Z_{t-1} و Z_t وبقيمة تساوي واحد على التوالي، وبما أن قيمة a و b متساوية في القيد الخاص

بالاستقرارية، لذلك ستكون $\frac{(b+a)\sigma_u^2\sqrt{3}}{(b-a)} = 0$ ، وأن σ_u^2 تمثل تباين العينة يتم تقديره من خلال

متوسط مربعات الخطأ لأنموذج باستخدام طريقة المربعات الصغرى على البيانات الأصلية.

- يتم استخدام طريقة المربعات الصغرى الاعتيادية OLS للحصول على تقدير معلمة الانموذج ϕ_1 بعد توسيع العينة بمشاهدة واحدة وكما في المعادلة الآتية:

$$\hat{\phi}_{1_{TG}} = \frac{\sum_{t=1}^{n+1} Z_t Z_{t-1}}{\sum_{t=1}^{n+1} Z_{t-1}^2} \quad \dots(6)$$

3.2 طريقة التقدير المختلط: ⁽¹⁾Mixed Estimation Method

تستخدم هذه الطريقة في حال وجود قيد متباين واحد أو أكثر، وتدمج هذه الطريقة بين المعلومات المتوفرة خارج العينة وبين بيانات العينة موضوع الدراسة. ويمكن تلخيص هذه الطريقة بالخطوات الآتية:

- نفرض توفر القيد المتباين حول معلمة الأنماذج $a \leq \phi_1 \leq b$ حيث أن a يمثل الحد الأدنى للقيد و b يمثل الحد الأعلى للقيد.
- يتم حساب المقدر المسبق للمعلمة وكما في المعادلة الآتية:
- الحد الأدنى للمعلمة + الحد الأعلى للمعلمة

$$\bar{\phi}_1 = \frac{\text{الحد الأدنى للمعلمة} + \text{الحد الأعلى للمعلمة}}{2} \dots (7)$$

- يتم حساب التباين للمقدر المسبق وكما يأتي:

$$S_{\phi_1}^2 = S^2(\bar{\phi}_1) = \left[(\bar{\phi}_1 \pm \frac{1}{2}) \right]^2 \dots (8)$$

- يتم استخدام المربعات الصغرى العامة GLS للحصول على تقدير معلمة الأنماذج وكما في المعادلة الآتية:

$$\hat{\phi}_{1_{ME}} = \frac{\sum_{t=1}^{n+1} Z_t Z_{t-1}}{\sum_{t=1}^{n+1} Z_{t-1}^2} + \frac{\sum_{t=1}^{n+1} Z_t Z_{t-1}}{\sigma_u^2 S_{\phi_1}^2} \dots (9)$$

4. المحاكاة

لفرض المقارنة وبيان جودة طرائق تقدير معلمة انماذج الانحدار الذاتي، سيتم استخدام المحاكاة، التي يمكن استخدامها في إجراء المقارنة ما بين الطرائق المدروسة أو المقترحة لمعرفة أيهما الأفضل. ويتم ذلك من خلال صياغة تجارب تمثل الحالات التي يمكن أن تحصل في الواقع العملي. وسيتم صياغة التجارب بحيث يمكن من خلالها الإجابة على التساؤلات الآتية:

1. كيفية تأثير طرائق التقدير تجاه التغير في حجم العينة.

2. كيفية تأثير طرائق التقدير تجاه التغير في توزيع الخطأ العشوائي.

وسيتم استخدام متوسط مربعات الخطأ للمعلمات المقدرة كمعيار للمقارنة.

كل تجربة سيتم تكرارها 1000 مرة. وسيتم اختيار أربعة حجوم للعينات وهي كما يأتي:

$n=(50,100,150,200)$

$$\phi_1 = (\pm 0.1, \pm 0.5, \pm 0.9)$$

والقيد المفروض لتحقيق الاستقرارية هو $\phi_1 \leq 0.9999$.
اما انواع الخطأ العشوائي فسيتم اختيار خمسة توزيعات للخطأ العشوائي وهي كما يأتي:

- التوزيع الطبيعي المعياري $N(0,1)$

- التوزيع الطبيعي $N(0,100)$

- التوزيع اللوغارتمي الطبيعي $LogN(0,1)$

- التوزيع الأسوي الثاني $DE(0,1)$

- توزيع الطالب $t(5)$

للحصول على تقدير معلمة انموج الانحدار الذاتي ϕ_1 سيتم استخدام الطرائق المبينة أعلاه وحسب الجدول الآتي:

المعادلات المستخدمة	التسمية	الطريقة	ت
4	OLS	المربعات الصغرى الاعتيادية	.1
6	TG	طريقة ثيل وكولوبرجر	.2
9	ME	التقدير المختلط	.3

4.1 تحليل نتائج المحاكاة

سيتم في هذه الفقرة تحليل نتائج المحاكاة وحسب توزيعات الخطأ العشوائي:

4.1.1 التوزيع الطبيعي المعياري $N(0,1)$

الجدول رقم (1) يبين القيمة التقديرية ومتوسط مربعات الخطأ لمعلمة الانموج في حالة الخطأ يتوزع التوزيع الطبيعي المعياري، يلاحظ من الجدول أن قيمة متوسط مربعات الخطأ لمعلمة الانموج تتناقص بزيادة حجم العينة لجميع الطرائق ما عدا طريقة TG إذ كانت قيمها تتزايد بزيادة حجم العينة، وأن طريقة OLS تمنح قيمة اصغر عندما تكون $\phi_1 = (\pm 0.5, \pm 0.9)$ وعندما تكون $\phi_1 = (\pm 0.1)$ كانت ME تمنح قيمة اصغر عند حجم العينة 50 و 100 وتاليها طريقة TG ومن ثم طريقة OLS بينما عند حجم 150 و 200 كانت طريقة OLS تمنح قيمة اصغر.

جدول (1) بين القيمة التقديرية
ومتوسط مربعات الخطأ لملعمة الأنماذج عندما يتوزع الخطأ
 $e \sim N(0,1)$

المعلمة	-0.9			-0.5			-0.1			
	OLS	TG	ME	OLS	TG	ME	OLS	TG	ME	
حجم العينة	$\hat{\phi}_1$	-0.8682	-0.0296	0.4487	0.4819	0.0047	0.1205	-0.0967	-0.0007	-0.0195
	MSE	0.0071	0.7580	0.2229	0.0158	0.2454	0.1461	0.0181	0.0099	0.0072
100	$\hat{\phi}_1$	-0.8804	-0.0149	0.4685	0.4880	0.0022	0.1206	-0.0976	-0.0003	-0.0196
	MSE	0.0031	0.7834	0.1981	0.0081	0.2478	0.1450	0.0103	0.0099	0.0069
150	$\hat{\phi}_1$	-0.8887	-0.0105	0.4841	0.4925	0.0015	0.1216	-0.0993	-0.0002	-0.0198
	MSE	0.0017	0.7913	0.1812	0.0052	0.2485	0.1439	0.0066	0.0100	0.0067
200	$\hat{\phi}_1$	-0.8899	-0.0077	0.4864	0.4947	0.0011	0.1218	-0.0962	-0.0002	-0.0191
	MSE	0.0013	0.7962	0.1776	0.0038	0.2489	0.1436	0.0049	0.0100	0.0067
حجم العينة	المعلمة	0.9		0.5		0.1				
50	$\hat{\phi}_1$	0.8635	0.0282	0.4397	0.4789	0.0046	0.1193	0.0977	0.0007	0.0199
	MSE	0.0079	0.7603	0.2301	0.0161	0.2454	0.1469	0.0198	0.0099	0.0073
100	$\hat{\phi}_1$	0.8832	0.0152	0.4735	0.4900	0.0023	0.1211	0.0979	0.0003	0.0196
	MSE	0.0026	0.7829	0.1926	0.0074	0.2477	0.1445	0.0100	0.0099	0.0069
150	$\hat{\phi}_1$	0.8858	0.0100	0.4780	0.4949	0.0015	0.1222	0.0996	0.0002	0.0199
	MSE	0.0019	0.7921	0.1862	0.0050	0.2485	0.1434	0.0068	0.0100	0.0067
200	$\hat{\phi}_1$	0.8923	0.0078	0.4906	0.4945	0.0011	0.1218	0.0988	0.0002	0.0197
	MSE	0.0011	0.7961	0.1736	0.0039	0.2489	0.1435	0.0050	0.0100	0.0067

4.1.2 التوزيع الطبيعي $N(0,100)$

الجدول رقم (2) يبين القيمة التقديرية ومتوسط مربعات الخطأ لملعمة الأنماذج في حالة الخطأ يتوزع التوزيع الطبيعي بمتوسط صفر وتباعين قدره 100، يلاحظ من الجدول أن قيم متوسط مربعات الخطأ لملعمة الأنماذج تتناقص بزيادة حجم العينة لجميع الطرائق ما عدا طريقة TG إذ لم تتغير قيمها بزيادة حجم العينة، وأن طريقة OLS تمنح قيمًا أصغر عندما تكون $(\hat{\phi}_1 = (\pm 0.5, \pm 0.9))$ وعندما تكون $(\hat{\phi}_1 = (\pm 0.1))$ كانت ME أصغر قيمًا عند حجم العينة 50 وتاليتها طريقة TG ومن ثم طريقة OLS وعند حجم العينة 100 كانت ME تمنح قيمًا أصغر بينما عند حجم 150 كانت القيم تتساوى بين OLS وME وعند حجم العينة 200 كانت طريقة OLS تمنح قيمًا أصغر.

جدول (2) بين القيمة التقديرية
ومتوسط مربعات الخطأ لمعلمة الأنماذج عندما يتوزع الخطأ
 $e \sim N(0,100)$

المعلمة		-0.9			-0.5			-0.1		
حجم العينة	الطرائق	OLS	TG	ME	OLS	TG	ME	OLS	TG	ME
	$\hat{\phi}_1$	-0.8650	-0.0003	-0.4467	-0.4788	0.0000	-0.1192	-0.0910	0.0000	-0.0185
50	MSE	0.0083	0.8094	0.2262	0.0160	0.2500	0.1469	0.0193	0.0100	0.0075
	$\hat{\phi}_1$	-0.8821	-0.0002	-0.4717	-0.4891	0.0000	-0.1210	-0.0957	0.0000	-0.0192
100	MSE	0.0028	0.8097	0.1939	0.0080	0.2500	0.1447	0.0096	0.0100	0.0069
	$\hat{\phi}_1$	-0.8898	-0.0001	-0.4865	-0.4945	0.0000	-0.1224	-0.1003	0.0000	-0.0200
150	MSE	0.0016	0.8098	0.1787	0.0055	0.2500	0.1434	0.0067	0.0100	0.0067
	$\hat{\phi}_1$	-0.8915	-0.0001	-0.4895	-0.4916	0.0000	-0.1206	-0.0990	0.0000	-0.0197
200	MSE	0.0013	0.8099	0.1748	0.0038	0.2500	0.1444	0.0049	0.0100	0.0066
حجم العينة	المعلمة	0.9			0.5			0.1		
50	$\hat{\phi}_1$	0.8640	0.0003	0.4429	0.4735	0.0000	0.1174	0.0913	0.0000	0.0186
	MSE	0.0079	0.8095	0.2280	0.0156	0.2500	0.1484	0.0202	0.0100	0.0075
100	$\hat{\phi}_1$	0.8815	0.0002	0.4710	0.4893	0.0000	0.1207	0.0961	0.0000	0.0193
	MSE	0.0030	0.8097	0.1950	0.0071	0.2500	0.1448	0.0101	0.0100	0.0069
150	$\hat{\phi}_1$	0.8895	0.0001	0.4854	0.4957	0.0000	0.1225	0.1023	0.0000	0.0204
	MSE	0.0016	0.8098	0.1797	0.0049	0.2500	0.1432	0.0066	0.0100	0.0066
200	$\hat{\phi}_1$	0.8911	0.0001	0.4876	0.4966	0.0000	0.1226	0.1019	0.0000	0.0203
	MSE	0.0011	0.8099	0.1759	0.0040	0.2500	0.1430	0.0053	0.0100	0.0066

4.1.3 التوزيع اللوغاريتمي الطبيعي $LogN(0,1)$

الجدول رقم (3) يبين القيمة التقديرية ومتوسط مربعات الخطأ لمعلمة الأنماذج في حالة الخطأ يتوزع التوزيع اللوغاريتمي الطبيعي بمتوسط صفر وتباعن قدره 1، يلاحظ من الجدول أن قيم متوسط مربعات الخطأ لمعلمة الأنماذج تتناقص بزيادة حجم العينة لجميع الطرائق ما عدا طريقة TG إذ كانت قيمها تتزايد بزيادة حجم العينة، وان طريقة OLS تمنح قياما اصغر عندما تكون $\phi_1 = (-0.5, -0.9)$ وعندما تكون $\phi_1 = (\pm 0.1)$ كانت طريقة TG تمنح قياما اصغر وعندما تكون $\phi_1 = (0.5, 0.9)$ كانت طريقة ME تمنح قياما اصغر عند جميع أحجام العينات.

جدول (3) بين القيمة التقديرية

ومتوسط مربعات الخطأ لمعلمة الأنماذج عندما يتوزع الخطأ $e \sim LogN(0,1)$

المعلمة		-0.9			-0.5			-0.1		
حجم العينة	الطرائق	OLS	TG	ME	OLS	TG	ME	OLS	TG	ME
	$\hat{\phi}_1$	-0.7662	-0.0027	0.3128	-0.1674	-0.0002	0.0351	0.3331	0.0008	0.0743
50	MSE	0.0345	0.8051	0.3600	0.1350	0.2498	0.2173	0.2074	0.0102	0.0317
	$\hat{\phi}_1$	-0.8020	-0.0014	0.3412	-0.1972	-0.0001	0.0411	0.3061	0.0003	0.0665
100	MSE	0.0160	0.8075	0.3215	0.1068	0.2499	0.2113	0.1780	0.0101	0.0286
	$\hat{\phi}_1$	-0.8125	-0.0009	0.3510	-0.2129	-0.0001	0.0443	0.2906	0.0002	0.0623
150	MSE	0.0117	0.8084	0.3083	0.0937	0.2499	0.2082	0.1622	0.0100	0.0269
	$\hat{\phi}_1$	-0.8218	-0.0007	0.3622	-0.2157	-0.0001	0.0446	0.2829	0.0001	0.0603
200	MSE	0.0092	0.8087	0.2949	0.0894	0.2499	0.2078	0.1549	0.0100	0.0262
حجم العينة	المعلمة	0.9			0.5			0.1		
50	$\hat{\phi}_1$	1.0040	0.1139	0.9225	0.8453	0.0067	0.3872	0.5286	0.0016	0.1388
	MSE	0.0109	0.6262	0.0023	0.1224	0.2434	0.0190	0.1977	0.0097	0.0039
100	$\hat{\phi}_1$	0.9970	0.0594	0.9285	0.8356	0.0026	0.3755	0.5145	0.0006	0.1311
	MSE	0.0094	0.7087	0.0017	0.1148	0.2474	0.0198	0.1806	0.0099	0.0022
150	$\hat{\phi}_1$	0.9950	0.0391	0.9298	0.8309	0.0015	0.3674	0.5070	0.0004	0.1281
	MSE	0.0090	0.7419	0.0016	0.1113	0.2485	0.0211	0.1733	0.0099	0.0018
200	$\hat{\phi}_1$	0.9940	0.0272	0.9283	0.8289	0.0011	0.3667	0.5058	0.0002	0.1268
	MSE	0.0089	0.7621	0.0015	0.1098	0.2489	0.0208	0.1704	0.0100	0.0015

4.1.4 التوزيع الأسوي الثاني $DE(0,1)$

الجدول رقم (4) يبين القيمة التقديرية ومتوسط مربعات الخطأ لمعلمة الأنماذج في حالة الخطأ يتوزع التوزيع الأسوي الثاني بمتوسط 0 وتبالين 1، يلاحظ من الجدول أن قيم متوسط مربعات الخطأ لمعلمة الأنماذج تتناقص بزيادة حجم العينة لجميع الطرائق ما عدا طريقة TG إذ كانت قيمها تتزايد بزيادة حجم العينة، وأن طريقة OLS تمنح قيمة أصغر عندما تكون $(\pm 0.5, \pm 0.9) = \phi_1$ وعندما تكون $(\pm 0.1) = \phi_1$ كانت طريقة ME تمنح قيمة أصغر عند حجم العينة 50 و 100 وتاليها طريقة TG ومن ثم طريقة OLS بينما عند حجم 150 و 200 كانت طريقة OLS تمنح قيمة أصغر وتاليها طريقة ME.

جدول (4) بين القيمة التقديرية
ومتوسط مربعات الخطأ لمعلمة الأنماذج عندما يتوزع الخطأ
 $e \sim DE(0,1)$

المعلمة		-0.9			-0.5			-0.1		
الطرائق حجم العينة		OLS	TG	ME	OLS	TG	ME	OLS	TG	ME
50	$\hat{\phi}_1$	-0.8657	-0.0569	-0.4433	-0.4866	-0.0097	-0.1211	-0.0988	-0.0015	-0.0201
	MSE	0.0078	0.7123	0.2272	0.0131	0.2404	0.1452	0.0193	0.0097	0.0072
100	$\hat{\phi}_1$	-0.8816	-0.0299	-0.4695	-0.4927	-0.0047	-0.1222	-0.0949	-0.0007	-0.0190
	MSE	0.0028	0.7573	0.1959	0.0078	0.2453	0.1437	0.0100	0.0099	0.0070
150	$\hat{\phi}_1$	-0.8873	-0.0200	-0.4790	-0.4948	-0.0031	-0.1221	-0.1028	-0.0005	-0.0205
	MSE	0.0017	0.7744	0.1843	0.0049	0.2469	0.1435	0.0062	0.0099	0.0066
200	$\hat{\phi}_1$	-0.8923	-0.0157	-0.4905	-0.4932	-0.0023	-0.1212	-0.0968	-0.0003	-0.0192
	MSE	0.0011	0.7821	0.1737	0.0037	0.2477	0.1440	0.0045	0.0099	0.0067
حجم العينة	المعلمة	0.9			0.5			0.1		
50	$\hat{\phi}_1$	0.8681	0.0576	0.4483	0.4845	0.0099	0.1208	0.0960	0.0015	0.0195
	MSE	0.0070	0.7110	0.2229	0.0140	0.2403	0.1456	0.0178	0.0097	0.0072
100	$\hat{\phi}_1$	0.8849	0.0317	0.4794	0.4922	0.0046	0.1218	0.0998	0.0007	0.0200
	MSE	0.0029	0.7542	0.1888	0.0073	0.2454	0.1440	0.0091	0.0099	0.0068
150	$\hat{\phi}_1$	0.8889	0.0206	0.4835	0.4915	0.0030	0.1209	0.0974	0.0005	0.0194
	MSE	0.0016	0.7733	0.1808	0.0049	0.2470	0.1443	0.0065	0.0099	0.0068
200	$\hat{\phi}_1$	0.8917	0.0155	0.4892	0.4929	0.0023	0.1213	0.0985	0.0003	0.0196
	MSE	0.0012	0.7824	0.1748	0.0042	0.2478	0.1440	0.0048	0.0099	0.0067

توزيع الطالب $t(5)$ 4.1.5

الجدول رقم (5) يبيّن القيمة التقديرية ومتوسط مربعات الخطأ لمعلمة الأنماذج في حالة الخطأ يتوزع توزيع الطالب بمتوسط 0 وتباعين 1.667، يلاحظ من الجدول أن قيم متوسط مربعات مربعات الخطأ لمعلمة الأنماذج تتناقص بزيادة حجم العينة لجميع الطرائق ما عدا طريقة TG إذ كانت قيمها تتزايد بزيادة حجم العينة، وأن طريقة OLS تمنح قيماً أصغر عندما تكون $\phi_1 = (\pm 0.5, \pm 0.9)$ وعندما تكون $\phi_1 = (\pm 0.1)$ كانت طريقة ME تمنح قيماً أصغر عند حجم العينة 50 و 100 بينما عند حجم 150 و 200 كانت طريقة OLS تمنح قيماً أصغر.

جدول (5) بين القيمة التقديرية
ومتوسط مربعات الخطأ لمعلمة الأنموذج عندما يتوزع الخطأ $e \sim t(5)$

المعلمة		-0.9			-0.5			-0.1		
حجم العينة	الطرائق	OLS	TG	ME	OLS	TG	ME	OLS	TG	ME
	$\hat{\phi}_1$	-0.8683	-0.0189	-0.4487	-0.4855	-0.0030	-0.1215	-0.0962	-0.0005	-0.0196
50	MSE	0.0069	0.7765	0.2221	0.0152	0.2470	0.1451	0.0182	0.0099	0.0072
	$\hat{\phi}_1$	-0.8818	-0.0095	-0.4713	-0.4882	-0.0014	-0.1206	-0.0969	-0.0002	-0.0194
100	MSE	0.0031	0.7931	0.1952	0.0079	0.2486	0.1449	0.0092	0.0100	0.0069
	$\hat{\phi}_1$	-0.8893	-0.0065	-0.4846	-0.4934	-0.0009	-0.1218	-0.0920	-0.0001	-0.0183
150	MSE	0.0015	0.7984	0.1802	0.0051	0.2491	0.1437	0.0066	0.0100	0.0069
	$\hat{\phi}_1$	-0.8921	-0.0048	-0.4902	-0.4947	-0.0007	-0.1216	-0.0964	-0.0001	-0.0192
200	MSE	0.0012	0.8014	0.1738	0.0034	0.2493	0.1436	0.0048	0.0100	0.0067
	المعلمة	0.9			0.5			0.1		
50	$\hat{\phi}_1$	0.8669	0.0187	0.4448	0.4823	0.0029	0.1207	0.0936	0.0004	0.0189
	MSE	0.0073	0.7768	0.2253	0.0161	0.2471	0.1459	0.0188	0.0099	0.0074
100	$\hat{\phi}_1$	0.8813	0.0095	0.4711	0.4909	0.0014	0.1215	0.1027	0.0002	0.0206
	MSE	0.0030	0.7930	0.1956	0.0076	0.2486	0.1442	0.0098	0.0100	0.0067
150	$\hat{\phi}_1$	0.8867	0.0063	0.4795	0.4949	0.0009	0.1222	0.1007	0.0001	0.0201
	MSE	0.0018	0.7988	0.1848	0.0050	0.2491	0.1434	0.0060	0.0100	0.0066
200	$\hat{\phi}_1$	0.8923	0.0048	0.4914	0.4959	0.0007	0.1222	0.0992	0.0001	0.0197
	MSE	0.0012	0.8014	0.1731	0.0039	0.2493	0.1432	0.0050	0.0100	0.0066

الاستنتاجات Conclusions: 5

تبين من خلال تجارب المحاكاة أن طريقة OLS كانت تعطي أقل متوسط مربعات خطأ لتقدير معلمة الأنماذج وتاليها طريقة ME عند جميع قيم ϕ_1 ولجميع أحجام العينات ما عدا عندما تأخذ $\phi_1 = (\pm 0.1)$ فكانت طريقة ME تعطي أقل متوسط مربعات خطأ لتقدير معلمة الأنماذج عند حجم العينة 50 و 100 وعند باقي أحجام العينة المدروسة كانت طريقة OLS تعطي أقل قيم ولجميع التوزيعات المدروسة، ما عدا عندما يتوزع الخطأ التوزيع اللوغاريتمي الطبيعي إذ منحت طريقة OLS قيمًا أصغر عندما تكون $\phi_1 = (-0.5, -0.9)$ وعندما تكون $\phi_1 = (0.5, 0.9)$ كانت طريقة ME تمنح فيما أصغر عند جميع أحجام العينات وعندما تكون $\phi_1 = (\pm 0.1)$ كانت طريقة TG عند جميع أحجام العينات.

المصادر العربية: References: 6

- .1 الحسناوي، أ.د. أموري هادي كاظم القيسي، باسم شلبيه مسلم (2002)، القياس الاقتصادي المتقدم النظرية والتطبيق، مطبعة الطيف ، بغداد.
- .2 الدوري، أحلام احمد جمعة (2003)، بعض الاختبارات الإحصائية لأنماذج الانحدار الذاتي من الرتبة الأولى، أطروحة دكتوراه فلسفية في الإحصاء، كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة بغداد.
3. Evans Merran , Nicholas Hastings, Brian Peacock (2000).Statistical Distributions .3rd ed.John Wiley & Sons. Inc. USA.
4. Fishman S ,George (1973).Concept And Methods In Discrete Event Digital Simulation .John Wiley & Sons. Inc. USA.
5. Hamilton, James D.(1994). Time Series Analysis, Princeton University Press.
6. Makridakis, S.(1976). A Survey of Time Series, *Journal of International Statistical Review* , Vol. 44, No 1, PP: 29-70.
7. Wei,William W.S.(1990). Time Series Analysis, Addison Wesley Publishing Company.