

Effect of three concentration of licorice extract with drinking water in some semen's characteristics of local Iraqi roosters

تأثير استخدام ثلاثة تراكيز من مستخلص عرق السوس مع ماء الشرب على بعض الصفات النوعية للسائل المنوي للديكة المحلية.

يعنى عباس مردادس د. ثامر كريم الجنابي* * م. سلام مرزة سهيل * د. احمد نوري الياسري*
وزارة العلوم والتكنولوجيا
جامعة كربلاء - كلية الزراعة - قسم الثروة الحيوانية

المستخلص:

أجريت هذه الدراسة لبيان تأثير استعمال مستخلص عرق السوس في ماء الشرب على بعض الصفات النوعية للسائل المنوي للديكة المحلية إذ قسمت الدراسة إلى أربعة معاملات استعمل مع ثلاثة منها مستخلص عرق السوس مع ماء الشرب في حين لم تضاف أي نسبة من المستخلص إلى المعاملة الأولى (T1) إذ اعتبرت معاملة سيطرة وقد بينت النتائج إن استعمال 10% و 20% و 30% من المستخلص للمعاملات T2, T3 و T4 على التوالي قد أدى إلى تحسن معنوي في كل من حجم القذفة وتركيب النطف والحركة الجماعية والحركة الفردية للنطف بينما أدى إلى انخفاض معنوي في نسب النطف الميتة والنطف المشوهة بالمقارنة مع نسب معاملة السيطرة (T1) وان أفضل النتائج التي تم الحصول عليها كانت باستعمال 30% من مستخلص عرق السوس مع ماء الشرب . وقد أثبتت هذه الدراسة إن لمستخلص عرق السوس تأثير إيجابي في تحسين الصفات النوعية للسائل المنوي للديكة العراقية.

ABSTRACT

This study was conducted to examine effect of licorice extract that was added to drinking water of local Iraqi roosters on some semen traits .The animal was divided randomly in to four groups. 10%,20% and 30% of licorice extract was added to water of T2,T3 and T4 respectively. Whereas T1 used as control treatment . The results showed highly significant increase in the semen quality compare with control treatment.The ejaculation volume,mass activity, individual motility and sperms concentration increased significantly in T2,T3 and T4 in compare with T1 ,while T2,T3andT4 decreased significantly in abnormal and died sperms percentage. This study indicate that the licorice extract has good influence to improvement of semen quality of local Iraqi roosters .

المقدمة:

يعد عرق السوس احد النباتات البرية التي تنمو قرب المسطحات المائية ويستخدم منذ القدم كعشبة علاجية حيث استخدم هذا النبات منذ أكثر من أربعة ألف سنة . إن الجزء المستخدم من عرق السوس هو جذوره التي تنمو تحت التربة ويجري تقطيعها لتحضير الشراب أو المستخلص أو سحقها للتحضير مسحوق ناعم يستخدم في عدد من العلاجات مثل القرحة والتشنجات المعاوية أو لتفحيف آثار العطش أو لعلاج فقر الدم كذلك يمزج المسحوق مع الحليب البقرى لزيادة إدرار الحليب عند الأمهات كما يستخدم لعلاج بعض المشاكل الجلدية مثل علاج الحروق ومنع تساقط الشعر . (1) وكذلك استخدام الأوربيون مستخلص عرق السوس في علاج السعال والتهاب الأمعاء والقرحة . (2) أما في مجال الإنتاج الحيواني فلم يتم استخدام عرق السوس بشكل موسع وعلى الرغم من ذلك فقد استخدم مستخلص عرق السوس في تغذية فروج اللحم تحت ظروف الإجهاد الحراري وقد أعطى نتائج متميزة إذ أدى إلى تحسن معنوي في معدل وزن الجسم وكفائه التحويل الغذائي ومعدل استهلاك الماء اليومي ومعدل استهلاك العلف التراكمي والحيوية والدليل الإنتاجي والمؤشر الاقتصادي ونسبة التصافي .(3) كذلك فإن إضافة عرق السوس بمقدار 0.25 و 0.75 غم لكل كغم وزن حي إلى النعاج العواصية أدى إلى تحسن معنوي في الكفاءة التنسالية وارتفاع نسبة الخصوبة والولادات . (4) وفي دراسة أجراها الباحث (5) باستخدام مستخلص عرق السوس على الفتران الاسترالية البيضاء وجد إن له تأثير معنوي إيجابي على إنزيمات الكبد وعمل الكلية والطحال . ولوحظ ان اضافة مستخلص عرق السوس الى ماء شرب فروج اللحم ادى الى

تحسن معنوي في الاداء الانتاجي بمختلف جوانبه والاداء الفسلجي وصفات النبیحة والصفات النوعية للحم . كما لوحظ من ناحية ثانية ، ان استخدام مستخلص عرق السوس في ماء شرب الطيور كان وسيلة فعالة في التخفيف من تأثير الاجهاد الحراري على الطيور المرباة خلال اشهر الصيف كما ان ادخال مستخلص عرق السوس في تركيبة مخفف السائل المنوي للديكة ادى الى تحسن معنوي في نوعية السائل المنوي الذي تم خزنه بدرجة حرارة $6 - 4^{\circ}\text{C}$ ، كما انه ادى الى اطالة فترة خزن السائل المنوي مع المحافظة على نوعيته لمدة 72 ساعة . (6) وقد اجريت الدراسة الحالية بهدف معرفة تأثير اضافة مستخلص عرق السوس مع ماء الشرب في بعض الصفات النوعية للسائل المنوي للديكة المحلية العراقية.

المواد وطرائق العمل :

اجريت هذه الدراسة بتاريخ 1 / 3 / 2012 واستخدم ستين ديكما محليا تتراوح اعمارهم بين 50 – 40 أسبوعا، حصلنا عليها من السوق المحلية لناحية الحسينية التابعة الى محافظة كربلاء و تم دراسة تأثير إضافة مستخلص عرق السوس إلى ماء الشرب بنسبة 10 و 20 و 30% على عدد من الصفات النوعية للسائل المنوي إذ قسمت التجربة إلى أربع معاملات وكل معاملة إلى ثلاث مكررات وكل مكرر مكون من خمسة ديكه. تم تقديم نفس العلية إلى كل المعاملات في حين تم تقديم الماء إلى المعاملة الأولى (T1) بدون أية إضافة مستخلص عرق السوس إذ اعتبرت معاملة سيطرة . (CONTROL) أما المعاملة الثانية (T2) فقد تم إضافة 10% من مستخلص عرق السوس إلى ماء الشرب . وفي المعاملة الثالثة (T3) تم إضافة 20% من مستخلص عرق السوس أما المعاملة الرابعة (T4) فقد أضيف 30% من المستخلص إلى ماء الشرب، ودرّبت الديكة على جمع السائل المنوي ولمدة عشرة أيام قبل اخذ العينات بطريقة المساج الظاهري - البطني (7) وبعد مرور شهر على الإضافة وبشكل دوري اي يعاد إضافة الماء كلما نفذ بنفس المقادير أعلاه تم جمع السائل المنوي من الديكة اذ تم جمع عينة جماعية من كل معاملة في أنبوبة مدرجة قياس 15 مل ذات تدرجات 0.1 مل وذلك لتحديد حجم القذفة لكل ديك وقد جمع السائل المنوي في الساعة الثامنة صباحا بعد قطع العلف والماء قبل خمس ساعات من إجراء عملية الجمع وذلك لتلافي تلوث السائل المنوي . وتخلص عملية جمع السائل المنوي بإجراء تدليك المنطقة الضectorale نزولا إلى منطقة الذيل إذ يقوم الطير بإباراز الحلمة وعند بروز الحلمة يجب الضغط على منطقة المجمع وبشكل ثابت إذ ينساب السائل المنوي من الحليمات ويتم جمعه بواسطة الأنبوبة المدرجة لقياس حجمه ثم البدء مباشرة بإجراء الفحوص الأخرى . وتم تقدير الحركة الجماعية للحيامن بوضع قطره من السائل المنوي على شريحة زجاجية ثم يوضع غطاء الشريحة بشكل انساني وبهدوء وفحصها تحت المجهر بقوة تكبير . (X 100) أما الحركة الفردية فتم استخدام قوة تكبير (X400) وتم إتباع تقدير الدرجات حسب الطريقة الموضحة فيما يلي : (8)

مميزاتها	تقدير الحركة الجماعية(%)
لا توجد اي حركة	0
وجود حركة لبعض الحيامن	10-20
وجود حركة تقدمية للحيامن	30-40
ظهور أمواج ودوامات بسيطة	50-60
وجود حركة تقدمية للحيامن مع ظهور أمواج ودوامات ذات سرعه كبيرة	70-80
وجود حركة تقدمية سرعتها واضحة مع ظهور دوامات متحركة بسرعة فائقة	90-100
مميزاتها	تقدير الحركة الفردية(%)
عموما جميع الحيامن غير متحركة	0
بعض الحيامن متحركة	10-20
غالبية الحيامن غير متحركة	30-40
نصف الحيامن متحركة	50-60
غالبية الحيامن متحركة	70-80
عموما جميع الحيامن متحركة	90-100

ويتم تقدير تركيز النطف باستعمال جهاز الهيموسايتوميتر (Heamosytometer) الذي يستعمل لعد كريات الدم الحمر والبيض حيث يتكون هذا الجهاز من خمسة مربعات كبيرة كل واحد منها يتكون من خمسة وعشرين مربعا متوضطا وكل مربع متوسط يتكون من ستة عشر مربعا صغيرا . ولقياس تركيز النطف يتم اختيار خمسة مربعات متوسطة والتي هي المربع الوسطي والمربعان العلويان الأيمن والأيسر والسفليان الأيمن والأيسر . وبعد عملية عد النطف يتم استخدام المعادلة التالية لتقدير عدد النطف لكل مللتر وكما يلي:

عدد النطف/ مل لتر = $400 * 10 = 4000$
 $X = \text{عدد النطف المحسوبة}$
 $80 = (\text{عدد المربعات المحسوبة} 5) \text{ مربعات متوسطة} 16 * \text{مربع صغير}$
 $400 = \text{نسبة التخفيف}$
 $400 = \text{عدد المربعات الكلية}$
 $10 = \text{ارتفاع المنصة}$
 إذ يتم تخفيف النطف بنسبة 400 : 1 وذلك لأن أعداد النطف في الطيور تكون كبيرة جدا . ويكون محلول التخفيف الخاص بحساب النطف من المواد التالية:
 0.9 غم من NaCl و 0.2 ملغم من صبغة الايوسين و 0.01 ملغم HgCl₂ ويذاب هذا الخليط في 100 مل من الماء المقطر .
 (9)
 ويتم حساب نسبة النطف الميتة (10) وذلك بعمل مسحات على شرائح زجاجية باستعمال صبغتي الايوسين والنكروسين اذ تتوضع قطرة من السائل المنوي مع 12 قطرة من الصبغة وتترك لمدة دقيقتين يتم بعدها عمل مسحات ويتم الفحص على قوة تكبير (1000) إذ تتميز النطف الحية بلونها الأبيض بسبب عدم نفاذ الصبغة إلى غشاءها البلازمي أما النطف الميتة فيكون لونها وردي اتقلها للصبغة بسبب نفاذية غشائها البلازمي ويتم حساب النطف الميتة حسب المعادلة التالية:
 $\text{النسبة المئوية للنطف الميتة} = \frac{\text{عدد النطف الميتة}}{\text{العدد الكلي للنطف}} * 100$
 وبنفس الطريقة يتم حساب النطف المشوهة الكلية ، (10) وحللت جميع الصفات مختبريا في كلية الزراعة / جامعة كربلاء . استعمل التصميم العشوائي الكامل في التجربة، وحللت البيانات إحصائيا باستعمال البرنامج الإحصائي (11) . SAS وكورنت متواسطات المعاملات باستعمال اختبار Dunn متعدد الحدود.

النتائج والمناقشة :

تشير نتائج الدراسة إلى إن مستخلص عرق السوس قد أدى إلى حصول تحسن عالي المعنوية في الصفات النوعية للسائل المنوي جدول (1) فقد بينت النتائج أن إضافة مستخلص عرق السوس بنسبة 10% و 20% و 30% إلى ماء الشرب للمعاملات T4 , T3, T2 على التوالي قد أدى إلى ارتفاع معنوي في حجم القذفة بالمقارنة مع معاملة السيطرة T1 وان أكثر حجم قذفه تم الحصول عليه كان في المعاملة الرابعة T4 فقد تفوقت هذه المعاملة معنويًا على باقي المعاملات في هذه الصفة وقد يعود السبب في ذلك إلى وجود بعض المركبات الاستيرويدية في مستخلص عرق السوس(3) و(13) وان هذه المركبات تحفز إنتاج هرمون LH وإدامة عمل مستقبلات هذا الهرمون في خلايا ليدج والتي تؤدي دورا رئيسيا في إفراز هرمون التستستيرون والذي له دور مهم في زيادة حجم السائل المنوي (6) و(14). وأشارت النتائج كذلك إلى وجود ارتفاع عالي المعنوية للمعاملات T3 و T2 و T4 في الحركة الفردية والحركة الجماعية بالمقارنة مع مجموعة السيطرة وان أفضل حركة فردية وجماعية كانت عند المعاملة الرابعة T4 والتي استخدم فيها 30% من مستخلص عرق السوس مع ماء الشرب ولعل السبب في هذا التحسن يعود إلى ان مستخلص عرق السوس يعمل كمضاد أكسدة فعال (7) إذ أن مضادات الأكسدة تعمل على الحفاظ على النطف من الأكسدة الخارجية مما يؤدي إلى إدامة حركة النطف إلى مدة أطول (6) و . (8) كما أظهرت النتائج بان إضافة مستخلص عرق السوس إلى ماء الشرب أدى إلى زيادة تركيز النطف بشكل معنوي في المعاملات T3 و T2 و T4 بالمقارنة مع معاملة السيطرة وان اعلى تركيز للنطف كان في المعاملة الرابعة T4 وقد يعود السبب في ذلك إلى إن المركبات الاستيرويدية الموجودة في مستخلص عرق السوس أدت إلى تحفيز الهرمون الذكري التستستيرون والذي بدوره أدى إلى زيادة إنتاج النطف . كما أشارت النتائج إلى انخفاض عالي المعنوية في النسبة المئوية للنطف الميتة والمشوهة في المعاملات T2 , T3 و T4 بالمقارنة مع المعاملة T1 السيطرة (وهذا قد يعود إلى زيادة حيوية النطف المأخوذة من الديكة التي تم إضافة المستخلص إلى ماء شربها ، إذ إن لها المستخلص دور في حماية أغشية النطف حيث يحافظ على سلامة الغشاء البلازمي . (12)

جدول . 1 تأثير إضافة ثلاثة تراكيز من مستخلص عرق السوس في بعض صفات السائل المنوي للديكة المحلية.

T4	T3	T2	T1	الصفات المدروسة
0.72 ±0.03 A	0.7 ±0.05 B	0.6 ±0.04 C	0.4 ±0.05 D	حجم الفذفة / مل
85 ± 2.6 A	80 ± 1.8 B	75 ± 2.0 C	68 ± 1.5 D	الحركة الجماعية (%)
86 ± 3.1 A	80 ± 2.0 B	75 ± 1.8 C	70 ± 2.5 D	الحركة الفردية (%)
3.88 ±0.16 A	3.16 ± 0.20 B	3.00 ± 0.14 C	2.38 ± 0.12 D	تركيز النطف/ 10^9 × مل
10.00 ±1.30 D	11.66 ±1.44 C	14.5 ± 1.01 B	18.66 ±1.66 A	نسبة النطف الميتة (%)
11.32 ±0.43 D	14.50 ± 0.60 C	18.8 ± 0.32 B	20.22 ±0.54 A	نسبة النطف المشوهة (%)

- القيمة تمثل المتوسط ± الخطأ القياسي.
- الحروف المختلفة تدل على وجود فروق معنوية بين المعاملات. (P≤0.01)

المصادر:

- 1- Bradley, P. R. 1992. British Herbal Compendium. Vol. 1. Bournemouth, British Herbal medicine Association.
- 2 - لأنه أفنان . 2011, عرق السوس فوائد وأثار جانبية. مركز بحوث السوق وحماية المستهلك ، جامعة بغداد ، العراق. المجلة العراقية لبحوث السوق.الإصدار 1-7
- 3 - الدراجي, حازم عبد الجبار . 2009 , مقارنة تأثير مستخلص عرق السوس والمعزز الحيوي وكلويد البوتاسيوم وبيكاربونات الصوديوم في الأداء الإنتاجي لفروج اللحم المعرض للإجهاد الحراري.
- 4 - السامرائي ,كامل عزيز و علي صباح بهاء الدين . 20011 , التأثير الحيوي لنبات عرق السوس Glycyrrhiza glabra على مستوى بعض الهرمونات الجنسية والكافاء التناصيلية للنخاع العواصية .المؤتمر العلمي الخامس لكلية الزراعة جامعة تكريت للمرة من 32 ولغاية 32 نيسان 2011
- 5- لطيف ,نضال ابراهيم .2009,تأثير مستخلص عرق السوس على بعض الجوانب الفسلجية للفران البيض السويسريه .مجلة جامعة الانبار للعلوم الصرفة ,الجلد الثالث العدد الثاني .
- 6-Al – Daraji, H. J. 2005. Effect of diluent supplementation with liquorice extract on semen quality of roosters . Iraqi J. Agric. Sci. 36 (4): 159 – 168.
- 7- Burrows, W.H. and J.P. Quinn ,1937. The collection of spermatozoa from the domestic fowl and turkey. Poultry Sci. 16 : 19-24.
- 8- Parker, J.E. ; F.F. Mckenzie and H.L. Kempster ,1942. Fertility in the male domestic fowl. Missouri . Agric. Exp. Res. Bulletin No. 374.
- 9 - لجذابي , ثامر كريم.. التقييم الوراثي لدجاج الكهورن الأبيض بالاعتماد على بعض صفات المنوي . اطروحة دكتوراه , كلية الزراعة , جامعة بغداد.
- 10- Lake, P.E. and J.M. Stewart ,1978. Artificial Insemination in Poultry . Ministry of Agriculture , Fisheries and food bulletin No. 213. Her Majesty's Stationery Office , London.
- 11- SAS.(2001). SAS\STAT "user" Guide for personal computers ,release 6.12.SASinstitute Inc ,Cary, N.C.,U.S.A.
- 12- Al-Daraji , H.J.2000. Effect of vitamin E on semen quality and fertilizing ability of roosters.Iraqi J .Agric.Sci. 27 (3) :360 - 365.
- 13- Gaby, A. (1988) Deglycyrrhizinated licorice treatment of peptic ulcer. Townsend Letter for Doctors. July:306.
- 14- Blesbois , E. ; I. Grasseau and J.C. Blum. 1993. Effect of vitamin E on fowl semen storage at 4 C . Theriogen. 39 : 771-779