

Using of nutshell pomegranate, Alum Solution to remove adhesive substance from common carp (*Cyprinus carpio*) Eggs during artificial reproduction.

استعمال محلول قشور الرمان و محلول الشب لإزالة المادة اللاصقة من بيوض اسماك الكارب الاعتيادي *Cyprinus carpio* في التكثير الاصطناعي.

طالب شمران نايف
قسم الإنتاج الحيواني، المعهد التقني المسيب، هيئة التعليم التقني.

المستخلص

أجريت هذه الدراسة في إحدى المفاسق العائدة للقطاع الخاص في ناحية الإسكندرية محافظة بابل للفترة من 4/9 ولغاية 25/4/2011 لدراسة إمكانية استبدال محلول التانين (Tannin) المستخدم في تقنيات التكثير الاصطناعي لتنمية وإزالة المادة اللاصقة Adhesive substance من بيوض اسماك الكارب الاعتيادي *Cyprinus carpio* بمحلول الشب و قشور الرمان. و متابعة تأثير ذلك على نسبتي الإخصاب والفقس.

تم استعمال أربع تراكيز مختلفة من محلول قشر الرمان (1, 2, 3 و 4) غم/لتر وأربع تراكيز من محلول الشب (0.5، 1، 1.5 و 2) غم/لتر مقارنة مع محلول السيطرة 0.5 غم/لتر لكل تجربة وبواقع ثلاث مكررات لكل معاملة وقد أثبتت نتائج التحليل الإحصائي للدراسة بأن لا توجد فروقات معنوية على مستوى $p < 0.05$ بين محلول قشر الرمان 2 غم/لتر ومحلول السيطرة حيث كانت متوسطات نسبة الفقس (70.97%) و (71.09%) على التوالي وكذلك لا توجد فروقات معنوية لمتوسطات نتائج محلول الشب 1 غم/لتر ومحلول السيطرة (71.41%) و (70.88%) على التوالي مما يعني إنهم الأفضل والأقرب لاستخدامهما بدلاً من محلول التانين.

Abstract

This study has been established in a private hatchery in Babylon province from 9 April to 25 April 2011, in order to study the possibility of tannins substitute (which is used in artificial propagation for elimination of adhesive substance from eggs of *Cyprinus carpio*) by alum solution or punnic granetun and their effects on both hatching and fertilization.

Four different concentrations of punnic granetun (1, 2, 3 and 4) g/L and another four concentrations of alum solution (0.5, 1, 1.5 and 2) g/L with a control solution (0.5 g/L Tannin) for each experiment at 3 replicates.

The Results showed that there is not significant difference ($p < 0.05$) between punnic granetum 2 g/L and control solution whereas averages of hatching ratio (% 70.97), (% 71.09) respectively also there is not any significant between alum solution (1g/L) and the control solution (% 71.41), (% 70.88) respectively for hatching ratio, that is mean they are the best to use instead of tannins solution.

المقدمة

ازداد الاهتمام العالمي بتطوير قطاع الاستزراع السمكي ليكون رديفاً أو البديل المستقبلي لفعاليات الصيد (1) لما له من المميزات التي تمكّنه من الحصول على إنتاجية في وحدة المساحة تعادل زهاء عشرة آلاف ضعف مما هو عليه في المصائد الطبيعية (2) كما ويعد الاستزراع السمكي واحد من أسرع أنظمة إنتاج الغذاء في العالم (3) وعنصراً رئيسياً من مقومات استراتيجيات الأمن الغذائي العالمي (4) إضافة إلى إمكانية الاهتمام في إنتاج الأصناف الجديدة المنتسبة والحصول عليها في الأوقات المطلوبة وبالوزان والأعمار المفضلة وإيجاد السبل الكفيلة لزيادة إنتاجها واستخدام الأسماك التي حسنت وراثياً ضمن برامج وراثية متقدمة لذلك كانت حتمية الاعتماد على التكثير الاصطناعي للأسماك المرباة في المزارع السمكية لمواكبة هذا الاهتمام لابد منها وإجراء البحوث العديدة والمختلفة في المراكز المتخصصة ومساندة التوسيع الحاصل في الاستزراع السمكي للحصول على أعلى المعدلات في الإخصاب والتقويس وغيرها من المميزات (5).

اتجهت الدراسات في الآونة الأخيرة في معظم دول العالم ومن ضمنها العراق إلى إيجاد بديل عن المواد المستعملة في تجهيز البيض المعد للتقويس أو الحضن على إن تكون تلك البدائل متوفرة ورخيصة وذلك لارتفاع أسعار محلول التانين 0.5 غم/لتر

(7,6) لذا جاءت هذه الدراسة لغرض استعمال محلول قشور الرمان الذي يحتوي على مادة الثنائي بنسبة 20-25% ومحلول مادة الشب الأبيض الشفاف (ملح ثانوي كبريتات البوتاسيوم المائية + كبريتات الألمنيوم $\text{KAl}(\text{SO}_4)_2 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$) الذي يذوب في الماء البارد ذو مذاق حامضي

المواد وطرائق العمل

في هذه الدراسة تم اختيار الأمهات المتقاربة في الأوزان 4.5 كغم لسهولة العمل وتقدير كمية الهرمون (الغدة النخامية) وتكون متقاربة في فترة النضج ولغرض إتباع الأسلوب الصحيح في اختيار الأمهات الداخلة في العملية الإنتاجية (8). درجة حرارة الماء خلال فترة الحضن في زجاجيات الفقس تتراوح ما بين (21-23°C) وهي ضمن معدلات أفضل درجة حرارة لحضانة بيض الكارب الاعتيادي (6,9,10). تلك العوامل أعطت للدراسة الضروف المناسبة لتكون أكثر دقة في إعطاء النتائج . أدخلت الأمهات المنتحبة بمعدل وزني 4.5 كغم للإناث لغرض إجراء عملية التكثير الاصطناعي وحسب طريقة (6) وجردت الإناث من البيوض

بتدليك منطقة البطن باتجاه الذنب وكذلك الحال مع الذكور للحصول على السائل المنوي (7). استخدم 750 غم من البيض المستحصل في كل تجربة بعد أخذ عينات بزنة (3-2) غم لمعرفة عدد البيض / كغم بيض وقياس قطر البيضة (11). قسمت التجربة الواحدة إلى خمس معاملات زنة كل معاملة (150) غم بيض لغرض دراسة تأثير التراكيز المختلفة من محلول قشور الرمان ومحلول الشب مقارنة مع معاملة السيطرة (استخدام الثنائي 0.5 غم / لتر) لإزالة المادة اللاصقة التي تحويها بيوض أسماك الكارب الاعتيادي.

تم الحصول على قشور الرمان من الأسواق المحلية، غسلت وجفت لإزالة الأتربة العالقة بها ثم سحقت يدويا باستخدام الهاون. بعدها جرى طحنها بماكينة كهربائية لمدة ثلاثة دقائق ثم وزنت الكميات المطلوبة لتحضير أربعة محاليل بالتراكيز (1, 2, 3, 4) غم / لتر على التوالي باستخدام ميزان حساس وأقرب 0.1 غم وأذيبت الكميات المطلوبة بالماء العادي وفي درجة حرارة المختبر.

مادة الشب متوفرة في الأسواق وخاصة الشب الأبيض الشفاف البلوري. وزنت مقادير الشب بواسطة ميزان حساس وأقرب 0.1 غم لتحضير أربعة محاليل بالتراكيز (1.05, 1.15, 1.2, 1.5) غم / لتر على التوالي وتم إذابة المقادير بالماء مباشرة وفي درجة حرارة المختبر.

خضب البيوض في كل معاملة بإتباع الطريقة الجافة لكونها الأفضل (12) حيث تمت إضافة السائل المنوي (الذي أخذ من أكثر من ذكر) إلى كمية البيض ومزج بواسطة ريشة طائر بعدها أضيف محلول الإخصاب بنسب معينة (13) والمحضر على ضوء ماذكرة (14,12)، وبما إن بيوض الكارب الاعتيادي قد تحتاج إلى أكثر من ساعة (تصل إلى ساعة ونصف) (14) لأجل انتفاخ البيوض إلى حجمها الكلي لذا تم الاستمرار بخلط البيض مع محلول الإخصاب ولغرض إزالة المادة اللاصقة ذات التأثير السلبي على البيض حيث تعمل على ظاهرة تكتل البيض داخل زجاجيات الفقس ومنع وصول الأوكسجين الذائب في الماء إلى البيض المخصب وبالتالي هلاك الأجنة (15) وكما يلي

في معاملتي السيطرة في كلا التجربتين تم إزالتها وزيادة صلابة القشرة باستخدام محلول الثنائي (Tannins) بمقادير (0.5) غم / لتر (16) حيث استخدمت الكمية اللازمة من محلول بالإضافة إلى البيوض المنتفحة ويخلط معها لمدة عشرين ثانية ولمرة واحدة بعدها يغسل البيض بالماء لعدة مرات (13,12,6). أما المعاملات الأخرى تم استخدام المحاليل المحضرة من قشر الرمان ومحاليل الشب حيث عمليت كل معاملة بأحد المحاليل التي أضيفت إلى البيوض المنتفحة ويخلط معها لمدة عشرين ثانية ولمرة واحدة بعدها يغسل البيض بكثافة من الماء قبل نقلها إلى أواني الفقس (Zougjars). قسمت كل معاملة إلى ثلاثة مكررات (لكل مكرر 50 غم بيض مخصوص) ووضعت في أواني الفقس المعينة المعلمة وتم ضبط معدل تدفق الماء (0.5 لتر / دقيقة في البداية ثم يرفع تدريجيا حتى يصل 2 لتر / الدقيقة في النهاية) وتم قياس درجة الحرارة وكانت 21°C . عمليت البيوض داخل الزوكرات بمحلول Malachite green بتركيز (5) ppm (6, 17).

بعد مرور 6 ساعات من وقت التخصيب أخذت عينات متجانسة من كل زجاجة فقس ووضعت في زجاجة تحوي مادة فورمالين 4% مدون عليها المعلومات حسب العادلة لغرض حساب نسبة الإخصاب فيما بعد (11, 18).

فترة الحضن المتفق عليها 3-5 يوم. لذلك وبعد مرور 48 ساعة من وقت وضع البيض في زجاجيات الفقس تم تغطية زجاجات الفقس بغطاء من القماش (الشاش) للسماح بمرور الماء فقط وعدم السماح لليرقات الفاقسة مستقبلاً بالمرور ويبدل هذا الغطاء كل (8-6) ساعة للتخلص من قشور البيض والبيض الغير مخصوص والنواتج الأخرى التي تكون عالقة على قطعة القماش خوفاً من انسداد فتحات القماش إلى إن يتم الفقس الكامل للبيض وتكون جميع اليرقات الفاقسة لازالت داخل زجاجة الفقس لمعرفة إعدادها لاحقاً لمعرفة نسبة الفقس لكل معاملة.

هيئ صندوق خشبي ذات إطارات خشبية مبطنة بقماش الشاش وبإبعاد (15×20×20) سم وضع داخل حوض بارتفاع أكبر من إبعاد الصندوق يحوي على فتحات لخروج الماء على ارتفاع 15 سم.

تفرغ محتويات كل زجاجة فقس (الماء+كل اليرقات الفاقسة) بعد غلق فتحة الماء من الأسفل لمدة دقيقة وبطريقة السيفون siphoning إلى الصندوق الخشبي المبطن والذي يسمح قماش الشاش بخروج الماء الزائد عن حجم الصندوق (6000) س³ والاحتفاظ باليرقات الفاقسة بداخلة. ثم تؤخذ ثلاثة عينات عشوائية من محتوى الصندوق الخشبي بواسطة بيكرا سعة 30 سم (مع مراعاة عملية الخلط الجيد لما موجود داخل الصندوق الخشبي من ماء ويرقات) لغرض حساب نسبة الفقس. هذه الطريقة كررت مع كل زجاجات الفقس للمعاملات التي شملتها التجربتين (30 زجاجة فقس).

احتسبت نسبة الإخصاب وفق المعادلة التالية

$$\text{نسبة الإخصاب} = \frac{\text{عدد البيض المخصب} \times 100}{\text{عدد البيض الكلي}} \quad (20,19,18)$$

تم احتساب نسبة الفقس وفق المعادلة التالية

$$\text{نسبة الفقس} = \frac{\text{عدد اليرقات الفاقسة} \times 100}{\text{عدد البيض المخصب}} \quad (21,19)$$

التحليل الإحصائي

استخدم برنامج SAS (22) في تحليل البيانات واستخدم اختبار Dunn لتحديد الفروقات المعنوية على مستوى $p < 0.05$ بين المتوسطات.

النتائج والمناقشة

أشارت نتائج التحليل الإحصائي للتجربة الأولى (استخدام محليل قشر الرمان) أدى إلى وجود انخفاض معنوي على مستوى $p < 0.05$ في نسبة الفقس في المعاملات (1, 2, 3) حيث بلغت متوسطات نسبة الفقس (31.43, 43.46, 53.31 %) على التوالي . في حين كانت متوسطة نسبة الفقس في معاملة السيطرة (1) (71.93 %) . وكما مبين في الجدول (1) وأظهرت النتائج بعدم وجود فروقات معنوية $p < 0.05$ بين نسب الإخصاب بين جميع المعاملات وكانت نسب عالية مطابقة لما ذكره (13, 14) . التباين العالي في نسب الفقس مع معاملة السيطرة يمكن تقسيمه بان المعاملة (1) والتي لوحظ فيها وجود درجة التصاق بين البيوض داخل زجاجيات الفقس وهذا يعني لم يتم إزالة بقايا المادة اللاصقة بال محلول ذات التركيز (1 غم/لتر) مما أدى إلى ظهور ظاهرة التصاق البيض وهذه الظاهرة تقلل من فرصة توفير الأوكسجين الذائب للبيض المخصب وبالتالي هلاك الأجنة (23) إما المعاملات 3 و 4 فإن زيادة التركيز في المعاملات أدى إلى زيادة تقصية البيض وإحداث إضرار على قشور البيض مما أثر سلبا على نسب الفقس (13, 18).

بنيت النتائج (جدول 1) بعدم وجود فروقات معنوية في متوسطات نسب الفقس والإخصاب بين المعاملة (2) ومعاملة السيطرة وكانت (71.09%) على التوالي مما يعني إن أداء المحليل ذات تركيز المستخدم في المعاملة (2) وتاثيرها على إزالة المادة اللاصقة وتقصية البيوض موازي لعمل أو فعالية محلول التانين في معاملة السيطرة وحسب ما ذكره (6,5).

يوضح الجدول (2) إن نتائج التحليل الإحصائي للتجربة الثانية (استخدام محليل مختلف للشب) بعدم وجود فروقات معنوية مابين نسب الإخصاب للمعاملات (1, 2, 3 و 4) ومعاملة السيطرة حيث كانت متوسطات نسب الإخصاب (80, 79.6, 79.7 و 78.8 %) على التوالي في حين كانت معاملة السيطرة (79%) وهذا يعني إن جميع التركيز ليس لها تأثير على نسبة الإخصاب وكانت نسبة الإخصاب مطابقة لما ذكره (13, 14).

تأثرت متوسطات نسب الفقس المدروسة معنويًا ($p < 0.05$) باختلاف تركيز محلول الشب (جدول 2) إذ وجد إن تركيز المعاملات (1, 3, 4) أعطت نسب فقس منخفضة ولها فروقات معنوية مع معاملة السيطرة حيث كانت المتوسطات للمعاملات (39.8, 51.9 و 44.5 %) على التوالي ومعاملة السيطرة (70.5%). ويمكن تقسيم ذلك إلى وجود علاقة قوية بين تركيز المحليل (الشب) وبين إزالة المادة اللاصقة وتقصية البيوض اللتان تؤثران على فقس بيوض الكارب . وفي المعاملة الأولى (تركيز 0.5 غم/لتر) كانت غير كافية لإزالة المادة اللاصقة وهذا ما يشير إليه الجدول رقم (2) بوجود درجة التصاق مما أدى إلى انخفاض نسبة الفقس وهذا مطابق لما ذكره (23) إما المعاملات (3, 4) وكانت تركيز المحليل عالية مما أثرت سلبا على بيوض سمك الكارب حيث سببت إضرار على قشور البيض وبالتالي على الأجنة (18,13).

وأوضح نفس الجدول أنه لا توجد فروقات معنوية في نسب الفقس بين المعاملة (2) ومعاملة السيطرة إذ كانت (71.4%) و (70.4%) على التوالي وهذا يعني إن محلول الشب (1 غم/لتر) يعطي نفس النتائج لمحلول التانين (0.5 غم/لتر) المستخدم في التكثير الاصطناعي.

نتائج هذه الدراسة تشير إن المعاملة (2) من التجربة الأولى والمعاملة (2) من التجربة الثانية هي الأكثر ايجابية مقارنة بمعاملة السيطرة لذلك نوصي باستخدام قشر الرمان بتركيز 2 غم/لتر ومحلول الشب 1 غم/لتر بديلاً من محلول التانين في مجال التعامل مع بيوض سمك الكارب الاعتيادي لتقصية وإزالة المادة اللاصقة.

مجلة جامعة كربلاء العلمية – المجلد العاشر - العدد الأول / علمي / 2012

تبين من التحليل الإحصائي بان لا توجد فروقات معنوية في نسبتي الإخصاب والفقس بين نتائج المعاملة (2) من التجربة الأولى ونتائج المعاملة (2) من التجربة الثانية وهذا يعطي حرية الاختبار بين المحلولين المستخدمين للعمل في التكثير الاصطناعي وحسب المتوفّر.

جدول (1) تأثير محاليل قشر الرمان (المتوسطات \pm الخطأ القياسي) على نسب الإخصاب والفقس في بيوض اسماك الكارب الاعتيادي.

الحالات	نسبة الفقس %	نسبة الإخصاب %	التركيز	المعاملة
+	31.426 ± 0.235 D	79.667 ± 0.881 A	1 غم/لتر	1
-	70.970 ± 0.235 A	$79.000 \pm 0.5.77$ A	2 غم/لتر	2
-	43.463 ± 0.594 B	79.333 ± 0.881 A	3 غم/لتر	3
-	35.310 ± 0.514 C	80.333 ± 0.881 A	4 غم/لتر	4
-	71.093 ± 0.577 A	79.667 ± 0.881 A	السيطرة	5

القيم التي تحمل حروف مختلفة تدل على وجود فروقات معنوية بينها عند مستوى احتمال ($P > 0.05$)
 1- المربع المضلل يمثل أعلى القيم

جدول (2) تأثير محاليل الشب (المتوسطات \pm الخطأ القياسي) على نسب الإخصاب والفقس في بيوض اسماك الكارب الاعتيادي.

الحالات	نسبة الفقس %	نسبة الإخصاب %	التركيز	المعاملة
+	39.837 ± 0.860 D	80.0 ± 1.000 A	0.5 غم/لتر	1
-	71.413 ± 0.263 A	79.613 ± 0.881 A	1 غم/لتر	2
-	51.905 ± 0.208 E	79.713 ± 577 A	1.5 غم/لتر	3
-	44.582 ± 0.359 C	78.831 ± 0.881 A	2.0 غم/لتر	4
-	70.889 ± 0.474 A	79 ± 0.333 A	السيطرة	5

القيم التي تحمل حروف مختلفة تدل على وجود فروقات معنوية بينهما عند مستوى احتمالية $p < 0.05$
 1- المربع المضلل يمثل أعلى القيم

المصادر

- المختار ، مصطفى احمد؛ حسوني، خالد محمد؛ سلمان، نادر عبد، الجنابي علي هادي. (2005). واقع استزراع الأسماك في محافظة البصرة. العراق، المجلة العراقية الزراعية العدد 2: 155-164 صفحة. 401 صفحة.
- مصدق ، علي دلفي. (2008). إنتاج الأسماك في العراق. جريدة الصباح، العدد 1410، 9 صفحة.
- منظمة الأغذية العالمية والزراعة للأمم المتحدة. FAO . (1997) . حالة الموارد السمكية وتربية الإحياء المائية في العالم للعام 1996 منشورات منظمة الأغذية والزراعة الدولية. روما. 920.
- المنظمة الدولية للتنمية الزراعية (1996) . الدورة النسبية القومية لاستزراع الأسماك في المياه المالحة. الخرطوم : 23 صفحة.

- 5- يوسف، أسامة محمد الحسيني وجودة، اشرف محمد عبد السميع(1998). التقنيات الحديثة للإنتاج التجاري للأسمك الاستزراع-التاريخ الصناعي- إنتاج اسماك). الدار العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، جمهورية مصر العربية : 709 صفحة.
- 6- Horvath, L. ; Tames, G. and Coche, A.G. (1985). Common Carp (part) Mass Production of eggs and early fry, FAO Training service, FAO. Publ,
- 7- RoHman, R.W; shirman, J.v and chaman , F. A. (1991). Introduction to Hormone. Induced spawning of fish. Southern Regional Aquaculture center. SRAC, Publication No. 421: 4.
- 8- الغزالى، علي رضا حسين (2010). تطبيق برنامج إنتاجي مكثف لاصبعيات اسماك الكارب الاعتيادي *Cyprinus carpio*. 23- Carballo, E. ; Eer, A. v. ; Schie, T.v. and
- 9-Hilbrands, A. (2008). small. Scale fish water fish farming. Third revised Edition Netherlands : 64 p.
- 10- FAO (2004) The state of the world fisheries Department, Roma, IssN 1020-5489: 152p
- 11- نايف ؛ طالب شمران (2005) بعض الصفات الإنتاجية التکاثرية لقطعان أمهات مفاسق الأسماك في محافظة بابل. رسالة ماجستير. الكلية التقنية / المسيد. قسم الإنتاج الحيواني، هيئة التعليم التقني : 155 صفحة.
- 12- Jerome, L. and Lionel, D. (2002). Fresh water Aquaculture. And polculture, unite de recherche Aquaculture. CIRAD. EMVIT Montpellier, France (in English) : 45 p.
- 13 - Woynarovich, E. and Horvath, L. (1980). Amanual for the culture of the Common carp (*cyprinus carpio*) ICL ARM pbl, ser, No. ooo. Manila, Philippines : 174 p.
- 14 - برانية ، احمد عبد الوهاب ؛ عيسى، محمد السعيد؛ الجمل، عبد الرحمن عبد اللطيف؛ عثمان، محمد فتحي محمد وصادق، شريف شمس الدين. (1997). الأسس العلمية والعملية لنقريخ ورعاية الأسماك والقشريات في الوطن العربي. الجزء الأول ، الدار العربية للنشر والتوزيع : القاهرة، جمهورية مصر العربية : 860 صفحة.
- 15- الشيخ ، محمد عادل عبد الرزاق ؛ منصور، قيس يامور واللوس ، سناء بشير. (1991)(تربية وإنتاج الأسماك (ح²) دار الحكمة للطباعة والنشر ، بغداد. 336 صفحة.
- 16- Bakos, J. (1984) . inland Aquaclture Engineering . FAO. ADCP/REP/84/21. Roma : 345-377 pp.
- 17- Nandlal , S. and pickering , T. (2004) . Tilapia Hatchery Operation Tilapia Fish Farming in pacific /s/ and Countries Volume one, Secretariat of the Pacific community and Marine studies program, The university of the South pacific:32 p.
- 18- RALC, (1981). in tegrated fish farming , Vo1.1, Regional\ Aquaculture Lead Center of china, Wuxi, people's Republic of china, 411 p.
- 19- Shigang, Y., (1989). Artificial propagation of black carp, grass carp, silver carp, and bighead , Asian, pacific Regional Research and Training center in integrated fish farming , wuxi . (china), integrated fish farming in china, A world food day 1989, publication of the network of Aquaculture centres In Asia and the pacific Bangkok (Thailand), 33-50.
- 20- Bagenal, T.B. and Braumm E., (1971) Eggs and early life history, in; W.G. Recker (Ed). Methods for Assessment of fish production in fresh waters (2nd ed) /BP Handbook No. 3, Black well Scientific pub., oxford,166-198
- 21- الأمين، محمد أمين حمزة (2001) استخدام تقنيات إدارة مختلفة في إنتاج زراعة اسماك الكارب العشبى *Hypophthalmichthys molitrix* (Val) والكارب الفضي *Ctenopharyngodon idella* Val طروحة دكتوراه. كلية الزراعة. جامعة البصرة. 96 صفحة.
- 22- SAS, (2000). SAS users Guide : statistics sAs. Inst. Inc. Cary. Ne. usA.
- 23- خليل، فتحي فتوح محمد. (2005). الأسس العلمية والتطبيقية للمزارع السمكية (الجزء الثاني). تربية وإنتاج وإدارة المزارع السمكية. كلية الزراعة. جامعة المنصورة. جمهورية مصر العربية. الطبعة الأولى : 565 صفحة.