

Epidemiological & Statistical study about infection with liver flocks (*Fasciola gigantica*) in the carcasses from the slaughter house in region Kerbala

دراسة احصائية ووبائية عن الإصابة بديدان الكبد (*Fasciola gigantica*) في الحيوانات المذبوحة في مجازر منطقة كربلاء

م.م. إبراهيم فضل رشيد
كلية الطب البيطري / جامعة كربلاء

الخلاصة :

أجريت الدراسة الحالية التحرى عن نسب الاصابة بطفيلي ديدان الكبد *Fasciola gigantica* في ذبائح المجزرات المجزورة في محافظة كربلاء في المدة من كانون الثاني 2011 لغاية كانون الاول 2011 اذ فحصت خلال سنة كاملة مجموعه 66137 من الذبائح وكالاتي 46977 من الاغنام وبنسبة اصابة 71.02% ، 8958 من الماعز وبنسبة اصابة 3.54% ، 8701 من الابقار وبنسبة اصابة 13.15% و 1501 من الجاموس وبنسبة اصابة 2.26% جمعت العينات من مناطق مختلفة وسجلت عدة اصابات بهذا الطفيلي .

أظهرت النتائج ارتفاع نسب الاصابة في الاغنام خلال شهري تشرين الاول والثاني وكانت 11.35% وانخفضت خلال شهري شباط واذار حيث كانت 4.10% و 4.41% على التوالي ، وفي الماعز ارتفعت نسبة الخمج خلال شهري تشرين الاول والثاني اذ كانت 10.71% و 13.09% على التوالي وانخفضت خلال شهري شباط واذار وبنسبة 4.76% ، وفي الابقار ارتفعت نسبة الخمج خلال شهر تشرين الاول وبنسبة عالية قدرت 15.54% واقل نسبة خلال شهر اذار وبنسبة 5.40% ، وفي الجاموس ارتفعت نسبة الاصابة خلال شهر كانون الثاني وبنسبة 18.60% واقل نسبة كانت خلال شهر اذار وكانت 4.65% .

Abstract :

This study was conducted on slaughtered animals (Sheep – Goats – Cattle – Bofallo) in the slaughtered house of Kerbala province during period from 2-12011 until 30-12-2011 , so 46977 of Sheep carcasses , 8958 Goats carcasses , 8701 of Cattle carcasses & 1501 carcasses of Bofallo were examined during this study .

The results showed the infection rates were 71.02% Sheep , 13.54% Goat , 13.15% Cattle & 2.26% Bofallo & highest rate of infection with liver flock were in Sheep that reach to 53.5% as accompanied with others slaughtered animals .

In Sheep the rates of infection were elevated significant during Octobar & November which reached respectively 11.35% , while the infection rates decrease during February & March which reached to 4.10% & 4.41% respectively in other animals (Goats & Cattle) there were similar changes while in Bofallo the infection rates elevated during Decamber & reach to 18.60% but decrease during March & reached to 4.65% .

المقدمة :

يعتبر طفيلي الكبد *Fasciola* احد الطفيليات التابعة الى عائلة *Fasciolidae* وتوارد الدودة البالغة في القنوات الصفراوية للماكباد الاغنام والماعز والابقار والخنازير (1). تشير الدراسات في العراق الى ان هناك نوعين من الطفيلي *Fasciola hepatica* و *Fasciola gigantica* وهما النوعان المهمان بالإضافة الى انواع عديدة من طفيليات الكبد تعود لاجناس اخرى مثل *Dicrocoelium* (1 , 2) . ويتميز النوع الاول بانه اكبر حجما وجسمها اكثر شفافية وتكون الاكتاف غير واضحة مقارنة بالنوع الثاني (3) .

تحتاج طفيليات الكبد الى عاملين لاكمال دورة حياتها هما البيئة المناسبة التي تتمثل في درجة الحرارة والرطوبة والمضيف الوسطي اذ تحتاج *Fasciola hepatica* الى قواع برimary من نوع *Lymnaea tranctula* , وتحتاج *Fasciola gigantica* الى قواع مائي من نوع *Lymnaea auricularia* (4) . أكد (5 , 6) أن لاعداد المضيف الوسطي أثراً في تكون بيئية ملائمة لنمو البيوض وعملية الفقس. وأن الواقع المائي تفضل الماء الضحل ودرجات الحرارة التي لا تزيد عن 25-30°C والتي نجدها متوفرة في الانهار والاهوار وقنوات الري (7) ، وهناك

مجلة جامعة كربلاء العلمية – المجلد العاشر - العدد الرابع / علمي / 2012

عوامل عديدة تؤثر في الورق المائي وتجعله كمضيف وسطي لانتقال الاصابة منها وضعه الفسلجي وقابليته التكاثرية (8) ، أكدت (5) أن لارتفاع المضييف الوسطي أثراً في نشر المرض حيث أزدادت أعداد القوافع وبلغت قمة التواجد في فصل الربيع لارتفاع درجات الحرارة وتتوفر النباتات المائية ثم انخفضت في فصل الصيف نظراً لارتفاع درجات الحرارة ، كما ذكرت أن نسبة الاصابة بين الواقع تراوحت بين 10-40 % وأن أعلى نسبة اصابة سجلت في الصيف وقد يكون هذا سبباً في انخفاض كثافة الواقع المائية في هذا الفصل .

إن المرض الذي تسببه ديدان حلزون الكبد والذي يصيب الحيوانات أكلات الاعشاب من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية الكبيرة لمناطق الاريف التي تنتشر فيها الواقع والتي تعد المضييف الوسطي للطفيليات، أن قوافع *L.auricularia* المضييف الوسطي لطيفلي *F.gigantica* التي تعد من أشهر قوافع المياه العذبة المتمثلة بالبرك والانهار البطيئة الجريان ذات القعر الطيني وأكثرها انتشارا (9).

سجلت مواسم انتشار هذا الطيفلي ونسبة الاصابة به في الاغنام اذ وجد(10) ان نسبة الاصابة في جنوب شرق العراق وصلت في الاغنام الى 21% والماعز 11.2% وكانت نسبة الاصابة بالنوع *F. hepatica* اعلى من النوع *F. gigantica* في جميع الحيوانات .

المواد وطرائق العمل

أجريت هذه الدراسة في مجازر البهادلة، وقضاء الهندية التابعة الى محافظة كربلاء المقدسة وللمدة من 1-2-2011 الى 20-12-2011 وعلى مدار سنة كاملة ، وتم خلالها فحص 34031 ، 6928 ، 6989 ، 1208 من ذبائح الاغنام ، الماعز ، الابقار والجاموس على التوالي .

وقد فحصت الذبائح عينياً ثم ارسلت نماذج اعضاء الكبد المصابة الى مختبر الطفيليات في كلية الطب البيطري جامعة كربلاء لفحصها مختبرياً باستعمال المجهر الضوئي بعد تحضير شرائح زجاجية منها لتشخيص نوع الاصابة الطيفلية .
حضرت جميع النتائج للتحليل الاحصائي باستعمال برنامج SAS الاحصائي وحللت باستعمال مربع كاي للاستدلال عن وجود الفروقات المعنوية ، خضعت نتائج الدراسة للتحليل الإحصائي باستخدام اختبار دنكن متعدد الحدود وقد قورنت الفروقات المعنوية بواسطة اختبار مربع كاي الإحصائي ، وكذلك حللت النتائج أحصائياً باستخدام جدول تحليل التباين ANOVA عند مستوى احتمال ($P < 0.01$) في جميع المقارنات الواردة في الدراسة (11) .

النتائج والمناقشة :

فحص خلال اشهر الدراسة اعداد متباعدة من الحيوانات المجزورة في المجازر التابعة الى محافظة كربلاء ويوضح جدول (1) اعداد هذه الحيوانات ونسبها موزعة حسب اشهر الدراسة .

مجلة جامعة كربلاء العلمية – المجلد العاشر - العدد الرابع / علمي / 2012

جدول 1 – أعداد الحيوانات المذبوحة في مجازر محافظة كربلاء موزعة حسب أشهر السنة للعام 2011 .

نسبة الكلية %	المجموع	العدد الكلي	الحيوانات								الشهر	ت
			جاموس	أبقار	ماعز	أغنام	النسبة %	العدد	النسبة %	العدد		
44.31 A	5937	16.25	244	11.80	1027	7.83	702	8.43	3964	كانون الثاني	1	
23.04 C	3589	6.39	96	6.78	590	4.57	410	5.30	2493	شباط	2	
22.3 C	3686	5.46	82	5.66	493	5.64	506	5.54	2605	آذار	3	
40.58 A	6431	10.92	164	10.18	886	9.92	889	9.56	4492	نيسان	4	
39.86 A	6625	9.26	139	9.26	806	11.44	1025	9.90	4655	أيار	5	
31.6 B	5269	6.92	104	7.70	670	9.16	821	7.82	3674	حزيران	6	
40.12 A	6521	9.86	148	10.88	947	9.92	889	9.46	4537	تموز	7	
39.65 A	6862	8.39	126	10.27	894	10.58	948	10.41	4894	آب	8	
29.62 B	4641	6.99	105	7.76	676	8.23	738	6.64	3122	أيلول	9	
43.75 A	7467	9.52	143	11.36	989	11.60	1040	11.27	5295	تشرين الأول	10	
14.7 D	4888	-	-	-	-	5.32	477	9.38	4411	تشرين الثاني	11	
30.04 B	4221	9.99	150	8.30	723	5.72	513	6.03	2835	كانون الاول	12	
	66137	2.26 C	1501	13.15 B	8701	13.54 B	8958	71.02 A	46977	المجموع		

المتوسطات التي تحمل حروف متشابهة لاختلف معنويا .

P<0.01

▶

▶

أظهرت النتائج ان الاصابة الكلية في ذبائح الحيوانات المجزورة (اغنام , ماعز , ابقار , جاموس) كانت 592 ، اذ بلغت نسبة الاصابة في ذبائح الاغنام 53.54 % ، الماعز 14.18 % ، الابقار 8.32 % والجاموس 7.26 % . واوضح الجدول ان اعلى نسب الخمج كانت متفاوتة بين فصلي الربيع والخريف والشتاء وخاصة خلال شهر تشرين الاول حيث سجل اعلى نسب الاصابة في اغلب الحيوانات (جدول - 2 -) .

مجلة جامعة كريلاء العلمية – المجلد العاشر - العدد الرابع / علمي / 2012

جدول 2- أعداد ونسب الإصابة بديدان الكبد في الحيوانات المذبوحة خلال أشهر الدراسة.

النسبة الكلية	المجموع	العدد الكلي	الحيوانات								الشهر	ت		
			جاموس		أبقار		ماعز		أغنام					
			ج	مو	ب	ق	ب	ق	ب	ق				
48.11 A	60	18.60	8	11.48	17	9.52	8	8.51	27	كانون ثاني	1			
24.24 E	30	9.30	4	6.08	9	4.76	4	4.10	13	شباط	2			
19.22 F	28	4.65	2	5.40	8	4.76	4	4.41	14	آذار	3			
37.58 B	56	9.30	4	10.81	16	8.33	7	9.14	29	نيسان	4			
30.38 CD	50	4.65	2	6.75	10	9.52	8	9.46	30	أيار	5			
31.76 CD	49	6.97	3	9.45	14	7.14	6	8.20	26	حزيرا ن	6			
33.51 BC	48	11.62	5	7.43	11	5.95	5	8.51	27	تموز	7			
31.35 CD	49	6.97	3	5.40	8	9.52	8	9.46	30	آب	8			
29.06 D	45	6.97	3	6.75	10	7.14	6	8.20	26	أيلول	9			
44.57 A	71	6.97	3	15.54	23	10.71	9	11.35	36	تشرين الاول	10			
37.19 B	61	4.65	2	8.10	12	13.09	11	11.35	36	تشرين الثاني	11			
32.82 CD	45	9.30	4	6.75	10	9.52	8	7.25	23	كانون الاول	12			
	592	7.26 C	43	8.32 C	148	14.18 B	84	53.54 A	317	المجموع				


المتوسطات التي تحمل حروف متشابهة لاختلف معنويا .

P< 0.01

من خلال جدول (3) يتبيّن ان أعلى نسب الإصابة كانت في الأغنام اذ بلغت 53.5 % واقللها في الجاموس والتي وصلت الى 7.3 % .

جدول 3- مجموع أعداد الإصابة بديدان الكبد في الحيوانات المذبوحة في مجازر محافظة كربلاء خلال مدة الدراسة (سنة كاملة)

نوع الحيوان	أعداد الإصابات	نسبة الإصابات %	ت
أغنام	317	53.5	A
ماعز	84	14.2	C
أبقار	148	25	B
جاموس	43	7.3	D
المجموع الكلي	592	%100	



شكل (1) : يبين التوزيع الكلي لنسب الاصابة للحيوانات المجزورة خلال مدة الدراسة .

المناقشة :

ان نسب الاصابة ارتفعت في الاغنام خلال شهري تشنين الاول والثاني وانخفضت خلال شهري شباط واذار ، وفي الماعز ارتفعت نسبة الخمج خلال شهري تشنين الاول والثاني وانخفضت خلال شهري شباط واذار ، وفي الابقار ارتفعت نسبة الاصابة خلال شهر تشنين الاول واقل نسبة خلال شهر اذار ، وفي الجاموس ارتفعت نسبة الاصابة خلال شهر كانون الثاني واقل نسبة كانت خلال شهر اذار . ولهذا فان اعلى نسبة اصابة كانت خلال موسمي الخريف و الشتاء وافقها في الصيف ويعود السبب الى كون الحيوانات تكتسب الاصابة خلال فصل الربيع وبارتفاع درجات حرارة المحيط خلال موسم الصيف وهي ملائمة الى نمو المذنبات cercaria وانتشارها على الحشائش (12) كما ان مرحلة نمو الطفيلي ووصوله الى اكياد الحيوانات يحتاج الى مدة طويلة 3-4 اشهر (13) .

أظهرت الدراسة تركيز الاصابة في كل من شهر تشنين الاول والثاني وكانون الاول وكانون الثاني وهذا يتفق مع ما ذكره (14) بأن المدة من بداية الخريف الى نهاية الشتاء مناسبة جداً لنشاط القواعع لكي يصاب بالمهدبات وذكر (15) أن اصابة القواعع من المحتمل أن تحدث في أواخر الصيف ومن ثم تكمل تطورها خلال الشتاء وتطلق المذنبات في فصل الربيع مع ارتفاع درجة حرارة الماء ، كذلك بين (16) أن ارتفاع نسب اصابة القواعع في فصل الخريف ناتج عن اصابة القواعع باليرقات المهدبة خلال مدة نهاية الصيف التي نتجت عن فقس البيوض المطروحة في الربيع أو في بداية الصيف.

مجلة جامعة كربلاء العلمية – المجلد العاشر - العدد الرابع / علمي / 2012

كذلك تم تسجيل مواسم انتشار هذا الطفيلي ونسبة الاصابة في الاغنام حيث وجد (10) ان نسبة الاصابة في جنوب شرق العراق بلغت في الاغنام 21% والماعز 11.2% وكانت نسبة الاصابة بال النوع *F. hepatica* اعلى من النوع *F. gigantica* في جميع الحيوانات .

وأشار (17) ان الانتشار الواسع للطفيلي بنوعية في منطقة بغداد والمناطق المجاورة لها التي تتمثل بالمنطقة الوسطى من القطر ، كما بينت الدراسة ان نسبة الاصابة بهذا الطفيلي تزداد في بداية فصل الشتاء وتقل حتى تصل الى ادنى انخفاض لها في شهر نيسان .

كما اشار كل من (18 , 10 , 1) ان الوقت اللازم لتفقيس بيوض *F. hepatica* هو 10 – 18 يوم في درجة حرارة 26 + 2 كما اشاروا الى ان التفقيس لا يحدث في درجة حرارة اقل من 10 درجة مئوية . ان للرطوبة خلال فصلي الربيع والصيف تؤدي الى زيادة عدد القواقع مما يؤدي الى انتاج جيل ثانى من القواقع في فصل الخريف ويضاف هذا الى العدد الاساسي للسنة التالية وفي حالة الجفاف الى منتصف او نهاية الصيف يتاثر الانتشار حتى ذلك الحين (19 , 20)

سجل (21) ان نسب الاصابة بمدينة كوريا كانت 62.1% ، وفي ايران سجل (22) ان نسبة الاصابة بلغت 21% وفي كلا الجنسين . اما في الشرق الاوسط فان الدراسات التي اجرتها الباحثون على انتشار الطفيلي وكان النوع الشائع *F. gigantica* في تركيا وايران وجمهورية مصر العربية وفي الاردن وال سعودية . اما في العراق فيعتبر المرض ذات اهمية اقتصادية لما يسببه من هلاكات للابقار والجاموس والاغنام والماعز (23 , 24 , 22) .

وأشار (25) الى نسبة الاصابة بنوعي جنس *Fasciola* في مجرزة الموصل حيث كان 18.5% بال النوع *F. hepatica* لجميع اشهر السنة ، كما كانت نسبة الاصابة للنوع *F. gigantica* %5.5 .

ووجد (10) ان نسبة الاصابة في جنوب شرق العراق بلغت في الجاموس 16.4% وفي الابقار 44.3% وفي الاغنام 29% والماعز 11.2% ، وكانت نسبة النوع *F. gigantica* اعلى من النوع *F. hepatica* في جميع الحيوانات . لاحظ (26) عدم وجود علاقة لنسبة الاصابة بين اجناس الحيوانات لكن تكون نسبة الاصابة في الاناث اعلى من الذكور بسبب استخدام الاناث للانجاب مما يؤدي الى طول فترة تعرضها للاصابة خلافاً للذكور التي تدبح في اعمار مبكرة .

المصادر :

- 1 – Solusby L.J.E.(2000) . Veterinary parasitology.6th ed . The Ministry of Higher Education & Scientific Research.AL-mousel University.
- 2- Krull & Wendel H. (1969) . Veterinary Parasitology Library of the congress the United Status of America Chap. Helmenthes . 242 – 255 .
- 3- Dwisht ,D.; Bownd ,M.(1999). Geoegis . Parasitology Veterinary . Sixth .ed. Newyork state collage of Vet.Med. Ithala. Newyork .
- 4 - Petalia T.M.(2000) . Chronic fascioliasis is the most common clinical syndrome associated with Liver Fluke infection in sheep & cattle Below is acache of http://WWW.Petalia.com.an/templates/storytemplate_processes.cfm.
- 5 - Farage, H.F. (1998). Human Fascioliasis in some countries of the Mediterranean Region.East Mediterranean Health J., 4:156-160.
- 6 - الصقر، أحسان مهدي وخليل أبراهيم الطيف (1988) . علم الديدان البيطريه . مطبعة جامعة الموصل ، جامعة الموصل . صفحة .
- 7 - Madean,J.D. Gross , J. and Mahanty , S. (1999) Liver, lung and intestinal fluke infection. In: Tropical Infectious Disease. Currant R.L.,Walker. D.H. and Willer , P.W. (eds) Academic press. USA ,PP: 1044-1050.
- 8 - Mahmoud,A. A. F.(1984). Schistosomiasis. In: Tropical and Geographical Medicine.Waren,
- 9 - Bargues , M . D . ; Vigmo , M . ; Horak, P. ; Dvorak, J. ; Patzner , R . A . ; pointier, J . P . ; Jackiewicz , M . ; Meier-Brook , C . ; Mas-coma, S. (2001) European, Lymnaeidae (Mollusca: Gastropoda), Intermediate hosts of trematodiases, based on nuclear ribosomal DNAITS- 2 sequences Infect Genet Evol . 185-107.
- 10 -لطائي ، لازم حميد كايد (1983) . مسح عن طفيليات في الجاموس مع دراسة المضيف الوسطى لطفيلي *Gigantocotyle explanatus* دراسة مقدمة الى كلية الطب البيطري / جامعة بغداد .
- 11- الراوي ، خاشع محمود وعبد العزيز ، محمد خلف الله(1980) . تصميم وتحليل التجارب الزراعية. مطبعة جامعة الموصل ، الموصل . 245 صفحة .
- 12 - Dinnik , J.A & Dinnik , N.N. (1964) . The influence of temperature on the succession of redial & cercarial generation of *Fasciola gigantica* in snail host . Parasitol , 54,59 – 64 .

مجلة جامعة كربلاء العلمية – المجلد العاشر - العدد الرابع / علمي / 2012

- 13 -Suolsby , E.JL. (1968) . Veterinary Parasitology 6th ed. The Ministry of Higher Education & Scientific Research.Baghdad University.
- 14 -Knapp, S. E. ; Dunkel, A . M .; Han, K. and Zimmerman , L.A. (1992)Epizootiology of fascioliasis in Montana. Vet. parasitol. ,42:241-246.
- 15 -Erasmus , D. A . (1972) . The Biology of Trematodes .1st edn., EdwardArnold.(Publishers), London,PP:312.
- 16 - Bedarkar, S . N.; Narladkar, B. W. and Deshpande, P. D. (2000) .Seasonal prevalence of snail - born fluke infection .
- 17 - مكاوي . طالب (1989) . دراسة التغيرات المرضية للايقار المحلية المصابة طبيعيا بطفيلي الكبد *Fasciola hepatica* . المجلة البيطرية العراقية المجلد (13) .
- 18 - عباس . ماجد خضير (1980) . دراسات مختبرية في بعض الاووجة في ديدان الكبد في العراق نوع *Fasciola gigantica* رسالة ماجستير مقدمة الى كلية الطب البيطري / جامعة بغداد .
- 19 -Goll P.H.; Scott J.M. (1985) . Fascioliasis in the Ethiopian Central highlands . I.Dynamics of intermediate snail host B23 truncatula populations & their rad infection in sheep (*Fasciola hepatica* , Liver Fluke) ; London (UK) Copr.(19) : 1 – 12 .
- 20 -Vignoles P.; Roudelaud D.; Dreyfuss G. (2003). A first infection of Galba truncatula with *Fasciola hepatica* modifies the prevalence of asubsequent infection & cercaria production in the F1 generation , mParasitol.Res.91(4) : 349 – 52 .
- 21 -Lee C.G. ; Wee S. H. ;Park S. J. (1989). Clinicopathological Studies on the subclinical Fascioliasis in the Korean Native Cows in Khonama area . Korean Journal of Vet.Res.V.29(2) . 209 – 214 .
- 22 -Farage H.F. (1996) . Humman fascioliasis in some Countries of Eastrian Meditirian Region ;J.Med.Entomol 37(1) : 27 – 28 .
- 23 -Hellyer G.V. (1993) . Serological diagnosis of *Fasciola hepatica* . Parasitol.5(11):131 – 38 .
- 24 -Hasanat G.H. (2001) Economic Importance of parasitic liver diseases Among Sheep Sloughtered At Amman Abattoir. Jordan University of science & echnology faculty of Veterinary Medicine.
- 25 - البهاتي ، محمد علي (1986) . دراسة في الوبائية والامراضية النسيجية لديدان الكبد في الاغنام في منطقة الموصل ، رسالة ماجستير مقدمة الى مجلس كلية الطب البيطري / جامعة بغداد .
- 26 -Esteban J.G.; Gonalez G.; Cartale F.; Munoz-A .; Valeroma , Bargues M.D.El- Saydm . El-Wakeel A.A.; Abdel-Wahab Y.; Montresoenglls D.; Savioli,Mas. Comas. (2003) . Hyperendemic ascioliasis associated with the Schistosomiasis in Villages in the Nile Delta of Egypt , Am.J.Trop.Med.Hyg.69(4) : 429 – 37 .