

EFFECT OF BIO-FERTILIZER WITH PSB ON THE GROWTH AND YIELD OF WHEAT PLANT

تأثير التسميد الحيوي بالبكتريا المذيبة للفوسفات PSB في نمو وحاصل نبات الحنطة

بهاء عبد الجبار عبد الحميد كلية الزراعة/جامعة بغداد
ندى حميد مجيد كلية الزراعة /جامعة بغداد
عباس محمد عبدالله عبيد كلية الزراعة /جامعة بغداد

الخلاصة

اجريت تجربة اصص في الظلة الخشبية لقسم علوم التربة والموارد المائية- كلية الزراعة بأستخدام تربة مزيجية غرينية جلبت من احد حقول الكلية ثم جففت وطحنت ونخلت ثم عقت بغاز بروميد المثل. وضعت التربة في اصص بلاستيكية زنة 5كغم وتضمنت المعاملات التالية A₁ تربة اضيف لها سماد حيوي خلطا مع ماء الري، A₂ تربة اضيف لها سماد حيوي بمعاملة البذور، A₃ تربة اضيف لها سماد معدني متكامل(اليوريا , سوبر فوسفات ثلاثي،كبريتات البوتاسيوم)،A₄ تربة فقط بمعاملة مقارنة . control بزراعة محصول الحنطة صنف أباء 99 بعد ان تم معاملة البذورفي بعض المعاملات باللقاح الحيوي والبعض الاخر اضيف اللقاح الحيوي مع مياه الري. اوضحت النتائج تفوق المعاملات التي استخدم فيها السماد الحيوي (اللقاح الحيوي) في معايير نمو النبات في عدد السنابل ووزن مئة حبة والوزن الجاف للقش ونسبة الانبات على معاملات السماد المعدني والمقارنة وبطريقتي اضافة اللقاح الحيوي والتي اعطت 7 سنبله نبات⁻¹ و3.6غم مئة حبة⁻¹ و23.3غم سندانة⁻¹ قش و93% نسبة انبات لمعاملة البذور باللقاح الحيوي مقارنة بالشاهد التي اعطت 4 ، 2.56غم ، 15.5غم، 7% على التوالي. فيما اعطت معاملة A₂T₅ معدل ارتفاع 41.8سم عند مقارنتها بمعاملة الشاهد 29.9 سم. كما سجلت نفس المعاملة A₂T₃ - 6 عدد تفرعات النبات اما الشاهد A₄T₅ فكانت 2 فقط. وتوقت معنويا معاملة A₂T₃ في اعداد البكتريا المذيبة للفوسفات PSB اذ اعطت $10^6 * 653 \text{Cfu.gm dry soil}^{-1}$ فيما سجلت المعاملة A₂T₁ اعلى قيمة للنترات الجاهزه في التربة $28.2 \text{mg.kg}^{-1} \text{soil}$ وكانت المعاملة الافضل في كمية الفسفور الجاهز هي A₂T₃ التي اعطت $38.16 \text{mg.p.kgm}^{-1} \text{soil}$ اما معاملة A₂T₂ التي تفوقت في كمية النتروجين الجاهز بصيغة NH₄ اذ كانت 35.48 gm.NH₄+ . kgm soil

Abstract

A pot experiment was conducted in lath house at the College of Agriculture -University of Baghdad in 2010-2011 in a silty clay loam soil , to study the effect of Bio-fertilizer (PSB) phosphate solubilizer bacteria on the growth & yield of wheat (IPA-99) . The experiment was CRBD design with four treatments (A1,A2,A3,A4) . A4 –as control (only soil) , A3 – mineral fertilizr ($280 \text{ K.gm.N.ha}^{-1}$ & $40 \text{ K.gm.p.ha}^{-1}$ & 280 K.gm.ha^{-1} .

A2 (Soil was treated with Bio-fertilizer mixed with seeds and A1 (soil was treated with Bio-fertilizer mixed with irrigated water , the results showed that Bio-fertilizer application had a significant effect on the growth of plant , the number of tiller , the weight of 100 seeds , the total yield of dry matter ,and there was a significant increment in the available N&P in soil .The results of this study indicated

1-The treatments with Bio-fertilizer gave 7 tillers .plant⁻¹ , 3.6gm wt of 100 seeds & 93% of planting while the control (with out Bio-fertilizer)gave 4, 2.5 gm , & 7%) respectively.

2- the treatment A2T3 gave a high number in phosphate dissolving , CFU/ gm of dry soil $653 * 10^6$ & gave high level of available p which was $38.16 \text{ M gm.p.Kg}^{-1}$ of soil

3- the treatment A2T2 gave high level of available- N $35.48 \text{ Mgm NH}_4^+ . \text{Kg}^{-1}$ of soil⁻¹ .

4-the treatment A2T1 gave available-N 28.2Mgm.Kg Of soil⁻¹ .

المقدمة

تعد الأسمدة الكيميائية والمبيدات من اكثر المدخلات الزراعية تأثيرا في رفع انتاجية التربة والمحاصيل الزراعية ومن اجل ذلك توجه المنتجون الى استعمال الأسمدة الكيميائية والمبيدات في المجال الزراعي بشكل اصبح يهدد بالخطر صحة الانسان والحيوان والبيئة، عليه فان الاستعمال المفرط للمبيدات والأسمدة ادى الى اختلال التوازن الطبيعي بين الأفه واعدائها الحيويون فضلا عن تأثيراتها السلبية في عناصر البيئة والكتله الحيه في التربة (1) وذلك من خلال تثبيط هذه المبيدات لاعداد ونشاط الأحياء المجهرية المستوطنة في التربة مما يؤثر سلبا في العمليات الحيوية الجارية، ومن الممكن ان يحصل التمثيل الغذائي لهذه المركبات بواسطة احياء التربة المجهرية ومن ثم فقدان سميتها او تثبيطها او تحويل مجال السمية فيها الى مستوى ادنى.

ان مفهوم الانتاج الزراعي اليوم قد تحول من استراتيجيية الوصول الى اقصى انتاج الى استراتيجيية المستوى الامثل للانتاج اي الارتقاء بنوعية اقصى منتج يمكن تحقيقه وفق مواصفات انتاجية نظيفة وخالية من اثار المبيدات وسميتها. وفق هذا الاطار تعد تقنية استعمال المكافحة الحيوية Biocontrol والمخصبات الحيويه Biofertilizer احد اهم التقنيات الزراعية الحديثة من خلال اتباع المرشد والتكامل بين الاسمدة الكيميائية والحيوية وذلك بتقليل الإضافات المفرطة من الاسمدة الكيميائية والمبيدات على حد سواء بأستعمال المبيدات والاسمدة الحيوية في انتاج عدد من المحاصيل البستنية والحبوب (2). كما ان مفهوم التسميد الحيوي Biofertilizer يمكن ايجازه بأنه كائن مجهري او مجموعه متوافقه من الكائنات المجهرية التي تمتلك القدرة على تيسير بعض العناصر الغذائية الاساسية لنمو النبات من خلال بعض الاليات الحيوية اذ تقوم بتحويل بعض العناصر الغذائية غير الميسره الى الصور الميسره وجاهزة للأمتصاص من قبل جذور النبات ومنها Mn, Fe, S, P, N (3)، (4)، (5) وتتم عملية التسميد الحيوي بتلقيح التربة او البذور بهذه الكائنات الحية بصورة مباشرة او محمله على ماده حاملة بشكل لقاح حيوي تعمل على تغيير المحتوى البايولوجي في منطقة الرايزوسفير كما ونوعا. يعد التسميد الحيوي احد انجازات التقنية الحياتية والذي يتمثل بعزل وتنقية وتوصيف احياء مجهرية مختلفه تضاف على شكل لقاحات حيويه الى وسط نمو النبات اما نثرا او خلطا مع التربة او معاملة البذور باللقاح او يضاف مع مياه الري بهدف تحسين امتصاص العناصر الغذائية عند تغيير المحتوى المايكروبي في منطقة الرايزوسفير ويعتمد نجاحه على كفاءة الكائن الحي المستخدم ومدى توافق الكائن المجهري مع العائل النباتي وقدرته التنافسيه مع الكائنات الحية الموجوده اصلا في التربة فضلا عن اعداد الاحياء في منطقة الرايزوسفير وقدرتها على البقاء (6)، (7)، (8). تقدر نسبة الفسفور ب 11% في القشرة الارضية وتتراوح نسبته في التربة بين (0.02_0.15)% ويسمى الفسفور بالعامل النكاثري لدوره الفعال في تكوين الازهار والثمار والبذور وتطوير المجموع الجذري ويزيد من سرعه النضج المبكر (9)، (10). ويساهم الفسفور في تكوين مجموع جذري كثيف وعميق يساعد عملية امتصاص الماء والعناصر الغذائية وضروري لعدد من الفعاليات الحيويه في النبات.

وهو عنصر فعال لذا يكون دائما على شكل مركبات فوسفاتية وسريع التحول من صيغته الى اخرى (7). يتعرض الفسفور الى الترسيب في التربة بواسطة اكاسيد الحديد والالمنيوم في الترب الحامضية ويترسب بتفاعله مع الكالسيوم في الترب القاعدية بشكل فوسفات الكالسيوم او امتزازه على اسطح غرويات كاربونات الكالسيوم.

تم تقدير أعداد البكتيريا المذيبة للفوسفات (PSB) في المعاملات خلال مراحل نمو النبات وتضمنت مدة الانبات ومرحلة التفريعات وتكوين السنابل ومرحلة ما بعد الحصاد.

يتميز الفسفور بقلّة ذوبانه وحركته البطيئه الامر الذي يتطلب ايجاد وسائل توفيره بسهولة للنبات وهنا ياتي دور الاحياء الدقيقة في التربة التي تقوم بدور فعال في ذوبان وجاهزية الفسفور سواء كانت بكتريا ام فطريات او طحالب من خلال افرازها عديد من الحوامض العضويه والاعضوية وقدرتها في اذابة الفسفور اذ بدأت الشركات والمؤسسات العلميه البحثية في انتاج لقاحات حيوية تحمل احياء مجهرية تؤدي دورا مهما في ذوبان وجاهزية العناصر ومنها الفسفور (11)، لذلك استهدفت هذه الدراسة لمعرفة دور التسميد الحيوي في اذابة الفسفور المعدني وجاهزيته لنبات الحنطة في تربة كلسية.

طرائق العمل

نفذت التجربة بأستخدام اصص في الظله الخشبية لقسم علوم التربة والموارد المائيه في كلية الزراعة. بأستخدام تربة مزيجية غرينيه جلبت من حقول الكلية ثم جففت وطحنت وتم نخلها بمنخل قطر 4 ملم عقت التربة بغاز بروميد المثل. والجدول (1) يتضمن بعض خصائص التربة الفيزيائية والكيميائية التي قدرت بالطرائق المذكوره في (12). وضعت التربة في اصيص بلاستيكية زنة 5كغم. تضمنت التجربة المعاملات التالية:

A₁= تربة اضيف لها السماد الحيوي خلطا مع ماء الري

A₂= تربة اضيف لها السماد الحيوي خلطا مع البذور

A₃= تربة اضيف لها السماد المعدني المتكامل ويتضمن سماد اليوريا والسوبرفوسفات الثلاثي وكبريتات البوتاسيوم بواقع 100 كغم. هكتار⁻¹ نتروجين و50 كغم. هكتار⁻¹ P و 100 كغم. هكتار⁻¹ K حسب التوصية السمادية. وهذ موضحة في فقرة 4 من طريقة العمل ولبقية المعاملات عدا معاملة المقارنة بقيت بدون اضافة.

A₄= تربة فقط بدون اضافة معاملة. مقارنه Control. بواقع ثلاثة مكررات للمعامله الواحده وزعت باتباع القطاعات كامله التعشبية.

1- معاملة البذور باللقاح البكتيري. حضر محلول هايبيوكلورات الصوديوم بتركيز 1% وذلك باذابة 1مل من هايبيوكلورات الصوديوم النقي في 99مل ماء مقطر ثم وضعت فيه البذور لمدة دقيقة واحده بعدها اخرجت البذور وغسلت بالكحول الايثيلي ثم غسلت بالماء المقطر المعقم.

2- *تحضير الحامل carrier بتركيز 40% من الصمغ العربي. اخذ 40غم من الصمغ العربي ثم وضع في 60مل ماء مقطر واضيف اليه 10غم سكروز ثم عقم بالمؤصدة.

3- وضعت البذور المعقمة في مزيج الصمغ العربي المحضر اعلاه لمدة 15دقيقة ثم رفعت بالملقط ووضعت بالمخصب الحيوي بكمية 2gm على اساس الوزن لمدة (5) دقائق وأصبحت جاهزه للزراعة .

4- اضيفت الاسمدة الى المعاملات ماعدا معاملة المقارنه وبالمقادير التالية

1- يوريا 0.07gm.غم.كغم⁻¹تربة

2- سوبر فوسفات 0.01غم.كغم⁻¹تربة

3- كبريتات البوتاسيوم 0.07غم.كغم⁻¹تربة

- 5- زرعت البذور في الاصص ماعدا معاملة تلقيح البذور بالسماد الحيوي (تلوث البذور). تم زراعتها ب 10 بذور لكل اصيص . اضيف ماء الري بعد الزراعة للوصول الى السعة الحقلية.
- 6- بالنسبة لمعاملة السماد الحيوي مع ماء الري فقد اذيب السماد الحيوي بمقدار 1gm في لتر ماء وسقيت الاصص التابعه لهذه المعاملة في الريه الاولى والثانية لضمان تجانس توزيع الاحياء في التربة.
- 7- اضيفت الدفعة الثانية من سماد NPK الى معاملة الاسمه المعدنية اما معاملات التسميد الحيوي اضيف فقط النتروجين دفعه ثانية.
- 8- بعد الانبات خفت النباتات الى خمسة نباتات للاصيص الواحد وتم المحافظه على الرطوبة باتباع الطريقة الوزنية عند فقدان 50% من الماء الجاهز او السعة الحقلية.
- القياسات المطلوبه كانت نسبة الانبات، معدل ارتفاع النبات، عدد السنابل للنبات الواحد، عدد الحبوب، وزن منه حبة، الوزن الجاف للمجموع الخضري، تقدير الـ P الجاهز، NO_3^- الجاهز، NH_4^+ الجاهز في التربة وتم حساب اعداد البكتريا المذيبة للفوسفات في المخصب الحيوي وفي المعاملات المضاف لها المخصب الحيوي باستخدام وسط خاص بالاحياء المذيبة للفوسفات Pikovskay media ويتكون من اذابة 5gm كلوكوز، 2.5gm من $Ca_3(PO_4)_2$ ، 2.6gm من $(NH_4)_2SO_4$ ، 0.13gm من NaCl، 0.07gm من $MgSO_4.7H_2O$ ، 0.13gm من ملح kcl، 0.23gm من yeast extract، 0.002gm من $FeSO_4.H_2O$ ، 0.002gm من $MnSO_4.H_2O$ ، 15gm من Agar و عقم الوسط بالمؤصدة . تم تقدير عدد الاحياء المذيبة للفوسفات بجميع المعاملات في مراحل الانبات والتفرعات وتكوين السنابل ومرحلة ما بعد الحصاد.

جدول (1): بعض صفات التربة المستخدمة في الدراسة

Texture	EC dS .m-1	pH	NO3 Ppm	NH4 ppm	P ppm
SiCL	1.8	7.6	7	14	6.8

النتائج والمناقشة

اظهرت النتائج في جدول (2) عن وجود تأثير معنوي في عدد السنابل/نبات بين معاملات التسميد الحيوي والسماد المعدني

جدول (2) مجمل معايير نمو النبات خلال البحث


نسبة الانبات %	عدد السنابل/ نبات	وزن مئة حبة غم	الوزن الجاف للنش. غم/ أصيص	عدد الحبوب/ سنبله	عدد الحبوب / نبات	الصفة المعاملات
9	7	3.4	22.2	40.0	280	A1
9	7	3.6	23.33	43.0	295	A2
8.33	5	2.83	18.63	40	205	A3
7.33	4	2.56	15.53	38	152	A4
3.47	1.99	0.59	4.02	4.57	19.70	LSD

وكذلك بينها من جانب وبين معاملة المقارنة من جانب الا انه لا توجد فروق معنوية بين معاملات التسميد الحيوي في عدد السنابل للنبات الواحد بين طريقتي اضافة اللقاح الحيوي سواء معاملة الحبوب او اضافته مع مياه الري وتفاوتت معنويًا المعاملات A₂, A₁ التي لقت بالسماد الحيوي على المعاملات التي اضيف لها السماد المعدني A₄, A₃ والمقارنة اذ سجلت 3.4, 3.6, 2.5, 2.8 غم بالتتابع كما نلاحظ في الجدول ايضاً وجود فروق معنوية في الوزن الجاف للنش بين معاملات التسميد الحيوي A₂, A₁ التي سجلت 23.33, 22.2 غم. اصبص¹⁻ على التوالي مقارنة بمعاملات السماد المعدني ومعاملة المقارنة A₄, A₃ التي أعطت 15.53, 18.36 غم. اصبص¹⁻ على التوالي التي كانت هي الاخرى معنوية ايضاً .

كما اعطت النتائج قيم معنوية بين المعاملة A_4, A_1 في عدد الحبوب في السنبله اذ سجلت 38,40.0 حبه على التتابع وهذا يوضح دور واهمية الاسمدة الحيويه في زيادة الانتاج وتحسين كميته .

تشير النتائج في جدول (2) الى وجود فروق معنوية في عدد الحبوب في النبات اذ سجلت المعاملة A_2, A_1 قيما مقدارها 295,280 حبه. نبات بالتتابع مقارنة بالمعاملات A_4, A_3 التي اعطت 205, 152 حبه. نبات¹ بالتتابع.


في حين لم تكن هناك فروق معنوية في نسب الانبات بين المعاملات جدول 2 الا انه توجد فروق ظاهرية في عدد النباتات النامية اذ سجلت المعاملة A_2, A_1 نسبة انبات 90% فيما اعطت معاملة المقارنه نسبة انبات مقدارها 73% وهذا الفرق واضح بين التسميد الحيوي والمقارنه.



شكل 1: تأثير التسميد الحيوي في عدد تفرعات النبات والمدة الزمنية

في شكل 1 أشارت النتائج الى وجود فروقات معنوية بين المعاملة الواحد في عدد التفرعات مع المدة الزمنية ففي المعاملة A_1 التي أعطت فروقا معنوية بين المدد الزمنية T_5, T_4, T_3, T_2, T_1 على التتابع في حين اعطت المعاملة A_2 فروقا معنوية مشابهه في المدد T_5, T_4, T_3, T_2, T_1 على التتابع في عدد تفرعات النبات بينما لم تكن هناك فروقات معنوية بأختلاف المدد في المعاملة A_4, A_3 على التوالي . كما سجلت معاملات التداخل بين السماد والمدة الزمنية فروقات معنويه ايضا في عدد التفرعات بين المعاملة $A_1 T_5$ التي سجلت 6 فروع للنبات الواحد مقارنة بالمعاملات $A_4 T_5, A_3 T_5, A_2 T_5$ التي اعطت 5, 2, 2 فرع . نبات¹ بالتتابع وهذا يوضح اهمية اضافة الاسمدة الحيويه ودورها في تحفيز النمو وعدد التفرعات للنبات الواحد.


اوضحت نتائج شكل 2 عن وجود فروقات معنوية بين المعاملات والمدة الزمنية اذ اعطت المعاملة A_2 معدل ارتفاع النبات 1.96, 18.7, 20.6, 31.4, 41.8 سم للمدد T_1, T_2, T_3, T_4, T_5 بالتتابع في حين سجلت معاملة A_1 قيما معنوية في معدل ارتفاع النبات للمدد T_1, T_2, T_3, T_4, T_5 اعطت 1.96, 19.6, 30.9, 35.6, 41.6 سم بالتتابع مقارنة بمعاملة السيطره التي سجلت 1.8, 11.96, 18.53, 21.2, 29.93 سم للمدد نفسها بالتتابع في حين تأثرت معاملات التداخل بين التلقيح والمدة الزمنية معنويا في معدل ارتفاع النبات اذ اعطت المعاملة $A_1 T_3$ ارتفاعا 30.9 سم وبفوق معنوي على المعاملة $A_3 T_3$ التي اعطت 20.96 سم فيما سجلت المعاملة $A_4 T_3$ ارتفاعا مقداره 18.53 سم وهذا يوضح دور التسميد الحيوي في زيادة نشاط النبات الحيوي ونموه ومن ثم ينعكس هذا النشاط على الارتفاع ونمو النبات .



LSD: A*T=3.6

الشكل 2 : تأثير اضافة اللقاح الحيوي في معدل ارتفاع النباتات والمدة الزمنية

يظهر شكل 2 ونتائج التحليل الأحصائي أيضا وجود تفوق معنوي في معاملات اضافة اللقاح مع البذور في المعاملات A_2T_5, A_1T_5 التي اعطت ارتفاعا للنبات مقداره 41.8، 41.60 سم للمعاملتين بالتتابع مقارنة بمعاملات السماد الكيميائي والمقارنه A_4T_5, A_3T_5 التي سجلت معدل ارتفاع مقداره 30.7, 29.9 سم بالتتابع وهذا يبين اثر او اهمية اضافة اللقاح الحيوي اذ ان للأضافات الأحيائية دورا مهما في زيادة معايير نمو النبات من خلال زيادة جاهزية العناصر الغذائية وتوفير ظروف مناسبة لنمو المجموع الجذري كثيف وهذا ماكداه وأشار اليه (13)، (14) الذين بينو في بحوث أجريت على الحنطة والطماطة التي لقحت باللقاحات الحيوية وأدت الى زيادة في نسبة الانبات وأرتفاع النبات وطول المجموع الجذري والحاصل البيولوجي اذ ان التلقح بالعوامل الحيوية يعمل على زيادة امتصاص العناصر الغذائية ومنها Mn, K, P, N وغيرها . ونؤكد هذه النتائج قدرة اللقاح في زيادة جاهزية الـ K, P, N وغيرها في التربة المعاملة.




LSD: A*T=15.42

شكل 3 : تأثير التسميد الحيوي في الكثافة البكتيرية للبكتريا المذيبة للفوسفات

بينت نتائج شكل 3 والتحليل الاحصائي تفوق المعاملات التي اضيف لها اللقاح الحيوي مع البذور في كثافة الاحياء المذيبة للفوسفات PSB مقارنة مع معاملات عدم الاضافه والتي لم تسجل نمواً احيائياً يذكر كونها معقمه ولم يبقى اثر حيوي فيها اذ اعطت المعامله A_1T_3 كثافة بكتيرية CfU مقدارها $10^6 * 343$ فيما سجلت المعامله A_2T_3 $10^6 * 653$ وبفروقات معنوية في حين كانت الاعداد البكتيرية في نهاية الموسم وللمعاملتين اعلاه متساوية اذا كانت CfU بمقدار $10^6 * 5$ في الزمن T_4 . وهذا يبين ان


العلاقات بين الاحياء المجهرية ونمو جذور النباتات ذات علاقات ايجابية ومتزامنة مع عمر نمو النبات في منطقة الرايزوسفير ملائمة لنمو الاحياء المجهرية وزيادة نشاط المجموع الجذري وذات منفعة متبادله تنعكس ايجابيا على حياة كل منهما في النمو والنشاط او الفعالية. اذ ان جذور النباتات عادة تفرز مواداً لزجة منها هرمونات وكاربوهيدرات وفيتامينات وانزيمات وعناصر فائضة عن حاجة النبات هذه جميعها تعتبر مصدر طاقة وغذاء تشجع النمو وتؤدي الى زيادة نشاط الاحياء المجهرية في منطقة الرايزوسفير . ومن ثم زيادة اعدادها وكثافتها بما يتلائم وحجم المجموع الجذري للنبات ومدى توفر مصادر غذاء وطاقة لزيادة اعدادها .



LSD: A*T=0.96

شكل (4): تأثير التسميد الحيوي في كمية النترات الجاهزة في التربة

اظهرت نتائج شكل 4 والتحليل الاحصائي تفوق معاملة اضافة اللقاح الحيوي مع بذور الزراعة مقارنة مع اضافته مع مياه الري اذ سجلت المعاملة $14.30 \text{ mg.k gm}^{-1}$ of soil $\text{NO}_3 \text{ A}_2\text{T}_4$ فيما اعطت المعاملة $7.63 \text{ mg. NO}_3 \text{ k. g}$ $\text{NO}_3 \text{ A}_1\text{T}_4$ في حين اعطت معاملة المقارنة $6.9 \text{ mg.kgsoil}^{-1}$ $\text{NO}_3 \text{ A}_4\text{T}_4$ قيمه مقدارها وهذا يبين دور الاحياء المجهرية في منطقة الرايزوسفير في تحولات النروجين لاسيما بكتريا Nitrosomonas وبكتريا Nitrobacter التي تؤدي دورا مهما في اكسدة الامونيا في التربة الى نترات عند توفر الظروف الملائمة وزيادة اعدادها ويحدث هذا عند توفر كميات وفيرة من الامونيوم NH_4^+ في منطقة الرايزوسفير الملائمة لنمو ونشاط عالي لحياء التربة المجهرية وأيد ذلك (15) وأكدته (16) وقد تأتي بعض الاحياء الدقيقة مع مياه الري او مع دقائق الغبار عند سقوطها او هي موجودة مستوطنة في التربة ثم تؤدي الدور المهم في تثبيت النروجين الجوي في منطقة الرايزوسفير.




LSD: A*T=1.66

شكل (5): تأثير التسميد الحيوي في كمية النروجين الجاهز بصيغة NH_4^+

أظهرت نتائج الشكل 5 تفوقاً معنوياً لمعاملات اضافة اللقاح الحيوي مع البذور في مرحلة الانبات والتفرعات مقارنة بمعاملة السيطرة في كمية الامونيا الموجوده في التربة اذ سجلت المعاملة A_2T_3, A_2T_2 قيمه مقدارها 35.43, 35.30 $mg.kg^{-1}$ of soil NH_4^+ وبالتتابع في حين اعطت المعاملات A_4T_2, A_4T_1 قيماً مقدارها 17.03, 28.26 $mg.kg$ of soil NH_4^+ وبالتتابع وهذا يشير الى ان تواجد او توافر اعداد كافيه من الاحياء المجهرية ذات التأثير الايجابي في تحولات N في منطقة الرايزوسفير سوف يؤدي الى زيادة جاهزية NH_4 وكميته في حدود المنطقة الجذرية ومن ثم ينعكس هذا التركيز على نمو ونشاط النبات المتعايش مع الاحياء المجهرية.

اما مرحلة ما بعد الحصاد نلاحظ انخفاض تركيز NH_4 اذ اعطت المعاملات A_2T_4, A_1T_4 قيماً مقدارها $mg.kg.soil^{-1}NH_4$ 21.03, 20.07 وبالتتابع في حين سجلت المعاملات A_4T_4, A_3T_4 قيماً اقل مقدارها 13.6, 13.9 $mg NH_4^{+4}.kg$ of soil بالتوالي وهذا يشير الى انحسار الفعاليات الحيوية في المنطقة الجذرية بعد الحصاد او بعد اكمال النبات دورة حياته وقد أشار (17) ان الاسمدة الفوسفاتية الحيوية تستطيع زيادة جاهزية الفوسفات كما تزيد من تثبيت الحيوي للنتروجين مع زيادة في جاهزية الحديد والزنك من خلال أنتاج مواد محفزة لنمو النبات.



LSD: A*T=1.48

الشكل (6): تأثير التسميد الحيوي في كمية الفسفور الجاهز في التربة

أوضحت النتائج في شكل 6 تفوقاً معنوياً لمعاملات اضافة اللقاح الحيوي على البذور قبل الزراعة او مع مياه الري في كمية الفسفور الجاهز في التربة مقارنة بمعاملات السماد المعدني والمقارنه اذ اعطت المعاملة A_1T_1 قيمه مقدارها 13.20 $mg.p.kg.soil^{-1}$ في حين سجلت المعاملة A_2T_1 قيمه مقدارها 20.06 $mg.p.kgm$ of soil⁻¹ هذا في مرحلة الانبات وهذا يشير الى تفوق معاملات اضافة اللقاح على البذور على معاملة اضافته مع مياه الري فيما اعطت المعاملات A_4T_1, A_3T_1 قيماً للفسفور الجاهز مقدارها 12.2, 7.10 $mg.p.kg.of$ soil بالتتابع اما في مرحلة تكوين السنبال فقد سجلت المعاملات A_2T_3, A_1T_3 قيماً مقدارها 38.16, 32.16 $mg.p.kgm$ of soil⁻¹ وبالتتابع مقارنة بمعاملة السيطرة A_4T_3 التي سجلت قيمه مقدارها 7.23 $mg.p.kgm$ of soil⁻¹ وان هذه النتائج متوافقه مع معايير النمو التي قدرت لنبات الحنطة هذا يؤكد ان للاحياء الدقيقة المذبية للفوسفات والمضافه الى التربة بشكل لقاح حيوي او تحت اسم سماد حيوي ادت دورا فعالا في جاهزية الفسفور وزيادة تركيزه في منطقة الرايزوسفير وتيسره للامتصاص من قبل النبات .

من نتائج هذه الدراسة يمكن التوصيه بضرورة التوسع باستخدام المخصبات الحيوية والتلقيح بأكثر من عامل احيائي لتحقيق الاستفادة القصوى من احياء التربة المجهرية المحفزه لنمو النبات والتقليل من استخدام الاسمدة الكيميائية لما لها من اضرار بيئية وتلوث بيئي كبير يضر بصحة الانسان والحيوان والنبات .

كما ان هذه النتائج تؤكد فعالية استخدام الاسمدة الحيوية في زيادة جاهزية العناصر للنبات واكد (7) ان التلقيح بالبكتريا المذبية للفوسفات PSB ادت الى زيادة نمو هذه البكتريا في منطقة الرايزوسفير وزيادة جاهزية الفسفور وهذا انعكس على النبات في نموه وانتاجه وايد ذلك (18).

من نتائج هذه الدراسة يمكن القول بضرورة التوسع في استخدام المخصبات الحيوية والتلقيح بأكثر من عامل احيائي واحد لتحقيق الاستفادة القصوى من احياء التربة المجهرية المحفزة لنمو النبات في منطقة الرايزوسفير عند الزراعة والتقليل من استخدام الاسمدة الكيميائية لما لها من اضرار بيئية وتلوث بيئي كبير يؤدي الى تدهور النظام البيئي وأضرار بصحة الانسان والحيوان والنبات ويعطي نتائج ذات اثار سلبية كما ان هذه النتائج تؤكد فعالية استخدام الاسمدة الحيوية في زيادة جاهزية العناصر الغذائية للنبات لا سيما في الترب الكلسية كما هي في الترب العراقية عالية المحتوى من الكربونات وأهمها الفسفور والعناصر الصغرى وهذا ما اكدته الدراسة .

المصادر

- 1- Alexander ,M.1977.introduction of soil microbiology.
- 2- التميمي، فارس محمد سهيل.2005. تأثير التداخلات بين المبيدات الحيوية والكيميائية والتسميد الحيوي على نبات القمح. اطروحة دكتوراه . كلية الزراعة.جامعة بغداد
- 3- Cooper,K.M.1984. Physiology of VA-Mycorrhizal association in mycorrhiza (eds) Cl. Powwelland D.J. Bagyaraj; 155-186 . Press inc . Boca. Raton, Florida.
- 4- التميمي، فارس محمد سهيل.2000. دور فطر المايكورايزا نوع G-mosseae في نمو نباتي الحنطة والذرة الصفراء. رسالة ماجستير- كلية الزراعة- جامعة بغداد
- 5- السامرائي،اسماعيل خليل. وسلمان ، نريمان داوود.2004. تأثير التسميد بصخر الفوسفات، والتلقيح بفطر المايكورايزا في النمو وحاصل التبغ. مجلة العلوم الزراعية العراقية –مجلد(35) عدد(6).
- 6- الحداد،محمد السعيد مصطفى.1998. دور الاسمدة الحيوية في خفض تكاليف الزراعة وتقليل تلوث البيئة وزيادة انتاجية المحصول . كلية الزراعة. جامعة عين شمس- الدورة التدريبية القومية حول انتاج واستخدام المخصبات الحيوية .
- 7- Sundara, B.,Natarajan, V.and Hari,K.2002. influence of phosphorus solubilizing bacteria on the change in soil available. Field crop research . 77:43-49
- 8- Ratti,N.,Kumar,S.,verma, H.N. and Gautams,S.P 2001. Improuement in bioavailability of tricalcium phosphate to Cymbopogon martini var. motia by rhizobacteria. AMF and AZO Spirillum inoculation . microbiology research. 156:145-149.
- 9- Tisdal,S.L.,W.L.Nelson;J.D.Beaton and J.L. Havlin. 1977. Soil fertility and fertilizers.
- 10- جبيلي، يوسف.1996. البحوث العلمية للفوسفات. مجلة عالم الذرة. هيئة الطاقة الذرية في الجمهورية العربية السورية. عدد(43).
- 11- Deuble, A.and W.Merbach.2005: influence of microorganisms on phosphorus bioavailability in soil. Microorganism in soil. 191-177.-
- 12- Black, C.A 1965. Method of soil analysis.part2 chemical and microbiological proreties.
- 13- Afzal, A. and B. Asghari.2008. Rhizobium and phosphate solubilizing bacteria improve the yield and phosphorus uptacke in wheat (Triticum a-estivumL.)Int.J.Agr.Biol.10:85-88
- 14-Mahato, p.;Anoop Badoni and J.S.Chauhan. 2009. Effect of Azotobacter and Nitrogen on seed Germination and Early seedling Growth in tomoto. Researcher.1(4).(62-66).ISSN(1553-9865)
- 15- El.Shanshoury ,AR; Hassan,MA and Abdal Gaffar, BA.1989. Synergistic effect of vesicular-arbuscul- mycorrhizas and Azotobacter on growth and nutrient contents of tomoto plants. Phytion Horn . 29:203-212(Hort.Abst.61:358)
- 16- kumar,S.,Verma,H.N.and Gautam,S.P. 2001.Improvement in bioavailability of tricalcium phosphate by rhizobacteria .Microbiology research,156:145-149.
- 17 - Kucey, R.M.N.,H.H.Janzen and M.E.Leggett 1989. microbiology mediated in crease in plant. Available phosphorus. Ad.Agron.42:199-228
- 18-Young,c.c.,Lai,W.A.,Shen,F.T.,Hung,M.H.A.B.2003.Exploring the microbial potentially to augment soil fertility in Taiwan .International conference; Soil management Technology on Low productivity .Taiwan.pp.25-27.