

Chemical , Ecological and Pallinological distribution study of species *Amaranthus caudatus* L. (Amaranthaceae) in Iraq . دراسة كيميائية و بيئية والتوزيع الجغرافي وحبوب لقاح للنوع *Amaranthus caudatus* L (Amaranthaceae) في العراق

*فاضل كاظم كريم * نصير جواد كاظم ** نصير ماجد عبد الحسن
*كلية العلوم / جامعة الكوفة **كلية الزراعة / جامعة الكوفة

أخلاصه

تم إجراء البحث في مختبر بحوث النبات - قسم علوم الحياة- كلية العلوم- جامعة الكوفة. وتضمن دراسة كيميائية للأجزاء النباتية (الجنود والسيقان والأوراق والأزهار) للنوع *Amaranthus caudatus* L قيد الدراسة , وتبين أنها غنية بمحتواها الكيميائي. إذ تم فصل (6) مركبات كيميائية بألوان وأطوال سريان مختلفة . اذ وجدت المركبات (1 و 2) في الجنود وألوانها تراوحت (بيجي فاتح-بنى فاتح) وأطوال سريانها هي (94 و 41) والمركب (3) في الساق بطول سريان (89) ولون بني فاتح والمركبات (4 و 5) في الأوراق. وألوانها بني مصفر لكلى المركبين وأطوال سريان (89 و 93) في حين ظهر المركب (6) في الأزهار بلون بني فاتح وطول سريان (91) . وفيما يخص البيئة تبين أن النوع قيد الدراسة ينمو في بيئات مختلفة منها الأراضي الرملية والجبلية والصحراوية ويتواجد في معظم مناطق العراق المختلفة. وبخصوص التوزيع الجغرافي اتضح أن النوع قيد الدراسة واسع الانتشار إذ ينتشر في جميع أنحاء العراق باستثناء بعض المقاطعات الجغرافية . وفيما يخص حبوب لقاح النوع قيد الدراسة فقد تبين أنها ملساء وثنائية الفتحات والأحاديد Dicolporate.

ABSTRACT

The study was carried out in plant laboratory – Department of Biology , College of Science , Kufa University . The study aimed to determined the chemical content of plant parts(Root ,Leaves, Stems and Flowers) of genus *Amaranthus caudatus* L.The results explained that there are Six chemical compounds which were differ in their color and Rf . The first and second compounds were found in root where some color was violet and yellow .The three Compound Was found in the stem. The leaves had two chemical compounds (4,5) and their colors were clear violet while the sixth compound appeared in flower extract , with different Rf . and the color . the study of ecology showed that the species *Amaranthus caudatus* L. grew at different soil types such as sand , stone and desert . In concern to the distribution study of this genus indicate that it has been found in ten region of Iraq . Pollen grains of Species *Caudatus* were found to be Dicolpreat and smooth surface with a little Taxonomic value.

المقدمة: Introduction

تعد العائلة Amaranthaceae من أكبر العوائل النباتية وان الجنس *Amaranthus* الذي ينتمي لها واسع الانتشار في العالم الا انها تتركز في المناطق الحارة ولا سيما أمريكا وإفريقيا وتضم هذه العائلة (64) جنسا و (800) نوعا منها في العراق ثلاثة أجناس تضم عشرة أنواع وتزرع ستة أنواع للزينة (1) . كما أشار (2) إلى وجود خمسة أجناس ولا توجد دراسة تصنيفية مفصلة لهذا الجنس والمتمثل بنوع *A. caudatus* . وتهدف الدراسة الحالية للنوع قيد الدراسة إلى اكتشاف صفات داعمة للصفات المظهرية بغية الاستفادة منها في المجالات العلمية المختلفة ومعرفة صفات تصنيفية آخر تدعم الصفات الرئيسية المعول عليها في عزل الأنواع . إلا إن الدراسة الحالية الكيماوية هدف إلى معرفة انتشار مركبات الفلافونول مثل (Quercetin و Kaempferol) ومركبات الفلافون مثل Apigenin, Lutelin في نباتات هذه العائلة . الا ان (3) قاما باول محاولة للربط بين المظهر الخارجي والتركيب الكيماوي في دراسة على نبات ال *Eucalyptus* وقتها شاع استخدام المركبات الكيماوية كادله تصنيفية على نطاق واسع ومن هذه المركبات المركبات الفلافونودية وذلك بسبب التغيرات الكبيرة والانتشار الواسع الذي تمتاز به هذه المركبات (4) . وفيما يخص حبوب

اللقاح فقد ساهم هذا العلم في مجال تصنيف النبات مساهمه فعاله فالبيانات المحصل عليها في مجال حبوب اللقاح تقدم فائدة لا يمكن اغفالها على كل المستويات التصنيفية (5) وأكد (6) إن دراسة الصفات المظهرية لحبوب اللقاح كنوع الزخرفة Ornamentation ووجود الأشواك والأخاديد والتقوب وحجم حبه اللقاح يعطى معلومات وأدله أكثر بكثير من دراسة المقطع المستعرض لحبة اللقاح وتركيب جدارها. وكان لاختراع المجهر الاليكتروني الماسح (SEM) والمجهر الاليكتروني النفاذ (TEM) الأثر الكبير في تطور هذا العلم وتوظيف الصفات المورفولوجيه الدقيقة (Micromorphological Charactres) لحبوب اللقاح في عزل وتشخيص الأنواع والأجناس لمختلف العوائل النباتية. فمثلا قما(7) باستخدام الصفات المظهرية الدقيقة التي يظهرها المجهر الاليكتروني الماسح (SEM) في تشخيص نوع الجنس *Liliaceae Trilium* كذلك الدراسة التي قام بها(8) وغيرها من الدراسات. ومما تجدر الإشارة إليه إن النوع قيد الدراسة يعتبر من نباتات الزينة في العراق(1). إن الدراسة البيئية والتوزيع الجغرافي للنوع قيد الدراسة تساهم هي الأخرى في إيجاد بعض الصفات التي تدعم الصفات المعول عليها في تشخيص نوع الجنس .

المواد طرائق العمل : Materials of Methods

الدراسة الكيميائية / Chemical study

- تركزت الدراسة على الكشف عن المركبات الفينولية في نوع الجنس النامية في العراق واتبع في ذلك طريقه (4) وتلخصت بما يلي:
- 1- أخذت الأوراق والبرؤوس الزهرية والبذور من الجنس قيد الدراسة وسحقت كل على حدة وأخذت الأجزاء المطحونة بعد التصفيه من الشوائب .
 - 2- تم وزن كمييه (4-5) غم من كل عينه وأضيف إليها (50) مل كحول اثيلي 70% وتركت في درجه حرارة الغرفة من (24-48) ساعة.
 - 3- تم ترشيح النقيع باستخدام ورقه ترشيح نوع whateman.
 - 4- ركز الراشح إلى حجم مناسب لكي يتم التخلص من الكحول بواسطة مجفف هوائي وبدرجة حرارة معتدلة
 - 5- أضيف إلى الراشح بقدر حجمه من أيثر نفطي (petroleum ether) ذو درجة غليان 82م رج المحلول جيدا ثم وضع في قمع فصل (Separating funnel) وترك إلى أن يتم فصله إلى طبقتين واضحتين . وبذلك تم التخلص من مادة اليخضور التي تذوب في الايثر النفطي وتطفو للأعلى لأنها اقل كثافة من المستخلص المائي للمركبات الفينولية التي تميل للذوبان في الماء وتكون طبقه سفلى تسحب من أسفل القمع.
 - 6- تم تركيز مستخلص المركبات الفينولية إلى نصف الحجم تقريبا وذلك بتركه في تيار هواء جاف.
 - 7- استخدمت صفائح السيليكا الرقيقة (40-60) TLC aluminum sheets Merck بأبعاد (20×20) سم بعد ان نشطت Activated في الفرن بدرجة حرارة بين 100-110م ولمدة (20-30) دقيقة.
 - 8- وضعت بقع Spots صغيرة من المستخلص المركز المحضر في خطوة (6) بواسطة أنابيب شعرية Capillaries بحيث تركت مسافة (2) سم بين عينة وأخرى وكذلك تركت نفس المسافة من أعلى وأسفل الصفيحة وكررت عملية التنتيظ عدة مرات وقد تركت البقع حتى تجف بواسطة المجفف الهوائي ومن ثم وضعت القطرة التالية، وهكذا،
 - 9- وضعت الصفائح المحتوية على بقع العينات في حوض زجاجي متوازي المستطيلات مناسب يحتوي على احد المحاليل المذيبة وغطي بغطاء زجاجي محكم. حضر المذيب المناسب ووضع بالحوض قبلا وضع الصفيحة المحتوية على البقع بمدة مناسبة وذلك ليكون بخار من المذيب يملأ فراغ الحوض .
 - 10- استخدم المذيب BAW (5-1-4) الذي ثبت من خلال تجارب (9) و(10) و(11) انه الأكفأ في فصل المركبات الفينولية على صفيحة TLC حيث تم تحضيره مختبريا بخلط 80% مل من n-butanol و20 مل من حامض الخليك الثلجي و100 مل من الماء المقطر في قمع فصل ورجها وبعدها اترك الخليط ليستقر ويفصل إلى طبقتين ثم أخذت الطبقة العليا منه واستخدمت في العمل .
 - 11- تركت الصفائح في الحوض من (9-8) ساعة حيث يتحرك المذيب بمسافة معينة حددت بسته عشر سنتيمترا .
 - 12- أخرجت الصفائح من الحوض وتركت لتجف وسجلت عليها مواقع وألوان البقع المفصولة التي تظهر في الضوء الاعتيادي .
 - 13- فحصت الصفائح تحت الاشعه فوق البنفسجية بطول موجي (365) نانوميتر وسجلت عليها الملاحظات حول نوعية وكمية المواد التي انفصلت في كل عينة .
 - 14- تمت معاملة الصفائح بالمواد الكاشفة والمستعملة للكشف عن المركبات الفينولية مثل بخار الامونيا ومادة KOH 1% (4) ومن التجربة وجد أن بخار الامونيا هو الأكثر فائدة في إظهار المواد الفينولية. وضعت قنينة زجاج صغيره تحتوي على سائل الامونيا داخل الحوض وتركت مفتوحة ثم وضع غطاء الحوض وبذلك أصبح فراغ الحوض مشبعا بالامونيا ووضع الصفائح المحتوية على المواد الفينولية المفصولة في الحوض لمدة (15-20) دقيقة بعد ذلك أخرجت الصفائح وسجلت عليها الملاحظات عن التغيرات التي حصلت بسبب الامونيا.

15- فحصت الصفائح تحت الأشعة فوق البنفسجية (365) نانومتر و سجلت الملاحظات كما في السابق وأعطيت ارقام المركبات الموجودة في مستخلص الأوراق وأخرى لتلك الموجودة في مستخلص الرؤوس الزهري اعتماد على قيمة معامل السريان النسبي RF التي تساوي المسافة التي يتحركها المركب مقسومة على المسافة المذيب والناجح مضروب (100) على لون البقعة بوجود الأشعة فوق البنفسجية وبخار الامونيا حيث تم فصل المركبات الفينولية لكل المستخلصات ودرست كافة المركبات المستخلصة من الاجزاء النباتية (الجذور و الأوراق و الأزهار) وقد وضحت النتائج في الجدول (1) وشكل (2)

دراسة حبوب اللقاح

في هذه الدراسة تم الاعتماد على العينات الحقلية الطرية التي تم جمعها من المشاتل في بعض المحافظات الوسطى والجنوبية (بابل والكوت والنجف الأشرف وكربلاء والناصرية والبصرة) وحفظت الزهيرات في كحول ايثلي % 70 واتبعت طريقة (12) مع بعض التحوير. اذ أخذت أزهار ناضجة وغير متفتحة من العينات الطرية بعد ان وضعت في الماء لمدة (20- 30) دقيقة. نقلت الزهيرات الى شريحة زجاجية نظيفة وضعت عليها قطرة ماء فتحت الزهيرة بوساطة ابره ونقلت متوكها الى شريحة زجاجية أخرى وضعت عليها قطرة من صبغة (الكارمين -جلى كليسرين) وفتحت المتوك داخل القطره بعد ذلك تم ازالة بقية أجزاء المتوك ووضع غطاء الشريحة برفق وفحصت الشرائح تحت المجهر الضوئي المركب نوع Olympus وأخذت القياسات ل(50-60) حبة لقاح من حبوب لقاح نوع *Amaranthus caudatus* إذ تم قياس المحور الاستوائي والقطبي لكل حبه باستخدام مقياس العدسة العينية (Ocular) وصورت بعد ذلك في الكامرة الاليكترونية تحت العدسة الشيئية الزيتية Oil immersion lens .

البيئة والتوزيع الجغرافي :

اعتمد في هذه الدراسة على المعلومات التي تم الحصول عليها من السفرات الحقلية التي تم القيام بها إلى بعض محافظات القطر عام(2008) وخاصة المشاتل في كل من المناطق الوسطى والجنوبية والشمالية إضافة إلى المعلومات المثبة على هوية العينات المعشبية في معشب كلية الزراعة -بغداد كما تمت الاستعانة ببعض المعلومات التي نشرها باحثون أمثال (2)و(13). ورسمت الخرائط لتوضيح انتشار النوع استنادا الى تلك المعلومات.

النتائج Result


فيما يخص الجانب الكيماوي إن أجزاء النبات (الجذور و السيقان و الأوراق و الأزهار) غنية بمحتواها الكيماوي من المركبات الفينولية إذ ظهرت مركبات في أجزاء دون أخرى . ونظرا لعدم توفر standards لم يتمكن الباحث من تشخيص أسماء المركبات التي ظهرت وإنما اعتمد على قيمة السريان النسبي Rf لكل مركب ولون المركب على الصفحة TLC تحت الأشعة فوق البنفسجية وأعطيه لكل مركب رقم في كل من مستخلص الجذور و الأوراق و الإزهار وبين مدى اختلاف ذلك بين مستخلصات الأجزاء النباتية ووضعت تلك البيانات في جدول 1- وشكل 1— وأعتمد ذلك في المقارنة بين المركبات لقد أظهرت الدراسة وجود مركبين في الجذور بطول سريان (94و41) بألوان تتراوح بين فاتح-بني فاتح. في حين اظهر مستخلص الساق مركب واحد (3) بطول سريان (89) بالون بني فاتح. وظهرت نتائج مستخلص الأوراق مركبين بأطوال سريان Rf بالوان - . كما مبين في جدول 1- 1- وفيما يخص الدراسة البيئية اعتمد فيها على المعلومات التي تم الحصول عليها من السفرات الحقلية الى بعض مناطق القطر إضافة للمعلومات المثبتة على هوية العينات الجافة Labels والمودعة في معشب كلية الزراعة. كما تمت الاستعانة بالمعلومات التي نشرها الباحثون أمثال (13). فانه ينمو في التربة الطينية و الرملية والمنحدرات الصخرية والصخور الحجرية وكما مبين في جدول (2) وكذلك شكل (3) اما فيما يخص توزيع الجنس فقد أشار(13) و (14) إلى انه يتوزع في المقاطعات التالية . DWD- DLJ-DSD- وكما مبين في الشكل 2- فضلا من ان الباحث وجد ان النوع قيد الدراسة ينتشر في مناطق التلال F— ومقاطعة نينوى - FNI ومقاطعة كركوك FKI وكما موضح في شكل (1)- -وفيما يخص البيئة

نتائج دراسة حبوب ألقاح

اتضح من الدراسة الحالية أن حبوب لقاح النوع *Amranthus caudatus* هي من الطراز Dicolporate وتبدو تاجية الشكل في المنظر القطبي وقرصية الشكل في المنظر الاستوائي Equatoriai view وملساء وكما مبين في اللوحة (1) وظهر ان طولها في المنظر القطبي (11-12) مايكروميتر وعرضها (7-10) مايكروميتر في حين طولها في المنظر الاستوائي (8-10) مايكروميتر وعرضها (7-9) مايكروميتر وكما مبين في الجدول (3).

جدول 1- الاختلاف في المركبات الموجودة في اجزاء النبات للنوع *Amaranthus caudatus*

لون المركب تحت الاشعه فوق البنفسجيه	قيمة المتحرك Rf BAW	رقم المركب	اسم الجزء النباتي
بيجي فاتح	41	1	الجذور
بنى فاتح	94	2	
بنى فاتح	89	3	الساق
بنى مصفر	89	4	الأوراق
بنى مصفر	93	5	
بنى فاتح 	91	6	الأزهار



شكل- 1 - موقع المركبات الفينولية على لوحة TLC


جدول (2) نوع البيئة والتوزيع الجغرافي ومدى الارتفاع بالمتري للنوع

Amaranthus caudatus

الارتفاع/م	نوع البيئة				DWD	DL J	DS D	FKI	FN I	F	المقاطعات الجغرافية للنوع <i>Amranthus Caudatus</i>
1200-30	رملية 0				+		+	+		+	
2500	صخور جيرييه					+			+		
2500	منحدرات										
1500- 1000	صخريه-										

جدول (3) لقياسات حبوب القمح النوع *Amranthus caudatus* مقاسة بالمايكروميتر


نوع المنظر	الطول	العرض	عدد الفتحات
المنظر القطبي	12-11 10	10-7 8	2
المنظر الأستوائي	10-8 9	9-7 8	لا يوجد



شكل (1) خارطة المناطق الجغرافية الطبيعية ومقاطعاتها في العراق (عن Guest, 1966)

منطقة وادي الرافدين (L)	المناطق الصحراوية (D)	منطقة التلال (F)	منطقة الجبلية (M)
مقاطعة السهل الشرقي LEA	مقاطعة الجزيرة السفلى DLJ	مقاطعة الجزيرة العليا FUJ	محافظة ميسان MAM
مقاطعة السهل الاوسط LCA	مقاطعة الغرقة-العظيم DGA	مقاطعة نينوى FNI	محافظة مروان MRO
	مقاطعة الصحراء الغربية DWD	مقاطعة اربيل FAR	محافظة مسوب MSA
	مقاطعة الصحراء الجنوبية DSD	مقاطعة كركوك FK1	محافظة ميسان MJS
		مقاطعة التلال السفحية FPF	


شكل (2) المناطق الجغرافية الطبيعية ومقاطعاتها في العراق



شكل (3) خارطة توزيع النوع *Amaranthus caudatus*



1




2



1

μm



2

لوحة (1) تبين المنظر القطبي (1) و الاستوائي (2) لحبة اللقاح للنوع *Amaranthus caudatus*

المناقشة

ظهر من خلال نتائج الدراسة الكيميائية المحصل عليها ان الاجزاء النباتية (الجزور والسيقان والاوراق والازهار) تحتوي على اعداد كثيرة من المركبات القلافونودية المشار اليها في جدول (1) يمكن ان تكون ذات فعالية في تشخيص النوع قيد الدراسة. لذا يمكن اسغلال هذه الصفات في تدعيم الصفات المظهرية في النوع للجنس قيد الدراسة. كما وان الادله التصنيفية الكيميائية المحصل عليها من دراسة المركبات الكيميائية في النبات قد تختلف بين المجاميع المختلفه. وفيما يخص النوع *Caudat tus* النامي في العراق قد تين ان اعداد المركبات القلافونودية واختلافاتها في اطوال سريانها و الوانها قد اظهر انها واسعة الانتشار وكثيره ربما يعود السبب في ذلك الى الظروف البيئية وطبيعة الاراضى التي ينمو فيها النبات ونوع الترب .

اما بخصوص الدراسة البنية والتوزيع الجغرافي فقد سجلت الدراسة البنية انتشار النوع قيد الدراسة في اغلب مناطق القطر. وقد يعود السبب ربما الى ان مركز انتشار هذا النوع يمثل المديات القصوى للانتشار الجنوبيه والغريبه والوسطى . اذ ان عدد الانواع يقل بالابتعاد عن مركز انتشار الجنس (13) لذلك ان دراسات التصنيف الحديث تهتم وتعتمد على بيانات التوزيع الجغرافي لذا ان دراسة البنية والتوزيع الجغرافي للنوع قيد الدراسة المنتشر على المقاطعات الجغرافيه الموضحة في جدول (2) يساهم كثيرا في توضيح العلاقات التطوريه بين الانواع والاجناس وان من خلال دراسة التوزيع الجغرافي يلاحظ ان الجنس واسع في العراق وخصوصا في المناطق الصحراويه والمناطق الغريبه والوسطى من العراق مما يدل على قابليه النبات للتكيف والانبثاق في بيئات مختلفه ومتغايرة الظروف . يتضح مما تقدم ان المعلومات المحصل عليها من الدراسة الكيميائية والدراسة البنية والتوزيع الجغرافي يمكن ان تكون ذا فائده تصنيفيه في عزل الجنس وانواعه فضلا عن الدراسة البيئية والتوزيع الجغرافي يساهم كثيرا في توضيح العلاقات التطوريه.

و اظهرت نتائج الدراسة الحاليه لحبوب لقاح النوع *Amaranthus caudat us* النامي في العراق هي من الطراز *Dicol porate* ملساء والذي تمتاز به هذه العائلة وانها من الحبوب الصغيرة الحجم (15). و اشار(16) ان صغر حبة اللقاح ربما يعود الى كونه مرتبطا بمستوى الطاقم الكروسومي *Polypoidy* اذ ان حجم حبة اللقاح يزداد بزيادة مستوى هذا الطاقم وقد اشار الى مثل هذه الظاهره الكثير من الباحثين امثال (10) و(17) ويتضح مما تقدم انه يمكن اسخدام صفات حبوب اللقاح للنوع قيد الدراسة كادله اضافيه تدعم الادله المهظريه والتشريحيه والكيميائيه لو تمت دراستها باستخدام المجهر الاليكتروني الماسح (SEM) وذلك للوقوف على تفاصيل اكثر من زخرفه سطح الحبه والفتحات والاخاديد مما يسمح باستخدامها بشكل فعال في تشخيص كافة المراتب التصنيفية.

Reference

- 1-AL-Katib, Y.M.(1988) taxonomy of Seed plants, Uni . OF Baghdad 590pp.
- 2-Chakravarty ,H .I.(1976).Plant wealth of Iraq, Vol. I.Min. Agr. And Agr.Reform , Bot .Direct . Baghdad . 505 pp.
- 3 -Baker ,w .and Smith, H.G .(1920) .A Research on the Eucalyptu especilly in regard to their Esntial Oil (Edus.land 2) Sydney, Tech . Mus.Bull .13 N.S.W .Tech Eduen.Ser. (citd by Radford et al, 1974)
- 4- Harborne ,J.B.(1973) Phytochemical method, Aguide To modrn Techniques of plant Analyss, London, New York, chapman and Hali, 278pp
5. Radfor, A .E., Dikison ,W .C., Massey ,J.R And Bell, C.R.(1974) .systematics Vascular Plant. Harper and Row New, York , 891pp
- 6- Erdtman, G.(1943) An introduction to pollen Analysis .publish by the chronica Botnica compny, 3pp.
- 7- Takahashi , M. (1982) Pollen morphology in North America Species of TRILLIUM .AMER .J. Bot,m., 69(7) : 1185-1195
- 8-Morphology of the Dickson ,W.C., Nowicke ,J.W and Sk varla ,J.J.,(1982) pollen .j.Bot.67 (7):1055-1073 Dillenaceae and Actinidiaceae .Amer

- 9- AL –Mashadani, A .N. (1992)AcomparativeSystematic study of.) the genus Onosma L spp (Boraginacea) Ph.D.thesis Baghdad.
- 10 -AL- Sawha , D. A.(1992)the Genus Achillea L.In Iraq Biosystematic Aspects.P.H .D.thesis ,UNI. ofBaghdad
- 11-Motor, A .O.(2000), Systematic study of Genus Linaria (*Scrophulariaceae*)inIraq. PH .D. thesis,Babylon Uni
- 12-AL-Mayah, A.A.(1983). Taxanomy of Therminalia(Combretacea) Ph.D.Thesis,Uni of Leicester, UK.
- 13-Radda T.J and Daood . W.H(1982) Georaphcal Distrbution Of Wild Vasclar plant Of Iraq. National Harbrium OF Iraq (Unpublished)
- 14-Guest ,E .(1966). Flora of Iraq Ministry of A griculture ,Iraq Vol.1,213p 41-104
- 15-Stix, E .(1960).Pollen Morphologagisch UNtersuchugen an Composite Grana palyno.2(2):
- 16-AL –Shammary, J .M(2001).Asystematic Study Of The Genus Senecio L.(Compositae) Uni Of Babylon
- 17 -AL-Bermani,A.K.(1999)EpidermalCharacteristicsof the leaves lemmas and pales in the trib Brachypodieae Harz POACEAE).J.Uni., 4(3);696-708 .