

دراسة انتشار قمل الرأس في المدارس الابتدائية في قضاء الشطرة / محافظة الناصرية

بسعد عقرب العبودي*

تاريخ قبول النشر 2008/3/18

الخلاصة :

اظهرت الدراسة الحالية انتشار قمل الراس في تلاميذ المدارس الابتدائية في مناطق مختلفة من مدينة الناصرية وبنسبة (5.4%) للذكور و (9%) للإناث حصل اختلاف كذلك في الفئات العمرية إذ كانت الاصابة الشديدة بين عمر (11-8) سنة. وفيما يخص طول الشعر كانت أعلى نسبة هي للشعر المتوسط ولكل الجنسين إذ بلغت (35.2%). أما الشعر الطويل فكانت النسبة (25%) وللإناث فقط. كما سجلت أعلى نسبة لذوات الشعر المسريل إذ بلغت (14.8%) في حالة الإناث.

المقدمة :

بسرعة فائقة كما ان بزوج مرض الايدز يوصفه اخطر مرض عصري سلط الضوء على الامراض الطفيلية التي كانت نادرة في الماضي مما دفع الدول المتقدمة الى ان تركز من جديد اهتمامها على الامراض الطفيلية ; (Noble , 1982 , Lawrence, 1988 ; Faust *et al.*, 1975 ; Ichhpujan, 1994)

المواد وطرق العمل :

جمعت العينات من المدارس الابتدائية للمناطق المختلفة في قضاء الشطرة لمدينة الناصرية إذ تناولت الدراسة منطقة (الشعلة ، حي المعلمين) وبواقع اربع مدارس لكلا الجنسين (ذكور واناث) وباعمار تراوحت بين 7 – 15 سنة واخذ بنظر الاعتبار طول الشعر وطبيعة نسجة الشعر إذ قسم طول الشعر على ثلاثة مجامي :

- 1- الشعر القصير – لا يلامس الاذن.
- 2- الشعر المتوسط – يمس الاذن.
- 3- الشعر الطويل – يتجاوز الاذن.

وقسامت نسجة الشعر Texture على قسمين :

- 1- الشعر المسريل Straight hair : عندما تكون الشعر مستقيمة.
- 2- الشعر المجعد Carly hair : عندما تكون الشعرة ملتفة.

وقد تم فحص فروة الرأس مع تركيز الاهتمام على منطقتي القفا Nap وخلف الاذنين اذ ان القمل يفضل تلك المناطق (Service, 1980) واستعين بعدها تكبير بدوية عند الضرورة.

الطفيليات الخارجية

:parasites

قمل الرأس Pediculus humanus

: capitis (Head lice)

القمل حشرة ذات انتشار عالمي واسع عاشت منذ ملايين السنين وعرفت اصابة الانسان بها منذ الاف السنين وما زالت مالوفة ومتكررة الحدوث في الوقت الحاضر وصار بامكان الطفيليات ان تنتقل

التحليل الاحصائي :
تم تحليل النتائج باستخدام اختبار (Chi-square) وحساب الفرق المعنوي الاصغر (LSD).

*قسم علوم الحياة / كلية العلوم / جامعة بغداد

النتائج : Results

كانت نسبة الاصابة الكلية بقمل الراس في الذكور اقل من الاناث إذ بلغت النسبة المئوية للاصابة في الذكور (5.4 %) بينما كانت لدى الاناث (9 %) جدول (1) وكانت الفروق معنوية عند مستوى احتمالية $P \leq 0.05$.

وكانت نسبة الاصابة الكلية بحسب الفئات العمرية مرتفعة بين الفئات العمرية التي تراوحت (8 – 11) سنة ولكل الجنسين وكانت نسبة الاصابة في هذه الفئة العمرية عند الاناث اكبر من الذكور جدول

(2) وكانت الفروق معنوية عند مستوى احتمالية $P \leq 0.05$.

وعند مقارنة نسبة الاصابة بقمل الراس مع طول الشعر نلاحظ من خلال الجدول (3) ان نسبة الاصابة تزداد بزيادة طول الشعر ولكل الجنسين وكانت الفروق معنوية عند مستوى احتمالية $P \leq 0.05$.

كما كانت نسبة الاصابة في الشعر المسريل اعلى من نسبتها في الشعر المجعد ولكل الجنسين وهذه النسبة تزداد عند الاناث مقارنة مع الذكور جدول (4) وكانت الفروق معنوية عند مستوى احتمالية $P \leq 0.05$.

جدول (1) يمثل الاصابة الكلية بقمل الراس لقضاء الشطرة - الناصرية

الجنس	العدد المفحوص	الذكور	الاناث			العدد المفحوص	الاصابات	النسبة المئوية %	المجموع	النسبة المئوية %
			العدد	الاصابات	النسبة المئوية %					
شهيد الجمعة	27	5.6	14		5.6%	250	13	5.2%	250	5.4%
بدر الكجرى	45	9	10	25	55.6%	250	8	20	250	9%
الغفة للبنات										
سيف الله للبنات										

جدول (2)* يمثل الاصابة الكلية بقمل الراس ونسبها المئوية بحسب الفئات العمرية في طلاب المدارس الابتدائية الاربع

المجموع		11 فما فوق		10		9		8		7		الفئة العمرية
%	العدد	%	العدد	%	العدد	%	العدد	%	العدد	%	العدد	اسم المدرسة
5.2	13	4.4	11	0.4	1	0.4	1	---	---	---	---	بدر الكجرى
5.6	14	1.6	4	1.2	3	1.2	3	0.8	2	0.8	2	شهيد الجمعة
8	20	4	10	1.6	4	1.2	3	0.8	2	0.4	1	الغفة للبنات
10	25	4.8	12	1.6	4	2.4	6	0.8	2	0.4	1	سيف الله للبنات
7.2	72	3.7	37	1.2	12	1.3	13	0.6	6	0.4	4	المجموع

* عدد العينات المفحوصة في كل مدرسة خلال البحث 250 عينة.
مجموع العينات المفحوصة في كل المدارس قيد الدراسة = 1000 عينة

جدول (3) الاصابة الكلية بقمل الراس بحسب طول الشعر والجنس في طلاب المدارس الابتدائية الاربع.

طويل			متوسط			قصير			طول الشعر		
% الاصابات	الاصابات	المفحوص	% الاصابات	الاصابات	المفحوص	% الاصابات	الاصابات	المفحوص	الاصابة ونسبتها المئوية		الجنس
									الذكور	الاناث	
0	0	0	31.2	15	48	2.6	12	452			الذكور
6.6	25	375	40.5	15	37	11.3	10	88			الاناث
6.6	25	375	35.2	30	85	4.0	22	540			المجموع

المناقشة :

لا تعد الاصابة بقمل الراس حالة غريبة فهي وثيقة الصلة بالانسان وهي شائعة بين الاطفال والكبار في الاماكن المزدحمة كالمدارس وروضات الاطفال ودور الحضانة (Faus et al., 1975). وقد كشفت هذه الدراسة وجود نسبة اصابة واطئة لقمل الراس بين تلامذة المدارس الابتدائية في مدينة الناصرية إذ بلغت (7.2 %) جدول (1)، وهذه

جدول (4) الاصابة الكلية بقمل الراس حسب نوعية الشعر والجنس في طلاب المدارس الابتدائية الاربع في مدينة الناصرية.

الاناث		ذكور		الجنس	
نوع الشعر	مسريل	مجد	مسريل	مجد	نوع الشعر
عدد العينات المفحوصة	302	178	328	172	
عدد الاصابات	20	25	13	14	
نسبة المئوية %	6.6	14.8	3.9	8.1	

(Kubiassy *et al.* 1994) وهي تختلف عن ما توصل إليه كل من القرishi وأسماعيل 1994 من كون الاصابة بقمل الراس تكثر ضمن الفئات العمرية الصغيرة. وعلى نحو عام على الرغم من اختلاف الاصحائيات فإن انتشار قمل الراس في القطر يدل على وجود علاقة بين زيادة العمر ونسبة الاصابة بقمل الراس التي وصلت ذروتها عند الفئة العمرية (5 – 19) إذ تتمركز معظم الاصحاءات عند تلاميذ المدارس الابتدائية لمراكز السيطرة على الامراض الانتقالية 1991.

وعن العلاقة بين طول الشعر ونسبة الاصابة الكلية بقمل الراس جدول (3) فقد كانت أعلى نسب الاصابة في الذكور من نصيب ذوي الشعر المتوسط (31.2 %) أما في الإناث فكانت لدى ذوات الشعر المتوسط (40.5 %) لكل منها في حين سجل لدى ذوي الشعر القصير من الذكور والإناث اوطا نسبة (2.6 و 11.3) على التوالي ، والنتيجة العامة التي ظهرت في الدراسة الحالية تشير إلى أن الاصابة بقمل الراس تزداد بزيادة طول الشعر وهي تأتي مطابقة إلى Al-Kubaissy *et al.* (1994) إذ يعمل الشعر الطويل على توفير متسعاً أكثر للقمل مقارنة مع الشعر القصير ، وفيما يتعلق بطبيعة نسجة الشعر يلاحظ من جدول (4) أن أعلى نسبة للاصابة بقمل الراس كانت لدى الشعر الطويل المسربل من كلا الجنسين وهذه النتيجة أكثر وضوحاً في الإناث وهي توافق ما توصل إليه الخفاجي (1999) الذي أشار إلى زيادة الاصابة بقمل الراس لدى الأفراد من ذوي الشعر المسربل بالمقارنة مع ذوي الشعر المجمع وهذه النتيجة يمكن تفسيرها على أساس ان الشعر المسربل لا يعمل على عرقلة حركة القمل على عكس الشعر المجمع (Schmidt & Roberts, 1989).

المصادر:

1. Al-Affas, N. H. 1993. The incidence of the head lous (*Pediculus humanus capititis*) among pupils of two schools in Basrah city. J. Comm. Med., 6 (1) : 37 – 44.
2. Al-Jobory, D. S. 1998. Co-Trimoxazole in treatment of Pediculosis capititis in Iraq. Dip-in Dermatology & Venerology thesis , Coll. Med., Univ., Al-Mustansiria : 25 pp.
3. Al-Kubiassy, W. A. ; Al-Rawi, J. R. & Al-Rubae, M. G. 1994. The prevalence of head lice lous (*Pediculus humanus capititis*) among primary schools pupils in Baghdad

النتيجة أقل بكثير مما لاحظه كل من Al-Affas (1995) (25.4 %) في مدرستين في محافظة البصرة ، وأسماعيل والقرishi عام (1994) (13 %) في بعض مدارس قاطع الرصافة ببغداد و Al-Kubaissy *et al.* (1994) (42.2 %) في بعض مدارس مدينة بغداد ولجانبي الكرخ – الرصافة . و Al-Rubiay (1994) في مدارس محافظة البصرة والخفاجي (1999) (23.8 %) في بعض مدارس محافظة بابل إلا أنها أعلى من النسبة التي سجلتها عباس (1997) (1.4 %) في عشر مدارس في بغداد. إن سبب التباين في نسب الاصابة بين مناطق القطر المختلفة يمكن ارجاعه إلى التباين في المستوى الصحي العام والشخصي فضلاً عن اقصى انتشار بعض الدراسات ذات نسبة الاصابة العالية على مناطق فقيرة صحياً واقتصادياً وذات كثافة سكانية عالية إذ تقل سبل النظافة بما في ذلك قلة عدد مرات الاستحمام وصعوبة السيطرة على الاصابة بين الأطفال كذلك فان ازدياد الاختلاط بين شرائح المجتمع المختلفة وعدم معالجة الحالات الخفيفة يزيد من نقشى الاصابة في المجتمع Al-Rubiay (1994). ان التعلم مرض جلدي شائع في العراق خصوصاً في السنوات الأخيرة نتيجة الظروف الراهنة التي اثرت سلباً في الحالة الاجتماعية – الاقتصادية والصحة العامة في القطر ومن الجدير بالذكر ان الزخم الهائل في عدد التلاميذ ضمن الصف الواحد (50) تلميذاً وتلميذة مع اشتراك اكثر من تلميذ في المقدد الواحد لعدم توافر المقاعد الكافية كل ذلك ساعد على انتقال عدو الاصابة بالتعلم بين التلاميذ في المدارس قيد الدراسة. وبسبب صعوبة الحصول على العلاج المناسب للتعلم في ظرفنا الراهن استخدمت الحلاقة كاختيار اخير للأولاد في حين بقيت المشاكل مستمرة للإناث والذكور البالغين والسجناء والجنود والمعوقين والاسرى Al-Jobory (1998).

ولذلك جاءت نسبة الاصابة الكلية عند الإناث أعلى مما هي في الذكور (9 %) و (5.4 %) على التوالي مع العلم ان جميع الدراسات العراقية التي ذكرت باستثناء دراسة Al-Affas (1993) اشارت إلى ارتفاع نسبة الاصابة بين الإناث مقارنة مع اصابة الذكور. ويعتقد ان اختلاف الاصابة بين الجنسين بقمل الراس ليس له اساس فسلجي وإنما يعتمد على الاختلاف في تسلية الشعر فالشعر الطويل ، والمجدل هو صفة غالبة عند الفئات الأكبر سنًا كما ان قلة عدد مرات قص الشعر لدى الإناث تساعد على بقاء الاصابة وديموتها Al-Affas (1993) وفيما يخص علاقة الاصابة بقمل الراس بالفئة العمرية جدول (2) لوحظ ان أعلى معدلات الاصابة كانت مجموعة في عمر (8 – 11) وفي كلا الجنسين وهذه النتيجة توافق ما توصل إليه Al-

- 4th ed., Times Mirror , Mosby Coll., Publ., Saint Louis : 750 pp.
10. Service, M. W. 1980. Lice Corder Anoplura : Families Pediculidae and Phthiridae. In : A guide to medical entomology , 1st edn., Mac Millan Press Ltd., London : 136 – 14.
- اسماعيل، وجيء على والقريشى ، ليلي 11 اسماويل 1994. انتشار القمل بين تلامذة المدارس الابتدائية وعلاقته ببعض المتغيرات ذات العلاقة في قاطع الرصافة / بغداد. المجلة العلمية للتمريض ، 7 (1) : 65 – 60.
- الخاجي ، علي حسن عبود 12. انتشار الطفيليات المعاوية وقمل الراس لدى تلامذة بعض المدارس الابتدائية في قضاء الهاشمية ، محافظة بابل. رسالة ماجستير ، كلية العلوم ، جامعة بابل : 119 صفحة.
- عباس ، ايناس منير 13. وبائية الطفيليات المعاوية وقمل الراس لدى تلامذة بعض المدارس الابتدائية في مدينة بغداد – اطروحة ماجستير ، كلية التربية (ابن الهيثم) جامعة بغداد.
- مركز السيطرة على الامراض الانتقالية ، دائرة الرقابة الصحية وحماية البيئة ، وزارة الصحة – بغداد التقرير السنوي للعام 1966 – 1991 .
- city. J. Fac. Med. Baghdad, 36 (4) : 665 – 670.
4. Al-Rubiay, k. k. 1994. Prevalence of head lice among primary schools children in two urban districts in Basrah province. Iraq. Med. J. Basrah Univ., 12 (1 & 4) : 175 – 184.
5. Faust, E. C. ; Beaver, P. C. & Jung, R. C. 1975. Animal agents & vectors of human disease , 4th edn. , Lea & Febiger , Philadelphia : 479 pp.
6. Ichhpujani, R. L. & Bhatia, R. 1994. Medical parasitology , 1st edn., Japee Bros. Med. Publ., New Delhi : 384 pp.
7. Lawrence, A. ; Shanchner, A. Ronald & Hansen, C. 1988. Pediatric dermatology, 1st edn., Blackwell Sci. Publ., London : 1479 pp.
8. Noble, E. R. & Noble, G. A. 1982. Parasitology : The biology of animal parasites , 5th edn., Lea and Febiger , Philadelphia : 522 pp.
9. Schmidt, G. D. & Roberts, L. S. 1989. Foundations of parasitology ,

Prevalence of head Lice (*Pediculus humanus capitis*) among primary schools pupils in Nassirya city

*Bassd A. Al-Aboody**

*Department of Biology science, college of science, Baghdad University.

Abstract:

This study showed the spreading of head lice in pupils of primary schools of Al-Nassirya city.

The results showed that the percentage of males infected with lice was (5.4 %) and (9 %) for females. Also was obtained difference at age groups which we found maximum percentage of infection at age between (8 – 11) year. The highest infection for the hair tall at medium tall for both sex which the ratio (35.2 %) while for both sex with ratio (25 %) for girls. While the highest percentage for straight hair was (14.8 %) for girls.