

التأثيرات الخلوية الوراثية للمبيد الحشري Lambda cyhalothrin على الخلايا المرستيمية لجذور البصل Allium cepa L.

بتول علي شهاب*

تاریخ قبول النشر 2008/3/5

الخلاصة

تمت دراسة التأثير الخلوي الوراثي للمبيد الحشري Lambda cyhalothrin على الخلايا المرستيمية لجذور البصل باستعمال ثلاثة تراكيز هي 7.5% ، 10% و 15% لفترات معمالة 6، 12، 24 ساعة. المبيد خفض معدل دليل الانقسام لجميع التراكيز معنواً عن السيطرة واظهر قابليته في زيادة طور C-metaphase في التركيز 10% بنسبة 100% وكذلك ازدياد حالات الزيغ الكروموموسومي متمثلة بـ الكروموسومات المتميزة في الطورين الانفصالي والنهائي، خلايا ثنائية النواة، انوية صغيرة مما يدل تأثير المبيد على تكون وتوزيع الالياف المغزلية.

المقدمة:

sister chromatides exchange العظم لل فأر (16,15,14,13,12) وكذلك وجد ان مبيدات Pyrethroid تؤدي الى زيادة الخل في DNA للخلايا البيضاء المحيطية في الإنسان (17) وكذلك human peripheral Leucocytes الى زيادة الانوية الصغيرة في الاسماك والى زيادة Polychromatic الكروماتين في الكريات الحمراء erythrocytes في فأر (18).

أختبرت عدد من النباتات لاستعمالها كدليل للتحري عن المطفرات الوراثية لأن كروموسوماتها طويلة وانها تتعامل مع المطفرات بنفس الطريقة التي تتعامل بها مع خلايا اللبائن وخلايا بقية كائنات حقيقة النواة (22,21,20) ومن هذه النباتات البصل Allium cepa L حيث استخدم لدراسة التأثير السمي لكثير من المواد على الكروموسومات وانقسام الخلية (23) لهذا اجريت هذه الدراسة لمعرفة تأثير المبيد الحشري Lambda cyhalothrin احد احدث انواع Pyrethroids على خلايا القم النامية لجذور البصل لنقييم سميتها الوراثية حيث يستوجب الاستعمال الواسع الانتشار لهذه المبيدات الى تقدير امكانية التسمم الوراثي والخلوي cytogenotoxicity وان هذه المبيدات تكون بتماس مباشر ومؤثر على الكائنات ومنها الانسان.

المواد وطرق العمل:

حضر محلول قياسي من المبيد الحشري Lambda cyhalothrin (Icon) ماركة تجارية المستخدم في العراق لمكافحة الافات الحشرية الزراعية حيث تم اذابة 1.5 غ من المبيد في 250

أستناداً إلى مبيعات السوق في عام (1997) وجد ان حوالي 5684 مليون رطلًا من المبيدات الفعالة تستعمل سنوياً (1) وقد نشرت منظمة الصحة العالمية (2) ان حوالي ثلاثة ملايين حالة اصابة بالتسنم حدثت نتيجة التعرض إلى المبيدات الحشرية وحصول حوالي 220,000 حالة وفاة حيث ان الكثير من هذه المواد هي مطفرات (3)، (4) مرتبطة بظهور حالات التسرطن (5) وان الكثير منها يؤدي الى حدوث الاعاقة (6)، ومن هذه المبيدات، المبيدات الحشرية Pyrethroid الاستعمال في الحياة العامة حيث تستعمل لحماية الانسان والحيوان والنبات من مجموعة كبيرة من الحشرات وهي ذات فعالية عالية ضد الحشرات حتى في الجرع الفليلة (7) وان استخدام هذه المبيدات ازداد في السنوات الاخيرة بسبب سميتها الفليلة للكائن وكذلك قابليته المحددة للبقاء في التربة مقارنة بالمبيدات Organo phosphate، Organo chlorine بالإضافة الى قابليته على التحلل المائي السريع (8).

هذه المبيدات تعرف ايضاً بـ Synthetic Pyrethroid وتكون مشابهة كيميائياً الى مادة Pyrethrum الطبيعية المستخلصة من ازهار نبات Chrysanthemum المعروفة بفعاليتها العالية ضد الحشرات (9) بالإضافة الى كونها ذات سمية عالية جداً للأسماك والكائنات المائية الصغيرة (10) (11). ادى ازدياد استعمال هذه المبيدات في الاونة الاخيرة الى ظهور حالات السمية في كل من النبات، الحيوان والانسان حيث بينت الدراسات ازدياد حالات الزيغ Chromosome aberration الكرومومسي وظهور الانوية الصغيرة micronuclei و كذلك تبادل الكروماتيدات formation الشقيقة

ظهرت حالات من الزيغ الكرومومامي متمثلة بـ C-metaphase حيث بلغت نسبته 100% في التركيز 10% وفترات المعاملة الثلاثة شكل (1). هذه النتيجة مماثلة للمبيد fenvalerate في تأثيره على الخلايا المفاوية للإنسان حيث أدى إلى زيادة معنوية في طور C-metaphase مما يدل على تأثيره في توزيع وتكون خيوط المغزل (29).

شوهدت أيضاً الكرومومومات المتميزة والتي هي بسبب اختلاط الياف كروموماتيدات الكرومومومات فيما بينها (30) وأيضاً لوحظت نفس الظاهرة عند تعرض الخلايا النباتية إلى أنواع أخرى من مبيدات pyrethroid الحشرية (28,26).

إن تمييع الكرومومومات في الطور الاستوائي يجعل عملية انفصال الكروموماتيدات الشقيقة غير كاملة في الطور الانفصالي حيث تبقى متصلة بالجسور (bridges) (32) والتي عند انسحابها قد تؤدي إلى حدوث تكسر في الكرومومومات وبالتالي إلى تكون قطع صغيرة عديمة السنترورمير تبقى في وسط السايتوبلازم متحولة إلى نوى صغيرة أو قد تظهر هذه النوى بسبب الكرومومومات المتأخرة في الانسحاب (Lagging) بسبب تأثير المبيد على خيوط المغزل والذي أدى إلى تأخر ارتباط هذه الكرومومومات بالخيوط أو عدم ارتباطها (32,26).

ظهور خلايا ثنائية النواة وكذلك عدم انتظام توزيع السايتوبلازم في الطور النهائي يدل على اختلال توزيع النبيبات الدقيقة وبالتالي اختفائها في منطقة phargmoplast في الطور النهائي (28) وإن تشتيت الخط المتوازي للنبيبات الدقيقة في الطور الاستوائي يؤدي إلى عدم اكتمال نمو الجدار الخلوي (28,26).

يظهر مما تقدم أن ارتفاع نسبة الزيغ الكرومومامي وظهوره في الجذور المعاملة بالمبيد مقارنة مع خلايا جذور السيطرة يدل على تأثيره السمي الخلوي الوراثي cytogenotoxicity.

مل من الماء للحصول على 10% من المادة الفعالة ثم خفف للحصول على التركيزين 5% و 7.5%.

استخدم البصل المحلي حيث غسلت الإبراز وزرعت في قناني وبعد نمو الجذور نقلت إلى قناني زجاجية حاوية على تراكيز مختلفة من المبيد 10%, 7.5%, 5% واستخدم الماء كسيطره وبعد انتهاء كل فترة من فترات المعاملة البالغة (24,12,6) ساعة غسلت الجذور وقطعت ووضعت في قناني صغيرة حاوية على محلول مثبت كاربوني (3) حجم كحول أثيلي 1 حجم حامض الخليك الثلجي) المحضر آنئاً، بعدها حضرت شرائح زجاجية للفحص الناجمة للجذور، فحصت 1000 خلية لكل مكرر أي 3000 خلية لكل تركيز وفترات المعاملة.

حسب دليل الانقسام mitotic index (M I) ودليل الطور phase index في (24) وبحسب المعادلات التالية :-
 دليل الانقسام $= \frac{\text{عدد الخلايا المنقسمة}}{\text{الخلايا}} \times 100$
 دليل الطور $= \frac{\text{عدد خلايا الطور}}{\text{الخلايا المنقسمة}} \times 100$
 عدد الحالات الشاذة $= \frac{\text{عدد الخلايا غير الطبيعية}}{\text{في الطور}} \times 100$
 حللت النتائج أحصائياً حسب اختبار دنكن (25).

النتائج والمناقشة:

تراوح معدل دليل الانقسام في خلايا جذور السيطرة بين 9,10.03 (الجدول 1) ولم يكن الاختلاف معنوي خلال فترات المعاملة الثلاثة وكان الاختلاف معنويًا عن بقية التراكيز المستخدمة، 10%, 7.5%، 5%، ولفترات الثلاثة حيث انخفض معدل دليل الانقسام في خلايا جذور المعاملة بالمبيد وسجل أقل معامل للانقسام في التركيز 10% ولجميع فترات المعاملة وتراوح ما بين (0.76, 2.63) عند المعاملة 24 ساعة حيث أدى المبيد إلى خفض دليل الانقسام إلى أقل من 50% بالمقارنة كنسبة مئوية من جذور السيطرة (الجدول 2) حيث كان 45.50 في التركيز 5% و 34.92% في التركيز 7.5% ووصل إلى 17.16 من 10% مما يدل على سميةه العالية على الخلايا وكذلك تبين هذه النتائج بأن له نفس تأثير أنواع أخرى من pyrethroid الصناعية مثل Cypermethrin و Fenvalerate و Deltamethrin في خفض دليل الانقسام (28,27,26)، يتبع من الجدول (3) بأن المؤثر في خفض دليل الانقسام هو التركيز وليس الوقت ولم تكن الفروق معنوية عند حساب المتوسط العام للساعات وكانت الفروق معنوية بين التراكيز.

جدول (1) دليل معدل الانقسام الخطي والنسبية المئوية لاطوار الانقسام والحالات الشاذة في جذور البصل المعاملة لساعات مختلفة بتراكيز مختلفة من المبيد الحشري Lambda-cyhalothrin

الحالات الشاذة (%)	دليل الطور (%)	دليل الانقسام (%)	التركيز ملغم/مل	الساعات				
كروموسومات متأخرة	جسور	انفصال ونهائي متتابع	استوائي متتابع	استوائي متوقف	انفصال ونهائي	استوائي	التمهيدى	6
					28.44	17.25	54.31	0.56±9.0(A)a 0%
					17.36	13.95	68.69	1.17±4.7(A)b 5%
11.11	11.11	20.17	74	21.88	14.87	63.25	0.63±3.26(AB)b 7.5%	
	4		100	25.02	22.64	52.34	0.28±2.63(A)b 10%	
	20.32			24.6	16.27	59.13	0.64±10.03(A)a 0%	
		30.73	22.87	21.28	17.49	61.23	0.16±3.73(A)b 5%	
13.33	45.30		35.26	24.28	14.85	55.87	0.38±4.63(A)b 7.5%	12
	7.46		100	13.40	24.87	61.73	0.12±1.46(B)c 10%	
				22.32	20.4	56.78	1.09±9.83(A)a 0%	
		32.48	20.30	26.98	24.63	48.39	1.28±4.63(A)b 5%	
	26.66		100	30.14	13.65	56.21	0.06±2.20(B)bc 7.5%	
	100		100	5.58	42.22	52.2	0.21±0.76(B)c 10%	

*الحروف الصغيرة المقارنة بين التراكيز عند التوقيت نفسه والحروف الكبيرة المقارنة بين التوقيتات عند التراكيز نفسه فالحروف المتشابهة تدل على عدم وجود فروق معنوية بين العمود عند مستوى معنوية 0.05 وفق اختيار دنكن (Duncan 1955).


جدول رقم (2) دليل الانقسام الخطي والاطوار في خلايا جذور البصل المعاملة بالمبيد الحشري Lambda-cyhalothrin كنسبة مئوية في السيطرة

الاطوار (%)	دليل الانقسام (%)	الساعات	التركيز
الانفصالى والنهايى	الاستوائى	التمهيدى	
61.04	80.86	126.47	52.22 6 %5
86.50	107.49	103.55	37.18
120.87	117.84	85.22	47.10
89.47	102.06	105.08	45.50 المتوسط العام
76.93	86.20	116.46	36.22 6 %7.5
98.69	122.0	94.48	46.16 12
135.03	65.31	98.99	22.38 24
103.55	91.17	103.31	34.92 المتوسط العام
87.97	131.24	96.37	29.22 6 %10
54.47	152.85	104.39	14.55 12
25.00	202.0	91.93	7.73 24
55.81	162.03	100.53	17.16 المتوسط العام

جدول (3) تأثير مدة المعاملة وتراكيز المبيد الحشري Lambda-cyhalothrin على دليل الانقسام في خلايا جذور البصل

المتوسط العالم للساعات	التركيز ملغم/مل				الساعات
	% 10	% 7.5	% 5	0.0	
4.87±a 0.812	2.63	3.27	4.6	9	6
4.96±a 0.962	1.47	4.63	3.73	10.03	12
4.35±a 1.101	0.76	2.2	4.63	9.83	24
	1.62c±0.293	3.36b±0.412	4.32b±0.529	9.62a±0.431	المتوسط العام للتراكيز

*الحروف المتشابهة ضمن العمود الواحد تدل على عدم وجود فروق معنوية بمستوى $p \leq 0.05$.



شكل (1) : الخلايا المرستمية للجذور البصل المعاملة بالمبيد الحشري *Lambda cyhalothrin*

1. خلية في طور C-metaphase .
2. خلايا في طور استوائي متبع .
3. انحراف ترتيب الكروموسومات عن خط استواء المغزل .
4. تعدد الاقطاب في الطور الانفصالي .
5. جسور متعددة في الطور الانفصالي .
6. كروموسومات متأخرة في الانسحاب في الطور الانفصالي .
7. انحراف الاقطاب في الطور الانفصالي النهائي
8. كروموسومات متأخرة في الانسحاب في الطور النهائي .
9. عدم انتظام تكوين الجدار الخلوي .
10. خلية ثنائية النوى



قطعة المستقيم مثل 5مايكرون

- permethrin, cypermethrin and fenvalerate to salmon, Lobster and shrimp. Bull. Environ. Contam. Toxicol. 25, 950.
- 11.** Datta, M., Kaviraj, A., 2003. Acute toxicity of the synthetic pyrethroids deltamethrin to freshwater cat fish *Clarias gariepinus*. Bull. Environ. Contam. Toxicol. 70, 296-299.
- 12.** Celika, A., Mazmancı, B., Camlica, Y., Ali As, Kin., 2005 Evalution of cytogenetic effets of Lambda-cyhalothrin on wistar rat bone marrow by gavage administration. Ecotoxicology and Environmental safety-VOL. 61: issue-1-128-133.
- 13.** Celik A, Mazmancı B., Camlica Y, Askin A, Comelekoylu 2003. Cytogenetic effects of Lambda-cyhalothrin on wistar rat bone marrow. Mutat. Res., 539: 91-97.
- 14.** Chauhan, L.K.S., Agarwal, D.K., Sundararaman, V., 1997 In vivo induction of sister chromatid exchanges in mouse bone marrow following oral exposure to commercial formulations of alpha-cyanopyrethroids. Toxicol. Lett. 93, 153-157.
- 15.** Agarwal, D.K., Chauhan, L.K.S., Gupta, S.K., Sundararaman, V., 1994. Cytogenetic effects of deltamethrin on rat bone marrow. Mutat. Res. 311, 133-138.
- 16.** Pati, P.C., Bhunya, S.P., 1989. Cytogenetic effects of fenvalerate in mammals in vivo test system. Mutat. Res. 222, 149-154.
- 17.** Villarini, M., Moretti, M.; Pasquini, R., Scassellati.S.G., Fatigoni, C., 1998. In vitro genetoxic effects of the insecticide detamethrin in human peripheral blood Leukocytes; DNA damage (comet assay) in relation to the induction of sister-chromatid exchanges and micronudei. Toxicology 130, 129-139.
- 18.** Cavas T, Ergene-Go Zukara S 2003 . Evaluation of the genotoxic potential
- المصادر:
1. USEPA, 2001. Pesticide industry sales and usage: 1996 and 1997 market estimates, available all: WWW.
epa.gov/oppbead/oestsales/97pestsale s/table.htm. (2001).
 2. World Health Organization, 1995 , Guide to short term tests for detecting mutagenic and carcinogenic chemicals. Environ. Health criteria 51, 208(Geneva).
 3. Galloway, S.M., Armstrong, M.J., Keuben, C., Colman, Brown, S.B., Cannon, C., Bloom, A.D., Nakamura, F., Ahmed, M., Duk, S., 1987. Chromosome aberrations and sister chromatid exchanges in Chinese hamster Ovary Cells, evaluation of 108 chemicals. Environ. MOL. Mutagen. 10, 1-175.
 4. Garaj-vrhovac, V., Zeljezic, D., 2000. Evaluation of DNA damage in workers occupationally exposed to pesticides using sigle-Cell gelelectrophoresis (SCGE) assay: Mutat. Res. 469, 279-285.
 5. Leiss, J.K., Savitz, D.A., 1995 . Home pesticide use and childhood cancer: a case control study. Am.J. Public Health 85, 249-253.
 6. Arbuckel, T.E., Server, L.E., 1998. Pesticides exposures and fetal death: a review of the epidemiologic Literature. Crit. Rev. Toxicol. 28, 229-270.
 7. Leahey, J.P., 1985. The Pyrethroid Insecticides. Taylor and Francis, London.
 8. Miyamoto, J., 1976 Degradation, metabolism and toxicity of synthetic pyrethroids, Environ. Heath Pers. 14, 15.
 9. (CPCN) compendium of pesticide common names 2001. Pyrethroid insecticides-
<http://www.helress.demon.co.uk>.
 10. Mcleese, D.W., Metcalfe, C.D., Zitko, V., 1980. Lethality of

- of *Allium sativum* Spectroscopic basis of chromosome damage Toxicology 216:244-252.
- 27.**Chauhan, L.K.S., Saxena , P. N., Gupta, S.K. 1999 Effects of Deitamethrin on the Wtrastructures of the root meristem Cell of *Allium cepa* pestieide Biochemistry and physiology 64, 135. 147.
- 28.**Chauhan, L.K.S., Saxena , P. N., Gupta, S.K. 1999 Cytogenetic effects of cypermethrin and fenvalerate on the root meristem Cell of *Allium cepa* . Environmental and Experimental Botany 42 (181-189).
- 29.**Carbonell, Puig, M. , Xamena, N., Marcos, R. 1989 Mitotic arrest induced by fenvalerate in human Lymphocyte cultures . Toxicology Letters, 48045-48.
- 30.**Klasterska, I. , Natarajan, A. T., Ramel, C. , 1976 . An interpretation of the origin of subchromatid aberrations and Chromosome stickiness as a category of chromatid aberrations. Hereditas 83. 153-162.
- 31.**Mcgill, M. , Sen, P., Hsu, T.C., 1974, Effect of ethidium bromide on mitosis and chromosomes . A possible material basis for chromosomes stickiness. Chromosome 47, 175-167.
- 32.**Lasada, A. & T. Hirano 2001 . Shapinathe metaphase chromosome : coordination of cohesion & condensation . Bio Essays. 23:924-935.
- of Lambda-cyhalothrin using nuclear and nucleolar biomarkers on fish Cells. Mutat. Res., 534: 93-99.
- 19.**Campana, M.A., Panzeri, A.M., Moren, V.J., Dulout, F.N., 1999. Genotoxic evaluation of the prethroid Lambda-cyhathrin using the micronucleus test in erythrocytes of fish *Cheirodon interruptus*. Mutat. Res 438. 155-161.
- 20.**Grant, W.F., 1994. The present status of higher plant bioassays for the detection of environmental mutagens. Mutat. Res. 310, 175-185.
- 21.**WHO, 1992 . Our Planet, Our Health: Report of the WHO Commission on Health and Environment. World Health Organization, Geneva.
- 22.**Grant, W.F., 1978. Chromosome aberrations in plant as a monitoring system. Environ. Health perspect, 27, 37-43.
- 23.**Fiskesjo, G., 1985. The Allium test as a standard in environmental monitoring. Hereditas 102, 99-112.
- 24.**Becker, W.M.; Klem smith, L.J & Hardin, J. 2003. The world of the Cell 5th Edition. Benjamin cummings Publishing Compay, Inc. New York.
- 25.**Duncan, D.B. 1955. Multiple range and multiple F. test. Biometrics, 1:1-45.
- 26.**Saxena, P.N., Chauhan, L.K.S., Gupta, S.K.2005 cytogenetic effects of commercial formulation of cypermethrin in root meristem Cells

Cytogenetic effects of insecticide Lamda cyhalothrin on meristemic cells of *Allium cepa* L.

Batool Ali Shahab*

*Biology Dept, College of Sciences for women, Baghdad University

Abstract:

The effect of insecticide lamda cyhalothrin on *Allium cepa* L.root meristem were studied cytogenetically .Using three concentrations of the insecticide 5%, 7.5%, 10% at 6,12,24hours treatments . The insecticide significantly reduced the mitotic index at all concentrations. Moreover showed its ability to induced C – metaphase in 10% .The effects were also caused chromosome aberration like stickness in anaphase, telophase, binucleated cells, Micronuclei formation. These alternations indicating that this insecticide was effective in producing disturbance of spindle fibers.