تأثير المستخلصات المائية للثوم *Allium sativum* والفلفل الحار *Capsicum* spp. على طفيلي الزحار الاميبي *Entamoeba histolytica* خارج الجسم الحي *in vitro*

بان جاسم محمد *

تاريخ قبول النشر 2010/ 3/ 1

الخلاصة

اجريت هذه الاختبارات خارج الجسم الحي *In vitro* للكشف عن تأثير المستخلصات المائية لكل من الثوم *Allium sativum* والفلفل الحار *Capsicum* spp. على الاطوار المغتذية trophozoites لطفيلي *Entamoeba histolytica* المنمى في الوسط الزرعي liver infusion agar عند درجة C 37، تم اضافة المستخلصين كلا على حدة بجرعات (0.01، 0.05، 0.1، 0.5، 1مل) الى عدد محدد من الاطوار المغتذية للطفيلي وتركت لمدة 24 ساعة ، وكانت النسب المئوية لقتل الاطوار المغتذية للطفيلي التي عوملت بالمستخلص المائي للثوم (14.82% ، 31.05% ، 46.16% ، 64.29% ، 92.7%) على التوالي ، وهي مقارنة جدا لتلك النسب الناتجة عن معاملة الطفيلي بالمستخلص المائي للفلفل الحار والتي كانت (17.86% ، 32% ، 44% ، 66.67% ، 100%) على التوالي . وبصورة عامة فإن النتائج اظهرت ان المستخلصات المائية للثوم والفلفل الحار فعالة في التخلص من الاطوار المغتذية لطفيلي *E. histolytica* خصوصا عند الجرعة 0.5 مل و 1 مل

الكلمات المفتاحية: *Allium sativum* ، *Capsicum* ، الزحار الاميبي

المقدمة :

ونظرا للاهمية الطبية لهذا الطفيلي فقد بذلت في العقود الاربعة الاخيرة جهود حثيثة للتعرف بشكل اكبر على الطفيلي والمرض وكيفية علاجه ، وتزايد الاهتمام باستخدام المستخلصات النباتية في علاج الاصابة بالطفيلي نظرا لما يحويه بعضها من مركبات تساعد في القضاء على القرص المعوية وشفاءها [7] فضلا عن كونها اقل ضررا واقل سمية من العقاقير الكيماوية، وهذه الدراسة التي نحن بصدها اجريت للكشف عن تأثير اثنين من تلك المستخلصات النباتية في طفيلي *E. histolytica* خارج الجسم الحي *in vitro* ، وهما : المستخلص المائي للثوم *Allium sativum* watery extract of garlic والمستخلص المائي للفلفل الحار *Capsicum* spp. extract of hot pepper

طفيلي *Entamoeba histolytica* ابتدائي معوي intestinal protozoan يصيب الانسان ويسبب له مرض الزحار الاميبي Amoebic dysentery والذي يعد احد مشاكل الصحة العامة خاصة في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية [1,2,3] اذ يصيب مايقارب 50 مليون شخص ويتسبب في 100000 حالة وفاة سنويا على مستوى العالم [2,4].

يمر الطفيلي خلال دورة حياته بطورين اساسيين هما الطور المغتذي Trophozoite والطور المتكيس Cyst ، والاخير يمثل الطور المعدي infective stage اذ تتم الاصابة بالطفيلي عن طريق تناول الطعام والشراب الملوث بذلك الطور [5] ، يعيش الطور المغتذي في تجويف الامعاء الغليظة للمضيف ، ويتغذى على الغشاء المخاطي للامعاء الغليظة وكربات الدم الحمر ويقوم بافراز انزيمات تحلل الغشاء المخاطي وتتمتع داخل جدار الامعاء فتتلف خلاياه مسببة قروحا مؤلمة وبذلك يحدث مرض الزحار الاميبي [5,6]

المواد وطرائق العمل :

اولا: المواد:

1- محلول الملح الفسيولوجي : Normal saline

تم تحضير هذا المحلول بأذابة 0.9 غم من كلوريد الصوديوم (NaCl) في حجم صغير من الماء

الموصدة عند نفس الظروف المذكورة سابقا مدة ربع ساعة.

ب- طور سائل : Liquid phase

يتكون من 5 مل من محلول الملح البفري buffered saline solution و 1 مل من مصل الدم فيكون الحجم النهائي 6 مل ، تضاف الى الطور الصلب في ظروف معقمة [9].

7 - المستخلصات النباتية : Plant extracts أ- المستخلص المائي للثوم *Allium sativum* : watery extract

تم وزن 100 غم من فصوص الثوم بعد ازالة القشور ووضعها في 500 مل من الماء المقطر ، وضعت في الخلاط ثم حرك المزيج الناتج باستمرار لمدة 48 ساعة في الهزاز shaker ، رشح المزيج عبر طبقات من الشاش المعقم sterile gauze ثم حفظ في الثلاجة لحين الاستخدام.

ب- المستخلص المائي للفلل الحار *Capsicum* : spp. watery extract

اتبعت نفس الخطوات المستخدمة اعلاه لتحضير المستخلص المائي للثوم في تحضير هذا المستخلص.

ثانيا- طرائق العمل:

1- عزل طفيلي *E. histolytica*

تم عزل الطفيلي من غائط الاشخاص المصابين بالزحار الاميبي والذي يكون ذا قوام مخاطي mucoid دموي Bloody ، اذا اخذت كمية من الغائط ومزجت جيدا مع 3 مل من الـ normal saline لحين الحصول على عالق ، ثم رشح المزيج عبر طبقات من الشاش المعقم للتلخيص من الجزيئات الكبيرة قبل ان يتم تلقيح الوسط به [10,13]

2- تلقيح الوسط الزرعي بطفيلي *E. histolytica* وادامته :-

تم اخذ 0.5 مل من العالق المحضر اعلاه وازادتها الى الوسط الزرعي liver infusion agar ، وضع الوسط في الحاضنة incubator بدرجة 37 c مدة 48 ساعة ، ثم اخذت قطرة من الراسب الواقع بين الطورين السائل والصلب باستخدام pasture pipette ووضعت على شريحة زجاجية ثم فحصت تحت المجهر لمشاهدة الطور المغتذي trophozoite للطفيلي ، ان عدم وجود اي نمو للطفيلي يعني ان النتيجة سالبة وعليه يتم اعادة عملية الزرع مرة اخرى [10] . استخدم الـ Haemocytometer chamber لحساب عدد الاطوار المغتذية للطفيلي وفق المعادلة الاتية :

$$\text{Total number of amoeba} = x * y * 10^4$$

المقتر ثم اكمل الحجم الى 1000 مل ، وثبت الرقم الهيدروجيني pH عند 7.2 باستخدام جهاز pH meter ، وعقم المحلول بالموصدة autoclave عند 121C وضغط 15 باوند/انج مدة ربع ساعة ، ثم حفظ المحلول في درجة 4C لحين الاستخدام [8]

2- محلول الملح المتعادل : buffered saline solution

حضر بأذابة 1غم من potassium dihydrogene phosphate (KH₂PO₄) و 0.6 غم من dihydrogene phosphate (Na₂HPO₄) و 0.84 غم من كلوريد الصوديوم في حجم قليل من الماء المقطر وامل الحجم الى 1000 مل وثبت الـ pH عند 7.2 ، عقم المحلول باستخدام الموصدة عند 121c وضغط 15 باوند/انج مدة ربع ساعة وحفظ في الثلاجة لحين الاستخدام [9]

3 محلول - النشا : Starch Solution

حضر بأضافة 0.5 غم من النشا الى 9.5 مل من الماء المقطر ومزجه جيدا باستخدام الهزاز shaker لحين الحصول على عالق suspension ، ثم اخذ 1مل منه ووضع في انبوب يحوي 9 مل ماء مقطر وحفظ في الثلاجة ، وعند تحضير الوسط الزرعي يضاف له 0.1 مل من هذا العالق كغذاء للطفيلي [10]

4 - صبغة الايوسين الكحولية : Alcoholic eosin stain

حضرت بأذابة 1 غم من الصبغة في 99 مل من الكحول الايثيلي تركيزه 75% ، ثم حفظت في قنينة معتمة بدرجة حرارة الغرفة لحين الاستخدام [11]

5- مصل الدم : Blood serum

تم سحب عينة دم من شخص سليم ووضعت في انبوب معقم خالي من مانع التخثر ، تركت العينة بدرجة حرارة الغرفة مدة 30 دقيقة ثم عرضت لعملية طرد مركزي بقوة 3000rpm مدة 10 دقائق ثم جمع المصل ووضع في انابيب أبندروف معقمة ، حفظت في درجة 20C لحين الاستخدام [12]

6 - الوسط الزرعي : liver infusion agar

ويتكون من طورين :

أطور صلب Solid phase

وهو على شكل مسحوق في عبوات تجارية جاهزة للاستخدام ، يتكون من :

Beef liver infusion	500 gm / 1
Proteose peptone	10 gm / 1
Sodium chloride	5 gm / 1
Agar	20 gm / 1

حضر هذا الطور بأذابة 55 غم منه في كمية قليلة من الماء المقطر ثم اكمل الحجم الى 1000 مل ، ثم سخن المزيج جيدا حتى الغليان للأذابة مكونات الوسط بالكامل ، ثم التعقيم باستخدام

النتائج والمناقشة :

1- المستخلص المائي للثوم :

تم التحري عن تأثير الجرعة المختلفة للمستخلص المائي للثوم على الاطوار المغذية لطفيلي *E. histolytica* بعد فترة حضانة مدتها 24 ساعة ، واطهرت النتائج ان ادنى نسبة من الاطوار المغذية الميتة Dead trophozoite وهي 14.82 % كانت عند جرعة 0.01 مل من المستخلص ، في حين ارتفعت تلك النسبة عند الجرعة 0.05 و 0.1 مل من المستخلص فكانت 31.05 % و 46.16 % على التوالي لتصل اعلى قيمة لها عند الجرعة 0.5 و 1 مل من المستخلص اذ بلغت 64.29 % و 92.7 % على التوالي (شكل 1)

ان التأثير المثبط لمستخلص الثوم على الاطوار المغذية لطفيلي *E. histolytica* ربما يعزى الى محتواه من الـ Allicin ، وهو المركب الفعال في الثوم والمسؤول عن رائحته المميزة ، وهو عبارة عن diallyl disulfide oxide ، اذ يثبط هذا المركب التأثير المرضي المتعلق بالاصابة ونمو الطفيلي وذلك عن طريق تثبيطه لأنزيم cysteine protease في الطفيلي [14,15,16,17]، كما ان محتوى الثوم من الـ thiosulfide له تأثير مضاد للابتدائيات Antiprotozoal ، اذ تتفاعل تلك المادة مع الانزيمات الحاوية على مجموعة (-SH) في تلك الكائنات مما يؤدي الى تثبيطها [18,19]

وربما تعود قابلية المستخلص المائي للثوم على قتل الاطوار المغذية للطفيلي الى حامضية المستخلص التي تصل الى (pH=5.7) وهذه الحامضية غير ملائمة لنمو الطفيلي الذي يفضل العيش والنمو في (pH = متعادل 7.2).

2- المستخلص المائي للفلل الحار:

اظهرت نتائج الدراسة ان جرعة 1 مل من المستخلص المائي للفلل الحار كانت فعالة في القضاء على الاطوار المغذية للطفيلي بنسبة 100% بعد فترة حضانة مدتها 24 ساعة ، في حين كانت للجرعات الأخرى

حيث ان:

X = اعداد الطفيلي في المربعات

Y = معامل التخفيف

10^4 = معامل تصحيح الخطأ بالحجم

وكان عدد الاطوار المغذية التي اضيفت للوسط

عند عمل subculture هو

$28 * 10^3$ trophozoite / ml

3- دراسة تأثير المستخلصات المائية للثوم والفلل

الحار على الاطوار المغذية لطفيلي *Entamoeba histolytica* خارج الجسم الحي

:-

أ - المستخلص المائي للثوم :-

تم دراسة تأثير المستخلص المائي للثوم على الاطوار المغذية trophozoites للطفيلي وذلك بأخذ ست مجاميع من القناني ذات الغطاء 6 screw - cap botteles groups على الوسط liver infusion agar ، كل مجموعة مكونة من 5 قناني ، تم اضافة جرعات متزايدة من مستخلص الثوم الى خمس مجاميع من القناني وهي (0.01 ، 0.05 ، 0.1 ، 0.5 ، 1 مل) على التوالي ، اما المجموعة السادسة مجموعة السيطرة

control بقيت خالية من المستخلص ، تم تحريك القناني لمزج المستخلص مع الوسط الزراعي بشكل جيد ، ثم اضيف 0.1 مل من عالق الطفيلي، وضعت القناني في الحاضنة مدة 24 ساعة بدرجة c 37 ، بعد فترة الحضانة اخذ 1 مل من السائل الموجودة في كل قنينة ووضعت في انبوب واطيفت له قطرة من صيغة الايوسين الحمراء لحساب اعداد الطفيلي باستخدام الـ Haemocytometer وتحديد الجرعة القاتلة والمثبطة للاطوار المغذية للطفيلي حسب المعادلات التالية:

$$\% \text{ of live trophozoites} = \frac{\text{Number of a live trophozoites} * 100}{\text{Total number of troph.}}$$

$$\% \text{ of dead trophozoites} = \frac{\text{Number of a dead trophozoites} * 100}{\text{Total number of troph}}$$

Total number of troph

ب- المستخلص المائي للفلل الحار :

تم دراسة تأثير المستخلص المائي للفلل الحار على الاطوار المغذية للطفيلي واتبع نفس الخطوات التي اتبعت مع المستخلص المائي للثوم في الفقرة السابقة.

- pathogenic species of Entamoeba. Lab . Med. 35:613-616 .
4. Achters, JP. and Mirelman ,D.,2006.Progress in research on E. histolytica pathogenesis.J.Microb .,vol.9, no.4 , pp:367-373
 5. Linford , A.S.;Heriberto , M.;Kafelyn R.G. ; Hanbang , Z.;Singh, V. ; Willian , A. and Petri , JR.,2009. Short hairpin RNA. Mediated knock down of Protein expression in E. histolytica , J. Microb . PP: 1035-1037
 6. Ryan, KJ . and Ray CG.,2004. Amebiasis .Sherris Med – Microb .,4th ed .,McGraw Hill ,N.Y.,pp.: 733-738.
 7. Yu sung ; Yu Yuchang and NiLun Ting , 2005. Capsaicin biosynthesis in water stressed hot pepper fruits . Bot.Bull. Acad. Sin .,(46):35-42.
 8. Myers , R.L.1995. Immunology (laboratory manual) , 2ed ed. , WM.C. Brown Pub. Inc. USA ,Dubuque , PP.: 126-127.
 9. Taylor , A.E.R. and Baker , J.R. 1968 .The cultivation of parasites invitro. Black well science Pub . Oxford , PP.: 120-144.
 10. Clark ,C.G.and Diamond , L.S. 2002. Methods for cultivation of huminal Parasitic protists of clinical importance .Clin-microb. Rev.,15:329-341.
 11. Luna , L.G.1968. Manual of histological staining methods , 3rd ed . McGraw – Hill book company , N.Y. , p:258
 12. Brousseau ,P.; Payette , Y.; Tryphonas , H.; Blakley , B.;Boermans , H.;Flipo , D. and Fournier,M.1999.Manual of immunological methods. CRC press LIC, USA,F. , PP.: 135
 13. Ramos , F.; Moran, P. ;Gonzalez, E. ;Garcia, G. ;Ramiro ,M. ; Gomez, A. ;Garcia ,M.C. ; Melendro, E.I. ;Valadez ,A. and Ximenez ,C.2005. E. histolytica

تأثير مثبط للاطوار المغتذية للطفيلي بنسبة (17.86 % ، 32% ، 44% ، 66.67 %) على التوالي (شكل 2)

من النتائج اعلاه نلاحظ ان هناك تأثير مثبط للمستخلص المائي للفلفل الحار على الاطوار المغتذية لطفيلي *E. histolytica* ، وهذا التأثير يعود لعدة اسباب منها حامضية المستخلص المائي التي تصل الى (pH= 5) والتي تحول pH الوسط الزراعي من متعادل الى حامضي ما يؤثر سلبا على نمو الطفيلي الذي يفضل pH متعادل لكي ينمو ، وقد يعود التأثير المثبط للمستخلص المائي للفلفل الحار الى المركب الفعال فيه Capsaicin وهو ذو تأثير مضاد لكثير من الكائنات الحية ومنها الابتدائيات Antiprotozoal وذلك بسبب محتواه من terpenoides التي تقضي على طيف واسع من الميكروبات عن طريق ميكانيكية تحطيم الغشاء الخلوي لها [20,7] cell membrane destruction , كما تقوم التربينات terpenes بالتداخل مع مراحل نمو الطور المغتذي و تثبط ايض الكربوهيدرات ما يؤدي الى قتل الطفيلي [14] فضلا عن كونها تمنع حدوث القرحة ulcer في القناة الهضمية وتقلل من شدة ماموجود منها [22,21,20]

المصادر :

1. Lejeune, M.; Rybicka JM. and chadee, K. 2009. Recent discoveries in the pathogenesis and immune response toward *E. histolytica* . Fut. Microb . PP.: 105-118
2. Moncada ,D.; Keller , K. and Chadee ,K., 2005 . *E. histolytica* – secreted product degrades colonic mucin oligosaccharides. Infect.Imm., 73:3790-3793.
3. DiMiceli ,L., 2004. Distigishing between pathogenic and non

18. Alvarez , A.H.; Cadena, M.G.; Silva , M.E. ; Savedra, E. and Avila E.E., 2007. E. histolytica : ADP ribosylation of secreted glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase. Exp. Parasit., 117(4): 349-356.
19. Swiderski , F.; Dabrowski, M.; Rusaczko K, A.; and Waszkiewicz , B., 2007. Bio active substances of garlic and their role in dietoprophylaxis and dieto therapy . Roczn. Panstw. Zaki . Hig ., 58(1) : 41-60.
20. Malgorzata , M. and Irena , P. , 2005. Antioxdant activity of the main phenolic compounds isolated from hot pepper fruit. J. Agr . – food chen ., 53(5) : 1750-1756.
21. Marjorie , M.C. , 1999. Plant products as antimicrobial agents. Clin. Microb. 12(4): 564-582.
22. John , G. 2005. Research on the health benefits of herbs and supplements. M. Acad. Microb. , 10: 257-265.
- and Entamoeba dispar : Prevalence infection in aural Mexican community. Exp. Parasitol., 110: 327-330 .
14. Coppi , A.; Cabinian , M.; Mirelman , D.; and Sinnis , P., 2006. Antimicrobial activity of Allicin abiologically active compound from garlic cloves. Microb . Agent Chem., 50(5) : 1731-1737
15. Davis, SR. , 2005. An overview of the antifungal properties of Allicin And its break down products. Mycoses , 48: 95-100
16. Rudiger, H. and Hafez, M., 2007. Effect of coated plant extracts on Histomonas meleagridis and growth of bacteria invitro . Avian Dis., 51(4) : 880-883.
17. Singh, UP.; Prithiviraj , B.; Sarma, BK.; Singh, M.; and Ray , AB., 2001. Role of garlic A. sativum in human and plant diseases . Ind. J. exp. Bio., 39(4) : 310-322.

The effect of *Allium sativum* and *Capsicum spp.* Watery extracts on the *Entamoeba histolytica* in vitro.

B. j. Muhamad

* Department of Biology, College of Science - University of Baghdad.

Abstract:

In vitro tests have been carried out to find out the efficacy of watery extracts of garlic *Allium sativum* and hot pepper *Capsicum spp.* against the trophozoites of *Entamoeba histolytica* cultivated in liver infusion agar media at 37 c .

The doses of (0.01, 0.05 , 0.1, 0.5, 1 ml) of garlic and hot pepper watery extracts were added to certain number of *E. histolytica* trophozoites for exposure time of 24 hrs., the mortality percentage of trophozoites treated with garlic extract were (14.82 % , 31.05% , 46.16% , 64.29% , 92.7%) respectively , these percentages were very close to that obtained from the treatment with the hot pepper extract which were (17.86% , 32% , 44% , 66.67% , 100%) respectively .

Generally these results showed that the garlic and hot pepper watery extracts both were effective to eliminate *E. histolytica* trophozoites , particularly the doses of (0.5 and 1 ml).

The differences in studied plant characters were significant in the case of the first concentration compared with the second one.