

عزل وتشخيص البكتريا الملوثة لنهر دجلة في بعض أفضية محافظة واسط Isolation and Identification of the Bacteria which Contaminated the Tigris River in Some Districts of Wasit Province

حميد مجيد جاسم **

رياض عباس عبد الجبار *

هلال حمود هائيس

المديرية العامة للتربية في محافظة بغداد/ الكرخ الثانية

*كلية العلوم/ جامعة تكريت

**كلية التقنيات الحيوية التطبيقية/ جامعة النهرين

Helal H. Hays

*Reyad A. Abduljabar

** Hameed M. Jasim

General Directorate for Educational in Baghdad/ Karkh 2

*University of Tikrit/ College of Sciences

**AL-Nauhraein University/ College of Applied Biotechnology

helalalhamood@yahoo.com

الملخص

تضمنت الدراسة عزل وتشخيص الأنواع والأجناس البكتيرية السائدة في مياه نهر دجلة خلال سنة واحدة ابتداء من شهر حزيران 2015 ولغاية شهر أيار 2016 وبواقع 8 مواقع، توزعت على النحو الآتي: موقعين في كل منطقة تفصل بينهما مسافة 50 متر، في كل من: قضاء العزيزية وناحية الزبيدية وقضاء النعمانية وأما في مدينة الكوت فقد شملت موقعين، أحدهما قبل سدة الكوت والأخرى بعد السدة. وتم ذلك بإجراء الاختبارات الكيموحيوية وتأكيد التشخيص باستعمال نظام (API20E (Analytical Profile Index، تشير نتائج التشخيص إلى وجود 22 عزلة عائدة للأجناس والأنواع الآتية في عينات مياه النهر *Aeromonas veronii* و *Aeromonas punctata* و *Bacillus subtilis* و *Exiguobacterium profoun* و *Pseudomonas alcaligenes* و *Enterobacter cloacae* و *Aeromonas caviae* و *Pseudomonas fluorescen* و *Bordetella spp* و *Photobacterium damala* و *Aeromonas hydrophila* و *Shigella spp* و *Buttiarella agrestis* و *Moraxella spp* و *Serratia liquefaciens* و *Acinetobacterumannii* و *Chryseomonas meningosept* و *Pasteurella spp* و *Erwinia spp* و *Escherichia coli* و *Enterobacterium hormaechei* و *Escherichia vulneris*. إذ شخّصت في فصل الصيف (شهر حزيران 2015) 16 عزلة بنسبة 27.5% وفي فصل الخريف (شهر أيلول) 16 عزلة بنسبة 27.5%، أما في فصل الشتاء (شهر كانون الأول) فكانت 12 عزلة ونسبتها 20.6% وأخيراً في فصل الربيع (شهر أيار 2016) فقد كانت 14 عزلة ونسبتها 24.1%. وكان الموقع 1 في قضاء العزيزية هو الأكثر تلوثاً بالبكتريا بسبب مياه المجاري المنزلية وفضلات المواشي ضمن الأنشطة الزراعية.

الكلمات المفتاحية: بكتريولوجية، كيموحيوية، نهر دجلة، واسط

Abstract

The bacteriological study was included isolation and identification aquatic bacteria of dominant species in Tigris River. The period of the study for one year which starting from June 2015 until 2016 May which include 8 stations which distributed as follows : two station in the each site with space 50-meter between them, which have all of the following districts counties run through AL-Azizia AL- Zubaydiah, AL-Numaniyah and AL-Akut distributed as two repeaters within Wasit province. Identifications methods using the biochemical tests and verify the identification by API20E system. Results have pointed to the appearance of the isolation of 22 belonging to the following genera and species in the river water samples involve: *Aeromonas veronii* , *Aeromonas punctata* , *Bacillus subtilis* , *Exiguobacterium profoun* , *Pseudomonas alcaligenes* , *Enterobacter cloacae* , *Aeromonas caviae* , *Pseudomonas fluorescen* , *Bordetella spp* , *Photobacterium damala* , *Aeromonas hydrophila* , *Acinetobacterumannii* , *Serratia liquefaciens* , *Moraxella spp* , *Buttiarella agrestis* , *Shigella spp* , *Chryseomonas meningosept* , *Pasteurella spp* , *Erwinia spp* , *Escherichia coli* , *Enterobacterium hormaechei* , and *Escherichia vulneris*. Temporal variation of aquatic bacteria in the study area was include: 16 bacterial isolate at June 2015 (27.5 %) 16 isolate at September (27.5%), 12 isolate at December (20.6 %) and 14 isolate in the May 2016 (24.1%). This study discover that station 1 was the most contaminated because domestic sewage and cattle feces within agricultural activities.

Key Words: Bacteriology, Biochemical, Tigris, Wasit

المقدمة


تحتوي المياه السطحية على أنواعاً مختلفة من الأحياء المجهرية منها ما تكون مسؤولة عن إحداث الإصابة المرضية والآخر ملوثات بكتيرية مختلفة وقد تزداد أعداد هذه الأحياء المجهرية خلال مواسم الأمطار التي تسقط على اليابسة فتجرّف معها أحياء التربة المختلفة لتصب في مياه الأنهر على الرغم من قدرة النهر على التنقية الذاتية (Self purification) [1]. وهناك العديد من الأمراض الناجمة عن الإصابة

بالأحياء المجهرية التي مصدرها الماء (Waterborne disease) كالتيفوئيد والكوليرا والزحار البكتيري والاميبى والالتهاب المعوي والتهاب الكبد الفايروسي والطفيليات وتبلغ حالات الوفاة التي لها علاقة بالأمراض المنسببة بالأحياء المجهرية التي مصدرها الماء 25 مليون حالة سنوياً [2]. وفي دراسة أجراها Taiwo وآخرون، (2014) [3] لبيان تأثير متدفقات المجازر على جودة مياه نهر Ogun في نايجيريا وجد أنه من الضروري معالجة مصادر التلوث بالأحياء المجهرية التي تؤدي إلى تردي نوعية المياه. إن بكتيريا المياه العذبة هي العصيات السالبة لصبغة كرام وغير المكونة للابواغ *Achromobacter spp* و *Flavobacter spp* وذاتية التغذية *Pseudomonas spp* و *Protus spp* و *Bacillus spp* و *Enterobacteriaceae* و *Vbrio spp*. وقد ذكر Okafor، (2011) [4] بأن البكتيريا الموجبة لصبغة كرام والمكونة للابواغ للنوع *Clostridium spp* والبكتيريا المختزلة للكبريت والحديد تسبب مشاكل صحية ورائحة غير مقبولة لمياه الشرب. ازداد الاهتمام بدراسة التنوع الميكروبي من خلال التشخيص الكيموحيوي والجزئي للميكروبات [5]. ويعتمد التشخيص الكيموحيوي للبكتيريا على إنتاج البكتيريا للأنزيمات وتخمر السكريات وإنتاجها للغاز والحمض والامونيا واستهلاكها للحمض الأمينية واختزال الكبريتات والايض الهوائي واللاهوائي وغيرها، وإن الكشف عن هذه المركبات يتم من خلال دلالات وأوساط زرعية تحوي مركبات تؤدي إلى تغير لون الوسط [6]. هدفت الدراسة الحالية إلى التحري عن الأنواع المختلفة من البكتيريا الملوثة لمياه نهر دجلة وفي عدة أفضية ونواحي لمحافظة واسط وتخصيصها مظهرياً وكيموحيوياً.

المواد وطرائق العمل

منطقة الدراسة

شملت منطقة الدراسة عدد من الافضية والنواحي الواقعة على ضفاف نهر دجلة والتابعة لمحافظة واسط وقد تم تقسيمها إلى 8 مواقع جمعت منها عينات الماء وهي: الموقعان الأول والثاني يقعان في قضاء العزيزية، والثالث والرابع في ناحية الزبيدية والخامس والسادس يقعان في قضاء النعمانية والموقع السابع والثامن قبل وبعد سدة الكوت على التوالي شكل (1) يبين الخارطة الجغرافية لمنطقة الدراسة.



شكل (1): الخارطة الجغرافية لافضية ونواحي محافظة واسط التي جمعت منها عينات الدراسة

جمع العينات

جمعت عينات الماء من جميع محطات الدراسة اعتباراً من حزيران 2015 ولغاية ايار 2016 وبمعدل عينة وبمكررين من كل موقع ولكل فصل. أخذت عينات الماء باستعمال قناني زجاجية معقمة ذات غطاء محكم. نقلت جميع النماذج فوراً إلى المختبر بواسطة حاوية فلينية مثلجة وبدرجة حرارة 4-6 م.

التشخيص البكتريولوجي

أجريت الفحوصات المجهرية والاختبارات الكيموحيوية اعتماداً على المصادر العلمية المتبعة عالمياً لتشخيص العزلات البكتيرية وفقاً لما هو موصوف من قبل Holt وآخرون، (1994) [9] وكما يأتي:

الصفات المظهرية

حددت الصفات المظهرية لعزلات البكتيريا اعتماداً على لون المستعمرات وشكلها على الأوساط الزرعية التفريقية وشبه الانتقائية (وسط أكار والمرق المغذي ووسط مأكوني ووسط أكار الدم)، فضلاً عن شكل الخلايا وانتظامها وأصطباقها في الفحص المجهرية.

الاختبارات الكيموحيوية

أجريت جميع الاختبارات الكيموحيوية لتشخيص العزلات البكتيرية وفقاً لما هو موصوف من قبل Atlas وآخرون (1995) [10] وكما يأتي :

إختبار إنزيم الكاتاليز وإختبار الأوكسيدز وإختبار الجيلاتينيز وإختبار أحمر الميثيل وإختبار فوكس – بروسكاور وإختبار تخمر السكريات وإختبار الحركة .

التشخيص باستخدام العدة التشخيصية API 20E (المجهز من شركة Biomerieux)

استخدم هذا النظام لتشخيص العزلات البكتيرية بعد تشخيصها أولاً بواسطة الاختبارات الكيموحيوية الأولية ويتضمن هذا النظام 20 اختباراً كيموحيوياً لتشخيص العزلات البكتيرية.

النتائج والمناقشة

أجريت عملية تنمية العزلات البكتيرية لعينات المياه المأخوذة من أقضية ونواحي محافظة واسط على الأوساط الزرعية الغنية للتعرف على أعداد وأنواع هذه العزلات. وقد أشارت النتائج إلى الحصول على 58 عزلة بكتيرية، إذ تم الحصول على 14 عزلة بكتيرية من قضاء العزيزية بلغت نسبتها (23.3%)، و 10 عزلات بكتيرية من ناحية الزبيدية بلغت نسبتها (20%)، و 14 عزلة بكتيرية من قضاء النعمانية بنسبة (23.3%)، و 12 عزلة و 10 عزلة من نهر دجلة قبل وبعد سدة الكوت بنسبة (20%) و (16.6%) على التوالي. وبعد إجراء الفحوصات المظهرية والاختبارات الكيموحيوية لتلك العزلات تم التمكن من تشخيص 18 عزلة بكتيرية وكما هو مبين في جدول (1).

جدول (1): التشخيص الكيموحيوي للعزلات البكتيرية باستخدام العدة التشخيصية API20E

الاختبار																		البكتريا		
ARA (Arabinose fermentation)	AMY (Amygdalin fermentation)	MEL (Melibiose fermentation)	SAC(Sucrose fermentation)	RHA(Rhamnose fermentation)	SOR(Sorbitol fermentation)	INO(Inositol fermentation)	MAN(Mannitol fermentation)	GLU(Glucose fermentation)	GEL(Gelatin Hydrolysis)	VP: Voges Proskauer(Acetoin Prouction)	IND(Indole Production)	IDA(Tryptophan Desaminase Production)	URE(Urease Production)	H ₂ S (Hydrogen sulfide Production)	CIT (Citrate Utilization)	ODC (Ornithine Decarboxylase)	LDC (Lysine Decarboxylase)		ADH (Arginine Dihydrolase)	ONPG(O-Nitrophenyl-β-D-galactosidase)
-	-	-	+	-	-	-	+	+	+	-	+	-	-	-	+	-	+	+	+	<i>Aeromonas hydrophila</i>
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	+	+	-	+	+	<i>Enterobacter cloacae</i>
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	+	-	<i>Pseudomonas fluorescens</i>
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	<i>Bordetella spp</i>
-	-	-	+	-	-	-	-	+	-	-	-	-	+	-	-	-	-	+	-	<i>Photobacteriu m damala</i>
-	-	-	+	-	-	-	+	+	+	-	+	-	-	-	+	-	+	+	+	<i>Acinetobacter bumannii</i>
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	<i>Serratia liquefcians</i>
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	+	-	<i>Moraxella spp</i>
+	+	-	-	+	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	+	<i>Buttiaxella agrestis</i>
-	+	-	+	-	-	-	+	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	<i>Shigella spp</i>
-	-	-	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	<i>Chryseomonas meningosept</i>
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<i>Pasteurella spp</i>
+	+	-	+	-	-	-	+	+	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	+	<i>Erwinia spp</i>
+	-	+	+	+	+	-	+	+	-	-	+	-	-	-	-	+	+	+	+	<i>Escherichia coli</i>
+	-	+	+	+	+	-	+	+	-	-	+	-	-	-	-	+	+	+	+	<i>Escherichia vuleneris</i>
-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	<i>Burkholderia cepacia</i>
+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	-	+	-	+	-	-	-	+	<i>Klebsiella oxytoca</i>
-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	+	+	+	-	+	+	-	-	-	<i>Morganella moraganii</i>

من ناحية أخرى فإنه لا يوجد تباين زمني في ظهور البكتيريا المعزولة إذ تم عزل وتشخيص 16 عزلة في فصل الصيف كما مبين في جدول (2) بنسبة (27.5%)

جدول (2) : الأنواع والأجناس البكتيرية المعزولة من مياه نهر دجلة ضمن محافظة واسط لفصل الصيف (شهر حزيران للعام 2015)

حزيران 2015						ت	الأجناس والأنواع البكتيرية السائدة في المياه
الكوكبات بعد	الكوكبات السادة	الكوكبات قبل	الكوكبات السادة	الكوكبات قبل	الكوكبات السادة		
1	1	1	-	1	1	1	<i>Aeromonas veronii</i>
-	-	-	-	1	1	2	<i>Exiguobacterium profoun</i>
1	-	-	-	-	1	3	<i>Pseudomonas alcaligenes</i>
-	1	1	-	-	1	4	<i>Enterobacter cloacae</i>
-	-	-	-	1	-	5	<i>Aeromonas caviae</i>
-	-	-	-	1	-	6	<i>Pseudomonas fluorescens</i>
-	1	-	-	-	-	7	<i>Bordetella spp</i>
-	1	-	-	-	-	8	<i>Photobacterium damala</i>
-	1	-	-	-	-	9	<i>Aeromonas hydrophila</i>

وفي فصل الخريف 16 عزلة كما مبين في جدول (3) بنسبة (27.5%) . أظهرت النتائج بان هنالك تباين موسمي وموقعي بالنسبة للأنواع البكتيرية المعزولة والمشخصة، إذ أن الزيادة في الأنواع البكتيرية كانت في نهر دجلة في فصلي الصيف والخريف أعلى من فصلي الشتاء والربيع وربما يعود سبب ذلك إلى ارتفاع درجة الحرارة التي تؤثر في النشاط الميكروبي فضلاً عن العوامل الأخرى مثل الأوكسجين والمادة العضوية ومركبات النتروجين [14].

جدول (3): الأنواع والأجناس البكتيرية المعزولة من مياه نهر دجلة ضمن محافظة واسط لفصل الخريف (شهر أيلول للعام 2015)

أيلول 2015						ت	الأجناس والأنواع البكتيرية السائدة في المياه
الكوكبات بعد	الكوكبات السادة	الكوكبات قبل	الكوكبات السادة	الكوكبات قبل	الكوكبات السادة		
1	1	1	1	1	1	1	<i>Aeromonas veronii</i>
-	-	1	-	-	-	2	<i>Aeromonas punctata</i>
1	1	-	-	-	-	3	<i>Bacillus subtilis</i>
1	1	1	1	1	1	4	<i>Pseudomonas alcaligenes</i>
-	-	1	-	-	-	5	<i>Acinetobacter baumannii</i>
-	-	1	-	-	-	6	<i>Serratia liquefaciens</i>
1	-	-	-	-	-	7	<i>Buttiauxella agrestis</i>

تتفق هذه النتائج مع تلك التي حصل عليها شبيب، (2013) [13] عند دراسته لدلائل التلوث الميكروبي لنهر دجلة في قضاء النعمانية ضمن محافظة واسط وأما في فصل الشتاء فكانت 14 عزلة كما مبين في جدول (4) ونسبتها (20.6%).

جدول (4): الأنواع والأجناس البكتيرية المعزولة من مياه نهر دجلة ضمن محافظة واسط لفصل الشتاء (شهر كانون الأول للعام 2015)

كانون الاول 2015						ت	الأجناس والأنواع البكتيرية السائدة في المياه
الكوكبات بعد	الكوكبات السادة	الكوكبات قبل	الكوكبات السادة	الكوكبات قبل	الكوكبات السادة		
-	1	1	1	1	1	1	<i>Aeromonas punctata</i>
1	1	1	1	1	1	2	<i>Pseudomonas alcaligenes</i>
-	-	1	-	-	-	3	<i>Aeromonas hydrophila</i>
-	-	-	1	-	-	4	<i>Buttiauxella agrestis</i>
-	-	1	-	-	-	5	<i>Shigella spp</i>
1	-	-	-	-	-	6	<i>Chryseomonas meningosept</i>
-	-	-	-	1	-	7	<i>Escherichia coli</i>

وأخيراً في فصل الربيع فقد كانت 12 عزلة كما مبين في جدول (5) ونسبتها (24.1%).

جدول (5): الأنواع والأجناس البكتيرية المعزولة من مياه نهر دجلة ضمن محافظة واسط لفصل الربيع (شهر آذار للعام 2016)

آذار 2016					ت	
المياه	المياه	المياه	المياه	المياه	الأجناس والأنواع البكتيرية السائدة في المياه	
-	1	-	1	-	<i>Aeromonas veronii</i>	1
-	-	1	-	1	<i>Aeromonas punctata</i>	2
1	-	-	-	-	<i>Enterobacter cloacae</i>	3
-	-	-	-	1	<i>Pseudomonas fluorescens</i>	4
-	-	-	1	-	<i>Aeromonas hydrophila</i>	5
-	-	1	-	-	<i>Moraxella spp</i>	6
-	1	-	-	-	<i>Chryseomonas meningosept</i>	7
-	-	-	-	1	<i>Pasteurella spp</i>	8
-	-	1	-	-	<i>Erwinia spp</i>	9
1	-	-	-	-	<i>Escherichia vulneris</i>	10

أظهرت النتائج بان هنالك تباين موسمي وموقعي بالنسبة للأنواع البكتيرية المعزولة والمشخصة إذ كانت في نهر دجلة في فصلي الصيف والخريف أقل من فصلي الشتاء والربيع. تم تشخيص الأجناس البكتيرية على مستوى النوع وكما مبين في جدول (1).

أظهرت النتائج عزل وتشخيص 22 نوع بكتيري تابعة لجنس *Aeromonas* على النحو الآتي: 11 عزلة لـ *Aeromonas veronii* ، و 7 عزلات *Aeromonas punctata* ، و 3 عزلات *Aeromonas hydrophila* وعزلة واحدة *Aeromonas caviae* وقد يعود سبب شيوع انتشار هذه الأنواع التابعة لجنس *Aeromonas spp* في مياه النهر لكونها متوطنة (autochthonous) في البيئات المائية (aquatic environments) ولأنها محبة للحرارة المعتدلة فضلاً عن أنها لاهوائية اختيارية مما يساعدها في تحمل الظروف اللاهوائية في المواقع غير جيدة التهوية في المياه [12]. وكذلك من الصفات المظهرية والوظيفية الأخرى التي ساعدتها في الانتشار الواسع قدرتها على الحركة وقد تقاوم الظروف غير الملائمة [15]. كما وجد أن الأنواع التابعة لجنس *Pseudomonas spp* كانت تمثل نسبة عالية من البكتيريا المعزولة من مياه نهر دجلة في المواقع المدروسة، إذ تم عزل وتشخيص 14 عزلة تابعة لهذا الجنس منها 10 عزلات *Pseudomonas alcaligenes* و عزلتين *Pseudomonas fluorescens* وعزلتين *Chryseomonas meningosept* (*Pseudomonas luteola*) كانت نتائج الأعداد أقل مما توصل إليه عبدالرحمن وآخرون، (2009) [16] عند دراستهم لبعض الملوثات البكتيرية في مياه نهر الفرات وبحيرتي الحبانية والثرثار إذ كانت نسبة الأنواع التابعة لجنس *Pseudomonas spp* 81% من مجموع العزلات التي تم عزلها وتشخيصها والبالغ عددها 216 عزلة وقد عزوا ذلك إلى حصول تلوث برازي للمياه من مصادر بشرية وحيوانية ومقاومة البكتيريا القولونية للحرارة. وأما في الدراسة الحالية فربما يعود سبب شيوع انتشار هذه الأنواع التابعة لجنس *Pseudomonas spp* في مياه النهر وفي مختلف مواسم السنة إلى التنوع الوظيفي والابضي لها مما جعلها واسعة الانتشار في المواطن البيئية اليابسة والمائية وهي هوائية مجبرة ولها مدى حراري واسع إذ يمكنها النمو في درجات حرارة تتراوح من 22 إلى 42 °م فضلاً عن تحملها للتركيزات الملحية العالية ولها زوج من الاسواط الطرفية وبعض أنواعها يثبت النتروجين الجوي [17]. تم عزل وتشخيص بعض الأجناس والأنواع التابعة للعائلة المعوية Enterobacteriaceae وكانت 5 عزلة (8.6%) إذ توزعت الأنواع التابعة لهذه العائلة إلى 4 عزلات لـ *Enterobacter cloacae* وعزلة واحدة للنوع *Enterobacter hormaechei*. وقد يعود سبب انتشار الأنواع التابعة لجنس *Enterobacter spp* في مياه النهر وعلى مختلف مواسم السنة إلى كونها احد الأنواع التي تنمو في درجات حرارة مياه معتدلة (mesophilic bacteria) [18]. كما تشير النتائج الى ظهور عزلتين لبكتيريا *Buttiarella agrestis* في مياه نهر دجلة في المحطات المدروسة. وقد يعود ظهور النوع *Buttiarella agrestis* إلى تلوث المياه بفضلات الحيوانات، حيث ان ماء النهر يمر بمناطق ذات نشاط زراعي يكثر فيه الرعي للمواشي [19]. عزلت وشخصت 7 عزلات تعود للجنس *Bacillus spp* من مياه نهر دجلة في المحطات المدروسة، أي بنسبة (11.6%) من مجموع البكتيريا المعزولة والمشخصة وكانت 5 عزلات للبكتيريا *Bacillus subtilis*، وقد يعود سبب انتشار النوع *Bacillus subtilis* أنها تقاوم الضغوط البيئية في التغيرات الحاصلة جراء الملوثات البيئية من خلال تركيب الغشاء الخلوي كونها موجبة لصبغة كرام وأيضاً وجود الابواغ الداخلية التي تقاوم بها الظروف غير الملائمة كالجفاف وارتفاع التراكيز الملحية [20] فضلاً عن التركيب المظهر والوظيفي احتوائها على بلازميدات أو جينات كروموسومية تساعدها في مقاومة سمية المعادن الثقيلة والمنظفات والمضادات الحيوية التي قد تصل إلى مياه النهر بالتلوث البيئي [21]، ووجدت عزلتين لبكتيريا *Exiguobacterium spp* وقد يرجع سبب ظهور الأنواع التابعة لهذا الجنس إلى بعض الصفات الخلوية التي تمتلكها هذه الأنواع مما يساعدها على الانتشار، ومن هذه الصفات أنها تنمو بدرجة حرارة 4م كما أنها محبة للوسط القاعدي [22]. أظهرت الدراسة الحالية عزل وتشخيص عزلتين من عائلة Moraxellaceae وتضم عزلة تابعة لـ *Moraxella spp* وعزلة *Acinetobacter baumannii* أما بقية الأجناس والأنواع البكتيرية كان مجموعها 8 ونسبتها 13.3% ظهرت على شكل عزلة واحدة هي كل من الأجناس والأنواع البكتيرية الآتية: *Bordetella spp* و *Moraxella spp* و *Pasteurella spp* و *Photobacterium damala* و *Acinetobacter baumannii*، وقد يعود سبب عزل هذه البكتيريا من مياه النهر إلى توفر الظروف الملائمة لنمو وتكاثر البكتيريا في حالة توافر المغذيات [4].

الاستنتاجات

ملائمة مياه نهر دجلة ضمن منطقة الدراسة لسيادة الأنواع البكتيرية التابعة لجنس *Aeromonas spp* إذ كانت الأكثر سيادة .

إن أجناس البكتيريا السائدة في مياه نهر دجلة ضمن أفضية محافظة واسط هي كل من *Aeromonas* spp و *Pseudomonas* spp و *Bacillus* spp و *Enterobacteraceae*. إن التغيرات في أنواع أجناس العزلات البكتيرية من محطة لأخرى يعود إلى اختلاف مصادر التلوث، وإلى الظروف البيئية التي تتعرض لها المواقع كافة خلال فصول السنة.

المصادر

- Sethi, P. and Kulkarni. (2010). Environmental Microbiology. Alfa Publication, New Delhi, India: p 296.
- Cunningham, William P. and Cunningham, Mary. (2006). Environmental Science Inquiry and Applications. Third Edition. McGraw-Hill Companies. New York. Inc. USA. pp 428.
- Taiwo, A.G., Adewunmi, A.R., Ajayi, J.O., Oseni, O.A. and Lyanda, Lanner, Y.A. (2014). Physico-Chemical and Microbial Analysis of the Impact of Abatoir Effluent on Ogun River Course. Int. J. Chem. Technol. Res. 6(5): pp 3083- 3090.
- Okafor, N. (2011). Environmental Microbiology of Aquatic and Water System. Springer Dordrecht Heidelberg London New York Springer Science and Business Media B.V. pp: 307
- Zeglin, L.H. (2015). Stream Microbial Response to Environmental Changes: review and synthesis of existing research. Front. Microb. 6 (454): 1-15.
- Hemraj, Vashit, Dikisha, Shama and Avneet, Gupta. (2013). A Review on a Commonly Used Biochemical Test for Bacteria. Int. J. Life. Sci. 1 (1): 1-7
- Dilnessa, T., Demeke, Gebresilasie, Mengistu, Getachew and Bitew, Adane. (2016). Emerging Blood Culture Technologies for Isolation of Blood Pathogens at Clinical Microbiology Laboratories, Review Article. J. Med. Microb. and Diagn. 5 (2): 1-7.
- Robinson, A.; McCarter Yrette S. and Tetreault, Janice. (1995). Comparison of Crystal Etric/Nonferminter System, API20 E System and Vitek Automicrobic System for Identification of Gram-Negative Bacilli. J. Clin. Microbiol. 33 (1): 364-370.
- Holt, J.G., Krieg, N.R., Sneath, H.A. Staley, J.T. and Williams, S.T. (1994). Berg's Manual of Determinative Bacteriology. (9th ed.). Williams and Wilkins. U.S.A. Pp: 479-484.
- Atlas, R.M., Parks, L.C. and Brown, A.E. (1995). Labroatory Manual of Experimental Microbiology, Mosby- year book, Inc, USA.
- Igbinsosa, Isoken H., Igumbor, Ehimario, U. and Aghdasi, Farhad. (2012). Emerging Aeromonas Species Infections and Their Significance in Public Health: Review Article. The Sci.World. J. 1(1):1-13.
- Percival, Steven, Chalmers, Rachel, Embrey, Martha, Hunter, Paul, Sellwood, Jane and Wyn-Jones, Peter. (2004). Microbiology of Waterborne Diseases. Elsevier Ltd. p 480.
- شبيب، عدنان كامل. (2013). تلوث نهر دجلة في مدينة النعمانية بالاعتماد على بكتريا الاشيريشيا القولونية كدليل للتلوث وتأثيره على الصحة العامة. مجلة التقني. 6 (3): 9-15.
- Armisen, T. Garcia, Nceoglu , Ozgul, Ouattara, Nouho Koffi, Anzil, Adriana, Verbanck, Natacha Brion and Servais, Pierre. (2014). Seasonal Variations and Resilience of Bacterial Communities in Sewage Polluted Urban River. Pals One Org. 9(3): 1-13.
- Ghenghesh, K. Sifaw, Ahmed, Salwa, F., El-Khalek, Rania, Abdel, Al-Gendy, Atef and Klena, John. (2007). Aeromonas-Associated Infections in Developing Countries: Review Article. J. Infect Dev. Countr., 2(2): 81-98.
- عبدالرحمن، ابراهيم عبدالكريم و زيدان، تحسين علي و سعود، وهران منعم. (2009). دراسة بعض الملوثات البكتيرية في مياه نهر الفرات وبحيرتي الحبابية والثرثار. مجلة جامعة الانبار للعلوم الصرفة. 3(3): 1-8.
- Silby, M.W., Winstanley, C., Godfrey Scott, A.C., Levy, Stuart B. and Jackson, Robert W. (2011). Pseudomonas Genomes: Diverse and Adaptable: Review Article. Federation of European Microbiological Societies, Microbiol Blackwell Publishing Ltd. Rev 35: pp 652-680.
- Gaaloova, B., Donauerova, A., Seman, M. and Bujdakova, H. (2014). Identification and β -lactam Resistance in Aquatic Isolates of Domica Cave in Solvak Karst (Slovakia). Int. J. of Speleol. 43(1): 69-77.
- Riggio, Marcello P., Lennon, Alan, Taylor, David J. and Bennett. (2011). Molecular Identification of Bacteria Associated with Canine Periodontal Disease. Vet. Microbiol. 150: 394-400.
- Akhter, A., Imran, M. and Akhter. (2015). Prevalence of Multi-Drug Resistance and Health Risk Potential in Metal Tolerant Enterobacter spp. from Polluted River Water. Eur. J. Environ. Ecol. 2(1): 44-52.
- Pitt, T.L., Malnick, H, Shah, J., Chattaway, M.A., Keys, C.J., Cooke, F.J. and Shah, H.N. (2007). Characterisation of *Exiguobacterium aurantiacum* Isolates from Blood Cultures of Six Patients. J. Compil. Euro. Soci. of Clin. Microbiol. and Infect. Dis. 13(1): 937-948.
- Paul, Dipak and Sinha, S. Narayan. (2015). Isolation an Characterization of a Phosphate Solubilizing Heavy Metal Tolerant Bacterium from River Ganga, West Bengal, India: Original Article. Songklanakarinn J. Sci. Technol. 37 (6): 657.