

Effect of Cultivar, Proline and Field Capacity on Shoot Growth of Wheat Plant .

تأثير الصنف ، البرولين والسعة الحقلية في نمو المجموع الخضري لنبات الحنطة *

عبد عون هاشم علوان

مالك عبدالله عذبي

جامعة كربلاء

*بحث مستقل من رسالة ماجستير للباحث الأول

المستخلص

أجريت هذه الدراسة باستعمال الأصص البلاستيكية في مزرعة خاصة واقعة على جانب طريق كربلاء – بابل (10 كم شرق مدينة كربلاء) لموسم النمو 2010 – 2011 بهدف دراسة تأثير الإجهاد المائي والرش بحامض البرولين في مؤشرات نمو المجموع الخضري لأربعة أصناف من نبات الحنطة ، وكانت الصفات المدروسة (عدد الأفرع ، ارتفاع النبات ، عدد الأوراق ، مساحة ورقة العلم ، الوزن الطري للمجموع الخضري ، الوزن الجاف للمجموع الخضري ، النمو المطلق والنمو النسبي) . نفذت التجربة باستعمال التصميم تام التعشبية Completely Randomized Design (CRD) كتجربة عاملية من ثلاثة عوامل وهي أربعة أصناف من الحنطة (فتح ، عدنانية ، اباء 99 ، شام 6) ، ثلاث تراكيز من حامض البرولين (0 ، 20 ، 40) ملغم.لتر⁻¹ وثلاث مستويات من السعة الحقلية (25% ، 50% ، 100%) وبأربع مكررات ، بحيث تضمنت التجربة 144 أصيصاً (وحدة تجريبية) . وقد تم الحصول على النتائج التالية :-

بينت النتائج إن تأثير الأصناف الداخلة في الدراسة كان معنوياً في الصفات المدروسة ، وإن الرش بالتركيز 20 ملغم . لتر⁻¹ ذا تأثير معنوي في كل الصفات المدروسة مقارنة مع التركيزين الآخرين (0 و 40) ملغم لتر⁻¹ . وأن المستوى 100% سعة حقلية الأفضل في تأثيره في الصفات المدروسة مقارنة مع المستويين الآخرين 25% و 50% من السعة الحقلية . أما بالنسبة لتأثير التداخل الثنائي بين عوامل الدراسة فقد كان تأثيره معنوياً في كافة الصفات المدروسة ، فقد أعطت معاملات التداخل بين الأصناف والتركيز 20 ملغم . لتر⁻¹ حامض البرولين أعلى معدل بالنسبة للصفات المدروسة ، من جهة أخرى أعطت معاملات التداخل بين الأصناف والتركيز 0 ملغم . لتر⁻¹ حامض البرولين أقل معدل بالنسبة للصفات الداخلة في الدراسة . كما أن التداخل الثنائي بين الأصناف ومستويات السعة الحقلية كان تأثيره معنوياً في الصفات المدروسة ، إذ أعطت الأصناف عند مستوى 100% سعة حقلية أعلى معدل للمؤشرات أعلاه . من جهة أخرى أعطت الأصناف عند 25% سعة حقلية أقل معدل للصفات السابق ذكرها . كذلك فإن التداخل الثنائي بين تركيز البرولين والسعة الحقلية كان تأثيره معنوياً في الصفات المدروسة ، فقد أعطى التركيز 20 ملغم . لتر⁻¹ بسعة حقلية 100% أعلى معدل لجميع الصفات المدروسة ، من جانب آخر أعطى التداخل بين التركيز 0 ملغم . لتر⁻¹ و 25% سعة حقلية أقل معدل لجميع الصفات المدروسة .

بينت نتائج الدراسة أن التداخل الثلاثي بين عوامل الدراسة قد كان تأثيره معنوياً في الصفات المدروسة باستثناء النمو المطلق فلم يكن للتداخل بين عوامل الدراسة تأثير معنوي في هذه الصفة . أما بالنسبة للصفات الأخرى فقد أعطى التداخل بين الأصناف وتركيز البرولين 20 ملغم . لتر⁻¹ وبسعة حقلية 100% أعلى معدل للصفات المدروسة . من جانب آخر أعطت الأصناف عند تركيز البرولين 0 ملغم . لتر⁻¹ بسعة حقلية 25% أقل معدل للصفات سابقة الذكر .

Abstract

A pot experiment was conducted in a private field located on the main road of Kerbala – Babylon , 10 kms eastern of Kerbala during the season of 2010 -2011 . The aim of this study was to assess the effect of water stress and proline on the shoot growth of four wheat cultivars. The shoot

growth parameters were plant height , tillers number , leaves number , flag leaf area , fresh and dry weight of the shoot , absolute growth and relative growth rates . Factorial experiment within completely randomized design with four replicates was applied . The experiment included four wheat cultivars (ie. Fateh , Adnania , IPA 99 and Sham 6) , three concentrations of proline (ie. 0 , 20 and 40) mg . l⁻¹ and three levels of field capacity (i.e. 25 , 50 and 100%) .

The results could be summarized as follow :

The effect of cultivars was significant on the previous mentioned traits ,and proline at 20 mg . l⁻¹ was more effective on all studied parameters compared with other concentrations (ie. 0 and 40) mg . l⁻¹ , and the field capacity of 100% was the best compared with 25% and 50% field capacities .

The interaction between cultivars and the proline was significantly effective on the studied parameters where cultivars treated with 20 mg . l⁻¹ proline gave the highest values compared with the control treatment (ie. 0 mg . l⁻¹) , and the interaction between cultivars and the field capacity was also effective on the shoot growth parameters . Cultivars grown with 100% field capacity gave higher values of the shoot growth parameters . On the other hand , those cultivars grown with 25% field capacity gave the lowest values of the previous mentioned parameters , and the interaction between the proline and field capacity was also significant on the studied parameters . The proline at 20 mg . l⁻¹ and 100% field capacity treatment gave the highest values of studied parameters , whereas plants grown with 0 mg . l⁻¹ and 25% field capacity gave the lowest values of root growth parameters .

المقدمة Introduction

بعد محصول الحنطة (*Triticum aestivum* L.) من اهم محاصيل الحبوب التي عرفها وزرعها الإنسان باعتبارها المادة الأساسية في غذائه والمصدر الرئيس للطاقة التي يحتاجها [1] ، وأن العالم سيحتاج في عام (2020) إلى بليون طن من الحنطة لسد الاحتياج العالمي بينما لا يتعدى الإنتاج الحالي (600) مليون طن [2] . أوضحت آخر الإحصائيات أن الإنتاج الكلي للحنطة في العراق لعام 2001 بلغ (1.03) ألف طن ويحتاج العراق إلى 3.25 مليون طن من حبوب الحنطة لتغذية سكانه ويستورد منها أكثر من مليوني طن وبما يعادل 60 – 70% من حاجته الفعلية [3] ، ويعود انخفاض الإنتاج المحلي من محصول الحنطة إلى عوامل عدة أهمها مشكلة الجفاف .

يعتبر الإجهاد المائي (الجفاف) احد أهم العوامل البيئية غير الإحيائية (Abiotic) الرئيسية التي تؤثر في نمو النباتات في المناطق المدارية ، فهو يمثل مشكلة محددة للنمو والإنتاج في كافة أنحاء العالم وتسبب خسائر زراعية مهمة خصوصاً في المناطق الجافة وشبه الجافة [4] . إن الجفاف يؤدي إلى تغيرات في البيئة الطبيعية للنباتات بصورة عامة وينعكس في اختلال العمليات الفسلجية وانخفاض إنتاجية النباتات على وجه الخصوص مما يسهم في تفاقم مشكلة نقص الغذاء في العالم [5] وهذا يستدعي العناية بمصادر المياه وعدم الهدر وتقنين استعمال المياه لغرض الحصول على إنتاجية نباتية عالية وبأقل كمية من الماء لان نسبة الأراضي المتأثرة بالجفاف قد تضاعفت منذ عام 1970 إلى أوائل عام 2000 [6] .

لقد دلت نتائج العديد من الدراسات إلى أن حامض البرولين يتجمع بشكل ملحوظ عند تعرض النبات للجفاف قياساً بالأحماض الأمينية الأخرى [7] ، فقد تناولت دراسات عديدة آلية تجمع حامض البرولين في أنسجة النبات وزيادة تحمل النبات للجهودات البيئية ومنها الإجهاد المائي على نبات الحنطة [8 ، 9] وعلى نبات الشعير [10] . كما تم استعمال حامض البرولين كمعاملة خارجية Exogenous application في تقليل أضرار الإجهاد الأوزموزي على نبات الذرة [11 ، 12] وعلى نبات الحنطة [13] .

وبما إن العراق يعاني بشكل عام من الجفاف وقلة الأمطار خلال موسم نمو الحنطة وكذلك قلة منسوب المياه في نهري دجلة والفرات ، عليه بات من الضروري إيجاد أصناف أكثر تحملاً للجفاف وكذلك البحث عن سبل التقليل من التأثير السلبي للجفاف ، ومن هذه السبل هو استعمال البرولين رشاً على النباتات ومعرفة التركيز الأمثل للحد من تأثير الجفاف .

المواد و طرائق العمل Materials and Methods

أجريت هذه التجربة في إحدى المزارع الخاصة الواقعة على جانب الطريق كربلاء – بابل (10 كم شرق مدينة كربلاء) للموسم الزراعي 2010 – 2011 في تربة طينية – غرينية والجدول (1) يبين بعض صفاتها الكيميائية والفيزيائية ، وتضمنت التجربة أربع أصناف من الحنطة *Triticum aestivum* L. هي (فتح ، عدنانية ، إباء 99 ، شام 6) والتي تم الحصول عليها من كلية الزراعة / جامعة كربلاء وثلاث تراكيز من حامض البرولين هي (0 ، 20 ، 40) ملغم . لتر⁻¹ وثلاث مستويات من السعة الحقلية (25% ، 50% ، 100%) . نفذت التجربة باستعمال أصص بلاستيكية وفق التصميم تام التعشية Completely Randomized Design (CRD) كتجربة عاملية (4 × 3 × 3) للصف ، تركيز البرولين والسعة الحقلية ، على التوالي وبأربع مكررات وبالتالي يكون عدد الوحدات التجريبية في التجربة (عدد الأصص) هي 144 أصيص سعة كل منها 7 كغم / تربة . إذ ملئت هذه الأصص (قطر 30 سم مع ارتفاع 45 سم) بالتربة بعد أخذها من عمق 0 – 30 سم وتجفيفها هوائياً وتمريضها من منخل قطر فتحاته 2 ملم . تم تقدير السعة الحقلية للتربة المستعملة بأخذ ثلاث أصص معبأة بـ 7 كغم / تربة مجففة هوائياً وشمسياً بصورة تامة ورويت إلى حد الإشباع الكامل وتركت لمدة 48 ساعة مع مراعاة تقليل كمية بخار الماء وذلك بوضع غطاء بلاستيكي على كل أصيص وتركت حتى نزول آخر قطرة من الماء الجذبي عن طريق الثقوب السفلية للأصص ثم وزنت مرة أخرى وكانت طريقة الحساب كالآتي [14]:

وزن الماء المفقود = وزن التربة الرطب – وزن التربة الجاف

النسبة المئوية للماء الموجود في 7 كغم / التربة = وزن الماء المفقود / وزن التربة الجاف × 100

وبعد إجراء حسابات السعة الحقلية وجد أنها 32.8%.

تمت زراعة بذور الحنطة بتاريخ 2010/11/15 [15] ، إذ زرعت 15 بذرة في كل أصيص على عمق 1 سم مع مراعاة اختيار البذور السليمة ذات الأحجام المتقاربة . تم تغطية جميع الأصص بغطاء بلاستيك حماية لها من الأمطار والرياح والطيور خلال مرحلة الإنبات وصولاً إلى مرحلة النضج ، وتم الري بماء النهر حتى الوصول إلى 50% من السعة الحقلية . وبعد 15 يوم من الزراعة تم ري الوحدات التجريبية حسب المعاملات المطلوبة (25% ، 50% ، 100%) من السعة الحقلية المحسوبة ، وذلك بوزن الأصص وإكمال الوزن إلى السعة الحقلية المطلوبة ، وأضيف سماد Diammonium Phosphate (DAP) بمعدل 1 غم . أصيص¹ على دفعتين ، الأولى قبل الزراعة والاخرى بعد الزراعة بـ 25 يوماً ، كذلك تم إضافة سماد كبريتات البوتاسيوم بمعدل 1 غم . أصيص¹ بعد الزراعة بـ 15 يوماً ، تم إضافة السماد بما يكافئ 175 كغم . هكتار¹ . وتم متابعة العمليات الزراعية من ري وإزالة الأدغال حتى قبل عملية الحصاد ، وتم خف البادرات إلى 5 بادرات . أصيص¹ بعد مرور 25 يوماً من الزراعة . واستمر الإرواء حسب السعة الحقلية المطلوبة حتى عملية الحصاد وكانت هذه العملية تتم حسب الحاجة عن طريق وزن الأصص وإضافة الماء إليها لغرض الحصول على الوزن الرطب الأول الذي بدأت به التجربة.

حضّر محلول أساس Stock solution من حامض البرولين (الذي تم الحصول عليه من جامعة بغداد – كلية التربية / ابن الهيثم) وذلك بوزن 1 غم منه وإذابته في 1000 مل من الماء المقطر ، ثم تحضير التراكيز المطلوبة منه (20 ، 40) ملغم . لتر¹ حسب قانون التخفيف إضافة إلى معاملة السيطرة وهي صفرمغم . لتر¹ . تم الرش بحامض البرولين في الصباح الباكر بعد مرور 45 يوماً من زراعة البذور (مرحلة التفريع) وبتاريخ 2010/12/30 وكان الرش بصورة متساوية وحتى الابتلال الكامل ، ورشت معاملات السيطرة بالماء المقطر مع استمرار الري حسب السعات الحقلية المطلوبة وهذه تمثل الرش الأولى . وبعد ثلاثين يوماً من الرش الأولى تم إجراء عملية الرش الثانية وبتاريخ 2011/1/30 (كانت الرش الثانية في مرحلة بزوغ الورقة العلمية) وحسب التراكيز المذكورة أعلاه مع الاستمرار بالري حسب السعة الحقلية المطلوبة (25% ، 50% ، 100%) من السعة الحقلية المحسوبة .

جدول (1) : بعض الصفات الكيميائية والفيزيائية لتربة الدراسة * .

3.2	ديسي سيمنز . م ¹	E C
7.7		Ph
10.0	غم . كغم ¹	المادة العضوية
101.3	ملغم . كغم ¹	النيتروجين الجاهز
8.2	ملغم . كغم ¹	الفسفور الجاهز
215.0	ملغم . كغم ¹	البوتاسيوم الجاهز
220.0	غم . كغم ¹	الكلس
مفصولات التربة		
70.0	غم . كغم ¹	رمل
520.0	غم . كغم ¹	طين
410.0	غم . كغم ¹	غرين
Silty clay طينية غرينية		نسجة التربة

* تمت التحاليل في مختبرات تحليل التربة في كلية الزراعة – جامعة الكوفة .

وعند الحصاد تم اخذ القراءات التالية :

(1) معدل عدد الأفرع . نبات¹ (2) معدل ارتفاع النبات (سم) . (3) معدل عدد الأوراق . نبات¹ . (4) معدل مساحة ورقة العلم (سم²) .

حسب المعادلة التالية [16] :- المساحة الورقية (سم²) = 0.95 × طول الورقة (سم) × عرض الورقة (سم) .

(5) معدل الوزن الرطب للمجموع الخضري (غم) . (6) معدل الوزن الجاف للمجموع الخضري (غم) .

(7) معدل النمو المطلق للنبات الجاف (غم . يوم¹) تم حسابه بدلالة الوزن الجاف وفقاً للمعادلة التالية [17] :

$$AGR = \frac{(W2 - W1)}{(T2 - T1)}$$

حيث إن :-

W1 = الوزن الجاف للجزء الخضري عند الزمن الأول .

W2 = الوزن الجاف للجزء الخضري عند الزمن الثاني .

T1 = زمن أخذ العينة الأولى مقاسه باليوم .

T2 = زمن أخذ العينة الثانية مقاسه باليوم .

(8) معدل النمو النسبي للنبات الجاف (غم / غرام وزن جاف / يوم) وفقاً للمعادلة [17] .

$$R.G.R. = \frac{(\text{Loge } w_2 - \text{Loge } w_1)}{(T_2 - T_1)}$$

حيث إن :-

$\text{Loge } w_1$ = اللوغاريتم للوزن الجاف للعينة عند الزمن الأول .

$\text{Loge } w_2$ = اللوغاريتم للوزن الجاف للعينة عند الزمن الثاني .

T_1 = زمن اخذ العينة الأولى مقاسه باليوم .

T_2 = زمن اخذ العينة الثانية مقاسه باليوم .

تم تحليل النتائج إحصائياً ومقارنة المتوسطات باستعمال أقل فرق معنوي (L.S.D.) Least Significant Difference عند مستوي احتمال 0.05 حسب [18].

النتائج والمناقشة Results and Discussion

بينت النتائج إن للأصناف تأثيراً معنوياً في معدل عدد الأفرع ، إذ أعطى الصنف شام 6 أعلى معدل بلغ 5.5 فرع . نبات¹، بينما أعطى الصنف اباء 99 أقل معدل بلغ 4.5 فرع . نبات¹ (جدول 2) ، قد يعزى سبب التباين بين الأصناف في عدد الأفرع إلى اختلافاتها الوراثية وكذلك في طبيعة نموها ، إذ وجد إن صفة التفريع والتكبير في النضج هي من الخصائص المرتبطة بالتركيب الوراثي وتتاثر بدرجات متفاوتة بالبيئة المحيطة بها [19] . اتفقت هذه النتائج مع ما توصل إليه [9] في دراستهم على نبات الحنطة . كما إن تأثير الأصناف كان معنوياً أيضاً في صفة ارتفاع النبات ، إذ أعطى الصنف اباء 99 أعلى معدل بلغ 85.7 سم بينما أعطى الصنف شام 6 أقل معدل لارتفاع النبات بلغ 77.4 سم (جدول 3) ، قد يعود ذلك إلى اختلاف الأصناف فيما بينها في تركيبها الوراثي أو قد يعزى تباين الأصناف فيما بينها في صفة ارتفاع النبات إلى اختلافها وراثياً في طول السلاسل بين العقد وهي من الصفات المهمة التي تميز الأصناف عن بعضها في الارتفاع [20] . وهذا يتفق مع نتائج دراسة [1] من أن هناك اختلافات وراثية بين أصناف الحنطة في تأثيرها في الصفة أعلاه . أما بالنسبة لتأثير الأصناف في معدل عدد الأوراق فقد كان معنوياً هو الآخر حيث أعطى الصنف شام 6 أعلى معدل بلغ 28.2 ورقة . نبات¹ بينما أعطى الصنف اباء 99 أقل معدل بلغ 23.6 ورقة . نبات¹ (جدول 4) ، وما يؤيد ذلك فإن الأصناف التي أعطت أعلى معدل لعدد الأفرع (الجدول 2) قد أعطت أيضاً أعلى معدل لعدد الأوراق ، تتفق هذه نتائج مع ما توصل إليه [21] في دراسته على نبات الحنطة والتي أثبت فيها أن عدد الأوراق لنبات الحنطة يختلف باختلاف الصنف المزروع . كما إن تأثير الأصناف كان معنوياً أيضاً في تأثيره في صفة مساحة ورقة العلم، إذ أعطى الصنف اباء 99 أعلى معدل بلغ 39.3 سم² بينما أعطى الصنف شام 6 أقل معدل لهذه الصفة بلغ 34.3 سم² (جدول 5)، يتبين من هذه النتائج أن مساحة ورقة العلم تتناسب عكسياً مع عدد الأوراق (الجدول 4) وهذا ربما يعود إلى التنافس على المادة الغذائية المتوفرة ، كذلك قد يعزى ذلك إلى أن أصناف الحنطة تتباين فيما بينها في صفة مساحة ورقة العلم تبعاً لتباينها في التركيب الوراثي وهذا يتفق مع ما توصل إليه [22] إذ وجد أن هناك فروق معنوية بين أصناف الحنطة بالنسبة لتأثيرها في هذه الصفة . كما وجد أن هناك تأثيراً معنوياً للأصناف في صفة الوزن الطري للمجموع الخضري ، إذ أعطى الصنف فتح أعلى معدل بلغ 32.9 غم . نبات¹ ، بينما أعطى الصنف شام 6 أقل معدل للصفة سابقة الذكر بلغ 30.7 غم . نبات¹ (جدول 6) ، مما يدل على الاختلافات الوراثية بين الأصناف في هذه الصفة وتأثيرها الواضح عليها ، تتفق هذه النتائج مع ما توصل إليه [23] من أن اختلاف أصناف الحنطة في تأثيرها في معدل الوزن الطري للمجموع الخضري يعود إلى اختلافها في التركيب الوراثي . كذلك بينت النتائج أن للأصناف تأثيراً معنوياً في معدل الوزن الجاف للمجموع الخضري أيضاً ، إذ أعطى الصنف فتح أعلى معدل بلغ 10.3 غم . نبات¹، من جهة أخرى أعطى الصنف شام 6 أقل معدل للصفة السابق ذكرها بلغ 9.6 غم . نبات¹ (جدول 7) ، هذا يعني أن تأثير الأصناف في هذه الصفة يختلف تبعاً لتركيبها الوراثي ، اتفقت هذه النتائج مع دراسة [24] من أن أصناف الحنطة تختلف فيما بينها في تأثيرها في معدل الوزن الجاف للمجموع الخضري تبعاً لاختلافها في التركيب الوراثي . كما أن للأصناف تأثيراً معنوياً أيضاً في صفة النمو المطلق ، إذ أعطى الصنف فتح أعلى معدل بلغ 0.081 غم . يوم¹ ، بينما أعطى الصنف شام 6 أقل معدل والذي بلغ 0.074 غم . يوم¹ (جدول 8) ، مما يدل على أن التباين الوراثي بين الأصناف له تأثير في معدل النمو المطلق للنبات الجاف نتيجة لاختلاف الأصناف وراثياً في معدل الوزن الجاف (الجدول 7) [25] . اتفقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة [26] على نبات الذرة . كذلك كان للأصناف تأثيراً معنوياً في النمو النسبي أيضاً ، حيث أعطى الصنف فتح أعلى معدل بلغ 0.015 غم . غم وزن جاف¹ . يوم¹ ، بينما أعطى الصنف شام 6 أقل معدل للصفة سابقة الذكر بلغ 0.012 غم . غم وزن جاف¹ . نبات¹ (جدول 9) ، وهذا يتفق مع ما أشار إليه [27] من أن الأصناف تختلف فيما بينها في تأثيرها في الصفة أعلاه تبعاً لتركيبها الوراثي .

كما بينت النتائج أن هناك فروقاً معنوية بين تراكيز حامض البرولين في تأثيرها في معدل الصفات قيد الدراسة ، إذ تبين أن التركيز 20 ملغم . لتر¹ برولين كان الأفضل في تأثيره في تلك الصفات مقارنة بالتركيزين الآخرين (0 ، 40) ملغم . لتر¹ إذ أعطى زيادة في معدل عدد الأفرع قدرها 15.2 % ، 6.0 % على التوالي (جدول 2) . كما تفوق على التركيزين الآخرين في

تأثيره في معدل ارتفاع النبات بزيادة قدرها 7.0% ، 3.0% على التوالي (جدول 3) . كما أعطى زيادة في معدل عدد الأوراق قدرها 15.4% ، 4.1% على التوالي مقارنة مع التركيزين الآخرين أيضاً (جدول 4) . كما بينت النتائج في (جدول 5) أن الرش بتركيز 20 ملغم لتر⁻¹ برولين كان الأفضل في تأثيره في صفة مساحة ورقة العلم ، إذ تفوق على التركيزين الآخرين (0 و 40) ملغم لتر⁻¹ بزيادة مقدارها 16.2% ، 5.0% على التوالي . كما أعطى التركيز نفسه زيادة في الوزن الطري للمجموع الخضري قدرها 10.0% ، 6.0% على التوالي (جدول 6) . كما أعطى زيادة في معدل الوزن الجاف للمجموع الخضري قدرها 9.4% ، 6.1% على التوالي مقارنة مع التركيزين الآخرين أيضاً (جدول 7) . وأعطى زيادة في معدل النمو المطلق قدرها 10.7% ، 6.4% على التوالي مقارنة مع التركيزين الآخرين (جدول 8) . دلت النتائج السابقة على أن الرش بحامض البرولين قد أدى إلى زيادة معنوية في الصفات سابقة الذكر ، وهذا يدل على أن الرش بحامض البرولين أدى إلى زيادة في نمو النبات وهذا يعود إلى دوره الإيجابي في تنظيم الجهد الأوزموزي من خلال تنظيم الجهد الضغطي والجهد المائي مما يزيد من قابلية الخلية على سحب الماء من وسط النمو ومن ثم زيادة في نمو النبات وإدامة استطالة الخلايا وإدامة فتح الثغور وعملية التركيب الضوئي [28] ، وهذا يتفق مع ما توصل إليه [13 و 29] من أن الرش بحامض البرولين له دور إيجابي في زيادة نمو النبات وذلك لدوره الفعال في تعديل الجهد الأوزموزي للخلية النباتية . من جهة أخرى بينت النتائج الموضحة في (الجدول 9) أنه لا يوجد تأثير معنوي للرش بالبرولين في معدل النمو النسبي ، وهذا يجعل هذه النتائج مخالفة لما توصل إليه [12] الذي وجد أن للرش بحامض البرولين له تأثير إيجابي في تحسين نمو النبات ، ربما يعود ذلك إلى عدد مرات الرش بحامض البرولين ، فقد رشت نباتات الحنطة في هذه الدراسة مرتين بينما قام [12] برش النباتات ابتداءً من مرحلة الورقة الواحدة ولخمس مرات .

كما أشارت النتائج إلى وجود فروق معنوية بين مستويات السعة الحقلية في تأثيرها في الصفات الداخلة في الدراسة ، إذ تفوق المستوى 100% سعة حقلية على المستويين الآخرين 25% و 50% سعة حقلية في تأثيره في تلك الصفات ، إذ أعطى زيادة في معدل عدد الأفرع . نبات¹ قدرها 30.2% ، 9.8% على التوالي مقارنة بالمستويين الآخرين (جدول 2) ، قد يعود السبب في اختزال عدد الأفرع بتأثير الإجهاد المائي إلى فشل أو تأخر ظهورها من عقد البراعم الجانبية عند بداية نشوئها وإعاقة نمو ونشوء الجذور التاجية المهمة في تكوين الأفرع وتطورها [30] ، وهذا يتفق مع نتائج دراسة [31] من أن تأثير الرطوبة المحدودة للتربة يؤدي إلى تقليل عدد الأفرع في النبات . كما أعطى المستوى نفسه زيادة في معدل ارتفاع النبات قدرها 7.0% ، 3.0% على التوالي مقارنة بالمستويين الآخرين (جدول 3) ، ربما يعزى سبب اختزال ارتفاع النباتات عند تعرضها للإجهاد المائي إلى قلة انقسام خلايا الساق والأوراق وصغر حجمها نتيجة لانخفاض الجهد المائي فيها بسبب نقص جاهزية ماء التربة مما يؤدي إلى انخفاض كفاءة اعتراض وتحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة كيميائية وإنتاج المادة الجافة اللازمة لإتمام عملية الاستطالة [32] ، فضلاً عن تثبيط عمل الأوكسين ضوئياً والمسؤول عن السيادة القمية للساق [33] ، وتتفق هذه النتائج مع ما وجدته [34] من أن الشد المائي قد أدى إلى اختزال ارتفاع النبات لمحصول الحنطة ولاسيما عند التعرض له في مرحلة استطالة الساق . كذلك أعطى المستوى نفسه زيادة في معدل عدد الأوراق . نبات¹ والتي بلغت 64.0% ، 27.1% على التوالي مقارنة بالمستويين الآخرين (جدول 4) ، إن نقص عدد أوراق النبات بصفة عامة عند تعرضه للإجهاد المائي يعزى إلى ذبول الأوراق السفلى وسقوطها بسبب نقص الماء لأن سقوط الأوراق يعد وسيلة دفاعية تمكن النبات من تقليل النتج [35] . مما يجعل هذه النتائج متفقة مع ما توصل إليه [36] من أن انخفاض رطوبة التربة قد أدى إلى انخفاض واضح في عدد الأوراق لاسيما في بدء حياة النبات . كذلك أعطى زيادة في معدل مساحة ورقة العلم قدرها 50.9% ، 10.1% على التوالي مقارنة مع المستويين الآخرين (جدول 5) ، اتفقت هذه النتائج مع ما توصل إليه [37] من أن الشد المائي خلال مراحل النمو الخضري يؤدي إلى تقليل مقدرة الخلايا على الانتفاخ والاستطالة واختزال حجمها ومن ثم اختزال المساحة الورقية للنبات تبعاً لمستوى الشد المائي . كما أعطى زيادة في معدل الوزن الطري للمجموع الخضري قدرها 61.0% ، 24.0% على التوالي مقارنة مع المستويين الآخرين (جدول 6) ، قد يعزى ذلك نتيجة لتأثير العمليات الحيوية ومنها عملية البناء الضوئي بالإضافة إلى قلة امتصاص العناصر الضرورية في العمليات الحيوية هذا بالإضافة إلى التأثير المباشر لانخفاض محتوى التربة من الماء الجاهز مما يؤدي إلى إعاقة النمو الطبيعي [4] . اتفقت هذه النتائج مع ما توصلت إليه [38] من أن الوزن الطري للنبات ينخفض مع انخفاض المحتوى الرطوبي للتربة . كما أعطى زيادة في معدل الوزن الجاف للمجموع الخضري قدرها 41.0% ، 17.0% على التوالي مقارنة مع المستويين الآخرين (جدول 7) ، ويعزى السبب في انخفاض الوزن الجاف نتيجة لتأثير العمليات الحيوية ومنها عملية البناء الضوئي بالإضافة إلى قلة امتصاص العناصر الضرورية في العمليات الحيوية هذا بالإضافة إلى التأثير المباشر لانخفاض محتوى التربة من الماء الجاهز مما يؤدي إلى إعاقة النمو الطبيعي للنبات وقلة تراكم المادة الجافة [38] ، وأعطى زيادة في معدل النمو المطلق والتي بلغت 29.4% ، 11.4% على التوالي مقارنة مع المستويين الآخرين (جدول 8) ، مما يدل على أن مستويات الإجهاد المائي المنخفضة تؤثر تأثيراً سلبياً في معدل الصفة أعلاه لأنها تخفض من نمو النبات من خلال خفض عدد الأفرع (جدول 2) وارتفاع النبات (جدول 3) وعدد الأوراق (جدول 4) والمساحة الورقية (جدول 5) وهذا يتفق مع نتائج دراسة [26] من أن الإجهاد المائي قد خفض من نمو نباتات الحنطة . كذلك أعطى نفس المستوى زيادة في معدل النمو النسبي مقدارها 15.4% ، 7.1% على التوالي مقارنة مع المستويين الآخرين (جدول 9) ، وهذا يدل على أن مستويات الإجهاد المائي المنخفضة تؤثر تأثيراً سلبياً في معدل الصفة سابقة الذكر ، وهذا يتفق مع نتائج دراسة [26] من أن الإجهاد المائي قد خفض من نمو نباتات الحنطة .

أوضحت التداخلات الثنائية بين كل من الصنف وتركيز البرولين أن هناك فروقاً معنوية في تأثيرها في الصفات المدروسة ، حيث أعطى الصنف شام 6 المستلم 20 ملغم لتر⁻¹ برولين أعلى معدل لعدد الأفرع بلغ 5.9 فرع . نبات¹ ، بينما أعطى الصنف اباء 99 والذي لم يعامل بالبرولين أقل معدل لهذه الصفة بلغ 4.1 فرع . نبات¹ (جدول 2) . أعطى الصنف فتح المستلم 20 ملغم .

لتر⁻¹ برولين أعلى معدل لارتفاع النبات بلغ 88.3 سم ، بينما أعطى الصنف شام 6 والذي لم يعامل بالبرولين أقل معدل بلغ 75.0 سم (جدول 3) . أعطى الصنف شام 6 المستلم 20 ملغم . لتر⁻¹ برولين أعلى معدل لعدد الأوراق حيث بلغ 30.0 ورقة . نبات⁻¹ ، بينما أعطى الصنف إباء 99 والذي لم يعامل بالبرولين أقل معدل بلغ 21.6 ورقة . نبات⁻¹ (جدول 4) . وأعطى الصنف إباء 99 المستلم 20 ملغم . لتر⁻¹ برولين أعلى معدل لمساحة ورقة العلم حيث بلغ 41.4 سم² ، بينما أعطى الصنف شام 6 والذي لم يعامل بالبرولين أقل معدل لهذه الصفة بلغ 32.0 سم (جدول 5) . وأعطى الصنف فتح المستلم 20 ملغم . لتر⁻¹ برولين أعلى معدل للوزن الطري للمجموع الخضري حيث بلغ 34.7 غم . نبات⁻¹ ، بينما أعطى الصنف شام 6 عند عدم معاملته بالبرولين أقل معدل لهذه الصفة بلغ 29.2 غم . نبات⁻¹ (جدول 6) . وأعطى الصنف فتح المستلم 20 ملغم . لتر⁻¹ برولين أعلى معدل للوزن الجاف للمجموع الخضري بلغ 10.8 غم . نبات⁻¹ ، بينما أعطى الصنف شام 6 عند عدم معاملته بالبرولين أقل معدل لهذه الصفة بلغ 9.1 غم . نبات⁻¹ (جدول 7) . أعطى الصنفان فتح وإباء 99 المستلمان 20 ملغم . لتر⁻¹ برولين أعلى معدل للنمو المطلق بلغ 0.085 غم . يوم⁻¹ ، بينما أعطى الصنف شام 6 عند عدم معاملته بالبرولين أقل معدل لهذه الصفة بلغ 0.071 غم . يوم⁻¹ (جدول 8) . أعطى الصنف فتح المستلم 20 ملغم . لتر⁻¹ برولين أعلى معدل للنمو النسبي إذ بلغ 0.015 غم . غم وزن جاف⁻¹ . يوم⁻¹ ، بينما أعطى الصنف شام 6 عند عدم معاملته بالبرولين أقل معدل لهذه الصفة بلغ 0.011 غم . غم وزن جاف⁻¹ . يوم⁻¹ (جدول 9) . يمكن أن نستنتج من النتائج المشار إليها سابقاً أن أصناف الحنطة تختلف فيما بينها في استجابتها للرش بحامض البرولين وذلك تبعاً للتركيب الوراثي لها ، وهذا يتفق مع نتائج [12] في دراستهم على نبات الذرة الصفراء من أن التركيب الوراثي للصنف يلعب دوراً فعالاً في استجابته للرش بحامض البرولين .

كما أوضحت التداخلات الثنائية بين الصنف والسعة الحقلية أن هناك فروقاً معنوية في تأثيرها في هذه الصفات أيضاً ، إذ أعطى الصنف شام 6 بسعة حقلية 100 % أعلى معدل لعدد الأفرع بلغ 6.1 فرع . نبات⁻¹ ، بينما أعطى الصنف إباء 99 بسعة حقلية 25 % أقل معدل لهذه الصفة بلغ 3.7 فرع . نبات⁻¹ (جدول 2) ، وهذا يتفق مع ما وجدته [20] في دراستها من أن أصناف الحنطة تختلف فيما بينها في مقدرتها على التفريع تحت ظروف الإجهاد المائي فضلاً عن اختلاف مقدرة الأصناف في المحافظة على ديمومة بقاء الأفرع المنتجة حديثاً وإمدادها بالمواد الغذائية اللازمة لإكمال نموها تحت ظروف الشد المائي . كما أعطى الصنف فتح بسعة حقلية 100 % أعلى معدل لارتفاع النبات بلغ 95.7 سم ، بينما أعطى الصنف شام 6 بسعة حقلية 25 % أقل معدل لهذه الصفة بلغ 65.5 سم (جدول 3) ، ويعزى سبب تباين الأصناف في ارتفاعها تحت ظروف الإجهاد المائي إلى اختلاف تحملها بسبب اختلافها في تركيبها الوراثي ، وهذا يتفق مع ما توصل إليه [39] بوجود اختلافات بين أصناف الحنطة في هذه الصفة بتأثير كمية مياه الري . كما إن الصنف شام 6 بسعة حقلية 100 % قد أعطى أعلى معدل لعدد الأوراق بلغ 36.7 ورقة . نبات⁻¹ ، في حين أعطى الصنف إباء 99 بسعة حقلية 25 % أقل معدل لهذه الصفة بلغ 18.3 ورقة . نبات⁻¹ (جدول 4) . كما بينت النتائج أن الصنف إباء 99 بسعة حقلية 100 % أعطى أعلى معدل لمساحة ورقة العلم بلغ 47.8 سم² ، بينما أعطى الصنفان فتح وعدنانية بسعة حقلية 25 % أقل معدل لهذه الصفة بلغ 26.0 سم² لكل منهما (جدول 5) . كما أعطى الصنف فتح بسعة حقلية 100 % أعلى معدل للوزن الطري للمجموع الخضري بلغ 42.5 غم . نبات⁻¹ ، بينما أعطى الصنف شام 6 بسعة حقلية 25 % أقل معدل لهذه الصفة بلغ 22.8 غم . نبات⁻¹ (جدول 6) . كما أن الصنف فتح بسعة حقلية 100 % قد أعطى أعلى معدل للوزن الجاف للمجموع الخضري بلغ 12.5 غم . نبات⁻¹ ، بينما أعطى الصنف شام 6 بسعة حقلية 25 % أقل معدل لهذه الصفة والذي بلغ 7.7 غم . نبات⁻¹ (جدول 7) . كما أعطى الصنف إباء 99 بسعة حقلية 100 % أعلى معدل للنمو المطلق بلغ 0.089 غم . يوم⁻¹ ، من جهة أخرى أعطى نفس الصنف وبسعة حقلية 25 % أقل معدل لهذه الصفة بلغ 0.070 غم . يوم⁻¹ (جدول 8) . كما أعطى الصنف إباء 99 بسعة حقلية 100 % أعلى معدل للنمو النسبي بلغ 0.015 غم . غم وزن جاف⁻¹ . يوم⁻¹ ، بينما أعطى الصنف شام 6 بسعة حقلية 25 % أقل معدل لهذه الصفة بلغ 0.012 غم . غم وزن جاف⁻¹ . يوم⁻¹ (جدول 9) . لقد دلت النتائج السابقة على أن الأصناف تتباين فيما بينها في درجة استجابتها لمستويات الإجهاد المائي وذلك تبعاً للتركيب الوراثي لها ، وهذا يجعل هذه النتائج متفقة مع ما توصل إليه [26] في دراسته على نبات الحنطة من أن التركيب الوراثي للصنف يلعب دوراً كبيراً في مدى استجابته للإجهاد المائي .

كما أوضحت التداخلات الثنائية بين تركيز البرولين والسعة الحقلية أن هناك فروقاً معنوية في تأثيرها في الصفات قيد الدراسة أيضاً ، إذ أعطت المعاملة بتركيز البرولين 20 ملغم . لتر⁻¹ وبسعة حقلية 100 % أعلى معدل للصفات : عدد الأفرع . نبات⁻¹ (جدول 2) ، ارتفاع النبات (جدول 3) ، عدد الأوراق . نبات⁻¹ (جدول 4) ، مساحة ورقة العلم (جدول 5) ، الوزن الطري للمجموع الخضري (جدول 6) ، الوزن الجاف للمجموع الخضري (جدول 7) ، النمو المطلق (جدول 8) ، النمو النسبي (جدول 9) بلغت : 5.9 فرع . نبات⁻¹ ، 94.9 سم ، 34.8 ورقة . نبات⁻¹ ، 47.8 سم² ، 15.6 غم . نبات⁻¹ ، 41.7 غم . نبات⁻¹ ، 0.092 غم . يوم⁻¹ ، 0.015 غم . غم وزن جاف⁻¹ . يوم⁻¹ على التوالي . بينما أعطت المعاملة بتركيز 0 ملغم . لتر⁻¹ و 100 % سعة حقلية أقل معدل للصفات المذكورة بلغ : 4.0 فرع . نبات⁻¹ ، 70.6 سم ، 18.7 ورقة . نبات⁻¹ ، 25.8 سم² ، 9.5 غم . نبات⁻¹ ، 23.0 غم . نبات⁻¹ ، 0.065 غم . يوم⁻¹ ، 0.011 غم . غم وزن جاف⁻¹ . يوم⁻¹ على التوالي ، دلت هذه النتائج على أن الرش بحامض البرولين قد حسن من الصفة أعلاه في كل مستويات السعة الحقلية وهذا يتفق مع نتائج دراسة [13] على نبات الحنطة من أن الرش بحامض البرولين قد حسن من نمو النبات في كافة درجات الإجهاد الاوزموزي .

أما بالنسبة للتداخل الثلاثي بين عوامل الدراسة فقد كان هو الآخر مؤثراً معنوياً في هذه الصفات ماعدا النمو المطلق إذ لم يكن له تأثير معنوي في هذه الصفة (جدول 8) . إذ أعطت الأصناف عند تركيز 20 ملغم . لتر⁻¹ برولين وبسعة حقلية 100 %

أعلى معدل للصفات (عدد الأفرع ، ارتفاع النبات ، عدد الأوراق ، مساحة ورقة العلم ، الوزن الطري للمجموع الخضري ، الوزن الجاف للمجموع الخضري ، النمو النسبي) ، فقد أعطى شام 6 أعلى معدل لعدد الأفرع بلغ 6.5 فرع . نبات¹ (جدول 2) ، وأعطى الصنف فتح أعلى معدل لارتفاع النبات بلغ 98.7 سم (جدول 3) ، وأعطى الصنف شام 6 أعلى معدل لعدد الأوراق بلغ 39.1 ورقة . نبات¹ (جدول 4) ، كما أعطى الصنف اباء 99 أعلى معدل لمساحة ورقة العلم بلغ 50.8 سم² (جدول 5) ، كما أعطى الصنف فتح أعلى معدل للوزن الطري للمجموع الخضري بلغ 44.5 غم . نبات¹ (جدول 6) ، وأعطى الصنف فتح أعلى معدل للوزن الجاف للمجموع الخضري بلغ 13.1 غم . نبات¹ (جدول 7) ، وأعطى الصنف اباء 99 أعلى معدل للنمو المطلق بلغ 0.015 غم . غم وزن جاف¹ . يوم¹ (جدول 9) . من جهة أخرى أعطى التداخل الثلاثي بين الأصناف وتركيز 0 ملغم . لتر¹ برولين و 25% سعة حقلية أقل معدل للصفات المذكورة أعلاه ، حيث أعطى الصنف اباء 99 أقل معدل لعدد الأفرع بلغ 3.4 فرع . نبات¹ (جدول 2) ، وأعطى الصنف شام 6 أقل معدل لارتفاع النبات بلغ 63.5 سم (جدول 3) ، وأعطى الصنف فتح أقل معدل لعدد الأوراق بلغ 16.9 ورقة . نبات¹ (جدول 4) ، وأعطى الصنف عدنانية أقل معدل لمساحة ورقة العلم بلغ 23.0 سم² (جدول 5) ، كما أعطى الصنف شام 6 أقل معدل للوزن الطري للمجموع الخضري بلغ 21.1 غم . نبات¹ (جدول 6) ، وأعطى الصنف شام 6 أقل معدل للوزن الجاف للمجموع الخضري بلغ 7.2 غم . نبات¹ (جدول 7) ، كما أعطى الصنف شام 6 أيضاً أقل معدل للنمو النسبي بلغ 0.011 غم . غم وزن جاف¹ . يوم¹ (جدول 9) .

جدول (2) : تأثير الصنف ، تركيز البرولين ، السعة الحقلية والتداخلات بينها في معدل عدد الأفرع . نبات¹ لنبات الحنطة .

الصنف	تركيز البرولين ملغم.لتر ¹	السعة الحقلية (%)			الصنف × تركيز البرولين
		25	50	100	
فتح	0	4.1	4.9	5.3	4.8
	20	4.5	5.5	5.8	5.3
	40	4.4	5.2	5.6	5.0
عدنانية	0	4.0	4.6	5.2	4.6
	20	4.4	5.4	5.8	5.2
	40	4.2	5.1	5.6	5.0
إباء 99	0	3.4	4.3	4.7	4.1
	20	3.9	5.0	5.5	4.8
	40	3.7	4.7	5.3	4.6
شام 6	0	4.6	5.0	5.6	5.1
	20	5.2	6.0	6.5	5.9
	40	4.9	5.7	6.5	5.6
LSD (0.05)	0.370				0.214
معدل تأثير السعة الحقلية		4.3	5.1	5.6	معدل تأثير الصنف
LSD (0.05)	0.107				
الصنف × السعة الحقلية	فتح	4.3	5.2	5.6	5.0
	عدنانية	4.2	5.1	5.5	4.9
	إباء 99	3.7	4.7	5.1	4.5
	شام 6	4.9	5.6	6.1	5.5
LSD (0.05)	0.214				0.123
					معدل تأثير تركيز البرولين
تركيز البرولين × السعة الحقلية	0	4.0	4.7	5.2	4.6
	20	4.7	5.5	5.9	5.3
	40	4.3	5.2	5.7	5.0
LSD (0.05)	0.185				0.107

جدول (3) : تأثير الصنف ، تركيز البرولين ، السعة الحقلية والتدخلات بينها في معدل ارتفاع النبات (سم) لنبات الحنطة .

الصنف	تركيز البرولين ملغم.لتر ⁻¹	السعة الحقلية (%)			الصنف × تركيز البرولين
		25	50	100	
فتح	0	71.2	78.7	91.9	80.6
	20	82.0	84.2	98.7	88.3
	40	79.2	81.6	96.5	85.8
عدنانية	0	72.7	78.2	90.9	80.6
	20	79.9	82.1	95.1	85.7
	40	76.7	80.4	93.1	83.4
إباء 99	0	75.3	83.4	91.6	83.4
	20	80.4	86.3	97.3	88.0
	40	77.4	85.1	94.5	85.7
شام 6	0	63.5	78.0	83.7	75.0
	20	67.9	83.5	88.7	80.1
	40	65.0	80.5	85.9	77.1
LSD (0.05)	3.57				2.06
معدل تأثير السعة الحقلية		74.3	81.8	92.3	معدل تأثير الصنف
LSD (0.05)	1.03				
الصنف × السعة الحقلية	فتح	77.5	81.5	95.7	84.9
	عدنانية	76.4	80.3	53.0	83.2
	إباء 99	77.7	85.0	94.5	85.7
	شام 6	65.5	80.7	86.1	77.4
LSD (0.05)	2.06				1.19
					معدل تأثير تركيز البرولين
تركيز البرولين × السعة الحقلية	0	70.6	79.6	89.5	79.9
	20	77.6	84.0	94.9	85.5
	40	74.6	81.9	92.5	83.0
LSD (0.05)	1.78				1.03

جدول (4) : تأثير الصنف ، تركيز البرولين ، السعة الحقلية والتدخلات بينها في معدل عدد الأوراق، نبات¹- لنبات الحنطة .

الصنف	تركيز البرولين ملغم/لتر ¹	السعة الحقلية (%)			الصنف × تركيز البرولين
		25	50	100	
فتح	0	20.5	24.5	30.6	25.2
	20	22.6	28.0	34.5	28.4
	40	21.8	26.7	34.0	27.5
عدنانية	0	19.0	22.8	28.6	23.4
	20	21.5	27.1	34.8	27.8
	40	20.7	25.9	33.3	26.6
إباء 99	0	16.9	21.4	26.4	21.6
	20	19.4	25.0	30.9	25.1
	40	18.5	23.8	29.7	24.0
شام 6	0	18.4	24.9	33.8	25.7
	20	21.0	30.0	39.1	30.0
	40	19.7	28.7	37.4	28.6
LSD (0.05)	3.94				2.27
معدل تأثير السعة الحقلية		20.0	25.8	32.8	معدل تأثير الصنف
LSD (0.05)	1.14				
الصنف × السعة الحقلية	فتح	21.6	26.4	33.0	27.0
	عدنانية	20.4	25.2	32.2	26.0
	إباء 99	18.3	23.4	29.0	23.6
	شام 6	19.7	27.8	36.7	28.2
LSD (0.05)	2.27				1.31
					معدل تأثير تركيز البرولين
تركيز البرولين × السعة الحقلية	0	18.7	23.4	29.8	24.1
	20	21.1	27.5	34.8	27.8
	40	20.2	26.2	33.6	26.7
LSD (0.05)	1.97				1.14

جدول (5) : تأثير الصنف، تركيز البرولين، السعة الحقلية والتداخلات بينها في معدل مساحة ورقة العلم (سم²) لنبات الحنطة .

الصنف	تركيز البرولين ملغم.لتر ⁻¹	السعة الحقلية (%)			الصنف ×
		25	50	100	تركيز البرولين
فتح	0	23.1	37.9	41.7	34.2
	20	28.5	42.0	49.3	39.9
	40	26.4	40.3	47.6	38.1
عدنانية	0	23.0	36.7	41.0	33.6
	20	28.3	44.0	48.6	40.3
	40	26.6	42.0	47.4	38.7
إباء 99	0	30.4	35.1	44.6	36.7
	20	33.5	39.9	50.8	41.4
	40	32.8	38.4	48.0	39.7
شام 6	0	26.5	32.6	37.0	32.0
	20	29.7	37.6	42.6	36.6
	40	27.8	35.4	39.6	34.3
LSD (0.05)	3.07				1.77
معدل تأثير السعة الحقلية		28.1	38.5	42.4	معدل تأثير الصنف
LSD (0.05)	0.89				
الصنف × السعة الحقلية	فتح	26.0	40.1	44.5	37.4
	عدنانية	26.0	40.9	45.6	37.5
	إباء 99	32.2	38.6	47.8	39.3
	شام 6	28.0	35.2	39.7	34.3
LSD (0.05)	1.77				1.02
					معدل تأثير تركيز البرولين
تركيز البرولين × السعة الحقلية	0	25.8	35.6	41.1	34.1
	20	30.0	40.8	47.8	39.6
	40	28.4	39.0	45.6	37.7
LSD (0.05)	1.53				0.89

جدول (6) : تأثير الصنف ، تركيز البرولين ، السعة الحقلية والتدخلات بينها في معدل الوزن الطري (غم . نبات¹) للمجموع الخضري (الساق والأوراق) عند الحصاد لنبات الحنطة .

الصنف	تركيز البرولين ملغم.لتر ¹	السعة الحقلية (%)			الصنف × تركيز البرولين
		25	50	100	
فتح	0	22.9	30.4	40.9	31.4
	20	26.9	32.8	44.5	34.7
	40	24.7	31.3	42.2	32.7
عدنانية	0	23.9	29.9	37.2	30.3
	20	26.9	33.2	39.8	33.3
	40	25.5	31.3	38.4	31.7
إباء 99	0	24.1	31.5	38.3	31.3
	20	26.3	35.3	41.7	34.4
	40	24.8	33.1	38.6	32.2
شام 6	0	21.1	29.8	36.7	29.2
	20	25.0	33.1	39.6	32.6
	40	22.5	30.7	37.8	30.3
LSD (0.05)	2.76				1.60
معدل تأثير السعة الحقلية		24.6	31.9	39.7	معدل تأثير الصنف
LSD (0.05)	0.80				
الصنف × السعة الحقلية	فتح	24.8	31.5	42.5	32.9
	عدنانية	25.4	31.5	38.4	31.8
	إباء 99	25.0	33.3	39.5	32.6
	شام 6	22.8	31.2	38.1	30.7
LSD (0.05)	1.60				0.92
					معدل تأثير تركيز البرولين
تركيز البرولين × السعة الحقلية	0	23.0	30.4	38.3	30.6
	20	26.3	33.6	41.7	33.7
	40	24.4	31.6	39.2	31.7
LSD (0.05)	1.38				0.80

جدول (7) :تأثير الصنف، تركيز البرولين، السعة الحقلية والتدخلات بينها في الوزن الجاف (غم . نبات¹) للمجموع الخضري (ساق وأوراق) لنبات الحنطة .

الصنف	تركيز البرولين ملغم.لتر ¹	السعة الحقلية (%)			الصنف ×
		25	50	100	تركيز البرولين
فتح	0	7.8	9.5	12.1	9.8
	20	9.1	10.2	13.1	10.8
	40	8.4	9.8	12.4	10.2
عدنانية	0	8.1	9.4	11.0	9.5
	20	9.1	10.4	11.7	10.4
	40	8.6	9.8	11.3	9.9
إباء 99	0	8.2	9.9	11.3	9.8
	20	8.9	11.1	12.2	10.7
	40	8.4	10.4	11.4	10.0
شام 6	0	7.2	9.3	10.9	9.1
	20	8.5	10.4	11.7	10.2
	40	7.6	9.6	11.3	9.4
LSD (0.05)	0.863				0.498
معدل تأثير السعة الحقلية		8.3	10.0	11.7	معدل تأثير الصنف
LSD (0.05)	0.249				
الصنف × السعة الحقلية	فتح	8.4	9.8	12.5	10.3
	عدنانية	8.6	9.8	11.3	9.9
	إباء 99	8.5	10.4	11.6	10.2
	شام 6	7.7	9.8	11.2	9.6
LSD (0.05)	0.498				0.288
					معدل تأثير تركيز البرولين
تركيز البرولين × السعة الحقلية	0	7.8	9.5	11.3	9.6
	20	8.8	10.5	12.2	10.5
	40	8.3	9.9	11.5	9.9
LSD (0.05)	0.432				0.249

جدول (8) : تأثير الصنف ، تركيز البرولين ، السعة الحقلية والتداخلات بينها في معدل النمو المطلق (غم . يوم⁻¹)
لنبات الحنطة .

الصنف	تركيز البرولين ملغم.لتر ¹⁻	السعة الحقلية (%)			الصنف × تركيز البرولين
		25	50	100	
فتح	0	0.067	0.075	0.088	0.077
	20	0.075	0.083	0.098	0.085
	40	0.070	0.080	0.095	0.082
عدنانية	0	0.067	0.075	0.083	0.075
	20	0.075	0.080	0.088	0.081
	40	0.070	0.077	0.085	0.078
إباء 99	0	0.067	0.077	0.085	0.077
	20	0.072	0.088	0.095	0.085
	40	0.070	0.083	0.088	0.078
شام 6	0	0.057	0.073	0.083	0.071
	20	0.067	0.083	0.088	0.079
	40	0.057	0.075	0.085	0.073
LSD (0.05)	N.S.				0.0051
معدل تأثير السعة الحقلية		0.068	0.079	0.088	معدل تأثير الصنف
LSD (0.05)	0.0026				
الصنف × السعة الحقلية	فتح	0.071	0.079	0.093	0.081
	عدنانية	0.071	0.078	0.085	0.078
	إباء 99	0.070	0.083	0.089	0.080
	شام 6	0.061	0.077	0.085	0.074
LSD (0.05)	0.0051				0.0030
					معدل تأثير تركيز البرولين
تركيز البرولين × السعة الحقلية	0	0.065	0.075	0.084	0.075
	20	0.073	0.083	0.092	0.083
	40	0.067	0.079	0.088	0.078
LSD (0.05)	0.0044				0.0026

جدول (9) : تأثير الصنف ، تركيز البرولين ، السعة الحقلية والتداخلات بينها في معدل النمو النسبي (غم . غرام وزن جاف¹ - يوم¹) لنبات الحنطة .

الصنف	تركيز البرولين ملغم.لتر ¹	السعة الحقلية (%)			الصنف ×
		25	50	100	تركيز البرولين
فتح	0	0.013	0.014	0.014	0.013
	20	0.014	0.014	0.014	0.015
	40	0.013	0.014	0.014	0.014
عدنانية	0	0.013	0.014	0.014	0.013
	20	0.014	0.014	0.014	0.014
	40	0.014	0.014	0.014	0.014
إباء 99	0	0.013	0.014	0.014	0.014
	20	0.014	0.014	0.015	0.014
	40	0.014	0.014	0.014	0.014
شام 6	0	0.011	0.012	0.012	0.011
	20	0.013	0.013	0.013	0.013
	40	0.012	0.012	0.012	0.012
LSD (0.05)	0.0006				0.0004
معدل تأثير السعة الحقلية		0.013	0.014	0.015	معدل تأثير الصنف
LSD (0.05)	0.0002				
الصنف × السعة الحقلية	فتح	0.013	0.014	0.014	0.015
	عدنانية	0.014	0.014	0.014	0.014
	اباء 99	0.014	0.014	0.015	0.014
	شام 6	0.012	0.012	0.012	0.012
LSD (0.05)	0.0004				0.0001
					معدل تأثير تركيز البرولين
تركيز البرولين × السعة الحقلية	0	0.011	0.013	0.013	0.014
	20	0.013	0.014	0.015	0.014
	40	0.012	0.013	0.014	0.014
LSD (0.05)	0.0003				N.S.

المصادر :

- 1- اليونس ، عبد الحميد احمد ومحفوظ عبد القادر محمد وزكي عبد الياس (1987) . محاصيل الحبوب . مديرية الكتب للطباعة والنشر – جامعة الموصل .
- 2- Rajaram, S. ; Singh, R.P. and Gnkel, M. (2000) . Breeding wheat for wide adaptation, rust resistance and drought tolerance-Research signpost Trivendum, India :139-163.
- 3- المنظمة العربية للتنمية الزراعية (2001) . الكتاب السنوي للإحصاءات الزراعية العربية ، جامعة الدول العربية . المجلد 21 .
- 4- Boyer, J. S. (1982) . Plant productivity and environment . Science J., 218 (4571): 443 – 448 .
- 5- Oweis, T. ; Zhang, H. and Pala, M. (2000) . Water use efficiency of rainfed and irrigated bread wheat in Mediterranean environments. Agron. J., 92: 231-238.
- 6- Isendahl, N. and Schmidt, G. (2006). Drought in the Mediterranean-WWF Policy Proposals, A. WWF Report, Madrid.
- 7- Balibera , M. M. ; Bolarin, C. and Franciso, P. A. (1999). Osmotic treatment in tomato seedling induces salt-adaptation in adult plant .Aust. J. Plant Physiol., 26 : 781 – 786 .
- 8- Tatar, O. and Gevrek, M.N. (2008) . Influence of water stress on proline accumulation , lipid peroxidation and water content of wheat. Asian J. Plant Sci., 7(4): 409-412.
- 9- Johari-Pirevatlou, M. ; Qasimov, N. and Maralia, H. (2010) . Effect of soil water stress on yield and proline content of four wheat lines . African J. of Biotechnology, 9(1):36-40.
- 10- Boggess, S. F. and Stewart, C. R. (1976). Effect of water stress on proline synthesis from radioactive precursore . Plant Physiol., 58: 398-401.
- 11- Ali, Q. ; Ashraf, M. ; Shahbaz, M. and Humera, H. (2008). Ameliorating effect of foliar applied proline on nutrient uptake in water stressed maize (*Zea mays* L.) plants . Pak. J. Bot., 40(1): 211-219.
- 12- Abd El-Samad, H. M. ; Shaddad, A. K. and Barakat, N. (2010) . The role of amino acids in improvement in salt tolerance of crop plants . J. of Stress Physiol. and Biochem., 6(3) : 26-37.
- 13- القزاز ، امل غانم محمود (2010) . تأثير الرش بحامض البرولين في تحمل نبات الحنطة (*Triticum aestivum* L.) المروي بمياه مالحة .رسالة ماجستير ، كلية التربية (ابن الهيثم) ، جامعة بغداد - العراق .
- 14- Sutcliffe, J. (1979). Plants and Water . Studies in Biology no. 14. 2nd ed. Pp. 122 .
- 15- الصيمري ، خنساء عبدالعالي شهيد (2009) . دراسة بيئية عن تأثير نسجة التربة وموعد الزراعة في النمو والحالة الغذائية لخمسة اصناف من الحنطة (*Triticum aestivum* L.) . رسالة ماجستير ، كلية التربية – جامعة كربلاء – العراق .
- 16- Rawnsdon, H.M. and Evans, L.T. (1970) . The pattern of grain growth within the ear of wheat. Aust. J. Biol. Sci. 23:753-763.
- 17- Hunt , R . (1978) . Plant Growth Analysis . Studies in Biol. No. 96. Edward Arnold (Publ.) Ltd., London .
- 18- الراوي ، خاشع محمود و عبد العزيز محمد خلف الله ، 1980 . تصميم وتحليل التجارب الزراعية .مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل ، العراق .
- 19- Evans, L. T. 1993. Evaluation Adaptation and Yield . Cambridge University press.
- 20- محمد ، هناء حسن (2000) . صفات نمو وحاصل ونوعية أصناف من حنطة الخبز بتأثير موعد الزراعة . أطروحة دكتوراه ، كلية الزراعة ، جامعة بغداد - العراق .
- 21- Chonan , N. (1971). Effect of temperature on the mesophyll structure of leaves in wheat and rice . Proc. Crop. Soc. Japan, 40:425-430.
- 22- الحسن ، محمد فوزي حمزة (2007) . نمو وقابلية التفريع لخمسة اصناف من الحنطة (*Triticum aestivum* L.) بتأثير موعد الزراعة وعلاقته بحاصل الحبوب ومكوناته . رسالة ماجستير ، كلية الزراعة ، جامعة بغداد - العراق .
- 23- Nouri, A. ; Etminan, A. ; Teixeira Da Silva, J.A. and Mohammadi, R. (2011) . Assessment of yield, yield-related traits and drought tolerance of durum wheat genotypes (*Triticum turgidum* var. durum desf.). Australian J. of Crop Sci., 5(1):8-16.
- 24- Ghamarnia, H. and Gowing, J. (2005) . Effect of water stress on three wheat cultivars . ICID 21st European Regional Conference, 4(2):15-19 .

- 25- الدليمي ، بشير حمد عبد الله ، نصر حامد عيود وعبد الصمد هاشم (2003) . دراسة بعض الصفات المظهرية والفسلجية لثمانى اصناف من حنطة الخبز (*Triticum aestivum* L.) . مجلة تكريت للعلوم الزراعية ، المجلد 3 ، العدد (7) .
- 26- Sial, M.A. ; Dahot, M.U. ; Arain, M.A. and Mirbahar, A.A. (2009) . Effect of water stress on yield and yield component of semi-dwarf bread wheat (*Triticum aestivum* , L.) . Pak. J. Bot., 41(4): 1715-1728.
- 27- Brown , P and Campbell, R. (1966) . Fertilizing dry land spring and winter wheat in the brown soil zone. J. Agron., 58:348-351.
- 28- ياسين ، بسام طه (1992) . فسلجة الشد المائي في النباتات . دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل – العراق .
- 29- Ali, Q. ; Ashraf, M. and Athar, H. U. (2007) . Exogenously applied proline at different growth stages enhances growth of two maize cultivars grown under water deficit conditions . Pak. J. Bot., 39(4): 1133-1144.
- 30- Hucl, P. and Bakerm, R. J. (1989). Tiller number and yield of spring wheat in a semiarid environment . Crop. Sci., 29(3):631-638 .
- 31- Zamani, A.S.; Zadeh, H.T. ; Ebrahimi, R. ; Tarakkoli, A. and Abedi, M.S. (2004) . The effect of the seed rate on the grain yield of new rainfed wheat Cultivars at west and north west of Iran. The Joint Agriculture and Natural Resources Symposium Tabriz-Ganja, May 14-16.
- 32- المعماري ، بشرى خليل شاكر (2000) . تأثير الشد المائي على ثبات الغشاء الخلوي ودالة الانقسام المايوتوزي في صنفين من الحنطة ، مجلة التربية والعلم ، 40 : 11 – 19.
- 33- عيسى ، طالب أحمد (1990) . فسيولوجيا نباتات المحاصيل الحقلية . وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، جامعة بغداد – العراق .
- 34- Ismail, M. I.; M. Duwayri and O. Kafawin. 1999. Effect of water stress on growth and productivity of different durum wheat crosses compared to their parents. Dirasat, Agric. Sci. 26: 98 – 105.
- 35- أحمد ، رياض عبد اللطيف . (1984) . الماء في حياة النبات. كلية الزراعة والغابات ، جامعة الموصل.
- 36- Abu – Hadid, L. H. ; El- Beltagy, A. S. ; Smith, A. R. and Hall, M. A. (1986) . Effect of water stress on tomato at different stages of development . Acta . Hort., 190 : 405-417 .
- 37- Krenzer, E.G. (2003) . Wheat Growth Development and Yield Components. Oklahoma Cooperative Extension Service, Wheat Management in Oklahoma A handbook for Oklahoma's Wheat Industry, Oklahoma State University , p 831.
- 38- شهاب ، الهام محمود، بشرى خليل شاكر (2001) . تأثير الشد المائي على إنبات ونمو صنفين من حنطة الخبز (*Triticum aestivum* L.) ، مجلة علوم الرافدين ، 12 (1) : 42 – 50 .
- 39- المعيني ، اياد حسين علي (2004) . الاحتياجات المائية لاربعة اصناف من حنطة الخبز (*Triticum aestivum* L.) تحت تأثير الشد المائي والسماذ البوتاسي . اطروحة دكتوراة ، كلية الزراعة ، جامعة بغداد – العراق .