دراسة تأثير حامض الاسكوريك على نمو العنقوديات الذهبية الممرضة لوحدته وخلطا مع بعض المضادات الحيوية

هناء سليم يوسف

قسم علوم الحياة، كلية العلوم، جامعة بغداد

الخلاصة

عزلت 115 عزلة من بكتريا *Staphylococcus aureus* من جروح وحروق بشرية ملوثة، درس مدى مقاومتها للمضادات الحيوية الشائعة الاستعمال با استعمال اقراص الحساسية، بعدها تم تحديد قيم التركيز المثبط الأدنى للنمو بطريقة تخفيف الانابيب. وجد ان هنالك تباين في هذه القيم للمضادات الحيوية المختلفة، واعطت عزلتان فقط مقاومة عالية ولجميع المضادات. وعند دراسة تأثير حامض الاسكوريك لوحدته وعند خلطه مع المضادات الاخرى وجد ان له تأثير على خفض قيم التركيز المثبط الأدنى للمضادات الحيوية الذي كان واضحا من خلال متابعة النمو في المزارع السائلة.

المقدمة

تعتبر بكتريا *S. aureus* من البكتيريا المهمة طبيا لانتشارها الواسع وقدرتها على المعيشة في ظروف بيئية مختلفة وياتي العاملون في المستشفيات في مقدمة مصادر التلوث لكونها تستوطن الانف واللوزتين والحنجرة لنسبة كبيرة منهم [1].

وقد لحظ الباحثان Tong (2) و Matsumate (3) ان *S. aureus* هي البكتريا السائدة في التهابات جروح العمليات كما لوحظ ان اغلب البكتريا المعزولة من جروح وحروق متقيحة مقاومة لعدد كبير من المضادات الحيوية (4) وترجع مقاومتها هذه الى امتلاكها اليات متعددة للمقاومة (5) و (6) لتقليل المقاومة استعملت مواد اخرى مع المضادات الحيوية في علاج الحالات المزمنة (7,8) من بين هذه المواد هو حامض الاسكوريك.

لحظ الباحثون سنة 1953 ان حامض الاسكوريك عند خلطه مع التركيز تحت المثبط من كيريتات النحاس وبيكاربونات الصوديوم سوف يقتل *Pseudomonas aeruginosa* خلال 5 دقائق (8) وبما ان مثلها الخليط غير ملائم للعلاج في الاصابات الجهازية او اصابات الحروق فقد تم التفتيش عن مواد اخرى تكون ملائمة لمثل هذه الحالات (8)(9)(10). حيث وجد ان حامض الاسكوريك له تأثير تازري مع بعض المضادات الحيوية المستخدمة انفا وان هذا التأثير يكون من خلال تغيير في السلسلة التنفسية عن طريق احلال محل عناصر معينة او التفاعل معها (8,11) في حين اشار (7) الى ان التأثير

التثبيطي لعمل امض الاسكوريك ناتج عن الاكسدة الذاتية وتحرير بيروكسيد الهيدروجين الى الوسط. اما [(7) و (9) فاشاروا الى ان تأثير حامض الاسكوريك في تقليل المقاومة ناجمة عن فقدان البلازميد المسؤول عن المقاومة نتيجة المعاملة بحامض الاسكوريك.

هدف البحث هو دراسة تاثير حامض الاسكوريك مع المضادات الحيوية واهميتها في تقليل المقاومة وبالتالي زيادة فعالية هذه المضادات .

المواد وطرق العمل

اولا : المواد المستخدمة :

- 1-وسط المانتول المملح لعزل وتشخيص العنقوديات الذهبية.
 - 2- وسط تحلل الدنا(Oxoid) لاختبار قابلية البكتريا على انتاج الانزيم المحلل لل DNA . جرى تحضير الاوساط الزرعية وفقا للتعليمات المرفقة.
 - 3- بلازما دم انسان (حضر مختبريا) لاختبار فحص التجلط (Coagulase test)
 - 4- وسط مولر - هنتون(Oxoid) لدراسة حساسية العزلات للمضادات الحيوية.
 - 5- وسط البيتون السائل (Oxoid) Peptone salt agar لتحديد قيم التركيز المثبط الادنى للمضادات.
 - 6- Ascorbic acid (Roche)
- المضادات الحيوية :

Penicillin; Ampicillin G Gentamycin Tobramycin Erythromycin
Streptomycin; Methoprim; Cloramphinicol (Lilly)

طرق العمل

- أ- عزلات *Staph.aureus* : - تم اخذ العينات من اشخاص يعانون من جروح وحروق والتهابات جلدية لمرحل عمرية مختلفة باستعمال قطايل معقمة ورطبة حيث تم تخطيطها على وسط المانتول. بعدها اختبرت المستعمرات المخمرة للمانتول واجري لها فحص تجلط الدم حسب ماجاء في المصدر (12)
- ب- اختبار الحساسية للمضادات الحيوية الشائعة الاستعمال تم بطريقة الناشر spreading على وسط المولر - هنتون، وبعد ترك الاطباق لتجف قليلا وضعت اقراص المضادات وتم حضن الاطباق بدرجة 37 مئوية ولمدة 24 ساعة بعد ذلك تم قياس قطر منطقة التثبيط Inhibition zone المتكونة حول منطقة القرص، اجري الاختبار حسب ماجاء في المصدر (13)
- ج- تحضير محاليل الخزن:- حضر محلول(ascorbic acid) بتركيز 40mg/ml في وسط المرق المغذي وتم حفظ الـ pH 7.4 ± 0.2 بواسطة 10 % NaOH كما حضرت المضادات وفق التراكيز التالية :

المضاد الحيوي	الرمز	التركيز
1-Methoprim	Me	1mg/ml
2-Ampicillin	Am	500µg/ml
3-pencillin G	G	500µg/
3-Pencillin G	P	
4-Erythromychn	E	500µg/ml
5-Chloramphnicol	C	1mg/ml
6-Gentamycin	G	50µg/ml
7-Tobramycin	T	50µg/ml
8-Streptomycin	S	100µg/ml

تم التعقيم بطريقة الترشيح بالاعشبية .

د- طريقة التخفيف بالاباييب عملت وفق المصدر (13). حضنت الاناييب بدرجة 37 مئوية لمدة 24 ساعة وقرات النتائج حيث اعتبر التركيز الذي يمنع النمو هو التركيز المثبط الادنى (MIC).

هـ- منحى النمو عمل لعزلة من (*Staph.aureus*) مقاومة لاغلب المضادات الحيوية فقد حضرت دوارق تحوي على 200 مل من الوسط الزرعي (المرق المغذي) موزعة كلاتي :-
دوارق تحتوي على حامض الاسكوريك فقط بتركيز 0.3 a-
دوارق تحتوي على المرق المغذي فقط. b-

c- دوارق تحتوي على نصف التركيز المثبط الادنى من المضاد + (حامض 0.3mg/ml).
لقت جميع الدوارق بـ 0.1ml من مزرعة بعمر 24 ساعة ، قرات النتائج كل نصف ساعة
بجهاز spectronic 20 ويطول موجي مقداره 560 nm . وعمل منحى النمو .

النتائج والمناقشه

بعد عزل 115 عزله من *Staph.aureus* الممرضه من اصابات جروح وحروق مختلفه تم اجراء الاختبارات التشخيصيه عليها على اساس اعطائها الفحص الموجب لاختبار تجلط البلازما وتخميها للمانتول وافرازها انزيم DNase الثابت بلحراره. وقد شخصت اعتمادا على المرجع (13) وتم اختبار الحساسيه للمضاد الحيويه بطريقه اقراص الحساسيه . اظهرت النتائج في الشكل (1) ان النسبه الاكبر من البكتريا كانت مقاومه للامبسلين ثم البنسلين يليها وعلى التوالي كلورامفينيكول ثم الستربتومايسين والاريثرومايسين والميثيريم . اما مجموعه المضادات الامينوكلايكوسيديه المتمثله بالتويرامايسين والجنتاميسين فكانت اقل نسبه من البكتريا مقاومه لها، تستعمل هذه المضادات اساسا في معالجه الاصابات الناجمه عن البكتريا السالبه لصبغه كرام. ومن ملاحظه النتائج نجد هنالك نسبه كبيره من العزلات مقاومه للمضادات.

في دراسته للنجار (4) نجد هنالك تشابه في نسبه البكتريا المقاومه للامبسلين والبنسلين -ج ويعتقد هذا بسبب افراز انزيم البنسلينيز في حين هنالك اختلاف في نسبه البكتريا المقاومه للمضاد الستربتومايسين رغم انه من المضادات الامينوكلايكوسيديه ايضا الا انه الاقدم والاكثر استخداما في السابق . اما المضادات الجنتاميسين والتويرامايسين الجيل الاحدث والاقل استعمالا للمضادات الاخرى.

يلاحظ ان المقاومه للمضادات النتراسايكلين والستربتومايسين والكلورامفينيكول تاتي بلدرجه الثانيه وهي تعود الى افراز انزيمات مثبطه للمضادات الحيويه والى حاجز النفاذيه (14) ففي حين ان المقاومه للجنتاميسين والتويرامايسين فتعود بلدرجه الاساسيه الى وجود حاجز النفاذيه فلو امكن تغيير صفات هذا الحاجز امكن تقليل مقاومه البكتريا لهذه المضادات .

تم اختيار عشرة عزلات عشوائيا لاجاد قيم التركيز المثبط الادنى MIC حيث اثبتت دراسته ظهور تباين في هذه القيم وخاصه بلنسبه للمضاد الامبسلين والبنسلين -ج . وكذلك للستربتومايسين والاريثرومايسين ويمكن ملاحظه ذلك من الجدول رقم (1) ويرجع هذا التباين في القيم الى ضروب العزلات نفسها والاليات التي تمتلكها البكتريا المقاومه للمضادات ومدى تعرض الشخص المصاب للمضادات الحيويه . يلاحظ بشكل عام ارتفاع قيم التركيز المثبط الادنى MIC للمضادات المختلفه مقارنة بمصدر (4) وهذا يعود الى شيوع استعمال المضادات الحيويه مقارنة بسنوات السابقيه مما يؤدي الى ظهور عزلات ذات مقاومه عاليه .

تم اختيار البكتريا التي تحمل اعلى قيم للمقاومه لدراسة تاثير حامض الاسكوريك على قيم التركيز المثبط الادنى MIC من الشكل رقم (2) يلاحظ وجود عزلتان فقط مقاومه لجميع المضادات الحيويه ، اختيرت احدهما لدراسة تاثير حامض الاسكوريك من خلال متابعة الخط البياني لنموها ومقاومته لعدد معين من المضادات الحيويه وكما يلاحظ في الشكل رقم (3) (a,b,c,d,e,f) فقد ظهر في جميعها تازر واضح في عمل حامض الاسكوريك وتأثير المضاد فيما كان هنالك انخفاض واضح في مقاومه البكتريا للمضادات المستعمله .

ولاحظ مثل هذا التأثير كلا من (8) Rawal et al و (11) Rawal & Charles ضد بكتريا *Pseudomonas aeruginosa* وقد بين الباحثان ان عمل حامض الاسكوريك ناجم عن الاكسده الذاتيه وتحرير بيروكسيد الهيدروجين الى الوسط.

كما ان حامض الاسكوريك استعمل كعامل مختزل من قبل (6,7) ضد بكتريا hemolytic streptococci واستعمل خلطا وبتركيز 600 ملغم مع مواد اخرى في علاج الاصابات الناجمه عن بكتريا ذات مقاومه عاليه للمضادات ويضمنها *S.aureus* المسببه لقرحه الفراش ، ولم تظهر هذه البكتريا بعد العلاج . اما الباحث (5,9) فعزى تاثير حامض الاسكوريك على هذه البكتريا ناجم من فقدان بلازميد المقاومه R-plasmid وان تأثيره انتقائي على البكتريا متعدد المقاومه .

من خلال هذه الدراسه يمكن استنتاج امكانيه استخدام حامض الاسكوريك مع مواد اخرى مثل المضادات الحيويه ويتراكيز اقل من التركيز المثبط الادنى لعلاج الاصابات الناجمه من جراء بكتريا مقاومه للمضادات الحيويه وخاصه في علاج الاصابات الجلديه لتقليل مقاومه البكتريا وجعل المضادات اكثر كفاءة في العمل .

المصادر

- 1-Kloos, N.E. (1980) Ann.Rev.Micro.34:559-592.
- 2- Tong, M.J. (1972). J.Aed.Assoc. 219: 1044-1047.
- 3-Mastumato, M.C.; Wyte, S.R.; Mosely, R.V.,and Hawley, R.J.(1969). Milit.Med. 13:655-665.
- 4-Al-najjar, A.R. (1989). J. Biol. Seri.20(1) :85-94.
- 5- Krishtinnsen, J.E. and Ameral, L.(1997). Antimicro.Chem. 40,319-327.
- 6-Dioxons, S.R.Brumfitt, W. and Hamilton, M.(1985). Infection. 13:35-43.
- 7- Shoeb, H.A.; Al-shora, H.I. and Abdel-Salam, T. (1995). appl.Micro. 21,398-401.
- 8-Rawal, B.D. (1978). Chem. Ther. 24: 166-171.
- 9-Amabile-Cuevas, C.F.; Pina-Zenteller, R and Wahlaborde, M.E., (1991). Muta.Res. 264:119-125.
- 10-Mulligan, M.E., Murry, L.A., Ribner, B.S., and Stanford, H.C., (1995). Am.J.Med. 98,599-600.
- 11-Rawal, B.D., and Charles, B.G., (1972). J. Tropic.Med. Publ.Helth. 3 (2)222-227).
- 12-Safik, M.H. and Muslh, R. (1988). J.Bio.Sci.Res. 19:611-622.
- 13-Rhman, G.T., (1989). Study of enterotoxin produced by *S.aureus* from different food groups & clinical materials in Mousl.Msc.Theiss. University of Moul.
- 14-Baryant, M.C., (1972). Antibiotics & their laboratory control. 2nd.ed. Butterwths, London.
- 15-Mates, S.M., Esemberg E. S., & Mandel L.J. (1982). Natio.Acad.of scie. 79:6693-6697..

شكل (3) *S. aureus* (Growth curve study). تأثير حامض الاسكوربيك على

a اسكوربيك اسيد. n. broth + 0.3 mg/ ml فقط الخط المتقطع nutrient broth (control) - الخط المستمر

b حامض الاسكوربيك. n. broth + 1/2 MIC-Am + 0.3 mg - الخط المستمر n. broth + 1/2 MIC (Am) - الخط المتقطع

حامض الاسكوربيك. / ml.

(3) النسخة المستمرة - (control) nutrient broth + 1/2 MIC. T. والنسخة المنقطعة n. broth + 1/2 MIC +

اسكوريك اسد. 0.3 mg / ml.

d النسخة المستمرة - n. broth + 1/2 MIC-Me والنسخة المنقطعة n. broth + 1/2 MIC-me + 0.3 mg/

حامض الاسكوريك. ml.

(3) اسكوريك اسد . 0.3 mg / ml + n. broth + 1/2 MIC-E والخط المتقطع (control) nutrient broth + 1/2 MIC.E - الخط المستمر شكل (3)

اسكوريك اسد . 0.3 mg / ml + n. broth + 1/2 MIC-C والخط المتقطع n. broth + 1/2 MIC-C - الخط المستمر f

S. للمضادات الحياتية المستعملة ضد (MIC) جدول (1) : تأثير حامض الاسكوريك على قيم التركيز المثبط الادنى

للمضاد). MIC المعزولة من الجروح الملوثة (العزلات المستعملة هي الاكثر مقاومة والتي تمتلك اعلى قيمة aureus

قيم MIC معطاة Mg / ml			النسبة المختزلة في قيم MIC (%)
رمز المضاد الحيوي	المضاد فقط	المضاد + حامض الاسكوريك 0.3 mg / ml	
Am	50	40	20
E	35	25	28.5
Me	20	15	25
C	25	15	40
S	40	35	12.5
P _G	45	30	33.3
T	15	10	33.3
G	20	20	0

للمضادات الحيوية (طريقة اقراص الحساسية) (عدد العزلات 115) *S. aureus* شكل (1) مقاومة العزلات الممرضة من
Mg / Disc Am (25) , E (30) , Me (20) , C (50) , S (30) , P_G (25) , T (10) , G (10) وتركيز المضاد

شكل (2) التباين في قيم التركيز الميكروبي للإنسلي للمنتجات الحيويه ضد عشر عزلات للكثيرت عشو لبا من *Staph. aureus* المعزونه من صموات. الموائع تشارك معتر كيم الترميز الميكروبي للإنسلي.

Effect of Ascorbic Acid on Pathogenic *Staphylococcus aureus* Growth singly and in Combination with Some Antibiotics

H. S.Yossef

Department of Biology, College of Science , University of Baghdad

Abstract

One hundred and fifteen isolates of *Staphylococcus aureus* were isolated from human infected wound and burn. The resistance of this organism for eight commonly used antibiotics was determined by disc diffusion methods.

The minimum inhibitory concentration MIC was determined for each drug by tube dilution method. Results showed significant variations in the MIC values. It was found that two isolates had high resistance for the eight antibiotics used. Effect of ascorbic acid on bacterial growth was studied singly and in combination with antibiotics. Reductions in MIC value were reported for different antibiotics when tested by growth curve method too.