

**Anatomical study of the lower and upper epidermis of the genus:
Mosa l . (Mosaceae) & the genus Canna l . (Cannaceae)
and it species in Iraq.**

**دراسة تشريحية مقارنة في البشرة العليا والسفلى لأوراق الجنس
(Cannaceae) *Canna l .* و الجنس (Mosaceae) *Mosa l .*
ونوعيه في العراق**

م.م. نيبال امطير طراد الكرعاوي

جامعة كربلاء/ كلية التربية/ قسم علوم

باحث بايلوجي. فاطمة كريم خضير

جامعة كربلاء/ كلية التربية/ قسم علوم

باحث بايلوجي. أثمار دخيل مراد

جامعة كربلاء/ كلية التربية/ قسم علوم

الخلاصة

لقد درست خصائص البشرة السفلى والعليا في أوراق جنس الموز *Mosa l .* و جنس الكانا *Canna l .* ونوعيه *C. indica* و *C. flaccica* في العراق ، وقد تم دراسة العديد من الصفات التي شخّصت انتماء الجنس قيد الدراسة إلى عائلتين مختلفتين ، كما وقد أفادت تلك الصفات في تمييز نوعي الجنس *Canna* ، واهم الصفات التي عزلت الجنس هي صفات الخلايا الطويلة والشعور ، كأشكالها وأبعادها ، وأعدادها ، والجزء الأكبر من هذه الصفات التشريحية تدرس لأول مرة . كما وتضمن البحث رسومات ولوحات لكل من البشريتين العليا والسفلى للوحدات التصنيفية المدروسة .

Summary

The abaxial and adaxial epiderm characteristics of leaf of the genus *Mosa l . Canna l .* and the two species *C. indica* and *C. flaccida* were examined in Iraq . There is many characteries were distinguished the two genus were belong to the defferent family, So most of these characters were proved to be of diagnostic vlua to the two species of the genus *Canna l .* the characters like the shapes , diameter and numbers of the long cell and stomata were the important to separate the two genus , and most of these characters have been studied for the first time . Figures and plantes for adaxial and abaxial epidermis were prepared for all taxon .

أولاً:- المقدمة

خلق الله الإنسان ومن فضله عليه أن أرشده وهداه إلى التفكير في كل ما يحيط به ومن بينها النباتات التي اكتشف فيها دواء وشفاء للمرض فكانت من أبرز ما بحث فيه من عهد الخليقة، إذ اتخذها منذ القدم مصدراً طبيعياً لغذائه ولدوائه ، ومن أجل ذلك فقد لجأ في جميع العصور كل بما يملك من إمكانيات في البحث لاكتشاف أسرار النباتات واستجلاء فوائدها في العلاج ، معتمداً في ذلك على التجربة الشخصية بينه وبين هذه النباتات وتحت نظرية الخطأ والصواب.

ومع تطور الحياة وتعقدتها زادت رغبة الإنسان في معرفة وتمييز ما ينفعه وما يضره منها، وتعد مثل هذه المحاولات بداية التصنيف Classification، وبسبب التطور العلمي الكبير الذي حصل في كل مجالات الحياة تطور التصنيف إلى ما يعرف في الوقت الحاضر بعلم Systematic ، وبهذه لم تعد الدراسات التصنيفية للنبات مقتصرة على الدراسة المظهرية لها فقط بل شملت جوانب متعددة أخرى، مثل التشريح والخلية والوراثة والكيمياء والحياتية والبيئة وعلم حبوب اللقاح وغيرها من الأدلة التصنيفية (Stace,1989) Taxonomic evidences

استعملت الدراسات التشريحية للإغراض التصنيفية منذ أكثر من مئة عام وزاد الاهتمام بها حتى أصبح استعمالها لا يقل أهمية عن الصفات المظهرية في الوقت الحاضر ، ويعود السبب في ذلك كونها أقل تعرضاً للظروف البيئية المحيطة مقارنة بالصفات المظهرية ولذلك اعتمدت الدراسات التشريحية من قبل العديد من الباحثين في عزل الأنواع النباتية ومن ذلك الموسوي

(Al-Musawi,1979) الجنس *Hyoscyamus* ودراسة البيرماني
(Al-Bermani,1996) للجنس *Aeluropus* واستعملت الأدلة التشريحية على مستوى الأجناس وأحيانا الضروب Varieties كما
في العائلة Combrataceae (Stace,1965,1989).

وتعد دراسة سولدر (Solder, 1908) وميتكالف وجوك (Metcalf & Chalk, 1950) من أوسع وأقدم الدراسات التي اعتمدت الصفات التشريحية في تصنيف المجاميع النباتية بما في ذلك عائلة الموز (Mosaceae) والموز الوردي (Cannaceae) حيث ورد فيها ملاحظات عامة عن بعض اجناس العائلتين، كذلك دراسة كولبرج (Goldberg, 1989) التي تضمنت ملاحظات عامة عن بعض المواد والمكونات في أنسجة النبات كذلك تطرق إلى عدد الخلايا المساعدة حول الثغر .

تعد ثمار الموز احد أهم الأطعمة في العالم , حيث يستزرع في المناطق الحارة فقد ذكر كيست بأنه في الصناعات الغذائية أو الوجبات الغذائية في فنزويلا و كثير من دول العالم و أن ألياف أوراقه تستخدم في العديد من الصناعات . أن فاكهة الموز لذيذة مغذية و دوائية , تحتوي على مواد دهنية وفيتامينات A و C و B2 و B5 و معادن كالفسفور والزنك و الحديد والفلور و الصوديوم و المغنيسيوم , كما يحتوي كمية كبيرة من السكر و بالأخص سكر العنب و سكر القصب و مواد بروتينية . و نظرا لوجود كمية من المعادن حيث يزود الجسم بأكثر حاجته من العناصر الحيوية , و قد وجد أن كالسيوم الموز يهضم أفضل من كالسيوم الحليب و أن الفلور يحمي الأسنان و فيتامين C يقوي الجهاز المناعي و العضلات و يحمي الجسم من الحفر و التعفّنات و فيتامين B يحمي الأعصاب و يكافح فقر الدم و يحفظ توازن الجسم , كما أن فيه هرمونات لها علاقة بتنظيم الجهاز العصبي و هو مفيد جدا للجهاز العظمي و المفاصل و الأعصاب .

كما انه يساعد في علاج الإسهال و اضطرابات الجهاز الهضمي و قرحة المعدة و الغير ناضج منه يستخدم كقباض , أما أوراقه فتستخدم كشراب لعلاج السعال و الحالات الصدرية مثل التهاب القصبات , و جذوره كقباض قوي يعطى لوقف لفظ الدم بالسعال جاك ر فارتى (Chakravarty,1976) .

يعد نبات موز الفحل نبات زينة يستزرع لأزهاره الجميلة و أوراقه الزاهية الخضرة . كذلك يمكن الاستفادة من بذوره السوداء المشرقة في صناعة الحلبي كالأساور و القلائد خاصة في الدول الأوربية و الهند و غيرها , و يستخلص منها صبغات حمراء , كما يمكن استخلاص ألياف من أوراقه تستخدم في صناعة الأقمشة و الحبال , جاكرفارتي (Chakravarty, 1976) . كما يصنع من بذوره سبج الصلاة في مصر و بعض الدول الإسلامية لذلك يسمى النبات بحبة السبحة , وان أوراقه لها خصائص شبيهة بخصائص أوراق الموز في علاج الكثير من الأمراض .

Materials and Methods المواد وطرائق العمل

حضرت البشرة من أوراق النباتات الطرية المجموعة من الحقائق العامة و المستزرعة من الحقائق المنزلية . وقد استخدمت الأوراق الطرية مباشرة في التحضير و قد استخدم في الدراسة الثلث الوسطى لورقة أخذت من منتصف الساق تقريبا أما طريقة تحضير البشرة فقد اتبعت طريقة كلاك(Clark , 1980) مع شيء من التغيير , إذ تم قطع الورقة (الجزء الوسطى) طوليا إلى نصفين من منطقة العرق الرئيسي و في حالة تحضير البشرة السفلى . تم وضع احد نصفي الورقة على شريحة زجاجية تحت مجهر التشريح بحيث تصبح البشرى العليا Adaxial epidermis للأعلى و البشرة السفلى Abaxial epidermis للأسفل , وتمت إزالة البشرة العليا و طبقة (Mesophil) بواسطة شفرة حادة بطريقة القشط Scrape و تم ذلك برفق وحذر لان بشرة الورقة في الموز والموز الفحل تكون رقيقة وسهلة التمزق خاصة البشرة العليا , و أثناء عملية القشط أضيفت بعض قطرات الماء الحار بين الحين وآخر للحفاظ على الورقة طرية ثم نقلت الورقة المحضرة بواسطة ملقط دقيق Forceps إلى الماء الحار لغرض تنظيفها من بقايا النسج المتوسط ثم صبغة بصبغة السفرانين لمدة 5 دقائق ثم غسلت بكحول اثيلي بتركيز 70% ثم بعد ذلك قلبت و وضعت على شريحة زجاجية Slide نظيفة و وضع عليها قطرة كليسرين Glycerin أو Lactic acid ثم غطيت بغطاء الشريحة الزجاجية Cover slide حيث أصبحت جاهزة للفحص إما عند تحضير البشرة العليا فتم وضع نصل الورقة بوضع عكسي للحالة الأولى و أجريت الخطوات السابقة الذكر نفسها علما إن تحضير البشرة العليا أصعب من تحضير البشرة السفلى . بعد ذلك حفظت الشرائح الزجاجية في حاوية سلايدات و وضعت في الثلاجة بدرجة حرارة (4) م لحين الدراسة . و تمت الاستعانة بالمفاتيح التصنيفية لبور(Bor , 1968 , 1970) و سميث (Smith , 1980) عند تشخيص أنواع الجنس , و قد اعتمدت المصطلحات الواردة لكل هتشوك (Hitchcock , 1951) و لورنس (Lawrence , 1951) و ستيرن (Stearn , 1973) و رادفورد و آخرون (Radford etal) و هابرد (Hubbard , 1984) و تراوح عدد العينات التي درست للنوع الواحد بين (20- 30) عينة للعائلتين إضافة إلى عدد القياسات المستخدمة في الدراسة المظهرية كان يتراوح (20- 35) قياس لكل صفة . و قد أستخدم مجهر Altay لفحص العينات و تم فحصها على القوة 40X حيث درست (25-30) لكل عينة (مساحة الحقل الواحد تحت قوة 40X = 96.158 مايكرو متر) و تم قياس أجزاء البشرة بمساعدة مسطرة عينية Ocular وورق بياني و تم رسمها بمساعدة الكامرة المنيرة (Camera lussida) نوع (Olympus) و تم تصوير الأجزاء المدروسة بكامرة فوتوكرافيا مجهرية نوع Seagull .

النتائج RESULTS

تتميز البشرة عموماً بوجود خلايا البشرة الطويلة وهي صفة تمتاز بها معظم نباتات ذوات الفلقة الواحدة ومنها عائلة الموز وعائلة الموز الفحل و أن الخلايا دائماً ما تكون مستطيلة وذات جدران مستقيمة غير منقرة وذات جدران منتخنة إلى متوسط النخن وخلايا البشرة تكون بنوعين خلايا طويلة ثغرية Stomatal long cell أي تحصر بينها ثغور على طول صفوفها وخلايا طويلة لا ثغرية non stomatal l.c أي لا تحتوي في صفوفها على أي ثغور والنوعين من الخلايا تتباين في أبعادها وإشكالها وترتيبها وعدد صفوفها بين البشريتين العليا والسفلى للنوع والجنس الواحد وكذلك بين الأنواع والأجناس المختلفة.

أما الثغور فهي من النوع العادي والأكثر شيوعاً والذي يسمى نوع ذوات الفلقة الواحدة أو الفلقتين monocot type حيث تكون فيه الخلايا الحارسة كلوية الشكل في المنظر السطحي وتحيط بالثغر خلايا مساعدة تختلف عن خلايا البشرة الاعتيادية بأشكالها وأحجامها وترتيبها حول الثغر وتكون عديدة حول الثغر الواحد وتختلف أعدادها بين النوعين قيد الدراسة.

البشرة في النباتات أحادية الفلقة مقسمة إلى منطقتين الأولى منطقة مافوق العروق والثانية مناطق ما بين العروق وتضم هذه أعداداً من صفوف الخلايا الطويلة الثغرية واللاثغرية تتغير بين الوحدات التصنيفية.

البشرة السفلى abaxial epidermis

1- الخلايا الطويلة:- long cell

اتضح من الدراسة بوجود التغيرات في أبعاد وأشكال وسمك جدران الخلايا المكونة لنسيج البشرة السفلى. أن البشرة تتكون في جنس الموز *Mosa* من خلايا طويلة ذات جدران قليلة التثخن بينما تكون أكثر تثخناً في الجنس *Canna* أما ترتيب الخلايا الطويلة فالخلايا الطويلة اللاثغرية تترتب بشكل موازي للخلايا الحارسة للثغور ويكون طولها أكبر من عرضها بثلاثة أضعاف، أما الخلايا الطويلة في الصفوف الثغرية فتترتب بشكل عمودي على الخلايا الحارسة للثغور حيث يكون شكل الخلايا الطويلة متساوي الأبعاد أو مربعاً في جنس الموز *Mosa* بينما يكون شكلها بيضوياً متطاولاً بالغالب أو متطاول غير منتظم في النوع *C. flaccida* بينما يكون هذا النوع *C. indica* مستطيلة ويكون طولها في النوعين الآخرين مماثل لطول الثغر مع الخلايا المساعدة، بينما الموز فيكون طول الخلايا الثغرية ثلث طول الثغر بخلاياه المساعدة وغالباً ما تترتب الخلايا الطويلة الثغرية ترتيباً موازياً للخلايا الحارسة في الثغر وهذا عكس ماتم إيجاده في الجنس *Canna* لوحة (1) شكل (1)

أما أبعاد فقد اظهرت تغيرات بين الوحدات التصنيفية قيد الدراسة و حيث كان أطوال الخلايا الطويلة في الصفوف الثغرية في جنس الموز تتراوح بين (15-20) مايكرو متر وبمعدل (17.5) مايكرو متر بينما كانت أكثر طولاً في جنس الكانا حيث تراوحت بين (35-75) مايكرومتر كما اظهرت تغيرات بين نوعي الجنس الكانا حيث كانت من النوع *C. indica* بين (50-75) مايكرومتر وبمعدل (62.5) مايكرومتر بينما تراوحت بين (35-65) مايكرومتر وبمعدل (50) مايكرومتر في النوع *C. flaccida* حيث يمكن التمييز بين النوعين بالمعدل جدول (1) لوحة (1).

أما عرض الخلايا الطويلة الثغرية تتراوح بين (10-12.5) مايكرومتر وبمعدل (17.5) مايكرومتر في جنس الموز بينما كان أكبر في الجنس الكانا حيث تراوحت بين (25-50) كما تغيرت في النوعين للجنس الأخير حيث تراوحت بين (37.5-50) مايكرومتر في النوع *C. indica* وبمعدل (47) مايكرومتر بينما تراوحت بين (25-30) مايكرومتر وبمعدل (27) مايكرومتر مما يميز النوعين عن بعضها البعض عن بعضها البعض بشكل واحد.

كما و اظهرت الخلايا الطويلة اللاثغرية تغيرات في أبعادها فقد كانت أطوالها في الجنس *Mosa* تتراوح بين (35.5-50) مايكرومتر بينما تراوحت في جنس الكانا بين (62.5-100) مايكرومتر كما وقد تميز النوعان للجنس الأخير في أطوال الخلايا حيث تراوحت بين (75-100) مايكرومتر في النوع *C. indica* وبمعدل (95) مايكرومتر بينما تراوحت بين (62.5-87.5) مايكرومتر في النوع *C. flaccida* وبمعدل أقل وهو (75) مايكرومتر كما ان عرض الخلايا اظهرت تغيرات في التمييز بين المراتب التصنيفية حيث تتراوح بين (10-15) مايكرومتر وبمعدل (12.5) مايكرومتر في الجنس *Mosa* بينما كان أكبر في الجنس *Canna* فقد تراوحت بين (25-30) مايكرومتر كما وقد تمايز نوعا الجنس الأخير حيث تراوحت أبعاد النوع *C. indica* بين (25-27.5) مايكرومتر وبمعدل (25) مايكرومتر بينما تراوحت بين (25-35) مايكرومتر وبمعدل أكبر بلغ (30) مايكرومتر جدول (1) لوحة (1).

أما أعداد الخلايا الطويلة في الحقل المجهرى الواحد فقد تغيرت بين الوحدات التصنيفية المدروسة فقد تراوحت عددها في جنس الموز بين (107-360) خلية وبمعدل (200) خلية بينما كانت أعدادها أقل من جنس الكانا حيث تراوحت بين (33-120) خلية كما تمايز النوعان للجنس الأخير حيث تراوحت أعداد الخلايا الطويلة في النوع *C. indica* بين (33-120) خلية وبمعدل (75) خلية، بينما تراوحت بين (90-120) خلية وبمعدل (100) خلية في النوع *C. flaccida* جدول (1).

تغيرت الوحدات التصنيفية في أعداد صفوف الخلايا الطويلة بين العرقين، فقد تراوحت أعداد صفوف الخلايا الثغرية بين عرقين في جنس الموز بين (2 -- 4) صفاً وبمعدل (3) صفاً، أما عدد صفوف الخلايا الكلي بين عرقين (الثغرية و اللاثغرية) فقد تراوحت في الموز بين (9 – 13) صفاً، بينما تراوحت أعداد الصفوف الثغرية في النوع *C. indica* بين (1 – 2) صفاً وبمعدل صفاً واحد، وكان عدد الصفوف الثغرية واللاثغرية أكثر من الموز والنوع الثاني، حيث تراوحت أعداد الصفوف الثغرية بين (6 – 9) صفاً وبمعدل (8) صفاً، أما عدد الصفوف الكلي بين العرقين فقد تراوحت بين (20 – 32) صفاً وبمعدل (24)، مما يميز المراتب التصنيفية عن بعضها البعض.

2 – الثغور Stomata

توجد الثغور بشكل صفوف منتظمة او غير منتظمة التوزيع احيانا ويزداد عدد الثغور على البشرة السفلى اكثر مما في البشرة العليا ، لقد اظهرت الثغور تبايرا في ابعادها واشكالها وتثنج جدرانها واعدادها بين الوحدات التصنيفية المدروسة . فقد تميزت الثغور في الجنس *Canna* بكون تثنجها اكثر مما في ثغور جنس الموز ، وتشارك الوحدات التصنيفية في انها محاطة بخليتين مساعدتين موازية للخليتين الحارستين ، ولكنها تختلف في اشكال تلك الخلايا المساعدة وكذلك في عدد الخلايا المساعدة الاخرى التي ترافق الثغور . حيث تراوح عدد الخلايا المساعدة المرافقة للثغور في جنس الموز بين (6 – 8) خلايا ، بينما تراوح بين (2 – 6) خلايا في جنس الكانا ، كما ويمكن تمييز النوعين لجنس الكانا استنادا لهذه الصفة حيث تراوح عدد الخلايا المساعدة في النوع *C. indica* بين (2 – 6) خلية وبمعدل (4) خلايا ، بينما تراوح بين (2 – 4) خلايا في النوع *C. flaccida* وبمعدل (2) خلية .

اما اشكال الخلايا المساعدة فقد تبايرت بين الجنسيتين ، فالخليتين المساعدتين الموازيتين للخليتين الحارستين حيث كانت بشكل قبوي منخفض وحيانا مستطيلة ضيقة موازية للثغر في جنس الموز *Mosa* بينما كان شكل الخليتين المساعدتين من النوع *C. indica* قبوي مرتفع وحيانا قبوي مرتفع بقمة مسطحة مما يعطي الثغر شكلا سداسيا متطاولا مع الخليتين المساعدتين بينما كان شكل القبوي المرتفع ذو قمة مسطحة هو الشكل الشائع في النوع *C. flaccida* وحيانا تتخذ شكلا قبويا مرتفعا . اما اشكال الخلايا المساعدة الاخرى فقد تبايرت ايضا في اشكالها بين الوحدات التصنيفية حيث كانت اشكال الخلايا الموازية للخليتين المساعدتين المرافقتين للثغر في جنس الموز بشكل مستطيل ينحني حول الثغر بينما كانت في جنس الكانا دائرة صغيرة تقع في قمة الخلايا المساعدة المرافقة للثغر وحيانا قليلة تكون مربعة صغيرة .

اما اشكال الخلايا المساعدة التي تكون عمودية على الثغر من جانبيه فتتخذ شكلا سداسيا غير متساوي الاضلاع غالبا في الجنس *Mosa* وحيانا قليلة تتخذ شكلا مستطيلا ضيقا او مربعا ينحني حول الثغر ليلتقي مع الخلايا المساعدة الموازية للثغر لتشكل الخلايا المساعدة دائرة تحيط بالثغر وتعطيه شكلا دائريا يميزه عن الجنس *Canna* كما في الشكل (1) لوحة (1) .

اما اشكال الخلايا المساعدة المتعامدة على الثغر فتكون بشكل مستطيل عريضة حول الثغر وتوجد هذه الخلايا فقط في النوع *C. indica* ولكنها قليلة العدد اما النوع الثاني *C. flaccida* فنادر ما تكون موجودة وعندها يكون شكلها بيضويا متطاولا ينحني حول الثغر .

لقد اظهرت الثغور تبايرا في ابعادها بين الوحدات التصنيفية حيث تراوح طول الثغر (الخليتين الحارستين مع الخليتين المساعدتين الموازية و المرفقة لها) بين (30-35) مايكرومتر في الجنس *Mosa* وبمعدل (32.5) مايكرومتر بينما كان طولها اكبر في الجنس *Canna* حيث تراوح بين (37.5-75) مايكرومتر كما وقد تمايز نوعي الجنس الاخير فقد تراوح طول الثغر في النوع *C. indica* بين (50-75) مايكرومتر وبمعدل (52.5) مايكرومتر بينما كانت الثغور اقصر في النوع *C. flaccida* حيث تراوحت بين (37.5-45) مايكرومتر وبمعدل (40) مايكرومتر .

اما اقطار الثغور فقد تراوحت بين (22.5-37.5) مايكرومتر في جنس الموز وبمعدل (25) مايكرومتر بينما كانت الاقطار اكبر قليلا في جنس الكانا *Canna* حيث تراوحت بين (30-50) مايكرومتر كذلك يمكن التمييز بين نوعي الجنس الاخير فقد تراوحت بين (40-50) مايكرومتر في النوع *C. indica* وبمعدل (42.5) مايكرومتر بينما تراوحت (30-35) مايكرومتر في النوع *C. flaccida* وبمعدل (32.5) مايكرومتر جدول (1) لوحة (1) شكل (1) .

كما كان لاعداد الثغور في الحقل المجهرى تبايرا مهما يفيد في التمييز بين الوحدات التصنيفية المدروسة فقد تراوح عددها في جنس الموز بين (17-28) ثغرا وبمعدل 25 ثغرا بينما كانت اعدادها اقل في جنس الكانا فقد تراوحت بين (9-15) ثغرا كما يمكن ان نميز بين نوعي جنس الكانا استنادا الى هذه الصفة حيث تراوحت اعداد الثغور في النوع *C. indaca* بين (9-12) ثغرا وبمعدل (10) ثغور بينما تراوحت بين (10-15) ثغرا وبمعدل (12) ثغرا في النوع *C. flaccida* .

B-البشرة العليا Ad axial Epidermis 1- الخلايا الطويلة Long cell

لا توجد اختلافات كبيرة بين البشريتين العليا والسفلى في الجنس *Canna* فشكل الخلايا والثغور وإبعادها متقاربة والفرق الوحيد هو في اعداد الثغور حيث يمكن ان نميز البشرة العليا عن السفلى بان عدد الثغور على البشرة العليا اقل من اعدادها في البشرة السفلى . بينما نجد ان الاختلاف واضح جدا بين بشرتي الجنس *Mosa* ، حيث ان معظم خلايا البشرة العليا تكون مستطيلة ضيقة أكثر انتظاما في ترتيبها وأكثر طولاً مما في البشرة السفلى حيث ان طولها يصل إلى (5-13) ضعفا بمقدار عرضها بينما كانت اقل انتظاما في اشكالها واقل طولاً . كذلك يمكن التمييز من خلال عدد الثغور حيث تكون معدومة غالبا في الحقل المجهرى وهذا عكس ما ذكر سابقا في البشرة السفلى حيث كانت اعداد الثغور كبيرة تصل إلى (28) ثغرا في الحقل المجهرى وكما يمكن تمييز البشريتين العليا والسفلى للموز بانعدام وجود اثار للعروق المتوازية التي تقع تحت البشرة العليا وهذا عكس ما وجدناه في البشرة السفلى حيث كانت للعروق تحت البشرة اثارا واضحة رغم تنظيف البشرة من النسيج الذي تحتها ، بينما في جنس الكانا فالعروق واضحة على البشريتين العليا والسفلى ، ويعود السبب في ذلك إلى سمك النسيج الميز وفيلي بين البشريتين في جنس الموز

، حيث إن العروق المتوازية تكون قريبة أو محاذية للبشرة السفلى بينما يفصلها نسيج ميز وفيلي كثيف عن البشرة العليا للموز وبذلك فلا تحتوي على مناطق عروق وما بين العروق كباقي النباتات الأحادية الفلقة .

لقد كانت إشكال الخلايا الطويلة الثغرية واللاثغرية مشابهة لما تم وصفه سابقاً للبشرة السفلى . إما أطول الخلايا الطولية في الصفوف الثغرية فقد تراوحت بين (50-87.5) مايكروميتر في جنس الموز وبمعدل (75) مايكروميتر ، بينما كانت أقل طولاً في جنس الكانا حيث تراوحت بين (37.5-62.5) مايكروميتر . كما وقد تشابه نوعي الجنس في أطوال الخلايا ولكن اختلفت المعدلات، حيث كان المعدل في النوع *C. Indica* (50) مايكروميتر ، بينما في النوع *C. flaccida* فقد بلغ (40) مايكروميتر . إما عرض الخلايا الطويلة الثغرية فقد كان في جنس الموز بين (7.5-10) مايكروميتر ، بينما كان عرض الخلايا أكبر في جنس الكانا حيث تراوحت بين (12.5-50) مايكروميتر ، كما ويمكن تمييز نوعي جنس الكانا استناداً إلى عرض الخلايا الثغرية ، حيث كانت في النوع *C.indica* بين (37.5-50) مايكروميتر وبمعدل (45) مايكروميتر ، بينما النوع *C. flaccida* كانت أقل بكثير فقد تراوحت (12.5-17.5) مايكروميتر وبمعدل (15) مايكروميتر .

كما وقد أفادت صفة إعداد صفوف الخلايا الطويلة الثغرية بين عرقين ، فقد تراوحت إعداد صفوف الخلايا الثغرية بين (3-6) صفوف وبمعدل (4) صفوف في النوع *C.indica* ، بينما كانت الصفوف أكثر في النوع *C. flaccida* بين (12-17) صفاً وبمعدل (15) صفاً ، كما كانت إعداد الصفوف الكلية للخلايا الطويلة بين عرقين تتراوح بين (20-25) صفاً في النوع *C. flaccida* وبمعدل (40) صفاً .

كما كان لإبعاد الخلايا الطويلة اللاتغرية تغييراً بين الوحدات التصنيفية المدروسة ، فقد تراوحت أطوال الخلايا اللاتغرية في جنس الموز بين (87.5-137.5) مايكروميتر وبمعدل (137.5) مايكروميتر ، بينما كانت الأطوال بين (75-125) مايكروميتر في جنس الكانا ، كما وقد تقاربت الأطوال بين نوعي الجنس كانا ولكن اختلفت في معدلات الأطوال حيث كانت (100) مايكروميتر في النوع *C. indica* بينما كانت (85) مايكروميتر في النوع *C. flaccida* . إما عرض الخلايا فقد كان بين (5.7-12.5) مايكروميتر في جنس الموز وبمعدل (10) مايكروميتر ، بينما تراوحت بين (25-37.5) مايكروميتر في جنس الكانا ، كما وقد اختلف نوعي الجنس الأخير في عرض الخلايا رغم التداخل ، فقد تراوحت عرضها في النوع *C.indica* بين (25-37.5) مايكروميتر وبمعدل (35) مايكروميتر ، بينما تراوحت في النوع *C. flaccida* بين (25-27.5) مايكروميتر وبمعدل (25) مايكروميتر .

إما عدد خلايا البشرة في الحقل المجهرى الواحد فقد كان لها أهمية في عزل وتمييز الجنسين فقد تراوحت عددها في جنس الموز بين (160-269) خلية وبمعدل (198) خلية ، بينما تراوحت إعدادها في جنس الكانا بين (37-143) خلية كذلك يمكن التمييز بين نوعي جنس الكانا ، حيث تراوحت عدد الخلايا بين (37-130) خلية وبمعدل (97) خلية في النوع *C.indica* ، بينما في النوع *C.flaccida* فقد تراوحت بين (80-143) خلية وبمعدل (120) خلية .

2- الثغور *S tomata*

لقد أظهرت الثغور تغييراً في إبعادها وإشكالها وإعدادها وترتيب الخلايا المساعدة حولها وإعداد تلك الخلايا بين الوحدات التصنيفية. فقد كانت إشكال الثغور مشابهة لما تم وصفه في البشرة السفلى سابقاً بالنسبة للجنس كانا *Canna* ولكن الشكل يختلف على البشرة العليا للجنس *Mosa* فقد كانت شكل الثغر سداسي قصير أو متساوي الإبعاد ، حيث كانت الخليتان المساعدتان المرافقة والزاوية للخليتين الحارستين ، كانت ذات شكل ثلاثي الزاوية *triangular shope* .

ونفس الشيء لإعداد الخلايا المساعدة الأخرى التي تحيط أو ترافق الثغر فإن صفاتها مماثلة لما ذكر في البشرة السفلى للجنس *Canna* ، ولكنه يختلف في جنس الموز كما هو موجود في البشرة السفلى ، فقد كانت الخلايا المساعدة الأخرى غير منتظمة الشكل والإبعاد وكذلك أقل ترتيباً وفي الغالب مبعثرة حول الثغر كما في شكل (2) ولوحة (1) كذلك فإن عدد هذه الخلايا يزداد على البشرة العليا فقد تراوحت بين (6-9) خلايا وبمعدل (7) خلايا مساعدة . وبذلك يكون عددها أكثر مما في جنس الكانا كما موضح سابقاً .

إما طول الثغور فقد تراوحت بين (32.5-37.5) مايكروميتر في الموز وبمعدل (35) مايكروميتر بينما كان طولها أكبر في الجنس *Canna* حيث تراوحت بين (40-100) مايكروميتر ، كذلك يمكن تمييز النوعين للجنس الأخير استناداً إلى صفة طول الثغور فقد تراوحت بين (50-100) مايكروميتر للنوع *C.indica* وبمعدل (75) مايكروميتر ، بينما تراوحت بين (40-52.5) مايكروميتر للنوع *C.flaccida* وبمعدل (45) مايكروميتر .

كذلك كان لقطر الثغور أهمية في تمييز الوحدات التصنيفية ، حيث تراوحت الأقطار في جنس الموز بين (2250-25) مايكروميتر ، وبمعدل (25) مايكروميتر ، بينما في جنس الكانا *Canna* فقد تراوحت بين (30-52.5) مايكروميتر ، إما نوعية فقد تراوحت الأقطار في النوع *C. indica* بين (45-52.5) مايكروميتر وبمعدل (50) مايكروميتر بينما تراوحت بين (30-3705) مايكروميتر في النوع *C. flaccida* وبمعدل (35) مايكروميتر .

كما كان لإعداد الثغور في الحقل المجهرى الواحد أهمية في عزل المراتب التصنيفية حيث تراوحت في جنس الموز بين (0-1) ثغراً ، وبمعدل (5) ، أي انعدام الثغور هو الشائع ، بينما في جنس الكانا فقد تراوحت بين (1-7) ثغراً ، كما وقد اختلف النوعان للجنس الأخير في إعداد الثغور ، حيث تراوحت بين (1-4) ثغور في النوع *C. indica* وبمعدل (3) ثغور ، بينما في النوع *C. flaccida* تراوحت بين (3-7) ثغور وبمعدل (5) ثغور ، مما يميز النوعان عن بعضهما البعض .

المناقشة Discussion

صنف الباحثون العائلتين الموزية Mosaceae والكانية Cannaceae تحت الرتبة الزنجبيلية order:-Zigiberales والتي تضم ستة عوائل بضمنها العائلتين قيد الدراسة (Streliziaceae Lowiaceae , Zingiberaceae , Cannaceae, Mosaceae, Marantaceae) ويوجد منها ثلاثة عوائل فقط هي الموزية والكانية وعائلة الزنجبيل Zingiberaceae (Guest, 1950)، بينما ذكر الموسوي (AL-musawi, 1987) ان العائلتين تنتمي الى رتبة الموزيات order:-Musales والتي تضم أربع استوائية او شبه استوائية، وهذه رتبة طبيعية تشابه فيها العوائل الى حد وضعها العالمان بنثام و هكر (Bentham & Hooker, 1973) في عائلة واحدة.

تضم عائلة الموز جنسين هما *Mosa* و *Eneste* وكلاهما يضم 70 نوعا يوجد فيها جنس واحد في العراق Mosa (Guest, 1933)، و اضاف كيست بان كثير من الباحثين قد ضم العائلتين (Streliziaceae, Lowiaceae) الى عائلة الموز وعدها عائلة واحدة منهم (Takhtajan, 1966) وهجنسون (Hutchinson, 1959) وقد شخص داوسن (Dowson, 1921) نوع الموز في العراق *M. paradisiaca*، واعتبره النوع الوحيد من الموز، وبعد (12) عاما أضاف كيست (Guest, 1933) بأنه يوجد نوع اخر هو *M. sapientum* بينما سجل الباحثان حسين وقاسم (Husain & Kasim, 1975) نوعين متوزعة في العراق هما *M. paradisiacal* والنوع *M. Nana* ويضيف كيست انه ربما يوجد منه 2-4 انواع متوزعة في العراق.

اما عائلة الموز الافرنجي (الكانا) فتضم جنس وحيد هو *Canna* ويذكر كيست بأنه يوجد منه 25 نوعا في العالم ثلاثة منه في العراق هي *C. generalis*, *C. flaccida*, *C. indica* بينما ذكر الموسوي (Al-Musawi, 1987) بأنه يوجد منه اكثر من 60 نوع في العالم منها نوع واحد متوزع في العراق هو *C. indica*

تمت دراسة العديد من الصفات التشريحية لبشرة اوراق جنسي الموز *Mosa* والكانا *Canna* ونوعي الكانا *C. indica* و *C. flaccida* لاستخدامها بوصفها ادلة تصنيفية تدعم الصفات المظهرية وتساعد في فصل الوحدات التصنيفية المدروسة وقد تبين من خلال الدراسة الحالية ان عدد من هذه الصفات كانت متداخلة بين الوحدات التصنيفية خاصة الصفات الكمية، بينما كانت الصفات النوعية اهمية بالغة في التمييز بين الوحدات التصنيفية، فضلا عن الافادة من عدد من الصفات الكمية وخاصة العددية كأعداد الخلايا والثغور في الفصل او التمييز بين الوحدات التصنيفية.

تعد العديد من الصفات النوعية لبشرة الاوراق مهمة في فصل وتشخيص الانواع والاجناس والعوائل، لذا فقد اعتمدها الكثير من الباحثين منذ بدايات القرن الماضي كعبد الله (Avduluv, 1931)، وميتكالف (Metckalfe, 1960)، ونيوتن (Newton, 1964)، واوندنر (Onder, 1978) والبيرماني (AL-Bermani, 1999) والكرعاوي (AL-Garaawy, 2005)، فقد اعتمدوها كصفات مهمة في تشخيص العوائل والاجناس والعشائر والانواع وحتى الضروب في النباتات الاحادية الفلقة.

والدراسة الحالية للجنسين *Mosa* و *Canna* ونوعي الجنس الاخير تؤكد اهمية الدراسات التشريحية في تصنيف هذه الوحدات التصنيفية، فقد اختلف الجنسان في شكل الخلايا الطويلة الثغرية، حيث كان شكلها متساوي الابعاد او مربعاً في الغالب في جنس الموز على البشرة السفلى، بينما اتخذت شكلاً بيضوياً متطاولاً في الغالب او متطاول غير منتظم في النوع *C. flaccida*، بينما يكون بشكل مستطيل في النوع *C. indica* ويكون طول الخلايا في نوعي الجنس *Canna* مساوياً لطول الثغور مع الخليتين المساعدتين، بينما في جنس الموز فطولها يكون ثلث طول الثغور مع الخليتين المساعدتين مما يشير الى اهمية هذه الصفة النوعية في التشخيص و التمييز بين الوحدات التصنيفية.

من الصفات النوعية الاخرى هو شكل الثغور وخلاياها المساعدة، فقد كان شكل الثغور مع الخليتين المساعدتين الموازيين لخليتي الثغور الحارستين، كان بشكل قبوي منخفض Low Dome shape، وغالباً مستطيلة في جنس الموز، بينما كان شكلها في جنس الكانا قبوي مرتفع high Dome shape، اما نوعي الجنس الاخير، فكانت في النوع *C. indica* بشكل قبوي مرتفع، بينما في النوع *C. flaccida* فشكلها قبوي مرتفع بقمة مسطحة مما يعطيها شكلاً سداسياً طويلاً. مما يشير الى اهمية هذه الصفة في عزل وتشخيص المراتب التصنيفية المدروسة.

اما شكلها على البشرة العليا فقد كانت في الموز بشكل سداسي متساوي الابعاد، حيث كان شكل الخليتان المساعدتان المرافقان للثغور ثلاثية الزوايا Triangular shape، بينما كانت اشكال الثغور للجنس *Canna* نفس ما ذكر للبشرة السفلى أي قبوي مرتفع، وبذلك يمكن الاعتماد على هذه الصفة ايضاً في التشخيص وعزل المراتب التصنيفية اعلاه.

كذلك الحال لأشكال الخلايا المساعدة الأخرى فالخليتين العموديتين على الثغور والخليتين الموازييتين للثغور (مع خليتيه المساعدتين) تكون بشكل مستطيل ضيق، تلتقي هذه الخلايا الأربع حول الثغور وتتحنى حوله لتعطيها شكلاً دائرياً في بشرة الموز، بينما في جنس الكانا فغالباً ما توجد فيه خليتان موازيتان للثغور دائرية الشكل و احياناً مربعة، ويندر وجود الخليتان العموديتان على الثغور وان وجدت فشكلها مستطيل عريضاً في النوع *C. indica*، او بيضوياً متطاولاً في النوع *C. flaccida* ومما سبق ذكره يمكن الاستفادة من هذه الصفة في عزل وتشخيص الجنسين عن بعضهما البعض وكذلك نوعي الجنس *Canna*.

من الصفات النوعية الاخرى التي لها اهمية في فصل الجنسين هو وجود مناطق مافوق العروق على البشرة العليا، حيث لا توجد مناطق مافوق العروق في بشرة الموز، بينما يمكن ملاحظة مناطق عروق وما بين العروق في بشرة الكانا العليا.

والصفات النوعية المذكورة سابقاً والتي أفادت في تشخيص وعزل الوحدات التصنيفية المدروسة حالياً لم يتم دراستها أو التطرق إليها من قبل أي من الباحثين سوى ما ذكره كولبرج (Goldberg, 1989) بأن عائلة الموز Mosaceae تكون فيها الخلايا الحارسة للثغور متناظرة ، وان عدد الخلايا المساعدة فيها متعددة وان الفرق بينهما وبين خلايا البشرة الاعتيادية ضعيفاً، كما ذكر ان الثغور في عائلة الكانا Cannaceae تكون فيها الخلايا الحارسة للثغور أيضاً متناظرة ، والخلايا المساعدة فيها 2-4 خلايا أو أكثر.

اما في الدراسة الحالية فقد كان عدد الخلايا المساعدة في البشرة السفلى للموز بين (6-8) خلايا ، بينما تراوح بين (2-6) خلايا في الكانا *Canna* ، كما وامكن تمييز نوعي الكانا استناداً الى هذه الصفة حيث تراوح عدد الخلايا بين (2-6) وبمعدل (4) خلايا في *C.indica* بينما في *C.flaccida* تراوح بين (2-4) وبمعدل (2) خلية ورغم تداخل هذه الصفة الكمية الا انها يمكن ان تساعد في عزل وتشخيص النوعين ، كم انها مهمة في تشخيص وعزل الجنس *Mosa* ، حيث يصل الى (9) خلايا .

اما الصفات الكمية الاخرى التي اسهمت في التشخيص هي صفة ابعاد الخلايا الطويلة ، فقد تراوحت ابعادها في البشرة السفلى وفي الصفوف الثغرية لجنس الموز بين (10-20) x (10-12.5) مايكرومتر مما يشير الى اهمية الصفة في عزل الجنس *Canna* عن بعضهما البعض ، بينما تداخلت ابعاد الخلايا الثغرية بين نوعي الجنس الكانا ، ولكن يمكن الاستفادة من معدلاتها كصفة مساعدة حيث كان المعدل (62.5) x (47) في النوع *C.indica* ، بينما في النوع *C.flaccida* كان (50) x (27) مايكرومتر.

كذلك الحال لابعاد الخلايا الطويلة اللاثغرية للبشرة السفلى في جنس الموز كان (37.5-50)x(10-15) مايكرومتر ، بينما تراوح في جنس الكانا بين (62.5-100)x(25-35) مايكرومتر مما يفيد في تشخيص وعزل الجنس *Canna* عن بعضهما البعض ، بينما تداخلت الاطوال بين نوعي الكانا الى انه يمكن الاستفادة من المعدلات كصفة مساعدة في التشخيص .

اما ابعاد الخلايا الطويلة على البشرة العليا فقد تداخلت اطوالها بين الجنس *Canna* ، بينما كان عرض الخلايا غير متداخل فقد تراوح بين (7.5-10) مايكرومتر في الموز ، بينما كان بين (12.5-50) مايكرومتر في الكانا . مما يميز الجنس *Canna* ، بينما تداخلت الابعاد كذلك بين نوعي الجنس الكانا .

اما اعداد الخلايا في الحقل المجهرى الواحد فقد اظهرت فائدة كبيرة في عزل وتشخيص الجنس *Canna* ، فقد تراوحت اعداد الخلايا الطويلة للبشرة السفلى في الموز بين (167-360) خلية، بينما في جنس الكانا فتراوحت بين (33-120) خلية ، بينما تداخلت اعدادها بين نوعي الجنس كانا ، كما ان اعداد الخلايا على البشرة العليا للموز فقد تراوح بين (160-296) خلية ، بينما كان في الكانا بين (37-143) خلية بينما تداخلت الاعداد بين نوعي الجنس الاخير .

اما اعداد صفوف الخلايا الكلي بين عرقين متوازيين فقد تداخلت بين الجنس *Canna* ولكنها تمايزت بشكل ملحوظ بين نوعي الجنس الكانا ، كذلك الحال لعدد صفوف الخلايا الطويلة الثغرية ، فقد كانت صفوف الخلايا الكلي في الموز بين (9-13) صففاً، بينما في النوع *C.indica* بين (3-5) صفوف بينما في *C.flaccida* بين (20-32) صففاً. مما يشير الى فائدة الصفة في عزل وتشخيص نوعي الجنس كانا .

كذلك الحال مع اعداد الصفوف الثغرية ، حيث كانت في الموز (2-4) صفوف ، وفي *C.indica* بين (1-2) صففاً، بينما في النوع *C.flaccida* بين (6-9) صفوف . مما يميز النوعين الاخيرين عن بعضهما البعض.

اما الثغور فقد بدت متباينة في انواعها او اشكالها ، وابعادها بين الوحدات التصنيفية المدروسة ، وقد افادت هذه التباينات في فصل وتشخيص الجنس *Canna* ، وقد ذكر ميتكالف (Metckalfe, 1960) بان لصفة انواع الثغور اهمية بالغة في تشخيص وعزل الوحدات التصنيفية خاصة الانوع والجناس في النباتات احادية الفلقة ، واعتمدها الكثير من الباحثين امثال العالم الروسي عبدالله (1931، A v d u l u v) ، والبيرماني (1999، A L - B e r m a n i) والحسيني (2000، AL- Hussaini) في دراستهم وعلاقتها بالتعدد المجموعي الكروموسومي Polyploidy. وتتفق هذه الدراسة مع ما جاء به الباحثون ، فقد تغايرت انواع الثغور بين الجنس *Canna* ، وكذلك نوعي الجنس *Canna* كما تم توضيحه سابقاً بالنسبة للصفات النوعية ، اما الصفات الكمية كابعاد الثغور و اعدادها ، فقد كان لصفة أطوال الثغور على البشرة السفلى أهمية في عزل الجنس *Canna* عن بعضهما البعض كذلك أطوالها على البشرة العليا ، تراوحت بين (32.5-37.5) مايكرومتر في الموز بينما كانت (40-100) مايكرومتر في الكانا ، بينما تداخلت صفة الطول بين نوعي الكانا ، أما أقطار الثغور فقد أفادت أيضاً في عزل الوحدات التصنيفية خاصة على البشرة السفلى حيث كانت الأقطار لبشرة الموز بين (22.5-25) مايكرومتر ، بينما كانت أكبر من جنس الكانا حيث تراوحت بين (30-25.5) مايكرومتر كذلك تمايزت بين النوعين حيث تراوحت بي (45-25.5) مايكرومتر في النوع *C.indica* وبين (30-37.5) مايكرومتر للنوع *C.flaccida* مما يشير إلى أهمية هذه الصفة في عزل الجنس *Canna* وكذلك النوعين على البشرة العليا فقد كانت متداخلة بين الجنس *Canna* ولكنها تمايزت بين نوعي الجنس الكانا ، حيث كانت بين (40-50) مايكرومتر في النوع *C.indica* بينما كانت في *C.flaccida* بين (30-35) مايكرومتر مما يميز ويفصل النوعين عن بعضهما البعض استناداً للصفة .

كذلك كان لإعداد الثغور أهمية في عزل الجنس *Canna* حيث كانت على البشرة السفلى للموز بين (17-28) ثغراً بينما في جنس الكانا بين (9-15) ثغراً ، أما على البشرة العليا فقد كانت في الموز بين (0-1) ثغراً وبمعدل (0) بينما كانت بين (1-7) ثغور مما يشير إلى أهمية هذه الصفة في فصلها عن بعضهما البعض ، غير إنها كانت متداخلة بين نوعي الجنس كانا *Canna* إلا انه يمكن الاعتماد على معدلاتها للإفادة منها كصفات مساعدة للتمييز بين النوعين .

وحدات التصنيفية	طول الخلايا الطويلة في الصفوف الثغرية (40X)Mm	عرضها Mm	طول الخلايا الطويلة في الصفوف اللاثغرية (40X)Mm	عرضها Mm	طول الثغور (40X)Mm	قطر الثغور (40X) Mm	عدد خلايا البشرة في الحقل المجهرى الواحد (40x)Mm	عدد الثغور في الحقل المجهرى الواحد (40X) Mm	عدد صفوف الخلايا الثغرية بين عرقين	عدد صفوف الخلايا الكلية بين عرقين
Mosa	20(17.5)10	12.5(11)10	50(45)37.5	15(12.5)10	35(32.5)30	37.5(25)2 2.5	360(200)167	28(25)17	4(3)2	13(12)9
Canna	75(62.5)50	50(47)37.5	100(95)75	27.5(25)25	75(52.5)50	(42.5)40 50	120(75)33	12(10)9	2(1)1	5(4)3
	65(50)35	30(27)25	87.5(75) 2.5	35(30)25	45(40)37.5	35(32.5)3 0	120(100)90	15(12)10	9(8)6	32(24)20

جدول (1) يوضح الصفات الكمية للبشرة السفلى في ورقة جنسي الموز Mosa والكانا Canna بنوعيه

الوحدات التصنيفية	طول الخلايا الطويلة في الصفوف الثغرية Mm(40x)	عرضها Mm	طول الخلايا الطويلة في الصفوف اللاثغرية Mm(40x)	عرضها Mm	طول الثغور Mm (40x)	قطر الثغور Mm	عدد خلايا البشرة في الحقل المجهرى (40x)	عدد الثغور في الحقل المجهرى الواحد (40x)	عدد الصفوف الثغرية بين عرقين	عدد صفوف الخلايا الطويلة الكلي بين عرقين
<i>Mosa</i>	87.5(75)50	10(8.5)7.5	137.5(125)87.5	12.5(10)7.5	37.5(35)32.5	25(25)22.5	296(198)160	1(0)0	--	--
<i>indica</i>	62.5(50)37.5	50(45)37.5	125(100)75	37.5(35)25	100(75)50	52.5(50)45	130(97)37	4(3)1	6(4)3	25(23)20
<i>canna</i>	625(40)37.5	17.5(15)12.5	100(85)75	27.5(25)25	52.5(45)40	37.5(35)30	143(120)80	7(5)3	17(15)12	50(40)34
<i>flaccida</i>										

جدول (2) يوضح الصفات الكمية للبشرة العليا في ورقة جنسي الموز *Mosa* و الكانا *Canna* بنوعيه

References

- 1-AL-Bermani ,A.K.(1996).Systematic studies in the genus Aelaropus trin . (poaceae) . Mu'tahjornal for research&Vol . 11, No. 3:p.71- 92 .
- 2- AL-Bermani , A.K. (1999) Epidermal characteristics of the leaves lemmas & paleas in the tribe Brachypodieas . Harz (poaceae) , jornal of Babylon Vniv . Vol . No.
- 3- AL-Gaeaawi , N.I. (2006) Morphological and Anatomicl study of the genus Echinochlea L .(Gramineae) InIraq.M.Sc., Thesis .Vniv .of Karbala,(in Arabic).
- 4- AL- Husaini ,E.M.(2000) .Systematic and Cytogenetic Studies in the genus Bromus l . of Iraq .M.Sc,Thesis.Vniv of Babylon.
- 5- AL- Musawi ,A.H.(1987). Plant taxonomy ,Vniv .Of Baghdad . 379 pp .(in Arabic)
- 6- Avdulov , N.P.(1931).Karyo – Systematic he Untersuchungen der Gramineen . Bull.Appl.Bot .Gene ,pl.Breed . Suppl .44:pl428.
- 7- Bentham ,G.(1881) Notes on , Gramineae .J.Linn.Soc.Bot.19:p.14.134.
- 8- Bor,N.L. (1968) .Gramineae..InC.C.Townsend and E.Guest flora of Iraq .Ministry of Agriculture ,Vol.9,588pp.
- 9- Bor ,N.L.(1970) .Gramineae .Im K.H.Rechinger , flora Iranica , N.70. AKademish e Druch V.verlagsanslal ,Graz-Austria,551pp .
- 10 – Chakravarty , H.L.(1976). Plant wealth of Iraq .S.NGuharay ,At Sree Sara Swaty.LTD:55 – 70 pp.
- 11 – Clark ,J.(1989). Preparation of leaf epidermis for to pographic study .Stain Technol .,35:p.35 -39 .
- 12 – Goldberg ,A.(1989) .Classification ,Evolution ,and phylogeny of the families of Monocotyledons .Simthsonian Institution press. Washington D.C.pp – 74
- 13 – Guest,E(1933).Nteson plants and plant products with their colloquial Names in Iraq :Bull 27 .Government press 52 pp .
- 14 – Hitchcock ,A.S.(1950)Manual of grass of the United state Government printing office, Washington ,p7 11 – 717 .
- 15 – Hubbard , C.E.(1984). Grasses .Agudie to their structure , identification uses and distribution in the British Isles ,3rd Penguin Book ,363 pp .
- 16 – Lawerence ,G.H.M.(1951).Taxonomy of vascular plant , the Macmilla Company , New York , 838 pp .
- 17 – Metchalfe , C.R.(1960).Anatomy of monocotyledons .I.Gramineae London :Oxford Uniro press ,731 pp .
- 18 – Newton ,L.E.(1965) . Taxonomic studies in the British species of Puccinella . M.sc.,thesis .Vniv of London .
- 19 – Onder , A.(1978) .Taxonomic and genetic variation in Scottish Festuca ovina L.S.I.ph .D., thesis ,Aberdeen .
- 20 – Radford , A.E.,Dickson ,W.C.,Massey ,J.R and Bell , C.R. and Bell ,C.R.(1974) .Vascular pant systematics .Harper and Row , New York,891pp. .
- 21 – Smith , P.M.(1980).Bromus .IN :T.G. Tutin , V.H.Heywood ,N.A. Burges , D.M.Moore , D.H.Valentine , S.M.Walters and D.A.Webb .Flora Eropaea Gambridge ,Vniv .press London and New Yor,Vol .V. p182 – 189 .
- 22 – Stace ,C.A.(1980) . plant taxonomy and Bio systematics . Great Britain at the pitman press , Bath ,279 pp .
- 23 – Stearn ,W.T.(1973). Botanical Latin ,2nd Edt .David and Chals London,566 pp.

شكل (١) يوضح التغيرات في أشكال وأبعاد خلايا و ثغور البشرة السفلى في

الجنسين *Canna, Mosa*

A: تمثل جنس الموز *Mosa*

B: تمثل النوع *C. indica*

C: تمثل النوع *C. flaccida*


شكل (٢) يوضح التغيرات في أشكال وأبعاد خلايا و ثغور البشرة العليا في

الجنسين *Canna, Mosa*

A: تمثل جنس الموز *Mosa*

B: تمثل النوع *C. indica*

C: تمثل النوع *C. flaccida*






A1




A2




B1



B2



C1



C2

لوحه (1) توضح التغيرات في أبعاد وأشكال تراكيب بشرة الأوراق العليا والسفلى للجنسين الموز و الموز الوردي حيث

- A1-بشرة عليا في جنس الموز
- A2-بشرة سفلى في جنس الموز
- B1-بشرة عليا في النوع *Cana indica*
- B2-بشرة سفلى في النوع *Cana indica*
- C1-بشرة عليا في النوع *Cana flaccida*
- C2-بشرة سفلى في النوع *Cana flaccida*