

Effect of Magnetically Treated Water Quality on Germination of Three Wheat Cultivars (*Triticum aestivum L.*)

تأثير الماء المعالج مغناطيسياً ونوعيته في إنبات ثلاثة أصناف من الحنطة
(*Triticumaestivum L.*)

ثامر خضير مرزة

قسم علوم الحياة
كلية العلوم / جامعة الكوفة
البحث مستقل

فاضل كاظم كريم
الابراهيمي

قسم علوم الحياة
كلية العلوم / جامعة الكوفة

الخلاصة:-

نفذت التجربة في حقل تابع للمعهد الفني / كوفة أثناء المدة من 7/12/2012 ولغاية 4/1/2013 بهدف تحديد تأثير نوعية مياه الري وشدة معالجتها مغناطيسياً لثلاثة أصناف من حنطة الخبز (*Triticumaestivum L.*) في مؤشرات الإنبات (نسبة الإنبات ومعامل سرعة الإنبات ومعامل تحفيز الإنبات) وطول كل من الجذير والرويشة بعد أربعة أسابيع من البذر.

صممت التجربة بالقطاعات العشوائية الكاملة Randomized Complete Block Design (RCBD) بترتيب الألواح – المنشأة المنشأة split-plot arrangement. وبثلاثة مكررات لكل معاملة. وتضمنت دراسة ثلاثة عوامل هي نوعية المياه (ماء النهر أو ماء البئر) عامل رئيسياً Main plot وثلاثة أصناف من حنطة الخبز هي (إباء-99 ورشيد وتموز-2) عاملأ ثانويًا Sub-plot والمعالجة المغناطيسية لماء الري بأربع شدات هي (Control, 750 و 1500 و 3000 كاوس) عاملأ ثالثياً Sub-sub-plot. وإستعمل لمقارنة المتوسطات اختبار أقل فرق معنوي المعدل Revised Least Significant (RLSD) عند مستوى إحتمال 0.05

وأشارت النتائج إلى أن معظم المؤشرات قيد الدراسة لمؤشرات الإنبات والنمو الخضري المبكر قد تفوقت عند الري بماء النهر مقارنةً مع ماء البئر. وحصل الصنف رشيد على أعلى المعدلات أعلاه، فيما كانت شدة مغنتة الماء بـ 750 كاوس قد تفوقت على بقية الشدات بما يخص مؤشرات الإنبات والشتتين 1500 أو 3000 كاوس في مؤشرات النمو الخضري المبكرة.

وخلصت التجربة إلى أنه يمكن إستعمال تقنية الماء المغнет في إسراع وزيادة مؤشرات الإنبات ومن ثم زيادة النمو فضلاً عن تحسين خواص التربة بإذابة أملاحها.

كلمات مفتاحية: ماء، المعالجة المغناطيسية، إنبات، حنطة.

Abstract:

An experiment was conducted in afield belong to the Technical Institute of Kufa, during the period from 7/12/2012 till 4/1/2013 determine the effect of irrigation water quality and its intensity of magnetically treated of bread wheat three cultivars (*Triticum aestivum L.*) on some germination parameters (germination percentage, germination coefficient and germination index) and early vegetative growth (Radicle and plumule length) four weeks after sowing.

The experiment was designed as Randomized Complete Block Design (RCBD) and split split – plots arrangement with three replication. The experiment included studying three factors; irrigation water quality (river water or well water) were put as Main plot, wheat bread cultivars. (IPAA-99, Rashid and Tamuze-2) Sub-plot and magnetic treatment of water with four intensities (0^{Control}, 750, 1500 and 3000 gauss) Sub-sub-plot. Revised Least Significant Difference (RLSD) at 0.05 probability was used to compare means.

Results showed that most of germination studied parameters and early vegetative growth were superior for river water compared to well water. Rashid cultivar gave the highest means for the studied parameters compared to the other cultivars. 750 gauss produced the highest germination parameters means. Whereas, 1500 and 3000 gauss treatments gave the highest means for early vegetative growth in radicle and plumule lengths.

It could be concluded that using magnetically technique of irrigation water resulted in speedy and increasing germination parameters and then increasing growth besides, improving soil characteristics due to depletion Of its salinity.

Keywords: Water, Magnetic treatment, Germination, Wheat.

المقدمة

إن تدني كفاءات طرائق الري المعروفة أدى إلى حدوث أضرار سلبية في المياه والتربيه على حد سواء؛ الأمر الذي إنعكس سلباً على الإنبات وكمية ونوعية الإنتاج النباتي، مما دعى إلى ضرورة إحداث تغيرات أساسية تتناسب مع حجم هذه الأضرار، ومن هذه التغيرات إتباع الطرائق والوسائل الحديثة في الري؛ إذ تعد طريقة الري بـاستعمال الماء المعالج مغناطيسياً (الماء الذي يتم الحصول عليه بعد تمريره من خلال مجال مغناطيسي معين) إحدى الوسائل في ترشيد استعمال المياه لكونها تميز بكافأة إجمالية عالية وقلة الضائعات المائية الحقلية وزيادة الإنتاج لوحدة الحجم من الماء (1).

تعد الحنطة الغذاء الرئيس الثابت على المستوى العالمي، ومع زيادة عدد السكان وتقدمه هنالك تحد مستمر لتعزيز وزيادة إنتاجيتها (2). وترتبط كفاءة المحصول عموماً بكفاءة إنبات البذور (3) و (4) وأن تطبيق المجال المغناطيسي على الماء ذو تأثير تنشيطي فيما يتعلق بزيادة إنبات البذور؛ ذلك لأن الرابطة الهيدروجينية في الماء السائل تتأثر بشدة في المجالات لكهربائية والمغناطيسية لذا فإن الماء المغفط يحمل لخصائص الفيزيائية والكميائية المختلفة من الماء العادي (5). كما أن ظاهرة تمنفط الماء نتيجةً لوقوعه تحت تأثير مجال مغناطيسي خارجي تعود إلى تراصف ذراته أو جزيئاته، وأن التوزيع العشوائي لها يؤدي إلى عدم ظهور عزم مغناطيسي للماء ولكن عندما يتعرض إلى مجال مغناطيسي خارجي فإن ثناياات الأقطاب المغناطيسية لذراته وجزيئاته سوف تترافق بإتجاه المجال المستعمل مما يؤدي إلى تقوية المجال المغناطيسي المستعمل ونشوء عزم مغناطيسي للماء فتُعرف تلك الظاهرة بـتمنفط الماء الذي تكون جزيئاته غير المغفطة في نطاقات عشوائية محصلة العزم المغناطيسي لها تساوي صفر في حين عند تعرضها لمجال مغناطيسي خارجي فإن العزم المغناطيسي للذرات تمثل بالإصطدام مع ذلك المجال، والذي يؤدي إلى تمنفط الماء (6). أما دور التحفيز المغناطيسي لبذور الحنطة فإنه أدى إلى تسريع عملية الإنبات، على الرغم من أن المجالات المغناطيسية تسرع من إنبات البذور ونمو النباتات فضلاً عن شدة المجالات المغناطيسية المطبقة ووقت تعریض البذور لها، فأنها تختلف اختلافاً كبيراً فيما بينها (7). لذا أجريت التجربة الحالية لتحديد تأثير الماء المعالج مغناطيسياً في إنبات ونمو البدارات لثلاثة أصناف من الحنطة (*Triticum aestivum L.*).

المواد وطرائق العمل 1- إجراء التجربة The Conducting of Experiment

نفذت التجربة في حقل تابع للمعهد الفي في الكوفة شمال غرب محافظة النجف الأشرف والذي يبعد عنها مسافة 10 كم وهي تقع ضمن خط عرض 32° شمالياً وطول 44° شرقاً وإرتفاع 25 م عن مستوى سطح البحر في موسم النمو (2012-2013) م لتربة غرينبيت مزيجية. صُمِّمت التجربة وفقاً لتصميم القطاعات العشوائية الكاملة Randomized Complete Block Design (RCBD) بترتيب الألواح – المنشفة المنشقة split-plots arrangement (8). وتضمنت التجربة دراسة ثلاثة عوامل هي:

عامل رئيسياً Main plot: نوعية ماء الري (ماء نهر وماء بئر).

عامل ثانوياً Sub-plot: أصناف حنطة الخبز الثلاث (إياء - 99 ورشيد وتموز - 2).

عامل ثالثياً Sub-sub-plot: مغفطة ماء الري بأربعة شدات هي (0 و 750 و 1500 و 3000) كالوس.

أخذت عينات عشوائية من تربة الحقل قبل وبعد الزراعة على عمق (0-30) سم بوساطة الأوكر لتحديد بعض من صفات التربة الفيزيائية والكميائية التي حللت في المختبر المركزي التابع لقسم علوم الحياة – كلية العلوم – جامعة بغداد، وكما مُبين في جدول (1). كما تم تحليل مياه الري قبل البدء بمعالجتها مغناطيسياً في المكان ذاته الذي حللت به التربة الحقل وكما مُبين في جدول (2).

جدول 1: بعض الصفات الكيميائية والفيزيائية لترية الحقل قبل وبعد عملية الزراعة

قبل الزراعة										عينات التربة قبل البدء بعملية الزراعة	
مفصولات التربة %			المادة العضوية %	العناصر الجاهزة (مايكروغرام. غم⁻¹)				EC (ds. m⁻¹)	pH		
Rمل Sand	غرين Silt	طين Clay		Mg	K	P	N				
47.00	19.60	33.40	1.12	184.69	89.27	13.65	18.34	7.60	7.78		
بعد الزراعة											
مفصولات التربة %			المادة العضوية %	العناصر الجاهزة (مايكروغرام. غم⁻¹)				EC (ds. m⁻¹)	pH	عينات التربة المرورية بالماء المغمض	
Rمل Sand	غرين Silt	طين Clay		Mg	K	P	N				
38.05	38.90	23.05	1.30	277.50	140.75	3.40	29.00	4.10	6.50	0	
35.00	37.00	28.00	0.90	97.50	54.50	3.50	31.00	2.60	6.77	750	
38.05	35.95	26.00	1.50	255.00	123.25	4.00	34.00	2.55	6.70	1500	
44.73	33.27	22.00	1.40	37.50	43.00	0.50	20.00	2.43	6.60	300	
34.45	38.55	27.00	0.85	325.00	193.00	3.00	22.00	7.77	6.90	0	
27.75	45.25	27.00	1.00	262.50	156.50	0.50	18.00	3.00	6.70	750	
32.83	44.67	22.50	1.40	70.00	56.75	3.50	25.00	3.00	6.80	1500	
47.50	24.50	28.00	1.70	277.50	193.00	3.10	26.00	3.62	6.60	3000	

جدول 2: بعض الصفات الكيميائية والفيزيائية لماء الري قبل المعالجة المغناطيسية

الأيونات الذاتية (مايكروغرام. غم⁻¹)							pH	التوصيل الكهربائي (EC)	نوع الماء
N	P	K	Ca	Na	Cl	SO₄			
9.00	11.00	13.00	5.00	7.00	10.00	8.00	7.75	1.2	نهر
2.00	5.00	12.00	8.00	30.00	29.00	38.00	8.50	1.5	بنز

بعد إجراء عمليات خدمة الحقل من حراثة وتنعيم للتربة قسم إلى قسمين: الأول يرى بماء النهر والثاني بماء البئر. تمثل كل مكرو بـ 12 وحدة تجريبية لكل من ماء النهر وماء البئر بأبعاد $(1 \times 1 \times 1)$ م وترك مسافة 1 م بين معاملات شدة المغناطيسة لكل نوع ماء مع المقارنة وفي كل قطاع رئيس عمل شق بعمق 50 سم وضع فيه بلاستيك (بولي أثيلين) لتجنب تسرب مياه الري مع ماء المقارنة.

قيس الشدة المغناطيسية للأجهزة مغناطيسية للأجهزة Magnetrons بقطر $\frac{1}{2}$ إنج وبشدود 0 و 500 و 1500 و 3000 Gauss meter الذي تم شراءه من مُنتجة الجوزي لسنة 2013 والذي قام بمعاييرته في وزارة العلوم والتكنولوجيا - دائرة تكنولوجيا ومعالجة المياه - قسم البحث والدراسات. نصبت مضخة لدفع الماء ذات رؤوس متعددة تتصل بأنابيب مطاطية تنتهي بأجهزة معالجة مغناطيسية موضوعة في بداية كل مز لتسهيل عملية جريان الماء.

زرعت بذور الحنطة للأصناف إباء-99 ورشيد وتموز-2 في الحقل بتاريخ 7/12/2012 بمعدل 35 كغم. دونم⁻¹ والذي يعادل حوالي 14 غم. م⁻² لكل صنف قيد الدراسة وسُقِيَتْ مباشراً وإستمرَّ رعي النباتات كلما دعت الحاجة إلى السقي، ولمدة ثلاثة أسابيع.

2- الصفات المدروسة Studied Characteristics

- النسبة المئوية للإنباتات (%) = $(\text{عدد البذور النابتة} / \text{العدد الكلي للبذور}) \times 100$.

$$\cdot \text{معامل نسبة الإنباتات} (\%) = [100 \times (T_x B_x + T_2 B_2 + T_1 B_1 / B_x + B_2 + B_1)] / (8).$$

T_1 : عدد البذور البازغة في اليوم الأول.

T_2 : عدد البذور البازغة في اليوم الثاني.

$$\cdot \text{مؤشر تحفيز الإنبات} = (8) (0.25 \times n_8 + 0.50 \times n_6 + 0.75 \times n_4 + 1 \times n_2).$$

n: نسبة الإنبات في اليوم المقرر (..., 8, 6, 4, 2).

• طول الجذير (سم)

• طول الرويشة (سم)

3- التحليل الإحصائي Statistical Analysis

إسْتُعْمَلْ نَصْمِيمِ الْقَطَاعَاتِ الْعَشْوَانِيَّةِ الْكَاملَةِ (RCBD) بِتَرْتِيبِ الْأَلْوَاحِ –
الْمَنْشَقَةِ الْمَشْقَةِ arrangemantSplit plots-plots ذات ثلاثة عوامل وبثلاث مكررات لكل معاملة؛ إذ إحتسبَ نوع ماء الري (ماء
نهر وماء بئر) عاملًا رئيسيًّا Main plot في التجربة وأصناف الحنطة (إباء-99 ورشيد وتموز-2) عاملًا ثانويًّا Sub plot
ومغنتة ماء الري بشدة (0 و 750 و 1500 و 3000) كاووس عاملًا ثالثًا Sub-sub plot، وقورنت متوسطات المعاملات
باستعمال اختبار أقل فرق معنوي المعدل Revised Least Significant Difference (RLSD) عند مستوى احتمال 0,05 (9).

Results النتائج

1- النسبة المئوية للإنبات (%)

يُتَضَّحُّ من جدول (3) تفوق ماء النهر في إعطاء أعلى نسبة إنبات في الحقل بلغت 52.06% مقارنةً بـ 50.66% لماء البئر.
وتتفوق الصنف رشيد بنسبة إنباته البالغة 53.71% على الصنفين إباء-99 وتموز-2 (الذين بلغت نسبة الإنبات لكلاً منهما 53.53% و 46.48%)، على التوالي. وتشير نتائج معاملات المغنتة أيضًا إلى أن معاملة 3000 كاووس أعطت أعلى نسبة إنبات بلغت 53.85% مقارنةً بـ 52.60% لمعاملة 750 كاووس و 51.05% لمعاملة المقارنة و 47.93% لمعاملة 1500 التي خفضت معنويًّا من نسبة الإنبات.

ويُشَيرُ التداخل الثنائي المعنوي بين ماء الري وأصناف الحنطة في الجدول نفسه إلى أن نسبة الإنبات لأصناف الحنطة كانت في أعلىها عند الصنف إباء-99 المرwoي بماء البئر والصنف رشيد المرwoي بماء النهر إذ بلغت (55.71 و 55.50)% لكلاً منهما، على التوالي. ولوحظ أيضًا أن نسبة الإنبات (49.32%) للصنف تموز-2 المرwoي بماء النهر كانت أفضل معنويًّا من المرwoي بماء البئر (44.35%).

كما سجَّلَ التداخل المعنوي بين ماء الري ومعاملات المغنتة أعلى نسبة إنبات للنباتات المرwoية بماء النهر المغнет بشدة 1500 كاووس وبماء البئر المغнет بشدة 3000 كاووس إذ بلغت نسبة الإنبات لكلاً منها (53.98 و 54.10)%، على التوالي مقارنةً بالمعاملات الأخرى بضمها معاملتي المقارنة لماء النهر 50.46% وماء البئر 51.61%.

وفيمَا يتعلَّقُ بالتدخل الثنائي بين أصناف الحنطة ومعاملات المغنتة فيُشيرُ إلى تفوق نسبة الإنبات الصنف إباء-99 مع معاملة المغنتة بشدة 3000 كاووس والبالغة 57.46% معنويًّا على جميع نسب الإنبات للأصناف الأخرى المعاملة بشدد مغناطيسية مختلفة.

ويُشَيرُ التداخل الثلاثي المعنوي في الجدول ذاته إلى أن كل صنف من أصناف الحنطة المزروعة تفوقت فيه نوعية الماء المغнет على مثيلاتها من النوع الآخر للماء؛ إذ تفوق الصنف إباء-99 المرwoي بماء البئر المغнет بشدة 3000 كاووس في نسبة إنباته البالغة 59.74% معنويًّا على مثيله المرwoي بماء النهر المغнет بالشدة ذاتها الذي سجَّلَ نسبة إنبات 55.18%， في حين تفوقَ الصنف رشيد المرwoي بماء النهر المغнет بشدة 1500 على الصنف ذاته المرwoي بماء البئر بالشدة ذاتها والذين بلغت نسبة الإنبات لهما (58.11 و 50.46)%، على التوالي. بينما الصنف تموز-2 حقَّ مع ماء النهر المغнет بشدة 750 كاووس أعلى نسبة إنبات (54.21%) من مثيله المرwoي بماء البئر المغнет بجميع الشدود المغناطيسية المستعملة. مما يُشيرُ إلى اختلاف الإستجابة بين الأصناف لنوعية الماء التي تزوى به بشدد مغناطيسية مختلفة والتي تُعزى إلى الطبيعة الوراثية لكل صنف وما لها من تأثير في تحديد نسبة الإنبات.

2- معامل سرعة الإنبات (%)

أشارت النتائج المعروضة في جدول (4) إلى تفوق ماء النهر على ماء البئر في إحرار أعلى نسبة لمعامل سرعة الإنبات التي بلغت لكليهما (31.367 و 30.445)%، على التوالي. ولوحظَ من نتائج التأثير المعنوي لأصناف الحنطة في تلك الصفة أنها ارتفعت مع الصنف رشيد بنسبة 31.111% والذي تفوقَ معنويًّا على الصنفين إباء-99 وتموز-2 اللذان بلغت نسبة معامل الإنبات لهما (30.943 و 30.664)%، على التوالي. كما أعطت جميع معاملات المغنتة تأثيرًا سلبيًّا سلبيًّا للنسبة المئوي لمعامل سرعة الإنبات مقارنةً بـ 31.204% لمعاملة المقارنة التي أعطت أعلى نسبة للصفة المدروسة.

ويُلاحظُ من التداخل الثنائي بين ماء الري وأصناف الحنطة أن أعلى نسبة لمعامل سرعة الإنبات كانت مع الأصناف المرwoية بماء النهر مقارنةً بالمرwoية منها بماء البئر. ويُوضَّحُ التداخل بين ماء الري ومعاملات المغنتة أن معاملات المغنتة لماء النهر تفوقت معنويًّا على مثيلاتها لماء البئر، كما لوحظ أن معاملات المغنتة لماء النهر أثرت بشكلٍ سلبيٍ في نسبة معامل سرعة الإنبات إذ إنخفضت جميعها معنويًّا عن معاملة المقارنة لماء النهر التي بلغت عندها نسبة الصفة المدروسة أعلىها (31.738%) في حين كان العكس مع ماء البئر الذي زادت فيه نسبة معامل سرعة الإنبات عن معاملة المقارنة (30.761%) إلى 30.799% مع معاملة المغنتة 750 كاووس لماء البئر. وفي السياق ذاته بين التداخل المعنوي بين أصناف الحنطة ومعاملات المغنتة إختلاف الإستجابة بين الأصناف تجاه الشدد المغناطيسية حيث إستجاب الصنف إباء-99 لجميع معاملات المغنتة في تسجيل أعلى نسبة لمعامل سرعة الإنبات مقارنةً بمعاملة المقارنة وبالصنفين رشيد وتموز-2 اللذين لم يستجب كل منهما لمعاملات المغنتة في تلك الصفة التي إنخفضت معنويًّا عن معاملة المقارنة لكل منها.

ويُظهرُ التداخل بين العوامل الثلاثة أن تأثير ماء النهر المغнет على الأصناف المدروسة كان أفضل معنويًّا من ماء البئر للعوامل ذاتها في زيادة نسبة معامل سرعة الإنبات لأصناف الحنطة وخاصةً مع الصنف إباء-99 المرwoي بماء النهر المغнет بشدة 750 كاووس والذي أعطى أعلى نسبة مئوية لمعامل سرعة الإنبات بلغت 31.672% مقارنةً بجميع المعاملات الثلاثية الأخرى. في حين

مجلة جامعة كريلاء العلمية – المجلد الثالث عشر- العدد الثالث / علمي / 2015

أحرزت الصفة المدروسة أعلى نسبة لها (32.161 و 31.907) % على التوالي مع الصنفين رشيد وتموز-2 المرويان بماء النهر غير المغнет.

3- مؤشر تحفيز الإنبات

تشير النتائج المُبيَّنة في جدول (5) إلى أنَّ مؤشر تحفيز الإنبات لماء النهر (23.200) تفوقَ معيونياً على مثيله لماء البئر (20.691) في الحقل. أما تأثير أصناف الحنطة على هذه الصفة فكان من نصيب الصنف رشيد الذي تفوقَ معيونياً على الأصناف الأخرى بتسجيله أعلى مؤشر لتحفيز الإنبات بلغ 23.605 مقارنةً بـ 22.679 للصنف إباء-99 و 19.552 للصنف تموز-2. كما أنَّ التأثير المعني لمعاملات المغнطة إقتصر فقط على المعاملة 750 كاوس التي تفوقَت معيونياً على معاملة المقارنة بتسجيلها أعلى مؤشر لتحفيز الإنبات بلغ 23.028 مقارنةً بـ 22.442 لمعاملة المقارنة و 20.242 و 22.069 لمعاملتي 1500 و 3000 كاوس التي خففت معيونياً من تلك الصفة التي بلغت 20.242 و 22.069، على التوالي.

الداخل المعني بين ماء الري وأصناف الحنطة يوضح أنَّ أعلى زيادة للصالة المدروسة كانت عند صنف الحنطة رشيد المروي بماء النهر التي بلغت 25.323 مقارنةً بمتلازماتها لماء البئر أو المعاملات الأخرى لنوعية ماء الري مع الأصناف المدروسة، ولوحظ أنَّ ماء النهر أعطى لجميع الأصناف تفوقاً معيونياً على متلازمتها لماء البئر. كما أنَّ التداخل الثنائي بين ماء الري ومعاملات المغнطة معيونياً في مؤشر تحفيز الإنبات وخاصةً مع ماء النهر المغнет بشدة 750 كاوس الذي سجل أعلى مؤشر لتحفيز الإنبات بلغ 24.408 و متقدماً على بذلك على جميع المعاملات الأخرى لماء النهر والبئر. وفيما يخص التداخل الثنائي بين أصناف الحنطة ومعاملات المغنطة فإنَّ جميع الأصناف مع معاملة المغنطة 750 كاوس أعطت أعلى مؤشر لتحفيز الإنبات مقارنةً بمعاملات المغنطة الأعلى منها التي أعطت للأصناف الثلاثة مؤشرات لتحفيز الإنبات أقل عن المذكورة سابقاً.

وأظهرت نتائج التداخل الثنائي بين ماء الري وأصناف الحنطة ومعاملات المغنطة أنَّ المعاملات المتضمنة ماء النهر كانت أفضل معيونياً من المتضمنة ماء البئر ولجميع الأصناف، كما لوحظ أنَّ تأثير المغنطة بشدتتها الأقل 750 كاوس كانت الأفضل في تسجيلها أعلى مؤشرات لتحفيز الإنبات لغالبية الأصناف المروية بماء النهر أو البئر.

4- طول الجذير (سم)

بيَّنت نتائج التحليل الإحصائي لبيانات جدول (6) وجود تفوق معيونياً في متوسط طول الجذير للنباتات المروية بماء البئر (10.43 سم) مقارنةً بـ 7.40 سم للمروية بماء النهر. أما عن تأثير أصناف الحنطة فأشارت النتائج إلى أنَّ أعلى متوسط لطول الجذير بلغ 9.64 سم الذي كان من نصيب الصنف رشيد ثلاثة الصنف تموز-2 بطول 8.94 سم ثم الصنف إباء-99 بطول 8.17 سم، على التوالي. كما لم تختلف معاملات المغنطة (750 و 3000) كاوس معيونياً عن معاملة المقارنة في متوسط طول الجذير الذي بلغ 8.83 و 8.80 و 8.23 سم، على التوالي بقدر تفوق المعاملة 1500 كاوس على جميع المعاملات المذكورة في تسجيل أعلى متوسط لطول الجذير بلغ 9.81 سم. وبيَّنت النتائج الخاصة بالتدخل الثنائي بين ماء الري وأصناف الحنطة أنه لا يوجد تأثير معيونى للتدخل بين عاملين الدراسة بالرغم من تفوق الصالة المدروسة مع الأصناف المروية بماء البئر على متلازماتها المروية بماء النهر. كما بينَ التداخل المعني بين ماء الري ومعاملات المغنطة أنَّ تأثير المغنطة بشدتتها 1500 و 3000 كاوس على ماء البئر كانت أفضل معيونياً في زيادة متوسط طول الجذير إلى (10.700 و 10.950 سم، على التوالي مقارنةً بمتلازماتها لماء النهر 8.920 و 8.650 سم)، بالترتيب على الرغم من أنَّ معاملات المغنطة لماء البئر لم تختلف معيونياً مع معاملة مقارنتها (10.230 سم) لكنها تفوقت جميعاً على نظيراتها لماء النهر. ولم يعطي التداخل الثنائي بين أصناف الحنطة ومعاملات المغنطة أي تأثير معيونى للصالة المدروسة رغم اختلاف الإصناف في استجابتها لمعاملات المغنطة. وفي السياق ذاته لم تُثْبِت عوامل الدراسة مجتمعةً تأثيراً معيونياً فيما بين معاملاتها رغم تفوق الصنف رشيد مع ماء البئر المغネット بجميع شدده على باقي المعاملات الأخرى في متوسط طول الجذير للنبات.

5- طول الرويشة (سم)

يُوضَّح من النتائج المذكورة في جدول (7) أنَّ ماء الري تأثيراً معيونياً في زيادة معدل طول الرويشة لنباتات الحنطة إلى 7.17 سم مع ماء النهر مقارنةً بمعدل طول الرويشة لماء البئر البالغ 6.96 سم. وما يخص تأثير أصناف الحنطة فأشارت النتائج إلى أنَّ جميع الأصناف أثَّرت معيونياً في معدل طول الرويشة، وسُجِّل أعلى متوسط لها 7.75 سم مع الصنف رشيد الذي تفوق معيونياً على الصنف تموز-2 الذي أعطى 6.80 سم، أما أقل متوسط للصالة فكان للصنف إباء-99 الذي لم يختلف معيونياً في الصنف تموز-2 بتسجيله متوسطاً لطول الرويشة بلغ 6.65 سم. كما أنَّ معاملات المغنطة لم تؤثر معيونياً في تلك الصالة على الرغم من إعطاء معاملة المغنطة بشدة 3 كاوس أعلى متوسطاً لطول الرويشة بلغ 7.35 سم مقارنةً بطول الرويشة لمعاملة المقارنة البالغ 7.00 سم.

ويشير التداخل المعني بين ماء الري وأصناف الحنطة إلى أنَّ الأصناف إباء-99 ورشيد وتموز-2 المروية بماء النهر إمتلكت أعلى معدلاً لطول للرويشة بلغ (6.800 و 7.903 و 8.823) سم، على التوالي مقارنةً بمتلازمتها لماء البئر بطول (6.503 و 7.613 و 6.790) سم، على التوالي إضافةً إلى أنَّ الصنف رشيد مع ماء النهر أو البئر حقَّ أعلى متوسطاً للصالة بالمقارنة مع الأصناف الأخرى لماء النهر أو البئر.

كما لم يؤثر كل من التداخل الثنائي بين ماء الري ومعاملات المغنطة والتداخل بين أصناف الحنطة ومعاملات المغنطة معيونياً في متوسط طول الرويشة إضافةً إلى أنَّ التداخل الثنائي بين عوامل الدراسة لم يُثْبِت هو الآخر تأثيراً معيونياً للصالة المدروسة بالرغم من وجود بعض الاختلافات في متوسط طول الرويشة بين معاملات مغنطة ماء الري لأصناف الحنطة المزروعة.

مجلة جامعة كريلاء العلمية – المجلد الثالث عشر - العدد الثالث / علمي / 2015

جدول 3: تأثير نوعية ماء الري والصنف والمعالجة المغناطيسية للماء وتدخلاتها في النسبة المئوية للإنبات (%)

التدخل الثاني بين ماء الري وأصناف الحنطة	المعالجة المغناطيسية (كاوس)				أصناف الحنطة	ماء الري
	3000	1500	750	0		
51.35	55.18	46.23	53.72	50.30	إباء – 99	نهر
55.50	54.37	58.11	54.37	55.18	رشيد	
49.32	51.60	45.58	54.21	45.90	تموز – 2	
55.71	59.74	55.67	52.41	55.02	إباء – 99	
51.92	51.60	50.46	52.90	52.74	رشيد	بئر
44.35	50.62	31.58	48.02	47.21	تموز – 2	
			0.17		RLSD 0.05	
0.08	53.85	47.93	52.60	51.05	متوسط تأثير المعالجة المغناطيسية	
		0.07			RLSD 0.05	
التدخل الثاني بين ماء الري والمعالجة المغناطيسية						
متوسط تأثير ماء الري	المعالجة المغناطيسية (كاوس)				ماء الري	
	3000	1500	750	0		
52.06	53.71	49.97	54.10	50.46	نهر	
50.66	53.98	45.90	51.11	51.65	بئر	
0.04			0.10		RLSD 0.05	
التدخل الثاني بين أصناف الحنطة والمعالجة المغناطيسية						
متوسط تأثير أصناف الحنطة	المعالجة المغناطيسية (كاوس)				أصناف الحنطة	
	3000	1500	750	0		
53.53	57.46	50.95	53.06	52.66	إباء – 99	
53.71	52.98	54.28	53.63	53.96	رشيد	
46.84	51.11	38.58	51.11	46.55	تموز – 2	
0.06			0.12		RLSD 0.05	

جدول 4: تأثير نوعية ماء الري والصنف والمعالجة المغناطيسية للماء وتدخلاتها في معامل سرعة الإنبات (%)

التدخل الثاني بين ماء الري وأصناف الحنطة	المعالجة المغناطيسية (كاوس)				أصناف الحنطة	ماء الري
	3000	1500	750	0		
31.371	31.128	31.540	31.672	31.146	إباء – 99	نهر
31.511	31.346	30.945	31.593	32.161	رشيد	
31.220	30.890	30.936	31.148	31.907	تموز – 2	
30.516	30.292	30.532	31.221	30.020	إباء – 99	
30.712	30.777	30.337	30.854	30.882	رشيد	بئر
30.108	30.567	28.432	30.322	31.112	تموز – 2	
			0.022		RLSD 0.05	
0.011	30.833	30.453	31.135	31.204	متوسط تأثير المعالجة المغناطيسية	
		0.009			RLSD 0.05	
التدخل الثاني بين ماء الري والمعالجة المغناطيسية						
متوسط تأثير ماء الري	المعالجة المغناطيسية (كاوس)				ماء الري	
	3000	1500	750	0		
31.367	31.121	31.140	31.471	31.738	نهر	
30.445	30.545	29.767	30.799	30.671	بئر	
0.006			0.013		RLSD 0.05	
التدخل الثاني بين أصناف الحنطة والمعالجة المغناطيسية						
متوسط تأثير أصناف الحنطة	المعالجة المغناطيسية (كاوس)				أصناف الحنطة	
	3000	1500	750	0		
30.943	30.710	31.036	31.446	30.583	إباء – 99	
31.111	31.061	30.641	31.223	31.521	رشيد	
30.664	30.728	29.684	30.735	31.509	تموز – 2	
0.008			0.016		RLSD 0.05	

مجلة جامعة كربلاء العلمية – المجلد الثالث عشر - العدد الثالث / علمي / 2015

جدول 5: تأثير نوعية ماء الري والصنف والمعالجة المغناطيسية للماء وتدخلاتها في مؤشر تحفيز الإنبات

التدخل الثاني بين ماء الري وأصناف الحنطة	المعالجة المغناطيسية (كاوس)				أصناف الحنطة	ماء الري
	3000	1500	750	0		
22.548	22.845	20.998	24.652	21.698	إياء - 99	نهر
25.323	24.074	25.417	24.994	26.809	رشيد	
21.728	22.048	19.631	23.578	21.657	تموز - 2	
22.810	23.651	23.000	22.959	21.633	إياء - 99	
21.887	21.747	20.339	23.187	22.276	رشيد	بئر
17.376	18.052	12.070	18.800	20.583	تموز - 2	
			0.090		RLSD 0.05	
0.045	22.069	20.242	23.028	22.442	متوسط تأثير المعالجة المغناطيسية	
			0.036		RLSD 0.05	
التدخل الثاني بين ماء الري والمعالجة المغناطيسية						
متوسط تأثير ماء الري	المعالجة المغناطيسية (كاوس)				ماء الري	
	3000	1500	750	0		
23.200	22.989	22.015	24.408	23.388		نهر
20.691	21.150	18.469	21.648	21.497		بئر
0.026			0.052		RLSD 0.05	
التدخل الثاني بين أصناف الحنطة والمعالجة المغناطيسية						
متوسط تأثير أصناف الحنطة	المعالجة المغناطيسية (كاوس)				أصناف الحنطة	
	3000	1500	750	0		
22.679	23.248	21.999	23.805	21.665	إياء - 99	
23.605	22.910	22.878	24.090	24.542	رشيد	
19.552	20.050	15.850	21.189	21.120	تموز - 2	
0.031			0.063		RLSD 0.05	

جدول 6: تأثير نوعية ماء الري والصنف والمعالجة المغناطيسية للماء وتدخلاتها في متوسط طول الجذير (سم)

التدخل الثاني بين ماء الري وأصناف الحنطة	المعالجة المغناطيسية (كاوس)				أصناف الحنطة	ماء الري
	3000	1500	750	0		
6.90	6.94	8.04	6.44	6.18	إياء - 99	نهر
7.70	7.15	9.05	8.43	6.20	رشيد	
7.60	5.86	9.67	8.56	6.33	تموز - 2	
9.45	9.68	9.78	8.74	9.60	إياء - 99	
11.58	12.86	11.99	10.59	10.88	رشيد	بئر
10.27	10.31	10.33	10.25	10.21	تموز - 2	
			N.S		RLSD 0.05	
N.S	8.80	9.81	8.83	8.23	متوسط تأثير المعالجة المغناطيسية	
			0.94		RLSD 0.05	
التدخل الثاني بين ماء الري والمعالجة المغناطيسية						
متوسط تأثير ماء الري	المعالجة المغناطيسية (كاوس)				ماء الري	
	3000	1500	750	0		
7.40	6.650	8.920	7.810	6.237		نهر
10.43	10.950	10.700	9.860	10.230		بئر
0.56			1.33		RLSD 0.05	
التدخل الثاني بين أصناف الحنطة والمعالجة المغناطيسية						
متوسط تأثير أصناف الحنطة	المعالجة المغناطيسية (كاوس)				أصناف الحنطة	
	3000	1500	750	0		
8.17	8.310	8.910	7.590	7.890	إياء - 99	
9.64	10.005	10.520	9.510	8.540	رشيد	
8.94	8.085	10.000	9.405	8.270	تموز - 2	
0.77			N.S		RLSD 0.05	

جدول 7: تأثير نوعية ماء الري والصنف والمعالجة المغناطيسية للماء وتدخلاتها في متوسط طول الرويشة (سم)

الداخل الثاني بين ماء الري وأصناف الحنطة	المعالجة المغناطيسية (كاوس)				أصناف الحنطة	ماء الري
	3000	1500	750	0		
6.800	6.81	7.09	6.12	7.18	إباء - 99	نهر
7.903	8.07	7.37	8.19	7.98	رشيد	
6.823	6.85	6.44	7.01	6.99	تموز - 2	
6.503	7.23	6.44	6.44	5.90	إباء - 99	
7.613	8.64	7.89	6.82	7.10	رشيد	بئر
6.790	6.52	7.31	6.45	6.88	تموز - 2	
	N.S				RLSD 0.05	
0.045	7.35	7.09	6.83	7.00	متوسط تأثير المعالجة المغناطيسية	
	N.S				RLSD 0.05	
الداخل الثاني بين ماء الري والمعالجة المغناطيسية						
متوسط تأثير ماء الري	المعالجة المغناطيسية (كاوس)				ماء الري	
	3000	1500	750	0		
7.17	7.24	6.96	7.10	7.38	نهر	
6.96	7.46	7.21	6.57	6.62	بئر	
N.S	N.S				RLSD 0.05	
الداخل الثاني بين أصناف الحنطة والمعالجة المغناطيسية						
متوسط تأثير أصناف الحنطة	المعالجة المغناطيسية (كاوس)				أصناف الحنطة	
	3000	1500	750	0		
6.65	7.02	6.76	6.28	6.54	إباء - 99	
7.75	8.35	7.63	7.50	7.54	رشيد	
6.80	6.68	6.87	6.73	6.93	تموز - 2	
0.38	N.S				RLSD 0.05	

المناقشة Discussion

إنَّ تأثير ماء الري المستعمل في ري البذور(ماء النهر) كما هو مبين في الجداول من (3 – 7) زاد من المؤشرات المدروسة المتضمنة النسبة المئوية للإنباتات (جدول 3) ومعامل سرعة الإنباتات (جدول 4) ومؤشر تحفيز الإنباتات (جدول 5) وطول الرويشة (جدول 7) مما عدا طول الجذير (جدول 6) الذي زاد في النباتات المروية بماء البئر. ويرجع السبب في ذلك إلى أن النمو يتحدد بمجموعة عوامل منها طبيعة تتعلق بظروف التربة والمناخ والماء والتي في حالة عدم ملائمة أحدها يؤدي إلى انخفاض في مؤشرات النمو الآخر وهذا ما بينته النتائج إذ بلغ أعلى معدل للصفات المذكورة أعلاه مع ماء النهر مقارنة بالصفات ذاتها للنباتات المروية بماء البئر التي أعطت معدلات أقل معنوياً من المذكورة سابقاً، ذلك لأن وجود بعض الأملاح في ماء الري (ماء البئر) يؤدي إلى خفض مؤشرات النمو للنباتات من خلال التأثير المباشر لهذه الأملاح في الضغط الأزموري والسمية الأيونية النوعية التي تحدث خلاً في التوازن الأيوني الذي يؤثر سلباً في العمليات الحيوية التي تجري في النبات كون التأثير السلبي للأملاح يتمثل في إنقسام وإستطالة الخلايا من خلال تأثيرها في التفاعلات المؤدية إلى إنتاج مشحّعات الإنقسام والأوكسجيناتAuxins والسايتوكاينيناتCytokinins والجيرليناتGibberellins إلى تحديد حجم وعدد الخلايا في الحزم الوعائية الناقلة المتمثلة بالخشب واللحاء(10). فضلاً عن ملوحة الماء التي تؤدي إلى زيادة تراكم أيوني الصوديوم والكلور بترابيز تؤثر سلباً في نشوء البادرات فتؤدي إلى إجهاض تكينه(11).

وفيمما يتعلق بالتأثير المعنوي للأصناف المزروعة فيما بينها فإن المؤشرات جميعها تفوقت معنوياً في نباتات الصنف رشيد على نباتات الصنفين إباء-99 وتموز-2 والسبب في ذلك ربما يعود إلى تباين الأصناف في تركيبها وراثياً وما تمتلكه من خصائص كامنة إنعكس لاحقاً على خصائص إنبات بذورها وسرعة نموها وطريقة إستجابتها لنوعية الماء الذي ترثى به (12). وهذا ما وجده (13) على صنفين من الشعير (14) في دراسته على خمسة أصناف من الحنطة.

وبالنسبة لتأثير المعالجات المغناطيسية للمياه التي استعملت في ري نباتات أصناف الحنطة قيد الدراسة فقد زادت من هذه المؤشرات بالشدادات 750 و 1500 و 3000 (كاوس)، وهذا ما أشارت إليه النتائج الواردة في الجداول من (3 - 7). وهذا قد يكون راجعاً إلى أن الطاقة المغناطيسية تعمل على تغيير خواص المياه المستعملة لري وأبرزها تقليل زاوية ارتباط ذرات الهيدروجين بذرة الأوكسجين من 105° إلى 103° وتكسير المجاميع العنقودية لجزيئات الماء إلى مجاميص أصغر (من 12 إلى 8 مجاميص أو أقل) مما سبب زيادة في سبولة الماء وسهولة تشربه في البذور وامتصاصه من قبل النبات (15 و 16). كما أن منطقة مياه الري كان لها تأثيراً إيجابياً معتبراً في المؤشرات قيد الدراسة جماعياً و خاصة نسبة وسرعة الإنبات لبذور الحنطة المروية بالمياه المعالجة مغناطيسياً، كما أن المياه المعالجة مغناطيسياً تُسْبِّل من اختراق المياه للأغشية الخلوية للبذور (17) ومن ثم حصول تشرب امتصاص أفضل ودخول أسرع عبر خلايا النبات مقارنة بالمياه غير المعالجة مغناطيسياً (18). وهذا يعني تحفيز إنزيمي للأميليزAmylase والإنفرتيزInvertase على تحويل النشاء المخزون في البذور إلى كربوهيدرات ذاتية تمد الجنين بالطاقة وتشجعه على الإنبات والنمو (19). فضلاً عن أن المياه المغنة تُسْبِّل عملية ذوبان الأملاح في التربة وتعمل على زيادة نفاذية

المياه في مسامات التربة ومن ثم تُسَهِّل عملية غسل الأملاح في التربة وتمكن من تكوين الطبقة السطحية للتربة التي تؤثر في عملية الإنبات ومعامل سرعة الإنبات للبذور ونمو البادرات (20 و 17). إن زيادة طول الجذير والرويشة بإستعمال المياه المعالجة مغناطيسيًا مقارنةً بغير المعالجة منها قد يكون ناتجًا من كفاءة المياه المغنة في نقل العناصر الغذائية وزيادة جاهزيتها في التربة من خلال عملها في إذابة المعادن والأملاح وسرعة دخولها عبر الجذور (21). الأمر الذي يترتب عليه زيادة إقسام الخلايا وإستطالتها وإنساعها ومن ثم زيادة نمو النباتات (22).
لذا يمكن توظيف تقنية معالجة المياه مغناطيسيًا في زيادة مؤشرات الإنبات المهمة ومن ثم زيادة النمو والإنتاج فضلاً عن تحسين خواص التربة من خلال زيادة ذوبان الأملاح والتخلص منها مع مياه البزل.

المصادر References

- 1- Hilal, M.H. (2000). Application of magnetic technologies in desert agriculture seed germination and seedling emergence of some crops in a saline calcareous soil. National Research, Engineering Center, Cairo Department Head, Giza Department of Technology, Egypt.
- 2- Fujisaka, S.; Harrington, L.W. and Hobbs, P.R. (1994). Rice-wheat in South Asia: Cropping systems and long term priorities established through diagnostic research. Agric. Systems, 46: 169-187.
- 3- Nisar, M.; Ghafoor, A. and Khan, M.R. (2011). Phenotypic variation in the agronomic and morphological traits of *Pisum sativum*L. germplasm obtained from different parts of the world. Russian J. Genet., 47: 19-25.
- 4- Ghafoor, A. and McPhee, K. (2012). Marker assisted selection (MAS) for developing powdery mildew resistant pea cultivars. *Euphytica*, 186(3): 593-607.
- 5- Wojcik, S. (1995). Effect of pre-sowing magnetic biostimulation of the buckwheat seeds on the yield and chemical composition of buckwheat grain. Curr. Adv. Buckwheat Res. 93: 667-674.
- 6- القيسى، غازي ياسين (2004). الكهربائية والمغناطيسية. الطبعة الأولى، دار الميسرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، الأردن.
- 7- Pietruszewski, S. and Kania, K. (2010). Effect of magnetic field on germination and yield of wheat. Int. Agrophys. 24: 297-302.
- 8- محمد، عبد العظيم كاظم ومؤيد أحمد يونس (1991). أساسيات فسيولوجيا النبات. الجزء الثالث، كلية الزراعة، جامعة بغداد، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، العراق.
- 9- الرواوي، خاشع محمود وعبد العزيز محمد خلف الله (1980). تصميم وتحليل التجارب الزراعية. جامعة الموصل، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، العراق.
- 10- Liu, L.; Ueda, A. and Saneoka, H. (2013). Physiological responses of white Swiss chard (*Beta vulgaris* L. subsp. *cicla*) to saline and alkaline stresses. Aust. J. Crop Sci., 7(7): 1046 – 1052.
- 11-Barefoot, R.R. and Reich, S.C. (1992). The Calcium Factor: The Scientific Secret of Health and Youth. 5th ed. South Eastern, PA.Triad Marketing.
- 12- حسين، علي سالم وعلي صالح مهدي ورزاق عویز عیدان وعليوي عبد الرضا (2007). تأثير فترات الري وأعمق الحراثة ومواعيد الزراعة في نمو وحاصل الذرة الصفراء (*Zea mays* L.). مجلة جامعة كربلاء، 4: 56-67. العراق.
- 13- الدليمي، حمزة نوري عبيد (1990). تأثير مستويات مختلفة من الملوحة في بعض المثبتات المورفولوجية والفيسيولوجية لصنفين من نبات الشعير. رسالة ماجستير، كلية التربية ابن الهيثم للعلوم الصرفة، جامعة بغداد، العراق.
- 14- حمزه، جلال حميد (2011). علاقة درجة الحرارة في خصائص إنبات بعض أصناف حنطة الخيز. مجلة العلوم الزراعية العراقية، 42(2): 45-52.
- 15- Zhou, X.K.; Lu, W.G.; Zhou, C.Q.; Song, H.J.; Jian, T.S. and Xia, R.H. (2000). Montecarlo simulation of liquid water in a magnetic field. J. Appl. Physiol., 88: 1802-1805.
- 16- Toledo, L.J.E.; Ramalho, C.T. and Magriots, M.Z. (2008). Influence of magnetic field on physical-chemical properties of the liquid water-insights from experimental and theoretical models. J. Mol. Structure, 888: 409-415.
- 17- Hilal, H.M. and Hilal, M.M. (2000). Application of magnetic technologies in desert agriculture I: seed germination and seedling emergence of some crop in a saline calcareous soil. Egypt J. Soil Sci., 40(3): 413-422.
- 18- Colic, M.; Chien, A. and Morse, D. (1998). Synergistic application of chemical and electromagnetic water treatment in corrosion and scale prevention. CroaticaChemicaActa, 71(4): 905-916.

- 19- عطية، حاتم جبار وعادل سليم الكيار (2001). آلية تحمل تراكيب وراثية من حنطة الخبز لملوحة التربة. مجلة العلوم الزراعية العراقية، 32: 89-96.
- 20- Guo, L.; Zhao, O.K. and Han, Y. (1994). Germination test seeds treated by magnetized water and rare earth fertilizer solution. Particular Sci., 11: 32-40.
- 21- Davis, R.D. and Rawls, W.C. (1996). Magnetism and its effect on the living system, Environ. Inter., 22(3): 229-232.
- 22- Blake, W. (2000). Physical and Biological Effect of Magnet. In: Santwani, M.T. (ed). The Art of Magnetic Healing. B. Jain. India Gyaa.com. India.