

Synergistic effect of spraying potassium and kinetin on growth and some nutrient elements content of lentil (*Lens culinaris Medic.*)

التأثير التآزري للرش بالبوتاسيوم و الكاينتين في النمو ومحتوى بعض العناصر الغذائية لنبات العدس(*Lens culinaris Medic.*)

ا.م.حسن عبد الرزاق علي السعدي* ا.د.عباس جاسم حسين الساعدي** م.أمل غانم محمود القزاز**
م. مختبر سهاد سعد يحيى** م. مختبر رغد حامد ناصر**
*كلية العلوم/الجامعة المستنصرية **كلية التربية للعلوم الصرفة-ابن الهيثم/ جامعة بغداد

الخلاصة:

نفذت تجربة في البيت الزجاجي التابع لقسم علوم الحياة/كلية التربية للعلوم الصرفة-ابن الهيثم/جامعة بغداد، لدراسة تأثير رش ثلاثة تراكيز من البوتاسيوم (200, 400 و 600) ملغم.لتر⁻¹ وتركيزين من الكاينتين (75 و 150) ملغم.لتر⁻¹ فضلا عن التداخل بين سائر تراكيز البوتاسيوم وتركيز الكاينتين، إضافة الى معاملة السيطرة التي رشت بالماء المقطر فقط، وبواقع رشتين في بعض الصفات المظهرية (ارتفاع النبات، عدد التفرعات ونسبة المادة الجافة) ومحتوى بعض العناصر الغذائية (النتروجين، الفسفور، البوتاسيوم، الكالسيوم و المغنسيوم) في المجموع الخضري لنبات العدس (*Lens culinaris Medic.*). نفذ البحث كتجربة عاملية بتصميم تام العشوائية (C.R.D) وبثلاث مكررات وقورنت المتوسطات باستعمال اقل فرق معنوي وعند مستوى احتمال 0.05 وأظهرت النتائج كالاتي:

- 1- أدى رش النباتات بتركيز البوتاسيوم 600 ملغم.لتر⁻¹ الى زيادة معنوية في معظم الصفات المدروسة، إذ اعطت أعلى متوسط لارتفاع النبات، عدد التفرعات ومحتوى النتروجين، البوتاسيوم والكالسيوم، بينما أعطت النباتات المرشوشة بتركيز البوتاسيوم 400 ملغم.لتر⁻¹ أعلى متوسط لنسبة المادة الجافة ومحتوى الفسفور و المغنسيوم مقارنة بأدنى القيم التي نتجت من نباتات السيطرة.
- 2- أدى رش النباتات بتركيز الكاينتين 150 ملغم.لتر⁻¹ الى زيادة معنوية في متوسط جميع الصفات المدروسة.
- 3- كان للتداخل بين عاملي الدراسة تأثيرا معنويا وكانت المعاملة المؤلفة من تركيز البوتاسيوم 400 ملغم.لتر⁻¹ والكاينتين 150 ملغم.لتر⁻¹ هي الافضل عن بقية المعاملات وفي جميع الصفات المدروسة باستثناء صفة التفرع.

Abstract:

The experiment was conducted in greenhouse of Biology Department, Education College for pure sciences/Ibn Al-Haithium, Baghdad University, to study the effect of spraying with three concentrations of potassium (200, 400 and 600) mg.L⁻¹, two concentrations of kinetin (75 and 150) mg.L⁻¹ and their interaction, meanwhile-the control transplants sprayed with distilled water with two sprayings times on some morphological characteristics (plant height, number of branches and dry matter percentage) and some nutrient elements content (N, P, K, Ca and Mg) of lentil shoot (*Lens culinaris Medic.*).

The experiment was conducted as a factorial experiment. Completely Randomized Design (C.R.D.) was used with three replicates. Least Significant Difference (L.S.D.) was used at probability of 0.05 to compare between means.

Results showed that:

- 1-Spraying plant with potassium at concentration 600 mg.L⁻¹ increased significantly some studied characteristics which gave the highest mean of plant height, number of branches and N, K and Ca contents, but concentration 400 mg.L⁻¹ gave the highest mean of dry matter percentage, P and Mg contents, compared with the lowest values which produced from the plants of control treatment.
- 2-Spraying plant with kinetin at concentration 150 mg.L⁻¹ increased significantly all studied characteristics.
- 3-The interaction between two factors studied was significant and treatment (400 mg K.L⁻¹ + 150 mg Kin.L⁻¹) was superior to all treatments in all characteristics except the number of branches.

المقدمة:

العدس (*Lens culinaris Medic.*) نبات حولي عشبي ينتمي الى العائلة البقولية Fabaceae, جذوره وتدية قليلة التفرع حاوية على عقد, سيقانه قائمة يتراوح ارتفاعها من 30-70سم, أوراقه ريشية مركبة ذات 11 وريقة أخيره منها متحورة الى محلاق صغير, أزهاره فراشية الكأس صغيرة وثماره قرنية متطاولة حاوية على بذرة او بذرتين محدبة الوجهين يختلف لونها حسب الصنف (1). يعد نبات العدس من المحاصيل الاقتصادية المهمة في تغذية الإنسان نظرا لاحتواء بذوره على 55.8% كربوهيدرات, 25% بروتين, 11.2% ماء, 10% دهون, 3.7% ألياف, 3.3% رماد وقليل من فيتامين B وA وعناصر مختلفة (2).
يعد عنصر البوتاسيوم العنصر السابع الأكثر وفرة في القشرة الأرضية وبكميات تقدر 0.5-2.5% معظمه بهيئة معادن مثبتة (3), اما في التربة العراقية فان 83% منها هي ذات خزين منخفض الى متوسط نسبيا من أصوره غير المتبادلة للبوتاسيوم وكذلك سرعة تحرره بطيئة تقدر بحوالي 500 ملغم. كغم. يوم⁻¹ (4) وهي لاتفي في الغالب لسد حاجة المحاصيل ذات المتطلبات العالية من البوتاسيوم ومنها البقوليات ولاسيما نبات العدس, لذلك جاءت الحاجة لاستخدام الأسمدة الحاوية على البوتاسيوم ومنها سماد كبريتات البوتاسيوم أكثر شيوعا نظرا لاحتوائه على البوتاسيوم 43% والكبريت 16% (5). يتأثر النمو والحالة الغذائية لنبات العدس بالعديد من العوامل لاسيما التسميد البوتاسي, اذ وجد ان التسميد البوتاسي الورقي قد حقق اختلافا معنويا في نمو وحاصل نبات العدس صنف Masur-93 مقارنة بمعاملة السيطرة (6), ووجدت أيضا فروق معنوية بين مستويات السماد البوتاسي الورقي (4500, 5000 و 5500) ملغم.لتر⁻¹ في نمو وحاصل نبات الباقلاء (7), كما لوحظ تفوق معنوي في ارتفاع النبات, عدد التفرعات, الوزن الجاف وتركيز العناصر لنباتات الحمص المسمدة بمستوى من السماد البوتاسي 60 كغم.ه⁻¹ مقارنة بالنباتات المسمدة بمستوى التسميد 30 كغم.ه⁻¹ (8), كذلك لوحظت زيادة معنوية في مؤشرات النمو الظاهرية والحالة الغذائية لنبات الماش بزيادة مستويات التسميد البوتاسي (0, 20, 40, 60, 80, 100 و 120) كغم.ه⁻¹ (9), نتائج مماثلة أخرى وجدت في بعض نباتات العائلة النجيلية كالحنطة (10) و الشعير (11).

تستعمل منظمات النمو في تحسين نمو النبات وزيادة امتصاصه للعناصر الغذائية وتخليصه من الاجهاد البيئي كالإجهاد المائي, الملحي ودرجات الحرارة المنخفضة والعالية وغيرها, ومن هذه المنظمات هي السايوتوكينات ومثالها الكاينتين (6- Furfurylaminopurine) الذي لم يكتشف وجوده في النباتات لحد الآن بالرغم من احتمال وجوده بصورة طبيعية في النبات كناتج انحلالي كجزء من تحولات حامض DNA, وقد تم تحضيره صناعيا من مخلوط كحول فير فوريل والأدينين في الاوتوكليف (12), اذ أدى رش الكاينتين بتركيز 0, 10, 20, 30 و 40 ملغم.لتر⁻¹ زيادة معنوية في عدد التفرعات, وزن المادة الجافة ومكونات الحاصل لنبات العدس صنف Giza-9 (13), وكذلك حقق رش الكاينتين بتركيز 200 ملغم.لتر⁻¹ فرقا معنويا في النمو والمحتوى الكيميائي لنبات العدس صنف Dimitra مقارنة بمعاملة السيطرة (14), كما وجد تفوق معنوي لنباتات الحمص المرشوشة بتركيز من الكاينتين 10⁻⁶ مولاري في النمو وتثبيت النتروجين في العقد الجذرية ومحتواه في النبات مقارنة بنباتات السيطرة (15), فيما أدى رش الكاينتين بتركيز 0, 50, 75, 100 ملغم.لتر⁻¹ زيادة معنوية خطية في ارتفاع النبات, عدد التفرعات, الوزن الجاف ومحتوى بعض المواد الكيميائية لنبات الباقلاء (16), نتائج مماثلة أخرى وجدت في بعض نباتات العائلة النجيلية كالحنطة (17) والذرة (18). ونظرا لأهمية محصول العدس وقلة إنتاجه في القطر مقارنة بالإنتاج العالمي لذا وضعت خطة البحث الى تحسين نموه وحالته الغذائية باستعمال تراكيز متزايدة من البوتاسيوم و الكاينتين والتداخل بينهما مع تحديد التركيز الأمثل لهما.

المواد وطرائق العمل:

نفذت تجربة عاملية في البيت الزجاجي التابع لقسم علوم الحياة/كلية التربية للعلوم الصرفة/ جامعة بغداد باستعمال تصميم تام التعشبية, اذ اشتملت على 36 وحدة تجريبية, ان هذا العدد ناتج من ثلاثة تراكيز من البوتاسيوم (مصدره سماد كبريتات البوتاسيوم) (200, 400 و 600) ملغم.لتر⁻¹ وتركيزين من الكاينتين (مستورد من شركة Merck الألمانية) (75 و 150) ملغم.لتر⁻¹, فضلا عن معاملة السيطرة التي رشت بالماء المقطر فقط مع ثلاثة مكررات لكل معاملة. ان كل وحدة تجريبية هي عبارة عن أصيص بلاستيكي مبطن من داخل كيس بلاستيكي, تم وضع في كل أصيص 7000 غم من التربة مأخوذة من الحديقة النباتية التابعة للقسم بعد تنظيفها وتجفيفها هوائيا وإمرارها بمنخل قطر فتحاته 2 ملم ليتم تقدير بعض الصفات الفيزيائية والكيميائية في مختبرات قسم التربة/الهيئة العامة للبحوث الزراعية في ابو غريب والموضحة في الجدول (1).

جدول (1) بعض الصفات الفيزيائية والكيميائية لتربة التجربة.

الصفة	الكمية	الصفة	الكمية
طين	144 غم/كغم تربة	المادة العضوية	22 غم/كغم تربة
غرين	488 غم/كغم تربة	معادن الكربونات	245 غم/كغم تربة
رمل	408 غم/كغم تربة	النتروجين	7.84 ملغم/كغم تربة
النسجه	مزيجه	الفسفور	6.80 ملغم/كغم تربة
E.C.	3.34 ديسيمينز/م	البوتاسيوم	9.00 ملغم/كغم تربة
pH	7.53		

اجريت عملية البذار لعشرة بذور من نبات العدس صنف بركة *Lens culinaris Medic. cv. Baraka* بتاريخ 2010/12/5 وأجريت عمليات الري بحيث يتم إيصال رطوبة التربة الى حدود 50% من السعة الحقلية, وبعد مرور 14 يوما من تاريخ البذار, تم عملية الخف الى ستة نباتات في كل أصيص مع إجراء عمليات الري وإزالة الأدغال لحين موعد انتهاء التجربة. اجريت عملية رش البوتاسيوم والكاينتين بالتراكيز المذكورة انفاً مرتين بعد مرور 53 و 67 يوما من تاريخ البذار وذلك عند الصباح الباكر باستخدام مرشة يدوية ذات حجم واحد لتر مع اضافة مادة ناشرة (محلول تنظيف) بتركيز 0.03% لتقليل الشد السطحي للماء وإحداث البلل التام على الأجزاء الخضرية ومن ثم زيادة كفاءة محاليل الرش في الامتصاص, وبعد مرور 91 يوما من تاريخ البذار تم دراسة الصفات أدناه للجزء الخضري فقط.

- 1- ارتفاع النبات (سم. نبات⁻¹): تم قياس ارتفاع النبات من سطح التربة ولغاية أعلى نقطة من النبات.
- 2- عدد التفرعات (فرع. نبات⁻¹): تم حساب عدد الأفرع الرئيسية من الفرع الرئيسي.
- 3- نسبة المادة الجافة (%): تم تسجيل الوزن الطري للعينات الخضرية بوساطة ميزان حساس. بعد ذلك تم تجفيف العينات في فرن كهربائي بدرجة حرارة 65°م ولمدة 48 ساعة ولحين ثبات الوزن ليتم تقدير الوزن الجاف, وتم حساب نسبة المادة الجافة (%). استنادا الى المعادلة الآتية:
نسبة المادة الجافة (%) = الوزن الجاف/الوزن الطري × 100
- 4- محتوى عناصر النتروجين, الفسفور, البوتاسيوم, الكالسيوم و المغنسيوم (ملغم. نبات⁻¹): تم اخذ وزن معلوم من الوزن الجاف وهضم باستعمال حامض الكبريتيك المركز وبمساعدة بيروكسيد الهيدروجين (19), وتم تقدير محتوى عنصر النتروجين (20), الفسفور (21), البوتاسيوم (22) والكالسيوم و المغنسيوم (23). اجري التحليل الإحصائي للنتائج حسب التصميم المذكور اعلاه وبموجب اختبار اقل فرق معنوي (L.S.D.) عند مستوى احتمالية 0.05 لإيجاد الفروق المعنوية بين متوسطات المعاملات (24).

النتائج والمناقشة:

ارتفاع النبات (سم. نبات⁻¹): تعد هذه الصفة مهمة لعلاقتها باعتراض الضوء فالنباتات الطويلة تستقبل اكبر قدر من الطاقة الشمسية مما يؤدي إلى زيادة كفاءة البناء الضوئي ومن ثم زيادة الحاصل (25), آذ اتضح من نتائج الجدول (2) ان الرش بعنصر البوتاسيوم له دور ايجابي في زيادة ارتفاع نبات العدس, فقد تفوقت تراكيز البوتاسيوم على معاملة السيطرة بصورة معنوية وان التركيز 600 ملغم. لتر⁻¹ سجل أعلى متوسط لارتفاع النبات 45.57 سم. نبات⁻¹ ولم يختلف معنويا عن التركيز 400 ملغم. لتر⁻¹ الذي أعطى متوسط ارتفاع للنبات 45.23 سم. نبات⁻¹ مقارنة بمعاملة السيطرة التي اعطت متوسط ارتفاع للنبات 40.87 سم. نبات⁻¹. ان الزيادة في ارتفاع النبات ناتجة عن دور البوتاسيوم في عملية الانقسام الخلوي بفعل التمدد المثالي للجدار الخلوي وزيادة قابلية الخلية على الانتفاخ وزيادة حجمها, اذ ان استطالة الخلية يتم السيطرة عليها بعمليات متعددة منها التغيرات المنسقة في الصفات الميكانيكية لجدار الخلية, الايض الخلوي والتعبير الجيني, وان البوتاسيوم يعمل على ارتخاء جدار الخلية, كذلك لوحظ ان البوتاسيوم ينشط الأنزيمات المسؤولة عن بناء المركبات الداخلة في هيكل النبات ومنها أنزيمات صنع البروتينات proteases وأنزيمات الطاقة kinases ودوره أيضا في عملية التوازن الهرموني وكفاءتها في عملها (26), آذ أشارت الدراسات الى دور البوتاسيوم في تطور العناصر الميكانيكية والحزم الوعائية للنبات مما يزيد من ثبات السيقان وتحملها للانحناء والسقوط وزيادة صلابتها, وان نقصه تصبح رخوة وغير صلبة (27). هذه النتائج جاءت مطابقة مع (6) و (8) في دراستهم على نباتي العدس والحمص بالتتابع.

أشارت نتائج الجدول (2) أيضا ان رش نبات العدس بالكاينتين له دور ايجابي في زيادة ارتفاع النبات, اذ تفوقت تراكيز الكاينتين 75 و 150 ملغم. لتر⁻¹ على معاملة السيطرة معنويا في متوسط ارتفاع النبات ونسبة زيادة 7.54 و 9.24% بالتتابع. تفسر هذه الزيادة في ارتفاع النبات نتيجة لعمل الكاينتين في حث الجينات المسؤولة عن بناء الأحماض النووية والبروتينات ومشاركته أيضا في انقسام الخلوي ليزداد بذلك النشاط المرستيمي للانسجه وكذلك أحداث تحورات في الجدار الخلوي وزيادة مرونته وهذا ينعكس بمحصلة لاحقا على زيادة ارتفاع النبات (28). هذه النتائج جاءت مطابقة مع (14) و (16) في دراستهم على نباتي العدس والبقلاء بالتتابع.

أظهرت نتائج التداخل بين تراكيز البوتاسيوم و الكاينتين تأثيرا معنويا في ارتفاع النبات, اذ اعطت النباتات المرشوشة بتركيز البوتاسيوم 400 ملغم. لتر⁻¹ والكاينتين 150 ملغم. لتر⁻¹ أعلى ارتفاع 46.40 سم. نبات⁻¹, بينما اعطت معاملة السيطرة أدنى ارتفاع 37.00 سم. نبات⁻¹ وتدرجت بقية المعاملات بينهما. ان معنوية التداخل بين عاملي الدراسة تشير الى انعكاس وتظافر تأثيرهما الانفرادي في تحسين هذه الصفة.

جدول(2):تأثير تراكيز البوتاسيوم و الكاينتين وتداخلهما في ارتفاع النبات(سم.نبات⁻¹) لنبات العدس.

تراكم الكاينتين (ملغم.لتر ⁻¹)	ارتفاع النبات (سم.نبات ⁻¹)			
	تراكم البوتاسيوم (ملغم.لتر ⁻¹)			
	0	200	400	600
0	37.00	42.00	44.00	45.50
75	42.00	43.40	45.30	46.20
150	43.60	44.70	46.40	45.00
L.S.D. 0.05	3.19			
متوسط البوتاسيوم	40.87	43.37	45.23	45.57
L.S.D. 0.05	1.84			

عدد التفرعات(فرع.نبات⁻¹): تتحدد نسبة التفرعات بصورة رئيسية بتجهيز المغذيات فضلا عن العوامل الأخرى كالسيطرة الهرمونية والعوامل الوراثية والبيئية. إذ لوحظ من نتائج الجدول(3) ان تراكيز البوتاسيوم عملت على زيادة معنوية في عدد التفرعات, وأعطى التركيز 600ملغم.لتر⁻¹ اعلى متوسط في هذه الصفة 5.22 فرع.نبات⁻¹ وبنسبة زيادة معنوية 62.11% قياسا بمعاملة السيطرة. ان هذه الزيادة ناتجة عن دور البوتاسيوم في حثه على الانقسام الخلايا المرستيمية كون هذه العملية تنشأ من غشاء البلازما الحاوي ATPase الذي يضخ ايونات الهيدروجين خارج السايوبلازم الى Apoplast ينتج عنها تراخي مادة جدار الخلية وكذلك تنشيط أنزيمات Hydrolysis المسببة تراخي مادة جدار الخلية وهي خطوة مهمة لتوسع الخلية, إذ ان تحرر ايونات الهيدروجين تعتمد على ايونات البوتاسيوم في Apoplast(29). وهذه النتيجة مشابهة مع (6)و(8) في دراستهم على نباتي العدس والحمص بالتتابع.

كما لوحظ من نتائج جدول(3) أيضا ان للكاينتين له تأثير ايجابي في صفة التفرع, إذ أظهرت النباتات المرشوشة بتركيز من الكاينتين 75 و150ملغم.لتر⁻¹ اختلافا معنويا في عدد التفرعات مع النباتات التي رشت بالماء المقطر(السيطرة) وبنسبة زيادة 17.87 و26.67% بالتتابع, تقصر هذه الزيادة نتيجة لدور الكاينتين في تضاده Antagonism effects مع فعل الاوكسين المتراكم في البرعم الطرفي من خلال تثبيط انزيم اوكسيديز حامض ألكليك IAA-Oxidase مما أدى الى التغلب على السيادة القمية Apical dominance وكسر السكون Dormancy وتكشف أنسجة الأوعية الخشبية بين البراعم الابضية والساق الرئيسية, الأمر الذي يقود الى زيادة التفرع في النبات اويحتمل فعل الكاينتين في تحفيز سرعة انتقال المغذيات والفيتامينات الى البراعم (30). وهذه النتائج متوافقة مع نتائج(13)و(16) أثناء دراستهم على نباتي العدس و الباقلاء بالتتابع. اما بالنسبة لتأثير التداخل تراكيز البوتاسيوم و الكاينتين في صفة التفرع فقد كان معنوياً, وأظهرت النتائج ان النباتات المرشوشة بتركيز من البوتاسيوم 600ملغم.لتر⁻¹ والكاينتين 75ملغم.لتر⁻¹ اعلى قيمة لعدد التفرعات 5.67 فرع.نبات⁻¹ مقارنة بأدنى قيمة لعدد التفرعات 2.33 فرع.نبات⁻¹ نتجت من النباتات المرشوشة بالماء المقطر(السيطرة), ان معنوية التداخل تعزى الى دور التازري بين البوتاسيوم ومنظم النمو(الكاينتين) في زيادة انقسام الخلايا واستطالتها الأمر الذي يؤدي الى زيادة التفرع في النبات.

جدول(3):تأثير تراكيز البوتاسيوم و الكاينتين وتداخلهما في عدد التفرعات(فرع.نبات⁻¹) لنبات العدس.

تراكم الكاينتين (ملغم.لتر ⁻¹)	عدد التفرعات (فرع.نبات ⁻¹)			
	تراكم البوتاسيوم (ملغم.لتر ⁻¹)			
	0	200	400	600
0	2.33	3.33	4.33	5.00
75	3.33	4.00	4.67	5.67
150	4.00	4.67	5.33	5.00
L.S.D. 0.05	1.02			
متوسط البوتاسيوم	3.22	4.00	4.78	5.22
L.S.D. 0.05	0.59			

نسبة المادة الجافة(%): تعد المادة الجافة الكلية مقياساً حقيقياً للتعبير عن كفاءة الكساء الخضري للمحصول في اعتراض الضوء خلال موسم النمو وتتأثر بعوامل عديدة منها وفرة المغذيات السمادية, إذ اشارت النتائج المعطاة في جدول(4) الى زيادة معنوية في نسبة المادة الجافة بزيادة تراكيز البوتاسيوم, فعند رفع التركيز من 0 الى 600 ملغم.لتر⁻¹ ازداد متوسط الصفة اعلاه بنسبة 9.95%. وقد يبرر ذلك مجموع تأثيرات البوتاسيوم في تحفيز 80 أنزيمات تنظم العمليات الايضية(البناء الضوئي, التنفس, نقل الكربوهيدرات, بناء البروتين وامتصاص الماء والمغذيات) وتأخيرها لفترة شيخوخة الأوراق, فضلا عن كونه المسؤول عن

الموازنة الأيونية ونفاذية الأغشية الخلوية، كذلك يعمل البوتاسيوم في النباتات الحية على المحافظة على الدرجة المثلى لانتفاخ غرويات البلازما والأغلفة الحيوية بمساعدة أيونات الأخرى (المغنسيوم، الأمونيوم والصوديوم) والذي يعكس بصورة ايجابية في النظام المائي وانتفاخ النباتات راجعا بذلك على تراكم المادة الجافة (31). هذه النتائج جاءت مطابقة مع (8) و (11) في دراستهم على نباتي الحمص والشعير بالتتابع.

كما اشارت نتائج الجدول (4) أيضا وجود تأثير معنوي لرش الكاينتين على النبات في متوسط نسبة المادة الجافة، إذ سجل أقصى متوسط لهذه الصفة عند التركيز من الكاينتين 150 ملغم.لتر⁻¹ مقداره 28.00% وأدناه لمعاملة السيطرة مقداره 23.86%. وقد يرجع سبب هذه الزيادة الى دور الكاينتين في حث أنزيمات البناء الضوئي وعمليات الأخرى على رفع نسبة الكربوهيدرات والبروتينات وزيادة ومعدل انتقالها وتشجيع انقسام الخلايا، كذلك الحفاظ على نسبة الكلوروفيل ومنع تساقط الأوراق ومن ثم تراكم في المادة الجافة (30). هذه النتائج جاءت مطابقة مع (13) و (18) في دراستهم على نباتي العدس والذرة بالتتابع. كما كان لتأثير التداخل معنويا، وأعطت معاملة التداخل (400 ملغم.لتر⁻¹ من البوتاسيوم و 150 ملغم.لتر⁻¹ من الكاينتين) أعلى قيمة لنسبة المادة الجافة بلغت 31.33% ومتفوقة بذلك على معظم معاملات التداخل وبنسبة زيادة مقدارها 44.51% مقارنة بمعاملة السيطرة.

جدول (4): تأثير تراكيز البوتاسيوم و الكاينتين وتداخلهما في نسبة المادة الجافة (%) لنبات العدس.

نسبة المادة الجافة(%)					تراكيز الكاينتين (ملغم.لتر ⁻¹)
متوسط الكاينتين	تراكيز البوتاسيوم (ملغم.لتر ⁻¹)				
	600	400	200	0	
23.86	26.52	24.32	22.90	21.68	0
25.08	26.73	27.03	22.87	23.67	75
28.00	26.53	31.33	27.27	27.04	150
0.55	1.14				L.S.D. 0.05
	26.53	27.56	24.35	24.13	متوسط البوتاسيوم
	0.67				L.S.D. 0.05

محتوى النتروجين (ملغم.نبات⁻¹): يعد محور التحليل الكيميائي للأنسجة النباتية واحدا من المحاور المهمة في تحديد محتوى العناصر الغذائية في هذه الأنسجة والذي يعد هذا المحتوى ممثلا لحالة العنصر في النبات وعليه فأي عامل يؤثر إيجابا في امتصاص العنصر الغذائي من قبل النبات يؤثر أيضا في محتوى هذا العنصر في النسيج النباتي وهذا ما أكدته الدراسة الحالية، إذ بينت النتائج في جدول (5) ان رش البوتاسيوم على المجموع الخضري قد حقق زيادة معنوية في متوسط محتوى النتروجين وبجميع تراكيز البوتاسيوم 400, 200 و 600 ملغم.لتر⁻¹ وبنسبة 19.63, 51.86 و 52.48% بالتتابع مقارنة بمعاملة عدم الرش (السيطرة). تحتاج البقوليات الى عنصر النتروجين والبوتاسيوم عن بقية العناصر الأخرى كالفسفور، المغنسيوم والكبريت، إذ تمتصها بمقدار 4-10 مرات، وأظهرت الدراسات دور البوتاسيوم في زيادة تركيز النتروجين من خلال أولا تحفيز الأنظمة الإنزيمية مثل peptidase و protease المهمة في بناء البروتين ودوره في فصل البروتين عن الرايبوسومات ومن ثم أتاحة الفرصة لبناء بروتين جديد، إذ ان في حالة نقص البوتاسيوم يتجمع النتروجين بشكل أمينات سامه مثل Putrescine و Agmatine التي تؤثر سلبا في نمو النبات، ثانيا يشترك البوتاسيوم في عملية فتح وغلق الثغور وزيادة المساحة الورقية يتبعه زيادة في البناء الضوئي وتراكم الكربوهيدرات التي تنتقل الى مناطق العقد في الجذر مما يشجع التجمعات البكتيرية وزيادة معدل تثبيت وتركيز النتروجين في النبات فضلا عن كون البوتاسيوم مهم في تحفيز الأنزيمات ATPase, Nitrogenase و Glutamine synthetase المهمة في اختزال النتروجين الى ايون النترات وتحسين نمو المجموع الجذري وزيادة عدد العقد وتطورها، ثالثا يعمل البوتاسيوم (ايون الموجب) على حمل ايون النترات (ايون السالب) ونقله الى الأعلى عبر اللحاء بهيئة نترات البوتاسيوم بدلا عن ايون المالات (ايون السالب) الى الأسفل عبر اللحاء أيضا (31). هذه النتائج مشابه لما توصل إليه (7) و (10) في نباتي الباقلاء والحنطة بالتتابع.

اتضح من نتائج جدول (5) أيضا ان لزيادة تركيز الكاينتين تأثير معنويا في متوسط محتوى النتروجين في النبات، إذ ازداد هذا التأثير كلما زاد تركيز الكاينتين وصولا الى التركيز الأخير (150 ملغم.لتر⁻¹) الذي أعطى نسبة زيادة مقدارها 51.44% مقارنة بمعاملة السيطرة. وقد يبرر ذلك الى قدرة الكاينتين الى إحداث تغيرات في المسارات الايضية وتنشيط الفعالية الإنزيمية منها Amylase, Nitrate reductase, Ribonuclease, Catalase و Protein alkinase وزيادة في صنع الكربوهيدرات والبروتين مما يتطلب سحب النتروجين من التربة وزيادة تراكمه في النبات (30)، او ربما انتقال الكاينتين المرشوش على المجموع الخضري الى الجذور مسببا زيادة في الانقسام خلايا مما يؤدي الى زيادة في العقد الجذرية فضلا عن مساعدته في دخول الماء والمغذيات الى هذه العقد وزيادة أوزانها الطرية ومن ثم تضخمها وهذا يصب بشكل ايجابي في عملية تثبيت النتروجين، إذ وجدت علاقة خطية بين كمية النتروجين المثبت وحجم العقد الجذرية، كذلك يعمل الكاينتين في داخل الجذور على زيادة تركيز

الفلافونويدات التي تساعد على اجتذاب بكتريا تثبيت النتروجين الجوي(32). هذه النتائج مشابهة لما توصل إليه(14)و(15) في نباتي العدس والحمص بالتتابع.

يتضح من الجدول ذاته هناك فروق معنوية بين تداخلات العاملين(البوتاسيوم الكاينتين) وأعطت المعاملة للنباتات المرشوشة بتركيز البوتاسيوم 400ملغم.لتر⁻¹ والكاينتين 150ملغم.لتر⁻¹ أعلى محتوى للنتروجين 60.12ملغم.نبات⁻¹ وبتفوق معنوي على جميع المعاملات المدروسة في حين اعطت معاملة السيطرة أدنى محتوى للنتروجين 12.10ملغم.نبات⁻¹.

جدول(5):تأثير تراكيز البوتاسيوم و الكاينتين وتداخلهما في محتوى النتروجين(ملغم.نبات⁻¹)لنبات العدس.

محتوى النتروجين(ملغم.نبات ⁻¹)					تراكيز الكاينتين (ملغم.لتر ⁻¹)
متوسط الكاينتين	تراكيز البوتاسيوم(ملغم.لتر ⁻¹)				
	600	400	200	0	
29.53	48.29	36.84	20.87	12.10	0
34.88	48.73	44.20	24.66	21.94	75
44.72	45.90	60.12	38.98	33.87	150
0.87	1.74				L.S.D. 0.05
	47.64	47.03	28.17	22.64	متوسط البوتاسيوم
	1.05				L.S.D. 0.05

محتوى الفسفور(ملغم.نبات⁻¹): ان رش البوتاسيوم على نبات العدس له اثر ايجابي في ارتفاع محتوى الفسفور, وهذا ما اشارت اليه نتائج الجدول(6) الى وجود فروق معنوية بين تراكيز البوتاسيوم في متوسط محتوى الفسفور, وأحرز التركيز 400ملغم.لتر⁻¹ اعلى متوسط لمحتوى هذا العنصر 6.83 ملغم.نبات⁻¹ وبنسبة زيادة معنوية 79.27%مقارنة بمعاملة السيطرة, وتعزى هذه الزيادة الى تحفيز البوتاسيوم لأنزيمات البناء الضوئي ومنها Ribulose diphosphate carboxylase(Rubisco) المسؤول عن تمثيل CO2 في النبات وزيادة نواتجها و ATPase المسؤول عن تحفيز بناء ATP لتحميل هذه النواتج مع زيادة في معدلات الفسفرة الضوئية Photophosphorylation والانتقال الالكتروني Electron transport مما يتطلب امتصاص الفسفور من التربة تلبية للعمليات التي ذكرت مسبقا, كذلك دور البوتاسيوم في تحسين نمو الجذور وتعمقها في التربة وزيادة كفاءتها في امتصاص العناصر الغذائية ومنها الفسفور(33), وهذا ينسجم مع ما توصل إليه(34) من ان رش البوتاسيوم على نبات العدس قد زاد معنويا في امتصاص الفسفور.

اما الكاينتين فقد أدت أضافته الى زيادة واضحة ومعنوية في محتوى الفسفور(جدول 6), وتفاوتت النباتات المرشوشة بتركيز من الكاينتين 75و150ملغم.لتر⁻¹ على نباتات المرشوشة بالماء المقطر معنويا في متوسط محتوى الفسفور وبنسبة زيادة 18.75و84.50%بالتتابع. ان زيادة الفسفور في النبات تعود الى دور الكاينتين في استحداث الجينات المؤثرة في إنتاج الأنزيمات الناقلة للسكريات مما زاد من وتيرة إنتاج الكربوهيدرات وزيادة عمليات الفسفرة وإنتاج مركبات الطاقة وهذا ما يتطلب سحب كمية كبيرة من الفسفور, كذلك لوحظ ان السايكوكينات تعطي نمو جذريا أكثر كثافة مما يزيد من كفاءة امتصاص العناصر ومنها الفسفور (35). تتشابه نتائج هذه الصفة مع ما ذكره(14)و(17)في نباتي العدس و الحنطة بالتتابع.

كان لتداخل تراكيز البوتاسيوم و الكاينتين تأثيرا معنويا في محتوى الفسفور, وأعطت المعاملة المؤلفة من تركيز البوتاسيوم 400ملغم.لتر⁻¹ والكاينتين 150ملغم.لتر⁻¹ أعلى محتوى للفسفور بلغ 10.61ملغم.نبات⁻¹ وبتفوق معنوي على جميع المعاملات المدروسة في حين اعطت معاملة السيطرة أدنى محتوى للفسفور بلغ 2.67ملغم.نبات⁻¹.

جدول(6):تأثير تراكيز البوتاسيوم و الكاينتين وتداخلهما في محتوى الفسفور(ملغم.نبات⁻¹)لنبات العدس.

محتوى الفسفور (ملغم.نبات ⁻¹)					تراكيز الكاينتين (ملغم.لتر ⁻¹)
متوسط الكاينتين	تراكيز البوتاسيوم(ملغم.لتر ⁻¹)				
	600	400	200	0	
4.00	5.44	4.44	3.46	2.67	0
4.75	5.92	5.44	4.02	3.62	75
7.38	6.97	10.61	6.79	5.15	150
0.40	0.80				L.S.D. 0.05
	6.11	6.83	4.76	3.81	متوسط البوتاسيوم
	0.46				L.S.D. 0.05

محتوى البوتاسيوم (ملغم.نبات⁻¹): اشارت نتائج جدول (7) ان التسميد البوتاسي الورقي له اثر ايجابي في محتوى البوتاسيوم وزاد هذا التأثير معنوياً مع زيادة تركيز السماد، اذ بلغ متوسط محتوى البوتاسيوم عند التراكيز 400, 200 و 600 ملغم.لتر⁻¹ هو 39.86, 52.81 و 56.27 ملغم.نبات⁻¹ بالتتابع مقارنة بمعاملة السيطرة التي اعطت 29.54 ملغم.نبات⁻¹، وهذه الزيادة ناتجة عن زيادة تراكيز البوتاسيوم التي تصل الى النبات بصورة أسرع وهذه دلالة على القابلية العالية لامتنصاص البوتاسيوم وتراكمه في الأنسجة النباتية مقارنة بالتسميد الأرضي، اذ وجد ان النبات يستفاد من العنصر المضاف مزجاً مع التربة بنسبة محدودة بسبب عوامل التثبيت، فقد والتنافس مع الايونات الأخرى مقارنة بأضافته بطريقة الرش فان النبات يمتصه بصورة سهلة وبكميات اكبر من سطح الورقة (36). وهذه النتائج تشابه نتائج كل من (7) و (9) على نباتي الباقلاء و الماش بالتتابع.

أدى الرش النبات بالكاينتين (جدول 7) الى تأثير ايجابي في متوسط محتوى البوتاسيوم، فعند رفع التركيز الكائنتين من 0 الى 75 ملغم.لتر⁻¹ ازداد معنوياً متوسط محتوى البوتاسيوم من 30.11 الى 40.63 ملغم.نبات⁻¹ وبنسبة زيادة 34.93%، وعند رفع التركيز الكائنتين من 0 الى 150 ملغم.لتر⁻¹ ازداد معنوياً متوسط محتوى البوتاسيوم من 30.11 الى 63.13 ملغم.نبات⁻¹ وبنسبة زيادة 109.66%. تلعب السايونيكينات دوراً حيوياً في تنشيط حركة وانتقال العناصر من الأجزاء المسنة الى الأجزاء الفتية نتيجة لاحتواء الأخير على تراكيز من السايونيكينات تعمل على جذب العناصر إليها وتسهل عملية امتصاصها ونقلها وتوزيعها في عصارة الأوعية الناقلة في الأنسجة اللحاءية ومنها البوتاسيوم (37). وهذه النتائج تشابه نتائج كل من (14) و (16) على نباتي العدس و الباقلاء بالتتابع.

أوضحت نتائج الجدول (7) أيضاً وجود فروق معنوية بين تداخل تراكيز البوتاسيوم و الكائنتين في محتوى البوتاسيوم، وأعطت النباتات المرشوشة بتركيز البوتاسيوم 400 ملغم.لتر⁻¹ و الكائنتين 150 ملغم.لتر⁻¹ أعلى محتوى للبوتاسيوم 79.03 ملغم.نبات⁻¹ مقارنة بأدنى محتوى للبوتاسيوم 16.21 ملغم.نبات⁻¹ ناتج من النباتات المرشوشة بالماء المقطر (السيطرة).

جدول (7): تأثير تراكيز البوتاسيوم و الكائنتين وتداخلهما في محتوى البوتاسيوم (ملغم.نبات⁻¹) لنبات العدس.

تراكيز الكائنتين (ملغم.لتر ⁻¹)	محتوى البوتاسيوم (ملغم.نبات ⁻¹)			
	تراكيز البوتاسيوم (ملغم.لتر ⁻¹)			
	600	400	200	0
متوسط الكائنتين	30.11	43.34	35.18	25.71
0	43.34	35.18	25.71	16.21
75	62.24	44.21	32.45	23.61
150	63.25	79.03	61.43	48.80
L.S.D. 0.05	4.21			
متوسط البوتاسيوم	56.27	52.81	39.86	29.54
L.S.D. 0.05	2.43			

محتوى الكالسيوم (ملغم.نبات⁻¹): اشارت النتائج في جدول (8) ان رش السماد البوتاسي له تأثير معنوي في متوسط محتوى الكالسيوم، اذ أعطى التركيز الأخير من البوتاسيوم (600 ملغم.لتر⁻¹) أعلى متوسط لمحتوى الكالسيوم 73.12 ملغم.نبات⁻¹ وبنسبة زيادة معنوية 77.73% مقارنة بمعاملة السيطرة، واختلاف معنوياً عن بقية تراكيز البوتاسيوم الأخرى. يعمل البوتاسيوم على زيادة النمو الخضري والمحافظة على النشاط الفسيولوجي وتأخير مرحلة الشيخوخة وإطالة تكوين المواد المصنعة فيها مما يتطلب امتصاص العناصر ومنها الكالسيوم، كذلك للبوتاسيوم دور في تكوين الخلايا السكرينية مما يزيد من دعامة وصلابة النبات وهذا يتطلب امتصاص الكالسيوم الذي يشترك في بناء الصفيحة الوسطى والجدران الخلوية بهيئة بكتات الكالسيوم (38). وهذا مشابه لما أوجده (6) و (11) على نباتي العدس و الشعير بالتتابع من ان التسميد البوتاسي زاد معنوياً من محتوى الكالسيوم.

كان لرش الكائنتين تأثيراً معنوياً في متوسط محتوى الكالسيوم (جدول 8)، اذ اعطت النباتات التي رشت لها الكائنتين تركيزه 150 ملغم.لتر⁻¹ أعلى متوسط لمحتوى الكالسيوم 73.36 ملغم.نبات⁻¹ وبنسبة زيادة معنوية مقدارها 54.38% مقارنة بالنباتات التي رشت بالماء المقطر (السيطرة) التي اعطت أدنى متوسط لمحتوى الكالسيوم 47.52 ملغم.نبات⁻¹. يعمل الكائنتين الى تشجيع الانقسام الخلوي وزيادة عدد الخلايا واتساعها وفي بناء الخلايا السكرينية مما يتطلب سحب الكالسيوم من التربة، كذلك يعمل الكائنتين على زيادة تركيز الكالسيوم في السايونيكينات من خلال تسهيل عملية ضخه وربطه مع بروتين Calmodulin (28). هذه النتائج منسجمة مع نتائج (14) و (16) على نباتي العدس و الباقلاء.

أوضحت النتائج في جدول (8) أيضاً على حصول تداخل معنوي بين تراكيز البوتاسيوم و الكائنتين في محتوى الكالسيوم، وأعطت النباتات المرشوشة بتركيز البوتاسيوم 400 ملغم.لتر⁻¹ و الكائنتين 150 ملغم.لتر⁻¹ أكبر محتوى للكالسيوم بلغ 93.60 ملغم.نبات⁻¹، في حين اعطت النباتات المرشوشة بالماء المقطر (السيطرة) اصغر محتوى للكالسيوم بلغ 27.75 ملغم.نبات⁻¹.

جدول(8):تأثير تراكيز البوتاسيوم و الكاينتين وتداخلهما في محتوى الكالسيوم(ملغم.نبات⁻¹) لنبات العدس.

محتوى الكالسيوم(ملغم.نبات ⁻¹)					تراكيز الكاينتين (ملغم.لتر ⁻¹)
متوسط الكاينتين	تراكيز البوتاسيوم(ملغم.لتر ⁻¹)				
	600	400	200	0	
47.52	67.16	53.55	41.61	27.75	0
56.66	75.69	65.96	46.91	38.06	75
73.36	76.50	93.60	65.25	58.10	150
1.21	2.43				L.S.D. 0.05
	73.12	71.04	51.26	41.14	متوسط البوتاسيوم
	1.40				L.S.D. 0.05

محتوى المغنسيوم(ملغم.نبات⁻¹): أكدت نتائج جدول(9) ان رش البوتاسيوم له تأثير معنوي في زيادة متوسط محتوى المغنسيوم في المجموع الخضري، إذ سجل التركيز من البوتاسيوم 400ملغم.لتر⁻¹ أعلى متوسط لمحتوى المغنسيوم 20.59ملغم.نبات⁻¹ ونسبة زيادة معنوية 77.04% مقارنة بمعاملة السيطرة، ولم يختلف معنويًا عن تركيز البوتاسيوم 600ملغم.لتر⁻¹ الذي أعطى متوسط لمحتوى المغنسيوم 20.05ملغم.نبات⁻¹. ان زيادة تراكيز البوتاسيوم في الأوراق سيما في الخلايا الحارسة سبب فتح الثغور وزيادة التبادل الغازي مما يترتب على ذلك رفع كفاءة البناء الضوئي وزيادة في بناء الكلوروبلاست لينتج عنها زيادة تركيز في صبغة الكلوروفيل مما يتطلب سحب عنصر المغنسيوم وانتقاله الى الأوراق، إذ ان 20% من المغنسيوم الكلي في النبات يدخل في بناء صبغة الكلوروفيل(39). تتفق هذه النتائج مع ما أوجده(8)و(9) على نباتي الحمص و الماش بالتتابع.

بينت نتائج جدول(9) أيضا وجود فروق معنوية بين تراكيز الكاينتين في متوسط محتوى المغنسيوم، إذ أعطى التركيز من الكاينتين 150ملغم.لتر⁻¹ أعلى متوسط لمحتوى المغنسيوم 21.05ملغم.نبات⁻¹ ونسبة زيادة معنوية 57.21% مقارنة بمعاملة السيطرة التي اعطت اقل متوسط لمحتوى المغنسيوم 13.39ملغم.نبات⁻¹.

يعد الكاينتين من هرمونات الصبا Juvenile في النبات كونه يحافظ على الكلوروبلاست بحجمها الطبيعي من خلال تحفيز انزيم NADH protochlorophyllid reductase المسؤول عن بناء صبغة الكلوروفيل وتنشيط انزيم Chlorophyllase المسؤول عن تحليل هذه الصبغة، وزيادة اتساع الخلايا دون انقسامها(بناء RNA دون زيادة DNA) وجعلها أماكن جذب للعناصر كالمغنسيوم والمواد الأخرى كالكربونات والأحماض الأمينية وهذا ما يدعى بالظاهرة Phytogerontology التي تحافظ على الأوراق بلونها الأخضر، كذلك وجد ان للكاينتين دور في تنشيط نشاط انزيم Dehydrogenase الخاص بدورة Pentose phosphate وأنزيم Ribonuclease اللذان يرتفعان تركيزهما عند دخول الورقة عمر الشيخوخة Senescence(40).تشابهه هذه النتائج مع ما أوجده(16)و(18) على نباتي الباقلاء و الذرة بالتتابع.

اما التداخل بين عاملي الدراسة فقد كان تأثيره معنويًا في محتوى المغنسيوم، وأعطت النباتات المرشوشة بتركيز من البوتاسيوم 400ملغم.لتر⁻¹ و الكاينتين 150ملغم.لتر⁻¹ أعلى محتوى للمغنسيوم 26.84ملغم.نبات⁻¹ بينما كان أدنى محتوى للمغنسيوم 6.67ملغم.نبات⁻¹ تم الحصول عليه من النباتات التي لم ترش بكلاً العاملين (السيطرة).

جدول(9):تأثير تراكيز البوتاسيوم و الكاينتين وتداخلهما في محتوى المغنسيوم(ملغم.نبات⁻¹) لنبات العدس.

محتوى المغنسيوم(ملغم.نبات ⁻¹)					تراكيز الكاينتين (ملغم.لتر ⁻¹)
متوسط الكاينتين	تراكيز البوتاسيوم(ملغم.لتر ⁻¹)				
	600	400	200	0	
13.39	18.87	16.22	11.78	6.67	0
16.23	20.54	18.70	14.07	11.61	75
21.05	20.74	26.84	20.02	16.60	150
0.69	1.37				L.S.D. 0.05
	20.05	20.59	15.29	11.63	متوسط البوتاسيوم
	0.79				L.S.D. 0.05

ان تفوق المعاملة المؤلفة من تركيز البوتاسيوم 400 ملغم.لتر⁻¹ والكاينتين 150 ملغم.لتر⁻¹ في ارتفاع النبات ونسبة المادة الجافة ومحتوى العناصر الغذائية مقارنة بالمعاملات الأخرى كان نتيجة حصول ائزان بين عاملي الدراسة، اذ عمل الكاينتين على خلق بيئة جيدة لنمو النبات (حث العمليات الحيوية) تتطلب امتصاص العناصر بصورة كبيرة سائده البوتاسيوم في نقل هذه العناصر وتوزيعها في النبات وتحفيزه للعديد من الأنزيمات التي ذكرت مسبقاً. نستنتج من نتائج التجربة ان هناك علاقة توافق بين التسميد البوتاسي الورقي والرش بالكاينتين فقد حسن معنوياً صفات النمو الخضري والحالة الغذائية لاسيما المعاملة المؤلفة من تركيز البوتاسيوم 400 ملغم.لتر⁻¹ والكاينتين 150 ملغم.لتر⁻¹، وعليه نوصي باستخدامهما في محاصيل أخرى او إجراء دراسات يستعمل بها منظمات نمو أخرى مع البوتاسيوم في نمو نبات العدس.

المصادر:

- 1-Parsa, M. and Bagheri, A.R. (2008). Bean. Mashhad university, pp: 528.
- 2-Singh, G.; Wade, L.J.; Singh, R.K. and Singh, V.P. (2001). Nutrient management in semi-deepwater (30-50cm) rice (*Oryza sativa*) and its effect on succeeding lentil (*Lens culinaris*) crop. Indian J. Agron., 46(1):12-16.
- 3-Sparks, D. L. (2000). Bioavailability of Soil Potassium. In: Handbook of soil walcolml summered. Press New York.
- 4-AL-Zubaidi, A.H. (2001). Potassium status in Iraqi soils. Regional workshop on potassium and water management in west Asia and North Africa IPI. Amman (Jordan).
- 5-Havlin, J. L.; Beaton, J.D.; Tisdale, S.L. and Nelson, W.L. (1999). Soil Fertility and Fertilizer. Six edition Prentice Hall. New Jersey.
- 6-Hamayun, M.; Khan, S.A.; Khan, A.; Shinwari, Z.K.; Ahamd, N.; Kin, Y. and Lee, I. (2011). Effect of foliar and soil application of nitrogen, phosphorus and potassium on yield components of lentil. Pak. J. Bot., 43(1): 391-396.
- 7-محمد حسين عزيز. (2014). تأثير الري التكميلي والرش بالبوتاسيوم و البورون على الصفات الكمية و النوعية لنبات الباقلاء. مجلة الزراعة للعلوم ديال، 6(1):187-201.
- 8-Gang, N.; Singh, R.K.; Singh, R.P.; Choudhury, S.K. and Upadhyay, P.K. (2014). Effect of potassium level and foliar application of nutrients on growth and yield of late snow chickpea (*Cicer arietinum* L.). Environment and Ecology, 32(1A):273-275.
- 9- Kumar, P.; Kumar, P.; Singh, T.; Singh, A.K. and Yadav, R.I. (2014). Effect of different potassium levels on mungbean under custard apple based agri-horti system. Afr. J. Res., 9(8):728-734.
- 10-Ali, T.S.; Samira, S.; Shakeri, E. and Mirjalili, M.R. (2014). Effect of different levels of potassium sulphate on yield, yield components and protein content of wheat cultivars. Appl. Mathematics in Engineering, Management and Technology, 2 (3):119-123.
- 11-الزبيدي صبا علي و التميمي محمد صلال. (2014). التأثير المتداخل للفسفور والبوتاسيوم في بعض صفات نمو نبات الشعير. مجلة الفرات للعلوم الزراعية، 6(1):134-126.
- 12-Taiz, L. and Zeiger, E. (2010). Plant Physiology. Fifth Edition, Sinauer Associates, Inc., Publishers Sunderland, Massachusetts.
- 13-Khalil, S.; EL-Saeid, H.M. and Shalaby, M. (2006). The role kinetin in flower abscission and yield of lentil plant. J. of Appl. Sci. Res., 2(29):587-591.
- 14-Giannakoula, A.E.; Illas, I.F.; Dragisic, J.J.; Maskimmaric, V.M. and Zivanovic, B.D. (2012). The effects of plant growth regulators on growth, yield, and phenolic profile of lentil plants. J. of Food Composition and Analysis, 28:46-53.
- 15-Fatima, Z.; Bano, A.; Sail, R. and Aslam, M. (2008). Response of chickpea to plant growth regulators on nitrogen fixation and yield. Pak. J. Bot., 40(5):2005-2013.
- 16-Sadak, M. Sh.; Dawood, M.G.; Bakry, B.A. and El-Karamany, M.F. (2013). Synergistic effect of indole acetic acid and kinetin on performance, some biochemical constituents and yield of Faba Bean plant grown under newly reclaimed sandy soil. World J. Agric. Sci., 9 (4):335-344.
- 17-محمد، هناء حسن. (2013). ارتباط إنتاجية ونوعية الخبز بصفات ورقة العلم تحت الإجهاد الرطوبي و الكاينتين. مجلة العلوم الزراعية، 44(2):206-219.
- 18-Babakhaain, S.; Nasri, M. and Oveysi, M. (2013). Effect of cytokine hormone spray and water stress on the yield and yield components of corn (*Zea mays* var. *saccharata*). Annals of Biological Research, 4(4): 130-133.

- 19-Agiza, A.H.; El-Hineidy, M.T. and Ibrahim, M.E. (1960). The determination of the different fractions of phosphorus in plant and soil, Bull., FAO. , Agric., Cairo Univ., 121.
- 20-Chapman, H.D. and Pratt, F.P. (1961). Methods of Analysis for Soils, Plants and Water. Univ., Calif., Div., Agric., Sci., 161-170.
- 21-John, M.K. (1970).Calorimetric determination of phosphorus in soil and plant materials with ascorbic acid. Soil Sci., 109:214-220.
- 22-Page, A.L., Miller, R.H. and Kenney, D.R. (1982). Methods of Soil Analysis. Part 2: Chemical and Microbiological properties. Agronomy. Series No.9 ASA. Soil Sci. Soc. Am. Inc. Madison, USA.
- 23-Wimberly, N.W. (1968). The Analysis of Agriculture Material. MAFF. , Tech., Bull., London.
- 24-SAS. (2012). Statistical Analysis System', User's Guide Statistical Version 9.1th ed., SAS. Institute Inc. Cary N.C., USA.
- 25-ستوسكوف، نيل. (1989). فهم إنتاج المحاصيل. الجزء الأول(كتاب مترجم) د.حاتم جبار عطية و كريمة محمد وهيب، دار الحكمة للطباعة والنشر، جامعة بغداد، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، العراق.
- 26-IPI, International Potash Institute. (2000). Potassium in plant production. Basel, Switzerland.
- 27-Verma, V. (2009).Textbook of Plant Physiology .Ane Book. Offset. PVT. LTD., India.
- 28-Lambers, H.; Chapin, F.S. and Pons, T.L.(2008). Plant Physiological Ecology. Second Edition, New York, USA.
- 29- مينكل، ك و كيربي، ي.آ.(2000). مبادئ تغذية النبات(كتاب مترجم). د.سعد الله نجم عبد الله الأنعمي، الطبعة الثانية، مؤسسة دار الكتاب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، العراق.
- 30-الشحات، نصر أبو زيد.(2000). الهرمونات النباتية والتطبيقات الزراعية، الطبعة الثانية. الدار العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، جمهورية مصر العربية، ص681.
- 31-Marschner, P. (2012). Mineral Nutrition of Higher Plant. Academic Press. Third Edition, INC. London.
- 32-السنوسي، محمد مراد و كريكر، سولاف.(2007). تأثير الإجهاد الهرموني في تطور العقد البكتيرية لثلاث أصناف من الحمص المزروعة بالجزائر. مجلة جامعة دمشق للعلوم الزراعية، 23(1):39-52.
- 33-Prajapati, K. and Modi, H.A. (2012). The importance of potassium in plant growth –A review. Indian J. of Plant Sci., 1:177-186.
- 34-EL-Sayed, A.A.; Fawzi, A. and Khalifa, K.E. (2000). Balanced nutrition of lentil: Role of potassium and micronutrients foliar spray. proc. of the 2nd Int. work shop of foliar fertilization. Bangkok, Thailand, 210-227.
- 35-Dobbelaere, S.; Vanderleydena, J.; Okon, Y. (2003). Plant growth -promoting effects of diazotrophs in the reviews in plant. Sciences. 22:107-149.
- 36-EL-Fouly, M.M. and Abo EL- Nour, E. A. A. (1995). Registration and use of foliar fertilizers in Egypt. pub. N.R.C. Cairo:1-5.
- 37-Wierzbowska, J. and Bowszys, T. (2008). Effect of growth regulators applied together with different phosphorus fertilization levels on the content and accumulation of potassium, magnesium and calcium in spring wheat. J. of Elemental. 13(3):411-422.
- 38-Barker, A.V. and Pilbeam, D.J. (2007). Handbook of Plant Nutrition. CRC Press, Taylor and Francis Group, LLC. Boca Raton, London, 234-367.
- 39-Johnston, A.E. and Milford, G.F.J. (2008). Potassium and nitrogen interactions in crops. Potash Development Association. PO Box 697, York, 32 5WP, UK, 2-16.
- 40-إدريس، محمد حامد. (2007). فسيولوجيا النبات. مركز سوزان مبارك العلمي، جمهورية مصر العربية، ص 264.