

A new species description to the genus *Cypris* O.F.Müller, 1776 (Crustacea/Ostracoda) from middle Iraq/Governorate

Kerbalaa with some environmental aspects

وصف نوع جديد من الدرقيات (Crustacea/Ostracoda) يعود للجنس

Cypris O.F.Müller 1776

من منطقة وسط العراق/محافظة كربلاء مع بعض الجوانب البيئية

حنان زوير مخلف حسين

جامعة كربلاء / كلية التربية للعلوم الصرفة

الخلاصة

تناول البحث وصف نوع جديد يعود للجنس *Cypris* O.F.Müller, 1776 صنف الدرقيات (Podocopida: Cyprididae) من منطقة وسط العراق وقد تم تشخيص النوع اعتماداً على الصفات الخارجية للدرع المتكون من مصراعين ايمن وايسر من حيث الشكل والحجم والتركيب وكذلك بالنسبة للواحق الجسم ابتداءً من اللامس الاول وانتهاءً بالقدم الذنبى وقد تم تسجيل مكان وتاريخ الجمع وبعض الجوانب البيئية.

Abstract

The present study introduce descript of a new species belongs to the genus *Cypris* O.F.Müller, 1776 class:Ostracoda(Podocopida: Cyprididae). The external features of the carapace(left and right valve),such us size,structure and shape also the apearance characteristics for the appendages, were discussed and illustrated. locality, time and dates of collection were recorded ,also some ecological sides.

المقدمة

توجد الدرقيات في كل انحاء العالم ،وفي كل من البيئات البحرية Marine وغير البحرية Non-Marine وتكثر في جميع انواع بيئات المياه العذبة سواء كانت دائمة او مؤقتة راکدة او جارية وتعد من اكبر مجاميع القشريات تنوعا وتضم حاليا حوالي 30000 - 50000 نوعاً حي و 30000 نوعاً متحجراً (1) اما المتحجرة منها فتوجد بالقرب من كل الطبقات الجيولوجية وقد سادت في المدة السيلورنية Silurian وتوجد على عمق 9سم (2) الدرقيات هي قشريات صغيرة الحجم معظمها بطول (0.3-5) ملم توجد بصورة رئيسة بين النباتات المائية وبقاياها، (3)و(4)

يغطي الدرع الذي يتكون من مصراعين 2 valves-جسم الدرقيات تماما والذي يتكون من منطقتين هما: منطقة الرأس Head or Cephalon والصدر Thorax يفصلان بواسطة حواجز ضيقة ان بيئة الدرقيات غالبا ما تعكس شكل وتركيب الدرع لذا يكون مهماً ومفيداً كمؤشر للبيئة القديمة Paleoenvironmental. وبصورة عامة درقيات المياه العذبة تميل لان تكون قشرتها ناعمة ورقيقة وضعيفة التكلس , وذو شكل يشبه حبة الفاصوليا (5) وتعد عائلتي Limnocytheridae و Cyprididae من اكثر عوائل الدرقيات شيوعا في البيئات غير البحرية وغالبا ما تعد ذو فائدة وقيمة كبيرة في معرفة البيئات القديمة Palaeoenvironment (6)و(7) إن أشكال الندب Scars التي هي عبارة عن نقاط مناطق اتصال العضلات المقربة و تقع داخل المصراعين لها صفة تصنيفية مهمة وبصورة رئيسة على مستويات مافوق العائلة والعائلة Superfamily & family . (8) ان وجود الدرقيات يمكن ان تتحكم به العوامل الثابتة مثل :توفر الغذاء و العمق والاس الهيدروجيني ,والايونات الذائبة, وتركيز الاوكسجين , ودرجة الحرارة , و تراكيز المواد الذائبة, والملوحة , و التوصيلية الكهربائية , و القوة الايونية, ومؤشر التشبع الكلسي (9). (10). و تفضل الدرقيات المعيشة في المياه النظيفة والمؤكسجة على الملوثة وتكون فعالة ونشطة اكثر في المساء ولا تفضل الاضاءة العالية (11)

وتوجد بعض الصفات المهمة للجنس *Cypris* O.F.Müller, 1776 منها : الحافة الامامية لكلا المصراعين كبيرة وتتجه نحو الداخل والمصراع الايسر من الامام ذو حافة داخلية نامية والحافة البطنية الامامية للمصراع الايمن تشبه الشفة المختزلة و المصراع الايسر متراكب على الايمن من الحافة البطنية والخلفية والدرع منتفخ جدا العرض اكثر من نصف الطول والحافة الكيوتكلية للحافة الامامية والخلفية للمصراعين قريبة من خط الاندماج.و الجانب البطنى للدرع مسطح و القطعة الطرفية لملمس الفكوك المساعدة اما اسطوانية او رفيعة والقاطع الهظمي الثالث ذو زوج من الاسنان الغليظة المهدبة والقدم الصدري الثاني يتكون من 4-5 قطع و المخلب الشبه نهائي للقدم الذنبى متين طوله عادة اقرب لطول المخلب النهائي. (12)

الهدف من الدراسة

اجراء دراسة تصنيفية لانواع مجموعة Ostracoda لغرض وصف وتشخيص الأنواع الجديدة او المسجلة سابقا اعتمادا على صفات المظهر الخارجي ذات الأهمية التصنيفية

المواد وطرائق العمل

جمعت النماذج بواسطة شبكة جمع الهائمات الحيوانية اثناء شهر ايلول 2004 من مبزل في محافظة كربلاء/الهندية (سيد إسماعيل) وقد حفظت هذه النماذج في قناني زجاجية تحوي كحول بنسبة 70% وبضع قطرات من الكلورين. اما التشريح فقد استخدم مجهر التشريح Dissecting stereo M. حيث تم فصل المصراعين الايمن والايسر وباقي لواحق الجسم الاخرى بواسطة ابر تشريح دقيقة جدا وثبتت على سلايدات وذلك باضافة قطرة من الكلورين وتم فحصها ورسمها بواسطة مجهر مركب Compound M. ورسمت الأجزاء المفصولة باستعمال نوعان من المقياس المجهرى العيني. Micrometer Ocular.

مايكروميتر مدرج ذو تدريجات (5-0) استعمل لقياس الطول والعرض والارتفاع
مايكروميتر مشبك استعمل لاجراء عملية رسم الأجزاء واستعمل الورق البياني لتطبيق عملية الرسم.
وقد استخدمت عدة مفاتيح لتشخيص النوع مثل (12و13و14و15و16و17)
وتم الاتصال بلمعنيين والمختصين في تصنف مجموعة Ostracoda في دول امريكا وسلطنة عمان وليبيا.
وقد تم توثيقها في متحف التاريخ الطبيعي في العراق

النتائج والمناقشة

النوع. *Cypris magna* sp.nov.

يوصف هذا النوع لأول مرة للعلم. (New species) وقد أشتق اسم هذا النوع تبعاً إلى حجمه الكبير مقارنة مع بقية الأنواع

Phylum : Arthropoda
Subphylum : Crustacea Pennant, 1777
Subclass : Ostracoda Latreille, 1806
Order : Podocopida Sars, 1866
Superfamily: Cypridoidea Baird, 1845
Family: Cyprididae Baird, 1845
Subfamily : Cypridinae Baird, 1845
Genus: *Cypris* O.F.Müller, 1776
Sp: *Cypris magna* sp.nov.

صفات النوع :

- 1- العيون متصلة كأسية الشكل.
- 2- ندب العضلات اربعة مربعة الشكل.
- 3- ملمس القدم الصدري الاول غير منفصل والصفحة الاهتزازية تحمل اربعة خيوط ذا زوائد .
- 4- القدم الذنبى ذو زوج من النهايات المخيلية المشوكة.

الدرع Carapace شكل(1)

بيضوي الشكل منتفخ طوله 1.23 ملم ، ذو لون اخضر فاتح و مغطى بنقر صغيرة وشعيرات. المقدمة والمؤخرة غير منطبقة، الحافة الامامية للمصراعين تتجه نحو الداخل. الحافة الخلفية للمصراع الأيمن متجهة نحو الداخل، العيون متصلة كأسية الشكل.

المصراع الايسر Left carapace شكل(2)

وجود نتوء في الجهة الخلفية للمصراع، الجهة الأمامية شبه مدببة، الحافة الظهرية ذو تحدب. الحافة البطنية شبه مستوية. وجود درنات صغيرة على الحافة الأمامية والخلفية للمصراع، الشعيرات تغطي الحافة الأمامية والبطنية والخلفية. السطح مغطى بشعيرات ونقر صغيرة وكثيفة. ندب العضلات اربعة مربعة الشكل مركزية الموقع .

المصراع الأيمن Right carapace شكل(3)

الحافة الظهرية ذو تحدب مدبب. الحافة البطنية ذو تقعر. الحافة الامامية والخلفية ذو درنات صغيرة . الشعيرات تغطي الحافة الامامية والبطنية والخلفية. السطح مغطى بشعيرات ونقر صغيرة. ندب العضلات اربعة مربعة الشكل كبيرة مركزية الموقع.

اللامس الاول 1st Antenna شكل(4)

يتكون من سبع قطع متدرجة في الحجم. اهلاب الاستشعار نامية بشكل جيد ريشية. القطعة القاعدية ذو خط مائل ينتصف القطعة، حاوية هليبين هلب عند طرف المقدمة ، وهلب ظهري وسطي الموقع ويقع على السطح الجانبي خط مائل. القطعة الثانية ذات تخرسين واضحين على السطح الظهري منها وتحمل هليبين قصيرين عند منطقة الاتصال بالقطعة الثالثة . الثالثة طويلة تحمل هليبين قصيرين. الرابعة تحمل زوجاً من الاهلاب الطويلة الريشية على السطح البطني . الخامسة تحمل ثلاثة اهلاب بطنية طويلة ريشية . السادسة تحمل ثلاثة اهلاب طويلة ريشية وهلب قصير يقع على السطح الظهري. القطعة السابعة وتكون ضيقة تحمل ثلاثة اهلاب ريشية قصيرة .

اللامس الثاني 2 nd Antenna (شكل 5)

يتكون من اربع قطع. القطعة القاعدية قصيرة تحمل زوج من الاهلاب عند منطقة الاتصال مع القطعة الثانية. القطعة الثانية ذو تركيب غشائي على طول السطح البطني، السطح الظهري ذو تقعر اقرب للقطعة القاعدية. القدم الداخلي يتكون من قطعتين القطعة الاولى ذو سطح ظهري وبطني مكسو بالشعيرات، تحمل على السطح البطني هلباً تحسسياً قصيراً منتفخاً. وجود اهلاب استشعار (5+1) نامية بشكل جيد ريشية عند طرف القطعة تبتعد كثيراً عن النهايات المخيلية. وجود هلب ذي قاعدة منتفخة عند الطرف البطني الحر. الطرفية تحمل خمس نهايات مخيلية مشوكة غير متساوية في الطول، السطح البطني ذو جانب مقطوع يحمل ثلاثة اهلاب متساوية في الطول في الثلث الاول منها أحدها مهدب. القدم الخارجي تركيب حرسفي يحمل هلباً طويلاً.

الفكوك Mandible (شكل 6)

القطعة القاعدية تركيب مستوي ذو قمة مستدقة تتسع تدريجياً باتجاه الاسفل لتكون تركيباً مستوياً ذي نهاية مقطوعة مائلة باتجاه الاعلى تحمل ستة اسنان، وجود شعيرة واحدة بداية السن الاول. الملمس يتكون من اربع قطع. القطعة الاولى متطولة تحمل على السطح الظهري صفيحة اهتزازية ذات قاعدة اسطوانية قصيرة تحمل ستة خيوط متساوية في الطول، وتحمل على السطح البطني المجموعة الهلبيه الاولى وتتكون من هلبين احدهما مهدب. الثانية وتكون مثلثة الشكل تحمل على السطح البطني المجموعة الهلبيه الثانية وتتكون من ثلاثة ثلاث اهلاب الاوسط منه مهدب وتحمل على السطح الظهري ثلاثة اهلاب متساوية في الطول عند منطقة الاتصال مع القطعة الثالثة. الثالثة تحمل على السطح الظهري وعند منطقة الاتصال ثلاثة اهلاب اثنان متساوية في الطول وواحد اقصر قليلاً. الطرفية ذو ثلاثة اهلاب طرفية و هلب نهائي جانبي.

الفكوك المساعدة Maxilla (شكل 7)

القطعة القاعدية ذو سطح خلفي محدب يحمل زوجاً من الاهلاب القصيرة. القاطع الهضمي الاول يحمل ستة اهلاب قصيرة طرفية. القاطع الهضمي الثاني يحمل ثلاثة اهلاب طرفية قصيرة. القاطع الهضمي الثالث يحمل زوجاً من الاسنان الغليظة المهدبة وهلبين نهائيين جانبيين الموقع. الملمس رفيع وطويل يحمل هلبين متساويين في الطول، القطعة الطرفية منها اسطوانية الشكل ذات 3 اهلاب طرفية وتحمل على السطح الامامي هلب مفرد. الصفيحة الاهتزازية ذو شكل نصف دائري غير كامل، يقع على السطح الامامي منها تخرصر سفلي وتحمل 16 خيط متدرج في الطول يليها منطقة خالية من الاهلاب وتنتهي ب5 اهلاب مهدبة متساوية في الطول.

القدم الصدري الاول 1st Thoracopod (شكل 8)

القاطع الهضمي يحمل تسعة من الاهلاب القصيرة. الملمس غير منفصل يحمل ثلاثة اهلاب، اثنان طويلة وثالث قصير. الصفيحة الاهتزازية تحمل اربعة خيوط ذا زوائد غشائية.

القدم الصدري الثاني 2 nd Thoracopod (شكل 9)

يتكون من خمس قطع. القطعة القاعدية ذو ثلاثة اهلاب الاوسط منها قصير. القطعة الثانية قصيرة ذات خط وسطي. الثالثة طويلة ذات سطح ظهري وبطني مكسو بالشعيرات يحمل هلباً طرفياً عند منطقة الاتصال مع القطعة الرابعة. الرابعة طويلة ذات سطح ظهري مكسو بالشعيرات تحمل هلباً وسطياً طويلاً مهدباً وهلباً طرفياً قصيراً. القطعة الطرفية منفصلة من الجهة البطنية عن القطعة الرابعة تحمل هلبين هلب قصير وهلب طويل مخلي مشوك.

القدم الصدري الثالث 3 rd Thoracopod (شكل 10)

يتكون من ثلاثة قطع. القطعة القاعدية ذو مقدمة عريضة تحمل هلبين. القطعة قبل الطرفية ذي انتفاخ وسطي تحمل هلبين هلب عند منطقة الاتصال مع القطعة القاعدية وهلباً وسطياً على السطح البطني لها. القطعة الطرفية تحمل هلبين مهدبين هلب عند منطقة الاتصال مع القطعة قبل الطرفية طويل وهلب قصير وسطي والجزء الطرفي منها يحمل ثلاثة اهلاب اثنان قصيرة وواحدة طويلة منعكسة مهدبة.

القدم الذنبى Uropod (شكل 11)

الجذع عريض من المقدمة وبضيق تدريجياً باتجاه المؤخرة التي تحمل زوج من النهايات المخيلية المشوكة وهلب خلفي واحد. رابط القدم الذنبى ذو فرعين.

نقاط المقارنة:

هذا النوع قريب الشبه بالنوع *Cypris subglobosa* Sowerby, 1840 (روسيا) ولكنه يختلف عنه بالنقاط الاتية:

- 1- ندب العضلات اربعة كبيرة مربعة مركزية الموقع.
- 2- اهلاب اللامس الاول مهدبة.
- 3- القطعة الاولى للقدم الداخلي للامس الثاني ذي سطح ظهري وبطني مهدب.
- 4- القدم القاعدية للفكوك ذي سطح مستوي، الصفيحة الاهتزازية اسطوانية تحمل ستة اهلاب غير مهدبة.
- 5- الملمس غير منفصل والصفيحة الاهتزازية تحمل اربعة اهلاب ذي زوائد غشائية.
- 6- القدم الذنبى ذو زوج من النهايات المخيلية المشوكة وهلب خلفي واحد.

النماذج المدروسة

1* انثى holotype

1* انثى allotype

2* انثى paratype

كربلاء - العراق - مزل سيد اسماعيل

جمعت خلال شهر ايلول 2004 (الجامع حنان زوير)

صفات النوع البيئة والحياتية:

يتواجد في مياه البزل المويحة ذات قاع طيني ,بين الطحالب والقصب والحشائش.

درجة حرارة الهواء = 32° م

درجة حرارة الماء = 24° م .

سرعة التيار = 0.009 م/ثا.

التوصيلية الكهربائية = 2.27 مايكروسيمن /سم.

الأس الهيدروجيني = 7.47


الملوحة = 1.452 ‰.

الشكر والتقدير Acknowledgements

أود ان اقدم شكري وامتناني الى البروفسور Reginald Victor جامعة السلطان قابوس \سلطنة عمان والبروفسور Richard M. Forester جامعة دنفر \الولايات المتحدة الامريكية للمساعدة في تشخيص النوع.


قائمة المصطلحات والمختصرات

المختصر	المصطلح الإنكليزي	المصطلح العربي
Exp	Exopod	قدم خارجي
Enp	Endopod	قدم داخلي
Fi	Filaments	خيوط
H	Hairs	شعيرات
L	Loop	حلقة
LV	Left Valve	مصراع ايسر
Md	M&ible	فكوك
MP	Masticatory Prossec	قاطع هضمي
Mx	Maxilla	فكوك مساعدة
3rdMP	Therd Masticatory Prossec	قاطع هضمي ثالث
NS	Natatory Setae	اهلاب استشعار
Pa	Palp	لمس
PM	Posterior Margin	حافة خلفية
PS	Posterior Setae	هلب خلفي
Pu	Pustuls	درن
RV	Right Valve	مصراع ايمن
SG1	Setal Groub 1	مجموعة هلبية اولى
SG2	Setal Groub 2	مجموعة هلبية ثانية
Sc	Scale	حشفة
SS	Sensory Setae	هلب حسي
T1	1st Thoracopod	قدم صدري اول
T2	2nd Thoracopod	قدم صدري ثاني
T3	3rd Thoracopod	قدم صدريه ثالث
Te	Teeth Bristels	اسنان غليظة
TG	Teeth	أسنان
TS	Terminal Segment	قطعة طرفية
UA	Uropodal Attachment	رابط القدم الذنبى
Up	Uropod	قدم ذنبى
UR	Uropodal Ramuse	فرع ذنبى
VP	Vibratoru Plate	صفحة اهتزازية
VM	Ventral Margin	حافة بطنية



منظر سطحي للدرع Carapace (أنثى)


النوع *Cypris magna* sp.nov



(شكل 1) منظر سطحي للدرع Carapace (أنثى)

النوع *Cypris magna* sp.nov.


شكل(2)Left carapaceالمصراع الايسر




شكل(3)Right carapaceالمصراع الأيمن

.النوع *Cypris magna* sp.nov

(شكل 4) 1st Antenna اللامس الاول




0.5 ملم




(شكل 5) 2nd Antenna اللامس الثاني

النوع *Cypris magna* sp. nov

(شكل 6) Mandible الفكوك




(شكل 7) Maxilla الفكوك المساعدة




النوع *Cypris magna* sp.nov

(شكل 8.) 1st Thoracopod القدم الصدري الاول




0.5 ملم




(شكل 9.) 2nd Thoracopod القدم الصدري الثاني

النوع *Cypris magna* sp.nov

(شكل 10) 3 rd Thoracopod القدم الصدري الثالث



0.5 ملم



(شكل 11) Uropod القدم الذنب

النوع *Cypris magna* sp. nov

المصادر

- 1-Smith , A. J & Park , L .E . (2003) . An Introduction to Ostracoda in : Park , L .E & Smith , A .J . (Eds). Bridging The Gap Trends in the Ostracode Biological ad Geological Sciences. The paleontological Society papers ,9 :9-10.
- 2-McConnaughey, B .H . & Zottoli, R. (1983).Introduction to Marine BioLogY . 4th . ed . ,The C. V. Mosby Company London: 638pp.
- 3-Cole , G. A. (1983). Textbook of Limnology. 3rd. ed., The C.V. Mosby, Company, London: 401pp
- 4-Raymont, J. E. G. (1983). Plankton & productivity in the oceans . 2nd. ed . Pergamon press Ltd.Zooplankton, 2 : (824) pp .
- 5-Athersuch , J . ; Horne , D . J . Whittaker , J . E (1989) . Intro duction to ostracoda . In Brill . E J (Ed) , Marine & brakish water ostracods . synopsis of the British fauna , 43 : 343 p p
- 6- Tatman, S. & Whately , R . (1996) . Apalaeontological reconstruction of the Ostracod Member of the Blairmore Formation , Alberta , Canada . Proc . 2nd . Europ . Ostracod . Meet . Univ . Glusgaw . Scotl& . 23 Micrplaeontological Society16th December , 1993 , British Micropalaeontological society London . 35 _ 38
- 7-Whately , R . C . & Cusminsky , G . C . (1995) . Quaternary lacustrine Ostracoda from northern patagonia , Argentina . In : Riha . (Ed .) . Ostracoda & Biostratigraphy : 303 _ 310 ..
- 8-Benson, R . H . (1983) . Biomechanical stability & sudden change in the evolution on of the deep-sea ostracode pedeidonamicus . paleobiology . 9 (4) : 398 _ 413.
- 9-Dean , W . E ; Forester , R . M . & Bradbury , J . P . (2002) . Early Holocene change in atmospheric circulation in the Northern Great Plains an upstream view of the 8. 2 ka cold event . Quaternary Science Reviews , 21 : 1763 _ 1775.
- 10-Szczechura , J . 1996 . Ecological control of ostracode distribution in the middle miocene of paratethyes In : keen , M . C . (Ed) . : Proc , 2nd Europ . ostracod . Meet . Univ . Glasgow . Scotland 23 rd _ 27th July , 1993 . Brit . Micropal . Soc . , London , 99 _ 106.
- 11-Last , W . M . ; Tellev , J . T . & Forester, R . M . (1994). Paleohydrology & paleochemistry of lake Monitoba , Canada : the isotope & Ostracode records . Jurnal of Paleolimnology , 12 : 269 _ 282.
- 12-Meisch, C. (2000). Freshwater Ostracoda of western & Central Europe. Spektrum Akademisher Verlag GmbH. Heidelberg, Berlin: 513pp.
- 13-Reginald, V. (2004). Crustacea: Ostracoda. In: yule, C. M & sen, Y. H. (Eds). Freshwater Invertebrates of the Malaysian Region. Academy of sciences Malaysian: 225 – 252.
- 14-Edmondson, W. T. (1959). Freshwater Biology.2nd. ed John Wiley & Sons, Inc. Newyork: 124 pp
- 15-Bronshtein, Z. S. (1947). Fresh – water Ostracoda. Translat by Indira Nayar, Oxonian Press Pvt. Ltd., New Delhi: 470pp.
- 16-Henderson, P. A. (2002). Freshwater Ostracodes. Pisces Conser- vation Ltd: 258pp.
- 17-Pennak, R. W. (1978). Fresh Water invertebrates of the United States. 2nd. ed. John Wiley and Sons, Inc. 2nd.ed.,803