



دراسة كفاءة بالغات مفترس محلي لافتراس ادوار بق الحمضيات الدقيقي

وعد حمودي عواد

مهني بحر عواد

جامعة الموصل – كلية الزراعة والغابات

الخلاصة:

اجريت هذه التجربة في مختبرات وغرف التربية في وحدة بحوث مكافحة الاحيائية/كلية الزراعة/جامعة بغداد بهدف اختبار الكفاءة الافتراضية لبالغات المفترس المحلي *Nephus jaderiensis* (Coleoptera:Coccinellidae) والذي يعد من الاعداء الطبيعية المهمة والكفوءة لحشرة بق الحمضيات الدقيقي (*Homoptera : Pseudococcidae*) *Planococcus citri* Risso. أظهرت النتائج ان للمفترس كفاءة افتراضية عالية في استهلاك الادوار غير البالغة لبق الحمضيات الدقيقي المدروسة تحت درجات حرارة 18 و 23 و 27 و 32 م° ، حيث بلغت معدلات بالغات المفترس للأدوار المختلفة من البق الدقيقي {بيض وحرورية عمر اول وحرورية عمر ثاني وحرورية عمر ثالث} 13.3 و 6.0 و 7.5 و 1.0 و 18.3 و 7.2 و 7.0 و 2.5 و 17.1 و 8.1 و 8.5 و 4.8 و 19.4 و 7.2 و 6.6 و 5.2 ، فريسة بالتتابع من قبل انث المفترس ، في حين بلغت 15.1 و 5.1 و 7.4 و 1.5 و 20.1 و 5.9 و 7.3 و 3.1 و 20.3 و 7.0 و 9.2 و 4.8 و 20.1 و 7.9 و 7.3 و 5.1 ، فريسة بالتتابع من قبل الذكور. نستنتج من هذه الدراسة بأن المفترس *Nephus jaderiensis* يعد من المفترسات الجيدة ضد البق الدقيقي اذ تهاجم بالغات المفترس الادوار المختلفة للبق الدقيقي وبمعدلات جيدة مما يشير الى اهميته كعامل احياي مهم في تنظيم سكان الآفة. نوصي بأجراء المزيد من الدراسات الحقلية للمفترس لتحديد مدى كفاءته حقليا بحسب الظروف المحلية وتحديد دوره في تنظيم سكان البق الدقيقي ودراسة مدى توافق المفترس مع طرائق مكافحة الاخرى لتحديد دورة الحيو ضمن برامج الادارة المتكاملة للآفات.

معلومات البحث:

تاريخ التسليم: ٢٠١٣/٠٠/٠٠
تاريخ القبول: ٢٠١٤/٠٥/٠٦
تاريخ النشر: ٢٠٢٢ / /

DOI: <http://dx.doi.org/10.37652/JUAPS.....>

الكلمات المفتاحية:

بق الحمضيات الدقيقي ،
بالغات ،
مفترسات.

المقدمة

حاجة السوق المحلية الا لمدة محدودة من العام اذ لم يزد عن 116.00 الف طن مقارنة بإنتاج الحمضيات في بعض الدول العربية مثل مصر وسوريا والبالغ(3522.95 و 1071.30)الف طن على التوالي(5). تتعرض اشجار الحمضيات للإصابة من الآفات يأتي في مقدمتها من حيث الأهمية حاليا ذبابة الياسمين البيضاء *Aleuroclava jasmini* Takahashi ، البق الدقيقي، الحشرات القشرية ، والتي تقلل من عطائها كما ونوعا وتعد افراد عائلة البق لدقيقي *Pseudococcidae* من الآفات الحشرية المهمة التي تصيب الحمضيات يرافقه بذلك حفار اوراق الحمضيات (1) .سبب استخدام المبيدات الكيميائية الى مشاكل بيئية خطيرة حيث ادى استخدامها المفرط الى الاخلال بالاتزان الطبيعي مما دعا المهتمين في مجال البيئة الى التوجه الى طرق اخرى بديلة لذا ظهرت اتجاهات حديثة في مكافحة الآفات ومنها مبادا مكافحة المتكاملة(4)

الحمضيات *Citrus spp* من اشجار المناطق المعتدلة وشبة الاستوائية المهمة اذ تحتل الموقع الاول في الانتاج العالمي من الفاكهة الذي بلغ عام 1999 نحو 98258000 طن (6) فيما اشارت تقارير المنظمة العربية للتنمية الزراعية للعام 2009 الى ان الانتاج الكلي في الدول العربية هو بمعدل 9224.90 الف طن وفي العراق تحتل اشجار الحمضيات المرتبة الثانية بعد نخيل التمر وتقدر عدد الاشجار المثمرة بنحو 8588.00 الف شجرة (5) اذ تزرع عادة بين اشجار النخيل التي توفر لها الحماية الكافية من الظروف الجو المتطرفة صيفا وشتاء .اما انتاجية اشجار الحمضيات في العراق فهي متدنية اذا ما قورنت بالدول العربية ويكاد الحاصل لا يسد

* Corresponding author at: Continuous Education Center, Mustansiriyah University, , Baghdad, Iraq;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5859-6212> .Mobil:777777
E-mail address: dean_coll.science@yahoo.com

حاويات بلاستيكية تحتوي على مستعمرات البق الدقيقي ثم نقلت الحاويات الى غرف التربية الخاصة بالمفترس بدرجة حرارة $27 \pm 2^{\circ}\text{C}$ ورطوبة نسبية 55-60% ومدة اضاءة (ضوء/ ظلام) 8:16 ساعة وجرى متابعة تكاثر مستعمرة المفترس .

النتائج والمناقشة :

الكفاءة الافتراضية لبالغات المفترس لأدوار البق الدقيقي عند

درجات حرارة مختلفة

تشير النتائج المدونة في الجدول (1) الى ان معدلات استهلاك مختلفة تتناسب مع حجم الطور الذي تهاجمه كما اظهرت النتائج وجود تأثير لدرجات الحرارة في معدلات استهلاك الادوار المختلفة اذ اظهرت نتائج التحليل الاحصائي وجود فروق معنوية بين معدلات الاستهلاك لبالغات المفترس ولجميع الاطوار المقدمة تحت التجربة عند درجات الحرارة (18° ، 23° ، 27° ، 32°) كما لم يلاحظ وجود فروق معنوية في معدلات الاستهلاك عند درجات الحرارة (27° ، 32°) وان لجنس البالغة تأثير معنوي في معدل الاستهلاك فضلا على ان هناك تأثير معنوي لنوع الفريسة المقدمة في معدلات الاستهلاك ووجود تداخل معنوي بين درجات الحرارة وجنس البالغة وكذلك بين الحرارة والفريسة وبين الجنس والفريسة فضلا عن وجود تداخل ثلاثي بين الحرارة والجنس والفريسة مما يؤثر على معدلات الاستهلاك. وعلى ضوء النتائج يمكن القول ان اقل معدلات الاستهلاك لبالغات المفترس كان عند درجة حرارة 18° فيما كانت اعلى معدلات الاستهلاك عند درجات الحرارة 23° ، 27° و 32° ان هذه النتائج جاءت مقارنة لما توصلت اليه (1) اذ سجلت معدلات استهلاك الذكور بمعدلات مقاربة للإناث حيث بلغت معدلات الاستهلاك 10.72 ، 11.88 و 14.81. فيما سجلت اناث وذكور المفترس معدل استهلاكي مرتفع لإناث البق الدقيقي اذ بلغ 91 ، 88 انش على التوالي. نستنتج مما سبق اهمية المفترس كعامل معتمد وفعال في برامج مكافحة الاحيائية للبِق الدقيقي اذ ان مهاجمة جميع ادوار الفريسة من قبل بالغات المفترس يعد احد ابرز العوامل المهمة في تنظيم الكثافة السكانية للآفة اي تمتاز بقدرة تكاثرية عالية.

المصادر

1_AlKhateeb, N . and A.Raie. 2001. A study of some biological parameters of the predator *Cryptolaemus montrouzieri* (Mulsant) Introduced to *Planococcus*

ان تجربة العالم في هذا المضمار واسعة ومتنوعة وحقت العديد من الدول بما فيها بعض الدول عربية التي تبنت مثل هذه البرامج نجاحات كبيرة في السيطرة على الآفات مع تقليل استعمال المبيدات ناهيك عن المكاسب في المجالين الصحي والبيئي . ان هذه الدراسة ستشمل دراسة جانب من الجوانب الحياتية للمفترس المحلي وهي الكفاءة الافتراضية حيث ستبين معلومات مهمة عن كفاءة هذا المفترس ضد هذه الآفة والتي سوف تساهم في الشروع لتكثير هذا العدو الحيوي واطلاقه لمكافحة آفة البق الدقيقي.

المواد وطرائق العمل

اعداد العائل النباتي لتربية بق الحمضيات الدقيقي

تم الحصول على دفعات متوالية من درنات البطاطا صنف دزري تميزت بكسر سكونها ونمو النباتات فيها بطول لا يتعدى 2سم لضمان وجود مستعمرات البق الدقيقي بعد استبعاد الدرنات المتضررة تم غسل الدرنات المنتقاة بالماء لإزالة الاتربة والاساخ ونقلتها بعدها الى حاويات كبيرة الحجم تحتوي على محلول هايپوكلورات الصوديوم بتركيز 4-6 % ولمدة نصف ساعة للتخلص من مسببات الممرضة على سطح الدرنه ان وجدت وضعت الدرنات في صناديق بلاستيكية مشبكة بأبعاد $15 \times 25 \times 45$ سم نقلت الصناديق بعدها الى غرفة التثبيت المعدة لهذا الغرض ووضعت على رفوف من الالمنيوم عند درجة حرارة $20 \pm 2^{\circ}\text{C}$ ورطوبة نسبية 55-60% وظلام دامس بغية الحصول على نباتات بيضاء الملائمة لتربية حشرة بق الدقيقي . بعد وصول نباتات درنات البطاطا الى الطول المناسب نقلت الى غرف تربية البق الدقيقي حيث عدت الدرنات بالبِق الدقيقي رتبت الصناديق فيما بعد في امكنها الدائمة على الرفوف في غرف التربية عند درجة حرارة $26^{\circ} \pm 2^{\circ}$ ورطوبة نسبية 55-60 % ومدة اضاءة (ضوء: ظلام) 8:16 ساعة جرى متابعة نمو الحشرة لحين الوصول الى العمر المناسب لتغذية المفترس.

تربية المفترس المحلي

تم الحصول على المفترس *Nephus jaderiensis* من اشجار الحمضيات المصابة بالبِق الدقيقي *P.citri* بقضاء ابي غريب حيث تم نقلها وتربيتها في غرف التربية في وحدة بحوث مكافحة الاحيائية حيث تم اطلاق 10 ازواج من بالغات المفترس (ذكور + اناث) في

- Coccinellidae) in response to *Aphis gossypii* (Hemiptera:Aphididae) with particular emphasis on larval parasitism. Environmental Entomology 40(4):835-843.
- 14_Malleshaiah,R.B.K. and K.N.M. gonda. 2000. Biology of citrus mealybug *Planococcus citri* (Risso) (Homoptera :Pseudococcidae). Crop Res. Hisar 20 (1) : 130-133.
- 15_Rao,C.N.,V.J.shivankar and Shyam Singh .2006.Citrus mealybug (*Planococcus citri* Risso) mangement–AReview .India ,Agric. Rev., 27 (2):142-146.
- 16_Walton,V.M.,K.L.Pringle,2005.Developmental biology of vinemealybug, *Planococcus ficus* (Signoret) (Homoptera:Pseudococcidae) and its parasitoid *Coccidoxenoidespermittus*(Timberlake)(Hymenoptera:Encyrtidae).African.Entomology 13: 143–14.
- 17_Isikber ,ali arda .2005 .Functional response of two coccinellid predators *Scymnus levaillanti* and *Cycloneda sanguinea* , to the cotton aphid *Aphis gossypii* .Turk. Journal Agriculture vol.347-355.
- 18_Lee, S.H. 2011. Effect of the probability of a predator catching prey on predator-prey system stability.Journal of Asia-Pacific Entomology (14) :159-162.
- 19_Timms, J. E. et al. 2008. the effects of host plant on the coccinellid functional response : Is the conifer specialist *Aphidecta oblitterata* (L.) (Coleoptera:Coccinellidae) better adapted to spruce than the generalist *Adalia bipunctata* (L.) (Coleoptera:Coccinellidae). Biological Control (47): 273-281.
- جدول 1. الكفاءة الافتراضية لبالغات المفترس *N. jaderiensis* لإدوار البق الدقيقي *P. citri*
- | نوع الفريسة المستهلك من قبل بالغات المفترس | | | | الجنس | درجة الحرارة |
|--|--------------------|-------------------|--------|-------|--------------|
| حوريات
عمر ثالث | حوريات
عمر ثاني | حوريات
عمر اول | البويض | | |
| 1.0 | 7.5 | 6.0 | 13.3 | انثى | 18° |
| 1.5 | 7.4 | 6.1 | 15.1 | ذكر | |
| 2.5 | 7.0 | 7.3 | 18.2 | انثى | 23° |
| 3.1 | 7.3 | 5.9 | 20.1 | ذكر | |
| 4.3 | 8.5 | 8.1 | 17.1 | انثى | 27° |
| 4.8 | 9.2 | 7.0 | 20.3 | ذكر | |
| 5.2 | 6.6 | 7.2 | 19.4 | انثى | 32° |
| 5.1 | 7.3 | 7.9 | 20.1 | ذكر | |
- citri* (Risso) in Syria, and estimate of its predation rate in the laboratory . Arab J.PI. Prot. 19 : 131-134.
- 2_Al-Khateeb,N. and L. Asslan. 2007. Study and determination of most important biological parameters of the predator *Nephus includens* Kirch and comparison with parameters of the famous introduced predator *Cryptolaemus montrouzieri* (Mulsant) . Damascus.Univ J. Agric.2(23) :121-134.
- 3_Al-Shamary,H.I. 2006. Study in Mass Rearing and Releasing of the Introduced Predator *Cryptolaemus montrouzieri* Muls (Coleoptera: Coccinellidae) of Spherical Mealybg *Nipaecoccus viridis* (Newst) Infesting Citrus Trees in Iraq.M.Sc.Thesis,Dept.of Plant Protectin.,Coll. of Agric., Univ. of Baghdad, pp.108.
- 4_Al-Rubeae,J.and K.AlHajiya .2012. Effects of population densities of black bean nymph on biological performance of the predator larvae of *Coccinella septempunctata* L.Iraqi J.Agric. Sci.43 (2): 18-27 .
- 5_Arab Organization for Agricultural Development.2009. Arab agricultural statistics yearbook. Khartoum(29):474.
- 6_FAO. 1999. Production Year Book (53).
- 7_Hamad,B.S.2005.Ecological and Biological Studis *Chrysoperla mutata* (MacLachlan) (Neuroptea:Chrysopidae)Natural Enemy of Dubasbug *Ommatissus lybius* DeBerg .(Homoptera: Tropiduchidae) .Ph.D.T hess , Coll of Science .Univ.of Baghdad.
- 8_Kontodimas , C . K . dimitris.2007.Life table parameters of the pseudococcid predators *Nephus includes* and *Nephus bisignatus* (Coleoptera: Coccinellidae).Entomol. 104: 407-415.
- 9_Kontodimas , C . K.Dimitris.2004.Comparative temperature-dependent of *Nephus includens* (Kirsch) and *Nephus bisignatus* (Boheman) (Coleoptera:Coccinellidae)preying on *Planococcus citri* (Risso) (Homoptera: Pseudococcidae): evaluation of a linear and various nonlinear models using specific criteria. Environ. Entomol.33(1):1-11.
- 10_Kontodimas ,C.K.Dimitris. 2008.Life table parameters of the aphid predators *Coccinella septemounctata*, *Ceratomegilla undecimnotata* and *Propylea quatuordecimpunctata* (Coleoptera: Coccinellidae). Eur. J. Entomol. 105:427-430.
- 11_Kontodimas ,C.K.dimitris.2012 . Nonlinear models for describing development and fecundity of the pseudococcid predators *Nephus includes* and *Nephus bisignatus*. Entomologia Hellenica 21: 13-24 .
- 12_Milonas,P.and Dimitrios .2011 .Predator's functional response: influence of prey species and size.Biological Control 59 : 141–146.
- 13_Mohamed , H . bayoumy. 2011. Foraging behavior of the coccinellid *Nephus includens* (Coleoptera:

THE STUDY OF THE PREDATORY EFFICIENCY OF LOCAL ADULTS CITRUS MEALYBUG PREDATOR

Muhaned B. Awad Waad H. Awad

E.mail: dean_coll.science@yahoo.com

ABSTRACT

This study was conducted at the Biological Control Unit laboratories /College of Agriculture/University of Baghdad , during the period from June 2012 to January 2014. To identify the value of the most important biological indicators of the Local mealybug predator *Nephus jaderiensis* (Coleoptera: Coccinellidae). The predator is one of the important natural enemies of citrus mealybug *Planococcus citri* Risso (Homoptera: Pseudococcidae) which regarded for long time as a key pest of fruit trees especially citrus causing significant economic losses. Study of predation efficiency showed that the consumption of male and female predators were also different being 13.3 , 6.0, 7. 5and 1.0 , 18.3 , 7.2 , 7.0 and 2. 5 , 17.1 , 8.1 , 8.5 and 4.8 , 19.4 , 7.2 , 6.6 and 5.2 for the fore mentioned immature stages by the adult females , while 15.1 , 5.1 , 7. 4 and 1.5 , 20.1 , 5.9 , 7.3 and 3.1 , 20.3 , 7.0 , 9.2 and 4.8 , 20.1 , 7.9 , 7.3 and 5.1 for the male . It was concluded that predator *Nephus jaderiensis* is one of the good against the Predators as mealybug attack the larvae and adults of different roles of predator mealybug and at good rates, indicating its importance as a factor in the organization of important biological pest population. We recommend conducting further field studies of predator to determine the extent of efficiency in the field, according to local conditions and to determine its role in regulating the population of mealybug and study the compatibility of the predator with other control methods to determine its vital role in integrated pest management programs