

**Effect of *Ibicella lutea* (Staph.) Van Eselt.
(Martyniaceae) Leaves Extracts in Some Biological
Aspects of False Armyworm Insect *Lucania loreyi*
(Dup.) (Lepidoptera: Noctuidae)**

Abdul-Razzak L. Al-Rubaie

Al-Furat Al-Awsat Technical University, Al-Mussaib Technical College

Spider_moh22@yahoo.com

Abstract

The present study included test the effectiveness of Turbinoid and Alkaloid compounds extracts from pure leaves of Devil's Claw *Ibicella lutea* on life performance of false armyworm insect *Lucania loreyi*, the Turbinoid compounds extract had a clear effect on the various insect lifestyle, the percentage of eggs destruction in the Turbinoid and Alkaloid compounds extract at a concentration of 2.0 mg/ ml reached (50.0 and 46.7%), respectively, compared with the control treatment that reach (0.0%), The percentage of the destruction of first and sixth larval instar was (90.3 and 73.3%) when transacted with Turbinoid compounds extract respectively at the concentration of 2.0 mg/ ml, while the percentage of destruction of first and sixth larval instar that transacted with Alkaloid compounds extract was reach (90 and 56.7 %) respectively at the concentration of 2.0 mg/ ml, the highest percentage for pupa destruction was reached about 80% when transacted with Turbinoid compounds extract at concentration of 2.0 mg/ ml compared with Alkaloid compounds extract which reached 43.3% at concentration of 2.0 mg/ ml, and the percentage of adult destruction reached 63.3% when transacted with Turbinoid compounds extract at a concentration of 2.0 mg/ ml and reached 40.0% with alkaloid extract, The accumulative percentage of immature phases destruction, when transacted with Turbinoid and Alkaloid compounds, extract reached about (100 and 83.3%), respectively, at a concentration of 2.0 mg/ ml.

Keywords: *Lucania loreyi*, *Zea mays*, *Ibicella lutea*, Biological control.

***Ibicella lutea* (Staph.) Van** تأثير مستخلصات أوراق نبات قرن الغزال
Eselt. (Martyniaceae) في بعض جوانب الأداء الحياتي لحشرة دودة الحشد
***Lucania loreyi* (Dup.) (Lepidoptera: Noctuidae)** الكاذبة

محمد حسين شيع

جامعة الفرات الأوسط التقنية/ الكلية التقنية/ المسيب

الخلاصة

تضمنت الدراسة الحالية اختبار فعالية مستخلصات المركبات التريبينية والقلوانية الخام لأوراق نبات قرن الغزال *Ibicella lutea* في الأداء الحياتي لحشرة دودة الحشد الكاذبة *Lucania loreyi* إذ كان لمستخلص المركبات التريبينية تأثيرٌ واضحٌ في مختلف حياتية الحشرة، إذ بلغت النسبة المئوية لهلاك البيض في مستخلص المركبات التريبينية و القلوانية وبتركيز 2.0 ملغم/ مل (50.0 و 46.7%) على التوالي مقارنة مع معاملة السيطرة التي بلغت (0 و 0%)، بينما بلغت النسبة المئوية لهلاك الطور البرقي

الأول والسادس (90.3 و 73.3%) عند المعاملة بمستخلص المركبات التريبنية على التوالي في التركيز 2.0 ملغم/مل، أما في مستخلص المركبات القلوانية بلغت النسبة المئوية لهلاك يرقات الطور الأول والسادس (90 و 56.7%) على التوالي في التركيز 2.0 ملغم/مل، وبلغت أعلى نسبة مئوية لهلاك العذارى 80% عند المعاملة بمستخلص المركبات التريبنية بتركيز 2.0 ملغم/مل أما مستخلص المركبات القلوانية فقد بلغت 43.3% بتركيز 2.0 ملغم/مل في حين بلغت النسبة المئوية لهلاك البالغات 63.3% عند المعاملة بمستخلص المركبات التريبنية وبتركيز 2.0 ملغم/مل في حين بلغت 40.0% عند المعاملة بمستخلص المركبات القلوانية وقد بلغت النسبة المئوية لهلاك التراكمي للأدوار غير البالغة عند المعاملة بمستخلص المركبات التريبنية والقلوانية (100 و 83.3%) على التوالي بالتركيز 2.0 ملغم/مل.

الكلمات المفتاحية: دودة الحشد الكاذبة، الذرة الصفراء، نبات قرن الغزال، المقاومة الأحيائية.

المقدمة

تعد الذرة الصفراء *Zea mays* L. من المحاصيل الحقلية المهمة في العالم والعراق وتأتي أهميتها بتعدد إستعمالاتها التي تدخل في الغذاء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وذلك بإستعمالها كمكون أساس في علفية الحيوانات، فضلاً عن الأغراض التصنيعية المختلفة الأخرى وتعد ثالث أكبر محصول زراعي إنتشاراً في العالم مما يجعلها تحظى بإهتمام كثير من الباحثين (1). يتعرض نبات الذرة الصفراء للإصابات بالعديد من الأمراض والحشرات بدءاً من البادرة وحتى تكوين العرائيص وتسبب في كثير من الأحيان إلى موت النبات في طور البادرة ولذلك يلجأ المزارعون إلى زراعة أكثر من حبة في الجورة الواحدة لتعويض الفقدان ومن هذه الآفات دودة الحشد الكاذبة *Leucania loreyi* (2). تتغذى يرقات دودة الحشد الكاذبة *L. loreyi* الحديثة الفقس على الأوراق الغضة وتعمل ثقوباً في حوافها وبتقدم اليرقات بالعمر تهاجم مختلف أجزاء النبات إذ تتغذى على القمم النامية والنموات الجديدة للأوراق وتهاجم العرائيص وتتغذى على الحبوب في الطور اللبني وتهاجم أجزاء مختلفة من النبات ما عدا الجذور وعند ظهورها بأعداد كبيرة فأنها تسبب أضراراً إقتصادية للذرة (3). على الرغم من إجماع الباحثين على أن المبيدات الكيميائية لعبت دوراً أساسياً وحيوياً للإنسان في زيادة إنتاج الغذاء إلا أنهم شددوا على ضرورة عدم اللجوء إليها إلا بعد أستنفاد كافة الطرق الوقائية الأخرى، إذ إن لهذه المركبات القدرة على تلويث المحيط البيئي وتغير الصفات النوعية لأجزاء المحيط الحيوي (4). من هذا المنطلق أصبح من الضروري التفكير في وسائل وطرائق بديلة مثل إستعمال المواد سريعة التحلل والمكافحة الحياتية وتصنيع الكيمياويات الهرمونية التي لايتعدى دورها الإخلال بالعمليات الفسلجية والكيمياوية الحياتية (5). لهذا تم التوجه نحو إستعمال عوامل طبيعية ذات أصل نباتي لمقاومة الحشرات إذ أثبتت الدراسات العلمية الفاعلية للعديد من النباتات فقد أشار (6) هناك الكثير من الأنواع النباتية ذات تأثير سمي وطارد ومثبط للنمو وأحداث العقم في الحشرات. أما في العراق أستعملت مستخلصات بعض النباتات في السيطرة على بعض الآفات الحشرية (7) (8) (9). ومن هذه النباتات نبات قرن الغزال *Ibicella lutea* إذ يؤثر على العديد من الحيوانات الفقرية وغير الفقرية إذ تسبب في السيطرة على مختلف أدوار حشرة البعوض *Culex pipiens* (10). وهناك العديد من المستخلصات أستعملت في التأثير على بعض الجراثيم *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Bacillus subtilis* and *Staphylococcus aureus* وأظهرت فعالية عالية (11).

لذا أجرى هذا البحث الذي يهدف الى أستعمال مواد من أصل نباتي بسبب أحتواء البيئة العراقية على نباتات متنوعة وحاوية على مركبات ذات أهمية طبية وبذلك نقلل من أستعمال المواد الكيميائية وتقليل التكاليف في السيطرة على الحشرة ومن هذه النباتات نبات قرن الغزال بأستخلاص بعض المواد الفعالة فيه.

المواد وطرائق العمل

جُمعت يرقات حشرة دودة الحشد الكاذبة *L. loreyi* من مخازن شركة ما بين النهرين لتفريط البذور وتجفيفها في محافظة بابل/ مشروع المسيب في شهر أيلول لعام 2015 وضعت في علب بلاستيكية سعة 500 مل حاوية على جريش الذرة وبواقع 250 غم وغطت فوهتها بقطعة قماش ململ ورُبيت اليرقات في حاضنة بدرجة حرارة 27 ± 2 م ورطوبة نسبية $65 \pm 5\%$ وصولاً الى مرحلة العذارى علماً إن هذه الطريقة الأولى في تربية الحشرة داخل المختبر في هذه الدراسة، جمعت العذارى ووضعت في علب بلاستيكية لحين بزوغ البالغات وتزاوجها وكثرت الحشرات قبل إجراء التجارب عليها وتم تشخيصها في متحف التاريخ الطبيعي/ جامعة بغداد من قبل أ.د. محمد صالح عبد الرسول أستاذ علم تصنيف الحشرات و أ.م.د. رزاق شعلان عكل على انها *Leucania loreyi*.

جمعت عينات نبات قرن الغزال *I. lutea* في شهر أيلول 2015 من منطقة الأسكندرية في محافظة بابل ثم نقلت الى المختبر ونظفت من الشوائب وغسلت ونشرت على ورق ترشيح مع مراعاة التهوية الجيدة وتركت حتى تجف في ظروف المختبر مع مراعاة التقليل المستمر منعاً للإصابة بالفطريات ولحين الجفاف التام (12). طحنت الأوراق بواسطة مطحنة كهربائية نوع توشيبا للحصول على مسحوق ناعم وحفظ المسحوق النباتي في أكياس نابلون ثم حفظت في الثلاجة لحين إستعمالها في عملية الاستخلاص.

حضرت مستخلصات المركبات التربينية الخام لنبات قرن الغزال بحسب طريقة (13) وذلك بوزن 10 غم من مسحوق أوراق النبات الجاف ووضعت في كشتبان الإستخلاص في جهاز السكسوليت Soxholet apparatus وأضيف 200 مل من الكلوروفورم بدرجة حرارة 45 م ولمدة 24 ساعة، رُكزت العينة المستخلصة بواسطة المبخر الدوار Rotary evaporator، جففت العينة الحاوية على المركبات التربينية الخام للنبات بإستعمال الفرن الكهربائي وبدرجة حرارة 45 م وحفظت المادة الجافة في عبوات زجاجية محكمة الغلق بعد تسجيل وزنها وهي فارغة ثم حفظت في الثلاجة لحين الاستعمال. لغرض تقدير الفعالية الحيوية لمستخلص المركبات التربينية الخام لنبات قرن الغزال، إذيب 2 غم للمستخلص التربينى الجاف من مزيج 1.5 مل من الكلوروفورم مع 1.5 مل من الكحول الأيثلي وأكمل الحجم الى 100 مل بإضافة الماء المقطر وأصبح تركيز المحلول الاساسي Stock solution 2% أو ما يعادل 20 ملغم/ مل وحضرت منه التراكيز (0.5 , 1.0 , 1.5 , 2.0) ملغم/ مل أما معاملة السيطرة فكانت 1.5 مل من الكلوروفورم مع 1.5 مل من الكحول الأيثلي وأكمل الحجم الى 100 مل بإضافة الماء المقطر. حضرت مستخلصات المركبات القلوانية الخام إذ أُتبعَت طريقة (14) والمحورة عن (15) في تحضير مستخلص المركبات القلوانية الخام لأوراق نبات قرن الغزال، بوزن 20 غم من مسحوق المادة الجافة وأستخلصت بـ 200 مل من الكحول الأيثلي ولمدة 24 ساعة في جهاز السكسوليت وبدرجة حرارة 45 م و رُكزت المادة المستخلصة بالمبخر الدوار، أذيت المادة المستخلصة بـ 5 مل كحول أيثلي وأضيف الى المستخلص الكحولي 30 مل من حامض الكبريتيك

بتركيز 2%, أجرى اختبار ماير Mayer لهذا المحلول للتأكد من وجود المركبات القلوانية, إذ أعطى الاختبار رسباً أبيضاً عكر عند إضافة كمية من الكاشف الى المستخلص, ثم أضيف لهذا المحلول كمية من هيدروكسيد الأمونيوم بتركيز 10% الى ان أصبح الأس الهيدروجيني $pH=9$, نُقل المحلول القاعدي الى قمع الفصل وأضيف اليه 10 مل من الكلوروفورم ورُج عدة مرات وترك المزيج ليستقر لينفصل الى طبقتين, أُخذت الطبقة السفلى (الطبقة الحاوية على المركبات القلوانية الذائبة بالكلوروفورم) وأهملت الطبقة العليا وكررت الخطوة الأخيرة ثلاث مرات وأخذت الطبقة السفلى في كل مرة بحيث أصبح المحلول المتجمع 40 مل تقريباً, ثم جُففت العينة بالفرن الكهربائي على درجة حرارة 45 م, كررت عملية الاستخلاص لعدة مرات لغرض الحصول على كميات كافية من المركبات القلوانية, حفظت المادة الجافة لحين الاستعمال, لغرض تقدير الفعالية الحيوية لمستخلص المركبات القلوانية الخام أخذ 2 غم من المستخلص القلواني الخام الجاف وأذيب في 3 مل كحول أثيلي تركيزه 96% وأكمل الحجم الى 100 مل بالماء المقطر للحصول على المحلول الاساس تركيزه 2% أو ما يعادل 20 ملغم/مل وحُضرت منه التراكيز (0.5, 1.0, 1.5, 2.0) ملغم/مل, أما معاملة السيطرة فكانت 3 مل كحول أثيلي وأكمل الحجم الى 100 مل بالماء المقطر.

تأثير مستخلصات المركبات التربينية والقلوانية الخام لأوراق نبات قرن الغزال في الهلاك اللاتراكمي لحشرة دودة الحشد الكاذبة التأثير في هلاك البيض

بعد الحصول على البيض الناتج من تزاوج البالغات أخذت 20 بيضة/مكرر بعمر لا يتجاوز 24 ساعة ووضعت في طبق بتري حاوٍ على ورق ترشيع وبواقع ثلاث مكررات ولكل تركيز, تم معاملة البيض بالتراكيز (0.5, 1.0, 1.5, 2.0) ملغم/مل ولكل مستخلص على حدة بطريقة رش المستخلص على البيض مباشرة بمرشة يدوية, أما معاملة السيطرة فكانت بإستعمال الماء المقطر مع المذيب المستعمل في الاستخلاص, نقلت الأطباق الحاوية على البيض المعامل وأطباق السيطرة في حاضنة درجة حرارتها 27 ± 2 م ورطوبة نسبية 5 ± 65 % (16). سُجلت نسبة هلاك البيض بعد مرور 24 ساعة من المعاملة عدلت نسبة الهلاك على وفق معادلة (17) Abbott.

التأثير في هلاك بعض الاطوار اليرقية

بعد فقس البيض مباشرة وخروج اليرقات بطورها اليرقي الأول أخذت عشر يرقات من الطور اليرقي الأول/مكرر بعمر 24 ساعة وبواقع ثلاث مكررات لكل تركيز ولكل مستخلص ثم وُضعت في أطباق بتري حاوية على 10 غم من الذرة غُوملت الأطباق بالتراكيز السابقة إذ أضيف 5 مل من كل تركيز ولكل مستخلص على حدة الى الوسط الغذائي. أما معاملات السيطرة فقد أضيف الى الوسط الماء المقطر مع المذيب المستعمل في الاستخلاص, وُضعت أطباق المعاملة والسيطرة في الحاضنة بالظروف نفسها السابقة وسُجلت نسبة الهلاك في الطور اليرقي الاول بعد 24 ساعة من المعاملة, تم تعديل نسبة الهلاك على وفق معادلة Abbott (17) كررت العملية السابقة الذكر للطور اليرقي السادس وبالعديد من المكررات والظروف نفسها.

التأثير في هلاك الدور العذري

بعد الحصول على العذارى الناتجة من اليرقات نُقلت عشر عذارى حديثة الظهور لكل مكرر وبواقع ثلاث مكررات لكل تركيز ولكل مستخلص كل على حدة ووضعت في أطباق بتري حاوية على أوراق ترشيح ثم عُمِلت العذارى بالتراكيز السابقة، برش المستخلص بواسطة مرشة يدوية، أما معاملة السيطرة فقد عوملت بالماء المقطر مع المذيب المستعمل في عملية الاستخلاص، نُقلت جميع الأطباق الى الحاضنة بالظروف السابقة نفسها المذكورة في فقرة الأطوار البرقية وسُجلت نسبة الهلاك بعد بزوغ آخر عذراء من معاملات السيطرة وعدلت نسبة الهلاك على وفق معادلة (17) Abbott .

التأثير في هلاك الحشرات البالغة

بعد خروج الكاملات من العذارى أخذت خمسة أزواج من حشرة الحشد الكاذبة (ذكر وأنثى) ووضعت في علب بلاستيكية وعُمِلت بتراكيز المستخلصات السابقة النباتية كلاً على حدة وبواقع ثلاث مكررات لكل تركيز أما معاملة السيطرة فكانت خمسة أزواج من الحشرات غير المعاملة بالمستخلص.

تأثير مستخلص المركبات التربينية و القلوانية الخام لأوراق نبات قرن الغزال في الهلاك التراكمي لحشرة دودة الحشد الكاذبة

لدراسة تأثير مستخلص المركبات التربينية و القلوانية الخام لأوراق نبات قرن الغزال في الهلاك التراكمي للأدوار غير البالغة لحشرة دودة الحشد الكاذبة إذ أُخذت عشر بيضات وبواقع ثلاث مكررات لكل تركيز للمستخلصات المذكورة سابقاً وجرى متابعتها لحين الوصول الى مرحلة البالغة، وتم حساب النسبة المئوية للهلاك للأدوار غير البالغة وأزيلت الحشرات الميتة يومياً من المعاملات إذ عُرِلت البالغات الناتجة من مكررات كل تركيز ولكل مستخلص كل على حدة في قناني زجاجية سعة 500 مل، غطت فوهتها بقماس ململ وربطت برباط مطاطي ووضع أسفلها قطن مشبع بمحلول سكري بتركيز 10% للتغذية مع وضع أشرطة متدلّية وسط القنينة لغرض وضع البيض.

التحليل الاحصائي

حُلّت نتائج الدراسة على وفق نموذج التجارب العاملية وبتصميم تام التعشبية Factorial experiments with complete randomized design وصُححت النسب المئوية للهلاكات على وفق معادلة (17) Abbott .

$$\frac{\% \text{ للهلاك في المعاملة} - \% \text{ للهلاك في معاملة السيطرة}}{100 \times \frac{\% \text{ للهلاك في المعاملة} - \% \text{ للهلاك في معاملة السيطرة}}{100}} = \text{النسبة المئوية للهلاك المصححة}$$

حوّلت النسب المئوية للهلاك المصححة الى قيم زاوية لإدخالها في التحليل الاحصائي و أُستعمل اختبار اقل فرق معنوي (L.S.D.) تحت مستوى معنوية (0.05) في برنامج Gen stat 2012 لبيان معنوية النتائج.

النتائج والمناقشة

تأثير مستخلصات المركبات التربينية والقلوانية الخام لأوراق نبات قرن الغزال في الهلاك اللاتراكمي لحشرة دودة الحشد الكاذبة
التأثير في النسبة المئوية لهلاك البيض

أوضحت نتائج جدول (1) تأثير عامل تراكيز المستخلص في هلاك بيض حشرة دودة الحشد الكاذبة إذ ارتفعت نسبة هلاك البيض الى 50% في تركيز 2.0 ملغم/ مل لمستخلص المركبات التربينية كذلك إختلف تأثير عامل نوع المستخلص في هلاك بيض دودة الحشد الكاذبة إذ بلغت معدلات نسب الهلاك المئوية في مستخلص المركبات التربينية و القلوانية عند التركيز 2.0 ملغم/ مل 50% و 46.7% على التوالي كما يتضح من الجدول، إن مستخلص المركبات التربينية كانت أكثر تأثيراً من مستخلص المركبات القلوانية في هلاك بيض الحشرة، بينت النتائج أيضاً وللتراكيز كافة تأثير التداخل لتراكيز مستخلص المركبات التربينية والقلوانية لأوراق نبات قرن الغزال في معدل النسبة المئوية لهلاك بيض الحشرة إذ تراوحت (16.7-50%) للتركيز 0.5 و 2.0 ملغم/ مل على التوالي لمستخلص المركبات التربينية و (13.3-46.7%) للتركيز 0.5 و 2.0 ملغم/ مل على التوالي لمستخلص المركبات القلوانية وأظهرت نتائج التحليل الأحصائي تحت مستوى 0.05 وجود فروقات معنوية بين المعاملات والتراكيز المستعملة إذ تفوقت المعاملة بالتركيز 2.0 ملغم/ مل لمستخلص المركبات التربينية على جميع المعاملات إذ بلغت 50% في حين بلغت 13.3% لمستخلص المركبات القلوانية عند التركيز 0.5% وقد يكون السبب في هلاك البيض هو دخول هذه المركبات الى داخل البيضة مما يؤدي الى قتل الجنين.

جدول (1): تأثير تراكيز مستخلص المركبات التربينية و القلوانية الخام لأوراق نبات قرن الغزال في معدل النسبة المئوية لهلاك بيض حشرة دودة الحشد الكاذبة *L. loreyi*

معدل النسبة المئوية لهلاك البيض		تركيز المستخلص ملغم/ مل	
المركبات القلوانية	المركبات التربينية		
13.3	16.7	0.5	
20.0	33.3	1.0	
33.3	43.3	1.5	
46.7	50.0	2.0	
التداخل	المستخلص	التركيز	L. S. D
1.619	0.810	1.145	

في دراسة أجرتها (10) على بيض بعوضة *C. pipiens* وجدت علاقة طردية ما بين نسبة الهلاك والتراكيز المستعملة إذ تراوحت نسبة الهلاك في المستخلص المائي لأوراق نبات قرن الغزال بين 8.8-29.2% أما في المستخلص الماء المغلي فقد تراوحت بين 8.8-26.8% في التركيز 0-25 ملغم/ مل على التوالي. تتفق النتائج مع ما اكده (18) إن المستخلصات التربينية الخام لأوراق نبات الياسمين الزفر *Heliothis armigera* أعطى نسبة هلاك لبيض حشرة دودة ثمار الطماطة *Clerodendrum inerme* 80% في التركيز 20 ملغم/ مل. وقد ذكر (19) إن معاملة السطح الخارجي للبيض ببعض المواد المشابهة لهرمون الشباب الحشري يعمل على إيقاف النمو الجنيني.

التأثير في النسبة المئوية لهلاك بعض الأطوار اليرقية للحشرة

بينت نتائج جدول (2) تأثير عامل تراكيز المستخلصات التربينية والقلوانية في هلاك يرقات حشرة دودة الحشد الكاذبة إذ ارتفعت النسبة المئوية لهلاك اليرقات الى 90.3% و 90% في التركيز 2.0 ملغم/ مل بالنسبة للطور الأول ولكلا المستخلصين إختلف تأثير عامل نوع المستخلص في هلاك يرقات دودة الحشد الكاذبة إذ بلغت معدلات نسب الهلاك المئوية في مستخلص المركبات التربينية و القلوانية عند التركيز 2.0 ملغم/ مل للطورين الأول والسادس 90.3% و 73.3% و 90% و 56.7% على التوالي كما يتضح من الجدول، إن مستخلص المركبات التربينية كانت أكثر تأثيراً من مستخلص المركبات القلوانية في هلاك يرقات الحشرة، بينت النتائج أيضاً تأثير التداخل لتراكيز مستخلص المركبات التربينية والقلوانية لأوراق نبات قرن الغزال في معدل النسبة المئوية لهلاك يرقات الحشرة إذ تراوحت من (63.3-90.3%) و (23.3-73.3%) للتركيز 0.5 و 2.0 ملغم/ مل على التوالي لمستخلص المركبات التربينية ولكلا الطورين وبلغت (46.7-90%) و (20-56.7%) للتركيز 0.5 و 2.0 ملغم/ مل على التوالي لمستخلص المركبات القلوانية ولكلا الطورين وأظهرت نتائج التحليل الأحصائي تحت مستوى 0.05 وجود فروقات معنوية بين المعاملات والتراكيز المستعملة.

جدول (2): تأثير تراكيز مستخلص المركبات التربينية و القلوانية الخام لأوراق نبات قرن الغزال في معدل النسبة المئوية لهلاك بعض الأطوار اليرقية لحشرة دودة الحشد الكاذبة *L. loreyi*

النسبة المئوية لهلاك بعض الأطوار اليرقية				تركيز المستخلص ملغم/ مل
المركبات القلوانية		المركبات التربينية		
الطور الأول	الطور السادس	الطور الأول	الطور السادس	
20.0	46.7	23.3	63.3	0.5
23.3	60.7	40.0	70.0	1.0
40.0	76.7	56.7	83.3	1.5
56.7	90.0	73.3	90.3	2.0
	التداخل	المستخلص	التركيز	L. S. D
	2.178	1.089	1.540	

إذ تفوقت المعاملة بالتركيز 2.0 ملغم/ مل لمستخلص المركبات التربينية على جميع المعاملات إذ بلغت 90.3% للطور الأول و 73.3% للطور السادس في حين بلغت 46.7% للطور الأول و 20% للطور السادس لمستخلص المركبات القلوانية عند التركيز 0.5%. أكدت (10) إن تأثير مستخلص الماء البارد لأوراق نبات قرن الغزال أكبر من تأثير مستخلص الماء المغلي إذ بلغت نسبة الهلاكات للأطوار الأول والثاني والثالث والرابع لبعوضة *C. pipiens* في مستخلص الماء البارد في التركيز 25 ملغم/ مل (90 و 86.3 و 78.9%) على التوالي بينما بلغت النسبة المئوية للهلاكات في مستخلص الماء المغلي في التركيز ذاته 90 و 74.4 و 57.4 و 51% على التوالي. وجد (10) إن هلاكات يرقات بعوض *C. pipiens* في تركيز 0.5 ملغم/ مل من المركبات التربينية (60.4 و 51 و 48.7 و 41.3%) للأطوار اليرقية الأول والثاني والثالث والرابع على التوالي. كما وجد (18) إن المستخلصات التربينية الخام لأوراق نبات الياسمين الزفر *C. inermis* أعطى نسبة هلاك ليرقات الطور الأول لحشرة دودة ثمار الطماطة *H. armigera* 73.33% في التركيز 20 ملغم/ مل. يتضح من النتائج إن يرقات الطور الأول كانت أكثر حساسية مقارنة مع يرقات الطور السادس ويعزى السبب في ذلك كونها حديثة الفقس وأجسامها نفاذة جداً للسوائل وعدم امتلاكها أي مقاومة أو مناعة ضد المستخلصات، إذ ذكر (5) إن لبعض المركبات النباتية دوراً في قتل الخلايا الطلائية المبطنة للقناة الهضمية الوسطى للحشرة المتغذية على النبات وهذه الخلايا مسؤولة عن إفراز الأنزيمات الهاضمة التي تزيل فعل تلك المركبات الغريبة وبالتالي تؤدي إلى موت الحشرة.

التأثير في النسبة المئوية لهلاك عذارى الحشرة

أوضح جدول (3) تأثير عامل تراكيز المستخلص في هلاك النسبة المئوية لعذارى حشرة دودة الحشد الكاذبة إذ ارتفعت نسبة هلاك العذارى إلى 80% في التركيز 2.0 ملغم/ مل، اختلف تأثير عامل نوع المستخلص في هلاك عذارى دودة الحشد الكاذبة إذ بلغت معدلات نسب الهلاك المئوية في مستخلص

المركبات التربينية والقلوانية عند التركيز 2.0 ملغم/ مل 80.0% و 43.3% على التوالي كما يتضح من الجدول، إن مستخلص المركبات التربينية كانت أكثر تأثيراً من مستخلص المركبات القلوانية في هلاك عذارى الحشرة، بينت النتائج أيضاً وللتراكيز كافة تأثير التداخل لتراكيز مستخلص المركبات التربينية و القلوانية لأوراق نبات قرن الغزال في معدل نسبة هلاك عذارى الحشرة إذ تراوحت (16.7-80%) للتراكيز 0.5 و 2.0 ملغم/ مل على التوالي لمستخلص المركبات التربينية و (6.7-43.3%) للتراكيز 0.5 و 2.0 ملغم/ مل على التوالي لمستخلص المركبات القلوانية.

جدول (3): تأثير تراكيز مستخلص المركبات التربينية و القلوانية الخام لأوراق نبات قرن الغزال في معدل النسبة المئوية لهلاك عذارى حشرة دودة الحشد الكاذبة *L. lorey*

تركيز المستخلص ملغم/ مل		النسبة المئوية لهلاك العذارى	
		المركبات التربينية	المركبات القلوانية
0.5		16.7	6.7
1.0		33.3	20.7
1.5		50.0	30.0
2.0		80.0	43.3
L. S. D	التركيز	المستخلص	التداخل
	0.999	0.707	1.413

وأظهرت نتائج التحليل الأحصائي تحت مستوى 0.05 وجود فروقات معنوية بين المعاملات والتراكيز المستعملة إذ تفوقت المعاملة بالتركيز 2.0 ملغم/ مل لمستخلص المركبات التربينية على جميع المعاملات إذ بلغت 80% في حين بلغت 43.3% لمستخلص المركبات القلوانية عند التركيز نفسه. وجدت الشكري (2000) إن نسبة هلاك عذارى بعوضة *C. pipiens* كانت عالية نتيجة لمعاملتها بالمستخلصين المائيين البارد والمغلي فبلغت 90 و 88.5% على التوالي في التركيز 25 ملغم/ مل وأوضح (20) في دراسة أجريت لمعرفة تأثير خمسة نباتات تعود لعائلة Myrtaceae في دودة الجريش الصفراء *Tenbrio moletor* إن المستخلصات النباتية أدت إلى حدوث تشوهات لكاملات الحشرة الخارجة من العذارى المعاملة بتركيز 500 مايكروغرام/ عذراء في حين وجد (21) إن مستخلص الماء الحار لأوراق نبات قرن الغزال كان الأفضل بالمقارنة مع مستخلص الماء البارد وفي نسب الهلاك لأطوار حشرة حفار ساق الذرة المختلفة *Cesamia cretica* إذ بلغت نسب موت العذارى 30.4% عند التركيز 100 ملغم/ مل للماء الحار مقارنة بـ 16.1% لمستخلص الماء البارد وعند التركيز نفسه.

أنفقت نتائج البحث مع ما ذكره (18) إن المستخلصات التربينية لأوراق نبات الياسمين الزفر *C. inerme* أعطى نسبة هلاك لعذارى حشرة دودة ثمار الطماطة *H. armigera* الناتجة من يرقات الطور الأول المغذاة لمدة يوم واحد 15.5% عند التركيز 20 ملغم/ مل مقارنة مع معاملة السيطرة 6.6% أما

بالنسبة للمغذاة ثلاثة أيام فقد بلغت أعلى نسبة مئوية لهلاك العذارى 17.7% مقارنة مع معاملة السيطرة التي بلغت 6.6%.

التأثير في النسبة المئوية لهلاك بالغات الحشرة

أظهرت نتائج جدول (4) تأثير عامل تراكيز المستخلص في هلاك بالغات حشرة دودة الحشد الكاذبة إذ ارتفعت النسبة المئوية لهلاك البالغات إلى 63.3% في التركيز 2.0 ملغم/مل. اختلف تأثير عامل نوع المستخلص في هلاك بالغات دودة الحشد الكاذبة إذ بلغت معدلات النسب المئوية للهلاك في مستخلص المركبات التربينية والقلوانية عند التركيز 2.0 ملغم/مل 63.3% و 40% على التوالي، كما يتضح من الجدول، إن مستخلص المركبات التربينية كانت أكثر تأثيراً من مستخلص المركبات القلوانية في هلاك بالغات الحشرة بينت النتائج أيضاً وللتراكيز كافة تأثير التداخل لتراكيز مستخلص المركبات التربينية والقلوانية لأوراق نبات قرن الغزال في معدل النسبة المئوية لهلاك بالغات الحشرة إذ بلغت (10 - 63.3%) للتراكيز 0.5 و 2.0 ملغم/مل على التوالي لمستخلص المركبات التربينية و (0 - 40%) للتركيز 0.5 و 2.0 ملغم/مل على التوالي لمستخلص المركبات القلوانية وأظهرت نتائج التحليل الأحصائي تحت مستوى معنوية 0.05 وجود فروقات معنوية بين المعاملات والتراكيز المستعملة.


جدول (4): تأثير تراكيز مستخلص المركبات التربينية و القلوانية الخام لأوراق نبات قرن الغزال في معدل النسبة المئوية لهلاك بالغات حشرة دودة الحشد الكاذبة *L. loreyi*

تركيز المستخلص ملغم/مل		النسبة المئوية لهلاك بالغات الحشرة	
		المركبات التربينية	المركبات القلوانية
0.5		10.0	0.0
1.0		30.0	3.3
1.5		46.7	30.0
2.0		63.3	40.0
L. S. D.	التركيز	المستخلص	التداخل
	1.145	0.810	1.619

إذ تفوقت المعاملة بالتركيز 2.0 ملغم/مل لمستخلص المركبات التربينية على جميع المعاملات إذ بلغت 63.3% في حين بلغت 40% لمستخلص المركبات القلوانية عند التركيز نفسه. وجد (21) إن مستخلص الماء الحار لأوراق نبات قرن الغزال كان الأفضل بالمقارنة مع مستخلص الماء البارد وفي نسب الهلاك للأطوار المختلفة لحشرة حفار ساق الذرة *C. cretica* إذ بلغت نسب موت البالغات 47.8% عند التركيز 100 ملغم/مل للماء الحار مقارنة بـ 33.1% لمستخلص الماء البارد وعند التركيز نفسه. وهذه النتائج تتفق مع ما وجدته (18) إن المستخلصات التربينية الخام لأوراق نبات الياسمين الزفر *C. inerme* أعطى نسبة هلاك لبالغات حشرة دودة ثمار الطماطة *H. armigera* 80% في التركيز 20 ملغم/مل.

تأثير مستخلص المركبات التربينية الخام لأوراق نبات قرن الغزال في الهلاك التراكمي لحشرة دودة الحشد الكاذبة

أوضحت النتائج في (الشكل 1) الى تأثير تراكيز مستخلص المركبات التربينية الخام لأوراق نبات قرن الغزال في الهلاك التراكمي لحشرة دودة الحشد الكاذبة إذ وجد إن هنالك علاقة طردية بين نسب الهلاك المئوية للحشرة ومدة تعرضها للمستخلص النباتي, إذ بلغت نسبة الهلاك التراكمي 100% للطور اليرقي الخامس في التركيز 2.0 ملغم/ مل وبينت نتائج التحليل الأحصائي وجود فروق معنوية مقارنة مع معاملة السيطرة, إذ تتراكم المركبات الفعالة الموجودة في المستخلص التربيني في أنسجة القناة الهضمية للحشرة مؤدية الى تسممها ومن ثم موتها (22) وهذا يتفق مع ما وجدته (10) إن الهلاك التراكمي للأدوار غير البالغة لبعوض *C. pipenes* تراوحت بين (38-100%) في التركيز 0.25 و 1.5 ملغم/ مل على التوالي من مستخلص المركبات التربينية لأوراق نبات قرن الغزال.




شكل (1): تأثير تراكيز مستخلص المركبات التربينية الخام لأوراق نبات قرن الغزال I. *lutea* في الهلاك التراكمي لحشرة دودة الحشد الكاذبة *L. loreyi*

تأثير مستخلص المركبات القلوانية الخام لأوراق نبات قرن الغزال في الهلاك التراكمي لحشرة دودة الحشد الكاذبة

أظهرت نتائج الدراسة الحالية (الشكل 2) تأثير تراكيز مستخلص المركبات القلوانية الخام لأوراق نبات قرن الغزال في الهلاك التراكمي لحشرة دودة الحشد الكاذبة إذ بلغت نسبة الهلاك 100% للعدارى في التركيز 2.0 ملغم/ مل مقارنة مع معاملة السيطرة التي بلغت صفر وبينت نتائج التحليل الأحصائي وجود

فروق معنوية في تأثير التراكيز المختلفة في نسب الهلاك. وجد (8) أن نسبة الهلاك التراكمية لحشرة الذبابة البيضاء *Bemisia tabaci* قد بلغت 86.6% نسبة لمعاملتها بمستخلص الماء الحار لنبات قرن الغزال وأوضحت (10) أن مستخلص المركبات القلوانية الخام لأوراق نبات قرن الغزال أدت إلى هلاك تراكمي للأدوار غير البالغة لبعوضة *C. pipenes* بلغت نسبتها 100% في التراكيز المستعملة كافة.



شكل (2): تأثير تراكيز مستخلص المركبات القلوانية الخام لأوراق نبات قرن الغزال *I. lutea* في الهلاك التراكمي لحشرة دودة الحشد الكاذبة *L. loreyi*

المصادر

1. الأسودي، محمد حميد ياسين (2002). التهجين التبادلي وتقدير المعالم الوراثية والارتباطات الوراثية والمظهرية بين الصفات لسلالات نقية من الذرة الصفراء. أطروحة دكتوراه، كلية الزراعة، جامعة بغداد: 157 صفحة.
2. العراقي، رياض احمد و رمضان، نديم احمد (2010). المرشد التطبيقي في مكافحة الآفات الزراعية. دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع: 758 صفحة.
3. جرجيس، سالم جميل؛ عبيس، حمزة كاظم و محمد، محمد عبد الكريم (2000). حشرات المحاصيل الحقلية. كلية الزراعة، جامعة بغداد: 44 صفحة.
4. العادل، خالد محمود و عبد، مولود كامل (1979). المبيدات الكيماوية في وقاية النبات. مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل: 217 صفحة.

5. **Bowers, W. S. (1984).** Insect Plant Interaction Endocrine Defenses, Pitman Books, London., 119-137 pp.
6. **Grainge, M. S.; Ahmed, W. C. and Mitchell, J. W. (1986).** Plant species Reportedly possessing pestcontrol properties Anecw/ uh Database. Honolulu: 128 pp.
7. **الجوراني, رضا صكب (1991).** تأثير مستخلصات الأس *Myrtus communis* لحشرتي الخابرا ودودة الشمع الكبرى. أطروحة دكتوراه, كلية الزراعة, جامعة بغداد: 111 صفحة.
8. **المنصور, ناصر عبد علي (1995).** تأثير مستخلصات مختلفة من نبات قرن الغزال في الأداء الحياتي للذبابة البيضاء *Bemisia tabaci*. أطروحة دكتوراه, كلية العلوم, جامعة البصرة: 121 صفحة.
9. **حسن, علاء جواد (1996).** تأثير مستخلصات مختلفة لأوراق نبات الدفلة *Nerium oleander* في الأداء الحياتي للذبابة المنزلية *Musca domestica*. رسالة ماجستير, كلية العلوم, جامعة بابل: 79 صفحة.
10. **الشكري, بیداء محسن (2000).** تأثير مستخلصات أوراق نبات قرن الغزال *Ibicella lutea* في بعض الجوانب الحياتية لبعوضة الكيولكس *Culex pipiens*. رسالة ماجستير, كلية العلوم, جامعة بابل: 85 صفحة
11. **Cerdeiras, M. P.; Fernandez, J.; Soubes, M.; Vero S.; Ferreira, F.; Moyna, P.; Olano, I. and Vazquez, A. (2000).** A new antibacterial compound from *Ibicella lutea*. Journal of Ethnopharmacology.,73: 521–525, available at: www.researchgate.net/publication/12236860 (accessed 31 May2016).
12. **السلامي, وجيه مظهر (1998).** تأثير مستخلصات نبات المديد *Convolvulus arvensis* والهندال *Ipomoea cairica* في الأداء الحياتي لحشرة من الحنطة *Schizaphis graminum* أطروحة دكتوراه, كلية العلوم, جامعة بابل: 111 صفحة.
13. **Harborne, J. B. (1984).** Phytochemical method. Chapman and Hall. New York 2nd Ed.288 pp.
14. **السامرائي, خلود وهيب (1983).** توزيع القلويدات وأهميتها التصنيفية في بعض الأنواع البرية من العائلة الباذنجانية Solanaceae في العراق. رسالة ماجستير, كلية العلوم, جامعة البصرة: 121 صفحة.
15. **Harborne, J. B. (1973).** Phytochemical method. Halsted Press. John Wiley and Sons New York. 278 pp.
16. **عبد الفتاح, نهاد مصطفى (1989).** تأثير درجات الحرارة الثابتة والمتبادلة والرطوبة النسبية في نمو وبقاء وتكاثر الذبابة المنزلية *Musca domestica*. رسالة ماجستير, كلية العلوم, جامعة بغداد: 85 صفحة.

17. **Abbott, W. S. (1925).** A method of computing the effectiveness of an insecticide. J. Econ. Entomol., 18: 65-67.
18. **المجدّي, عباس غانم حمزة (2007).** مكافحة دودة ثمار الطماطة *Heliothis armigera* (Lepidoptera: Noctuidae) Hubner) بمنظم النمو Match ومستخلصات نبات الياسمين الزفر *Clerodendrum inerme* (L.) Gaertn ودراسة تأثيرها في حياتية الحشرة. رسالة ماجستير, هيئة التعليم التقني, كلية التقنية/ المسيب: 87 صفحة. لحشرة حفار ساق الذرة *Sesamia cretica*. مجلة وقاية النبات, 2(2): 65-69.
19. **الدركزلي, ثابت عبد المنعم (1982).** علم فسلجة الحشرات. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي, دار الكتب للطباعة والنشر, جامعة الموصل: 297 صفحة.
20. **Jacobson, M. (1975)** Insecticides from plants. A review of the literature, 1952-1972 USDA Hand book: 461.
21. **التميمي, نهاد كاظم خلف؛ الربيعي, حسين فاضل و محمد, صبري فرج (2002).** تقويم فاعلية بعض المستخلصات المائية والكحولية لنبات قرن الغزال *Ibicella lutea* ضد الأطوار المختلفة
22. **Schluter, U.; Bidmon, H. J. and Grewe, S. (1985).** Azadirachtin affects growth and endocrine events in larvae of the tobacco hornworm, *Manduca sexta*. J. Insec. Physiol., 31: 773-777.