



مجلة المثنى للعلوم الزراعية
 muthjas.mu.edu.iq



Some genetic parameter for maize under different planting dates and environments

*Kamal Ahmed Kazem

Directorate of Agriculture Diyala Iraq

**Wajeelha Abed Hassan

Baghdad Univ. Col. of Agri. Eng. Sci.-Field Crop Dept.

Article Info.

Received
 2021 / 4 / 1
 Publication
 2021 / 6 / 7

Keywords

Locations Date
 of cultivation

Abstract

To evaluate the performance of introduced varieties of maize under different sowing dates and locations, in addition to local variety, a field experiment was carried out in two locations;. The study compared five varieties of maize introduced from America, with a local synthetic variety (Ibba 5018) and tested it in two locations at three sowing dates (1, 15 July and 1 August). The Randomized Complete Block Design RCBD was used with four replications, with split plot arrangements, the main plots included three sowing dates, the secondary plots included, the varieties. The traits of the days number to tassling and days to silking, plant height, ear height, number of leaves, leaves area, leaf area index, number of ears plant⁻¹, ear length, the number of rows ear⁻¹, number of grains row⁻¹, number of grains of the plant, weight of 100 grains, total dry matter weight, the number of days to Physiological maturity, crop growth rate, individual plant yield and yield (tons h⁻¹) were studied. The results showed that the values of the standard error (SE) in the two trial locations were low for the studied traits and within the acceptable limit except leaf area which was high in the first and second dates for the Baghdad location and for the three dates of the Diyala incident, as well as the values of the coefficient of variation (CV) were also low and within statistically acceptable limits and for all the traits studied in the three dates and for the two locations. Genetic variations were higher than the environmental variation for most of the studied traits and the phenotypic coefficient of variation is close to the coefficient of genetic variation for the two locations and the three sowing dates, and this indicates that the traits are genetically governed. The value of heritability in a broad sense was higher than 90% at Baghdad location for first of July for the traits leaves area and its index, weight of the dry matter, number of days to physiological maturity (96.6, 97.4, 93.4 and 94.4%, respectively) and for 15 July for the traits. Leaf area and its index, and number of days to physiological maturity (94.7, 94.7 and 93.4%), and for 1 Aug for 9 traits; number of days silking, the leaf area and leaf area index, number of ears dry matter, days to maturity, rate of crop growth and yield the plant and unit area ((95.7, 99.4, 99.4, 94, 98.4, 95.5, 98.6, 93.4, 93.5%) Sequentially. As for Diyala, the traits of leaf area, leaf area index, number of days to physiological maturity, yield of plants, and area unit in the three dates were superior to the highest heritability (92.3, 92.3, 98.7, 73.6, 73.6%), (90.2, 90.2, 98.8, 82.9, 82.9%), (90.9, 90.9, 86.4, 80.7, 80.7% respectively).

Corresponding author: E-mail(wajeelha@coagri.uobaghdad.edu.iq) All rights reserved Al- Muthanna University

The research is a part of thesis Ms. D of the first researcher.

دراسة بعض المعالم الوراثية لأصناف مدخلة من الذرة الصفراء تحت مواعيد زراعة وبيئات مختلفة

**وجيهة عبد حسن

**قسم المحاصيل الحقلية- كلية علوم الهندسة الزراعية- جامعة بغداد

كمال احمد كاظم *

*مديرية زراعة ديالى

المستخلص

الدراسة مقارنة خمسة اصناف مدخلة من امريكا بالمقارنة مع الصنف المحلي التركيبي اباء 5018 تحت تأثير الزراعة في موقعين وثلاث مواعيد زراعة (1 و 15 تموز و 1 آب). استخدم تصميم القطاعات العشوائية الكاملة RCBD بأربعة مكررات، بترتيب الألواح المنشقة، تضمنت الألواح الرئيسية، مواعيد الزراعة الثلاث، والألواح الثانوية، الأصناف المدخلة وصنف المقارنة، تمت دراسة صفات عدد ايام التزهير الذكري والانثوي وارتفاع النبات والعنوص وعدد الاوراق ومساحتها ودليل المساحة الورقية وعدد عرائص النبات وطول العرنوص وعدد صفوفه وحبوبة وعدد حبوب الصف ووزن 100 حبة ووزن المادة الجافة وعدد ايام النضج الفسلجي ومعدل نمو المحصول وحاصل النبات الفردي وحاصل وحدة المساحة، كانت قيم الخطأ القياسي (SE) في موقعي التجربة منخفضة للصفات المدروسة وضمن الحد المقبول وهي أقل من 20 باستثناء صفة المساحة الورقية التي كانت مرتفعة في الموعدين الاول والثاني لموقع بغداد وللمواعيد الثلاثة لموقع ديالى، وكذلك قيم معامل التباين (CV) كانت منخفضة وضمن الحدود المقبولة احصائياً ولجميع الصفات المدروسة في المواعيد الثلاث والموقعين، وكان التباين الوراثي اعلى من البيئي لمعظم الصفات المدروسة وان معامل التباين المظهري لها قريب من معامل التباين الوراثي للموقعين وللمواعيد الزراعية الثلاث، وهو ما يشير الى ان الصفات محكومة وراثياً وان تأثيرها بالبيئة قليل، وكانت قيمة التوريث بالمعنى الواسع اعلى من 90% في موقع بغداد عند الموعد الاول لصفات مساحة الاوراق ودليلها ووزن المادة الجافة وعدد ايام النضج الفسلجي (96.6 و 97.4 و 93.4 و 94.4% بالتتابع) وعند الموعد الثاني لصفات مساحة الاوراق ودليلها وعدد ايام النضج (94.7 و 94.7 و 93.4%)، وعند الموعد الاخير لـ 9 صفات هي عدد ايام التزهير الانثوي ومساحة الاوراق ودليلها وعدد العرائص ووزن المادة الجافة وعدد ايام النضج ومعدل نمو المحصول وحاصل النبات ووحدة المساحة (95.7 و 99.4 و 94 و 98.4 و 95.5 و 98.6 و 93.4 و 93.5%). اما في موقع ديالى ففوق صفات مساحة الاوراق ودليلها وعدد ايام النضج الفسلجي وحاصل النبات ووحدة المساحة في المواعيد الثلاثة بأعلى نسبة توريث (92.3 و 92.3 و 98.7 و 73.6 و 73.6%) و (90.2 و 90.2 و 98.8 و 82.9 و 82.9%) و (90.9 و 90.9 و 86.4 و 80.7 و 80.7%). نقترح زراعة الاصناف المدخلة في مواعيد زراعة ومواقع مختلفة اخرى لبيان مدى قدرتها على التكيف البيئي لمناخ العراق ودراستها في الموسم الربيعي، واختبارها تحت شتد الجفاف والكثافة النباتية.

البحث مستل من رسالة ماجستير للباحث الأول

الكلمات المفتاحية: مواعيد الزراعة، الأصناف الهجن، سلالات نباتية

المقدمة

من اجل نجاح أي برنامج تربية وتحسين يجب دراسة التغيرات الوراثية في المجتمع النباتي، اذ يمكن قياس التغيرات المظهرية في أي بيئة، ولكنها لا تمثل تأثير التغيرات الوراثية فقط بل تمثل تأثير التغيرات البيئية وعوامل النمو والتداخل بينهما وبين التغيرات الوراثية، فيكون المظهر الخارجي للنبات هو صورة للتأثير الوراثي والبيئي والتداخل بينهما (Hadi و Wuhaib, 2015). لذلك ومن دراسة التغيرات الوراثية يمكن تحديد النسب الوراثية للصفات، واهمها تقدير التباين الوراثي ونسبة التوريث بالمعنى الواسع، والتي هي عبارة عن درجة توارث الصفات الكمية من الاباء المنتجة الى الابناء الناتجة، لتوفير معلومات يمكن الاستدلال منها لتحسين أي محصول عند إدخاله في برامج الانتخاب، فضلاً عن ان التوريث في الصفات النوعية عالي لقلة عدد الجينات المسيطرة على الصفة وقلة تأثيرها بالظروف البيئية، بينما نسبة توريث الصفة الكمية منخفضة لكثرة عدد الجينات المسيطرة على الصفة وتأثيرها الكبير بالظروف البيئية، وتعد الذرة الصفراء من المحاصيل التي تمتلك تبايناً وراثياً كبيراً يرتبط بتباينها البيئي، مما يجعله محصولاً نموذجياً لدراسة المؤشرات الوراثية المهمة لمربي النبات.

بين Al-Khazaali وآخرون (2013) عند دراسة تغيرات المعالم الوراثية لصنف المقارنة بحوث 106 المحسن والاصلي تحت كثافات نباتية مختلفة، ان التغيرات الوراثية كانت اعلى بكثير من التغيرات البيئية لجميع الصفات المدروسة، وهذا ما جعل نسبة التوريث مرتفعة، وان حاصل المادة الجافة كان اعلى توريثاً وبلغ 99% و 80%، بينما التزهير الانثوي كانت الصفة اقل توريثاً اذ بلغت 79% و 81% للموسمين الخريفي والربيعي بالتتابع. وجد Dhannoon و Al-Jumaili (2014) عند دراسة المعالم الوراثية لبعض صفات الذرة الصفراء، ان قيم التباين البيئي

أقل من قيم التباين الوراثي لجميع الصفات، باستثناء الحاصل إذ كانت قيمة التباين البيئي أعلى من قيمة التباين الوراثي. بينت نتائج Hadi و Wuhaib (2015) ان اغلب الصفات محكومة وراثياً اذ انخفضت قيم كل من الخطأ القياسي ومعامل الاختلاف، وان قيم كل من GCV و PCV كانت متقاربة، وهذا يعني ان التباين الوراثي يشكل النسبة الاكبر من التباين المظهري، وبلغت اعلى نسبة توريث في الموسم الخريفي لكل من ارتفاع العرنوص وطول العرنوص وعدد حبوب النبات، وانخفضت قيم GCV الى نصف قيم PCV تقريباً، وهذا يعني ان تأثير التغيرات البيئية اكبر من التغيرات الوراثية لكل من صفتي عدد صفوف العرنوص وعدد العرائص، ولهذا كانت نسبة توريثها منخفضة.

توصل كل من Latheeth و Kazem (2016) إلى ان قيم كل من التباين الوراثي والبيئي اختلفت عن الصفر، وكان التوريث عالياً لأغلب الصفات اذ بلغ اعلا 99% للمساحة الورقية و 94% لارتفاع العرنوص و 93% لعدد ايام التزهير الانثوي وعدد حبوب الصف و 91% لكل من عدد ايام التزهير الذكري وارتفاع النبات، و 88% لكل من عدد صفوف العرنوص وحاصل حبوب النبات و 86% لعدد الاوراق و 75% لوزن 500 حبة، بينما ادنى نسبة توريث كانت 60% لعدد حبوب العرنوص.

لاحظ Harba وآخرون (2017) ان الزيادة البسيطة في معامل التباين المظهري عند مقارنته بمعامل التباين الوراثي يشير الى التأثير الطفيف للبيئة، هذا يعني ان معظم التباينات تعود الى الفعل الوراثي وهذا ما اكدته قيم التوريث بالمعنى الواسع العالية لأغلب الصفات المدروسة. لذلك كان هدف الدراسة، زراعة عدة أصناف مدخلة من الذرة الصفراء، واختبارها في موقعين وثلاثة مواعيد مختلفة، لتحديد أفضل الأصناف من حيث الإنتاج والتطبع للتغيرات البيئية، مع تحديد موعد الزراعة المناسب لكل صنف

في كل بيئة، بهدف زيادة الإنتاج في وحدة المساحة، كذلك دراسة

المواد وطرائق العمل

نفذت تجربة حقلية بموقعين الاول في حقول كلية علوم الهندسة الزراعية-جامعة بغداد في الجدرية والثاني في محافظة ديالى- قضاء المقدادية، ضمن الحقول الزراعية التابعة لمديرية زراعة المحافظة، للموسم الخريفي 2019 لتقييم خمسة أصناف من الذرة الصفراء مدخلة من امريكا، حصلنا عليها من الدكتور خالدة الطائي احضرتها من امريكا، وهي صنف 1 = 5401 DKC، صنف 2 = 5783DKC، صنف 3 = 6315 DKC، صنف 4 = 6590 DKC، صنف 5 = 6815 DKC، ومقارنتها مع صنف تركيبي محلي (5018) واختبارها تحت ثلاثة مواعيد زراعة هي 7/1 و 7/15 و 8/1، تم اخذ نماذج من التربة من عدة مواقع في كل من حقلي تجربة بغداد وديالى وخطت وتم تقدير بعض صفاتها في مختبر الدراسات العليا-كلية علوم الهندسة الزراعية -جامعة بغداد، وتم تهيئة الارض للزراعة ولموقعي التجربة من حراثة متعامدة وتنعيم وتسوية حسب التوصيات.

قسمت ارض التجربة للموقعين الى اربعة مكررات على وفق تصميم القطاعات العشوائية الكاملة RCBBD بترتيب الالواح المنشقة تضمنت الالواح الرئيسية مواعيد الزراعة الثلاث، والالواح الثانوية الاصناف الخمسة المدخلة وصنف المقارنة. وزعت عدد التراكيب الوراثية ومواعيد الزراعة على الوحدات التجريبية بواقع 72 وحدة تجريبية (3×4 × 6) وفصل كل مكرر عن الآخر بمسافة 1 متر، تمت الزراعة في الواح (3×3) على خطوط وبمسافة 70سم بين خط وآخر والمسافة بين نبات وآخر 20 سم، (بكثافة نباتية 71.43 الف نبات هـ⁻¹) وزرعت البذور بمعدل 2-3 بذرة في كل جورة، وخف عدد النباتات الى نبات واحد بعد وصوله الى ورقتين للنبات الواحد، تم التسميد بسماد سوبر فوسفات الثلاثي (46%P₂O₅) بمقدار 200 كغم هـ⁻¹ بدفعة واحدة قبل الزراعة، وسماد نايتروجيني 350 كغم هـ⁻¹ على شكل يوريا (46%N) على ثلاث دفعات الاولى بعد البزوغ بأسبوعين والثانية عند ارتفاع النبات 60 سم تقريباً والثالثة بعد التزهير. اجريت مكافحة وقائية لحشرة حفار ساق الذرة (Sesamiaacriteco) باستعمال مادة الديازينون المحبب تركيز 10% بمعدل 4 كغم هـ⁻¹ على دفعتين الاولى عند ارتفاع النبات 25 سم تقريباً والثانية بعد 15 يوماً من المكافحة الاولى، كما اجريت عملية التعشيب يدوياً وعدة مرات خلال الموسم وحسب الحاجة وكذلك اجريت عمليات ري الحقل حسب الحاجة، اخذت خمس نباتات وسطية لكل وحدة تجريبية تم اختيارها بصورة عشوائية مع استبعاد النباتات الطرفية. تم قياس صفات عدد الايام الى 50%تزهير ذكري وانثوي وارتفاع النبات وارتفاع العرنوص وعدد الاوراق ومساحة الاوراق ودليلها وعدد العرائيص وطول العرنوص وعدد صفوف العرنوص وعدد الحبوب في الصف وعدد حبوب العرنوص ووزن 100 حبة ووزن المادة الجافة

النتائج والمناقشة

بعض المعالم الوراثية للصفات المدروسة عند موعد الزراعة 1 تموز في موقع بغداد

المعالم الوراثية لجميع الأصناف عند كل موعد وكل بيئة.

الكلية وعدد ايام النضج الفسلجي ومعدل نمو المحصول وحاصل النبات الفردي وحاصل وحدة المساحة.

تم التحليل الاحصائي باستعمال برنامج الاكسل و Genestat لكل من الصفات المدروسة حسب تحليل التباين ANOVA بتصميم RCBBD بترتيب الالواح المنشقة اذ مثلت مواعيد الزراعة الالواح الرئيسية فيما مثلت الاصناف الستة الالواح الثانوية، واختبرت المعنوية باختبار F على مستوى معنوية 0.05 وقورنت المتوسطات الحسابية باستعمال LSD(اقل فرق معنوي) بمستوى معنوية 0.05 لجميع المتوسطات، حسب ما جاء به Steel و Torrie (1980). وبعد التأكد من معنوية الصفات تم اجراء التحليل الوراثي لتقدير بعض المعايير الاحصائية والمعالم الوراثية، حُسب معامل الاختلاف C.V. % لتقدير التجانس بين العينات وقُدر الخطأ القياسي SE لتقدير التجانس بين بيانات الصفات لكل من الصفات المدروسة. تم تقدير التباين الوراثي والبيئي والمظهري والتوريث بالمعنى الواسع لكل موقع وموعد زراعة باستعمال برنامج التحليل الوراثي SPAR2.0 بحسب ما جاء به Singh و chandary (1985).

التباينات الوراثية والبيئية والمظهرية

تم حسابها كما يأتي:

$$\sigma^2 G = \frac{MSG - MSE}{r}$$

$$\sigma^2 E = MSE$$

$$\sigma^2 P = \sigma^2 G + \sigma^2 E$$

إذ ان:

MSG: متوسط المربعات للتراكيب الوراثية

MSE: متوسط المربعات للخطأ التجريبي

r: عدد المكررات

$\sigma^2 G$ و $\sigma^2 E$ و $\sigma^2 P$ = التباينات الوراثية والبيئية والمظهرية بالتتابع .

كذلك قدر معامل الاختلاف الوراثي (GCV) ومعامل الاختلاف المظهري (PCV) كالآتي :

$$GCV\% = \frac{\sigma_g}{\bar{x}} \times 100$$

$$PCV\% = \frac{\sigma_p}{\bar{x}} \times 100$$

كذلك حسبت درجة التوريث بالمعنى الواسع $h^2_{b,s}$ على وفق المعادلة الآتية:

$$h^2_{b,s} = \sigma^2 g / \sigma^2 p \times 100$$

اذ ان δg و δp هما الانحراف الوراثي والمظهري بالتتابع

وان قيم التوريث ضمن الحدود المقترحة من قبل Al-athari (1982) هي أقل من 20% واطى و 20-50% متوسط وأكثر من 50% عالي.

تشير بيانات الجدول (1) لبعض المعالم الوراثية للصفات قيد الدراسة عند الموعد الاول (1 تموز) في موقع بغداد الى ان قيم الخطأ القياسي (SE) للصفات المدروسة كانت منخفضة وضمن الحدود المقبولة (اقل من 20)، باستثناء صفة

المساحة الورقية، اذ كانت قيمة الخطأ القياسي لها مرتفعة بلغت 27.84، ان قلة قيمة الخطأ القياسي للصفات المدروسة دليل على ان بيانات الصفات متماثلة وقريبة من المتوسط الحسابي. كذلك يبين جدول (1) ان قيم معامل التباين (CV) كانت منخفضة ايضا ولجميع الصفات المدروسة، وان قيمتها كانت اقل من عشرة، وهي ضمن الحدود المقبولة احصائياً، وهذا يدل على تجانس عينات الصفات المدروسة.

كذلك يوضح الجدول (1) ان قيم التباين الوراثي لأغلب الصفات المدروسة (13 صفة) كان اكبر من التباين البيئي، وهذا يعني ان التباين بين الاصناف المدروسة، كان اقل من سبب وراثي وان للبيئة تأثيراً قليلاً فيها، باستثناء صفات ارتفاع النبات وعدد الاوراق وطول العنوص وعدد حبوب الصف ووزن 100 حبة، كانت قيم تباينها البيئي اكبر من الوراثي، وهذا يعني ان النسبة المئوية لانخفاض التباين الوراثي عن البيئي لهذه الصفات بلغت 77.33% و 79.69% و 45.29% و 10.35% و 85.90% بالتتابع، وهذا يدل على ان مساهمة البيئة في اظهار تباين تلك الصفات كانت كبيراً، كما اظهرت هذه الصفات الخمس انخفاضاً في نسبة التباين الوراثي الى البيئي، اذ كان اقل من واحد، وبلغ 0.227 و 0.213 و 0.547 و 0.897 و 0.141 بالتتابع، لذلك في مثل هذه الصفات يكون الانتخاب صعباً بسبب عدم تمييز تباين الصفة، اذا كان ناتجاً عن البيئة او الوراثة.

بينما نسبة التباين الوراثي من المظهرية كانت كبيرة، في صفات عدد ايام التزهير الذكري والانثوي وارتفاع العنوص ومساحة الاوراق ودليلها وعدد صفوف العنوص وعدد حبوبه وعدد العرائص ووزن المادة الجافة وعدد ايام النضج الفسلجي ومعدل نمو المحصول وحاصل النبات الفردي ووحد المساحة، وان نسبة التباين الوراثي الى البيئي للصفات السابقة كانت عالية

واكثر من واحد، تراوحت بين 1.29 لصفة عدد ايام التزهير الذكري و 35.92 لصفة دليل مساحة الاوراق، وان هذه الصفات كانت قيم PCV (معامل الاختلاف المظهري) لها قريبة جداً من قيم GCV (معامل الاختلاف الوراثي) وان تباينها الوراثي أعلى من البيئي وهذا دليل على ان التباين المظهري كان اقل من التباين الوراثي، وان هذه الصفات تحكمها الوراثة (الجينات) في انتقالها من جيل لآخر وان هذه الصفات تتأثر بالبيئة بشكل قليل.

اما الصفات الخمس التي كان التباين الوراثي فيها اقل من التباين البيئي (ارتفاع النبات وعدد الاوراق وطول العنوص وعدد حبوب الصف ووزن 100 حبة)، فكان معامل الاختلاف المظهري فيها بعيداً عن معامل التباين الوراثي، وان هذه الصفات محكومة بالبيئة، وان نسبة التوريث بالمعنى الواسع لهذه الصفات كانت قليلة الى متوسطة حسب ما وصفه Al-athari (1982) وبلغت 18.49% و 17.57% و 35.36% و 47.27% و 12.36% للصفات الخمس بالتتابع.

اما صفات عدد ايام التزهير الذكري والانثوي وارتفاع العنوص ومساحة الاوراق ودليلها وعدد صفوف العنوص وعدد حبوبه وعدد العرائص ووزن المادة الجافة وعدد ايام النضج الفسلجي ومعدل نمو المحصول وحاصل النبات الفردي وحاصل وحدة المساحة، فكانت نسبة التوريث بالمعنى الواسع فيها عالية بلغت 56.45% و 88.81% و 62.92% و 96.57% و 97.38% و 64.24% و 79.31% و 70.61% و 93.42% و 94.42% و 88.04% و 72.25% و 72.25% بالتتابع، وذلك دليل على امكانية تحسين هذه الصفات بطريقة الانتخاب، بسبب تباينها الوراثي العالي، وهذا يؤكد نتائج Hadi و Wuhaib (2015) و Al-Rawi. (2016) وكذلك Abed Alamir (2018) و Almowsawi (2019) وصلوا الى نفس النتائج.

جدول 1. بعض المعالم الوراثية للصفات المدروسة عند موعد الزراعة 1 تموز في موقع بغداد									الصفات
h ² .b.s	G.C.V	P.C.V	σ^{2g}/σ^{2e}	σ^2p	σ^{2e}	σ^2g	C.V	SE	
0.5645	2.3453	3.1216	1.2959	2.3917	1.0417	1.3500	2.0601	0.5103	عدد ايام التزهير الذكري
0.8881	2.5278	2.6823	7.9395	2.4833	0.2778	2.2056	0.8971	0.2635	عدد ايام التزهير الانثوي
0.1849	1.0484	2.2620	0.2267	26.2953	21.4351	4.8602	2.2247	2.5217	ارتفاع النبات (سم)
0.6292	5.4691	6.8943	1.6975	81.0713	30.0538	51.0176	4.1977	2.7411	ارتفاع العرنوص (سم)
0.1757	1.9793	4.7221	0.2131	0.4857	0.4003	0.0853	4.2872	0.3164	عدد الاوراق
0.9657	4.4132	4.4908	28.1671	90400.026	3099.381	87300.645	0.8315	27.8360	مساحة الاوراق
0.9738	4.5198	4.5802	35.9231	0.0479	0.0013	0.0467	0.7414	0.0177	دليل مساحة الاوراق
0.3536	5.3506	8.9977	0.5471	2.6630	1.7213	0.9417	7.2339	0.6560	طول العرنوص (سم)
0.6424	8.1067	10.1142	1.7968	1.7919	0.6407	1.1512	6.0480	0.4002	عدد الصفوف
0.4727	6.1787	8.9868	0.8965	7.1040	3.7459	3.3581	6.5258	0.9677	عدد حبوب الصف
0.7931	13.1900	14.8105	3.8341	3388.3911	700.9414	2687.4497	6.7362	13.2376	عدد حبوب العرنوص
0.7061	14.1427	16.8311	2.4043	0.0480	0.0141	0.0339	9.1253	0.0594	عدد العرائيص (نبات)
0.1236	1.2911	3.6728	0.1410	1.2303	1.0783	0.1520	3.4384	0.5192	وزن 100 حبة
0.9342	10.9219	11.3000	14.1955	1637.0474	107.7321	1529.3152	2.8988	5.1897	وزن المادة الجافة
0.9442	2.8173	2.8993	16.9168	7.1667	0.4000	6.7667	0.6850	0.3162	عدد ايام النضج الفسلجي
0.8804	8.1311	8.6656	7.3407	0.1126	0.0135	0.0991	2.9962	0.0580	معدل نمو المحصول
0.7225	15.7574	18.5375	2.6043	393.8933	109.2846	284.6087	9.7643	5.2270	حاصل النبات الفردي
0.7225	15.7574	18.5375	2.6042	2.0097	0.5576	1.4521	9.7643	0.3734	حاصل وحدة المساحة

بعض المعالم الوراثية للصفات المدروسة عند موعد الزراعة 15 تموز في موقع بغداد

تشير بيانات الجدول (2) لبعض المعالم الوراثية للصفات المدروسة عند الموعد الثاني 15 تموز في موقع بغداد (كلية علوم الهندسة الزراعية جامعة بغداد – الجادرية)، إلى ان قيم الخطأ القياسي (SE) للصفات المدروسة كانت منخفضة،

باستثناء صفة المساحة الورقية، إذ كانت قيمة الخطأ القياسي لها مرتفعة بلغت 38.06، إن انخفاض قيمة الخطأ القياسي للصفات المدروسة دليل على ان بيانات الصفات متماثلة وقريبة من المتوسط الحسابي. كذلك يبين جدول (2) أن قيم معامل التباين (CV) كانت منخفضة أيضاً ولجميع الصفات المدروسة، وهي ضمن الحدود ومقبولة إحصائياً، وهذا يدل على تجانس عينات الصفات المدروسة.

كذلك يوضح الجدول (2) أن قيم التباين الوراثي لأغلب الصفات المدروسة كانت أكبر من التباين البيئي، وهذا يعني أن التباين بين الأصناف المدروسة، كان أغلبه بسبب وراثي وأن للبيئة تأثيراً قليلاً عليها، باستثناء صفات عدد أيام التزهير الذكري، وارتفاع النبات، وارتفاع العرنوص، وعدد الأوراق، وطول العرنوص، وعدد الصفوف في العرنوص، كانت قيم تباينها البيئي أكبر من الوراثي، وهذا يعني أن نسبة انخفاض التباين الوراثي عن البيئي لهذه الصفات بلغت 77.95% و 1.34% و 52.21% و 59.09% و 4.76% و 65.31% بالتتابع، وهذا يدل على أن مساهمة البيئة في إظهار تباين تلك الصفات كانت كبيراً، كما أظهرت هذه الصفات الست انخفاضاً في نسبة التباين الوراثي إلى البيئي، إذ كان أقل من واحد، وبلغت 0.2205 و 0.9866 و 0.4779 و 0.4091 و 0.9524 و 0.3469 للصفات الست بالتتابع، لذلك في مثل هذه الصفات يكون الانتخاب صعباً بسبب عدم تمييز تباين الصفة، إذا كان ناتجاً عن البيئة أو الوراثة.

بينما نجد أن نسبة التباين الوراثي من المظهرية كانت كبيرة، في صفات عدد أيام التزهير الأنثوي ومساحة الأوراق ودليلها وعدد حبوب الصف وعدد حبوب العرنوص وعدد العرائص في النبات الواحد ووزن 100 حبة ووزن المادة الجافة وعدد أيام النضج الفسلجي ومعدل نمو المحصول وحاصل النبات الفردي وحاصل وحدة المساحة، وأن نسبة التباين الوراثي إلى

البيئي للصفات السابقة كانت عالية وأكثر من واحد، تراوحت بين 1.25 لصفة عدد حبوب العرنوص و 17.84 لصفة مساحة الأوراق، وأن هذه الصفات كانت قيم PCV (معامل الاختلاف المظهري) لها قريبة جداً من قيم GCV (معامل الاختلاف الوراثي) وأن تباينها الوراثي أعلى من البيئي، وهذا دليل على أن التباين المظهري كان أغلبه من التباين الوراثي، وأن هذه الصفات تحكمها الوراثة (الجينات) في انتقالها من جيل لآخر وإن تأثرها بالبيئة قليل.

أما الصفات الستة التي كان التباين الوراثي فيها أقل من التباين البيئي (عدد أيام التزهير الذكري وارتفاع النبات وارتفاع العرنوص وعدد الأوراق وطول العرنوص وعدد الصفوف في العرنوص)، فكان معامل التباين المظهري فيها بعيداً عن معامل التباين الوراثي، وأن هذه الصفات محكومة بالبيئة، وأن نسبة التوريث بالمعنى الواسع لهذه الصفات كانت قليلة إلى متوسطة وبلغت 18.07% و 49.66% و 32.34% و 29.04% و 48.78% و 25.75% بالتتابع. أما صفات عدد أيام التزهير الأنثوي، ومساحة الأوراق، ودليلها، وعدد حبوب الصف، وعدد حبوب العرنوص، وعدد العرائص، ووزن 100 حبة، ووزن المادة الجافة، وعدد أيام النضج الفسلجي، ومعدل نمو المحصول، وحاصل النبات الفردي، وحاصل وحدة المساحة، فكانت نسبة التوريث بالمعنى الواسع فيها عالية بلغت 81.41% و 94.70% و 94.69% و 59.42% و 55.73% و 76.50% و 62.85% و 77.24% و 93.83% و 76.51% و 82.01% و 82.01% بالتتابع، وذلك دليل على إمكانية تحسين هذه الصفات بطريقة الانتخاب، بسبب تباينها الوراثي العالي، وهذا يؤكد نتائج Hadi و Wuhaaib (2015) و Al-Rawi وآخرون (2016) و Abed وآخرون (2017) الذين وجدوا أن أغلب صفات الذرة الصفراء، كان تباينها الوراثي أعلى من التباين البيئي.

جدول 2. بعض المعالم الوراثية للصفات المدروسة عند موعد الزراعة 15 تموز في موقع بغداد.

الصفات	SE	C.V	σ^2g	σ^2e	σ^2p	σ^2g/σ^2e	P.C.V	G.C.V	h ² .b.s
عدد أيام التزهير الذكري	0.42736	1.7399	0.1611	0.7306	0.8917	0.2205	1.9222	0.8171	0.1807
عدد أيام التزهير الأنثوي	0.7260	2.5381	9.2333	2.1083	11.3417	4.3795	5.8868	5.3115	0.8141
ارتفاع النبات (سم)	3.1893	2.8808	40.1429	40.6871	80.8300	0.9866	54.060	2.8615	0.4966
ارتفاع العرنوص (سم)	3.4547	5.3234	22.8156	47.7394	70.5550	0.4779	6.4717	3.6802	0.3234
عدد الأوراق	0.2268	3.0616	0.0842	0.2058	0.2900	0.4091	3.6345	1.9587	0.2904
مساحة الأوراق	38.0676	1.1306	103426.888	5796.579	109223.468	17.8427	4.9079	4.7759	0.9470
دليل مساحة الأوراق	0.0272	1.1306	0.0528	0.0030	0.0557	17.6	4.9079	4.7759	0.9469
طول العرنوص (سم)	0.3984	4.0216	0.6047	0.6349	1.2396	0.9524	5.6195	3.9250	0.4878
عدد الصفوف	0.4020	5.2204	0.2242	0.6463	0.8705	0.3469	6.0585	3.0744	0.2575
عدد حبوب الصف	0.7477	4.1541	3.2749	2.2364	5.5113	1.4644	6.5212	5.0268	0.5942
عدد حبوب العرنوص	19.9502	7.1845	2003.9948	1592.0349	3596.0297	1.2588	10.7976	8.0606	0.5573
عدد العرائص (نبات)	0.0427	6.4305	0.0238	0.0073	0.0311	3.2603	13.2643	11.6013	0.7650
وزن 100 حبة	0.5485	3.7517	2.0365	1.2036	3.2401	1.6920	6.1556	4.8802	0.6285
وزن المادة الجافة	11.7722	5.5832	1881.3292	554.3349	2435.6641	3.3938	11.7033	10.2857	0.7724
عدد أيام النضج الفسلجي	0.2981	0.6662	5.4111	0.3556	5.7667	15.2168	2.6831	2.59908	0.9383
معدل نمو المحصول	0.1383	5.8673	0.2492	0.0765	0.3257	3.2575	12.1052	10.5881	0.7651
حاصل النبات الفردي	6.9064	7.5864	869.9936	190.7946	1060.7882	4.5598	17.8882	16.1998	0.8201
حاصل وحدة المساحة	0.4933	7.5864	4.4389	0.9735	5.4124	4.5597	17.8882	16.1998	0.8201

بعض المعالم الوراثية للصفات المدروسة عند موعد الزراعة
1 آب في موقع بغداد

تشير بيانات الجدول 3 لبعض المعالم الوراثية للصفات المدروسة عند الموعد الثالث 1 آب في موقع بغداد، إلى أن قيم الخطأ القياسي (SE) للصفات المدروسة كانت منخفضة وضمن

الحدود المقبولة، باستثناء صفة المساحة الورقية وعدد حبوب العرنوص، إذ كانت قيمة الخطأ القياسي لها مرتفعة قليلاً بلغت 19.42 و 14.58 بالتتابع، ولكنها ضمن الحدود المقبولة، ان انخفاض قيمة الخطأ القياسي للصفات المدروسة دليل على إن بيانات الصفات متماثلة وقريبة من المتوسط الحسابي. كذلك أظهرت نتائج الجدول 21 إن قيم معامل التباين (CV) كانت منخفضة أيضاً ولجميع الصفات المدروسة، وإن قيمتها كانت أقل من عشرة، وهي أيضاً ضمن الحدود المقبولة إحصائياً، وهذا يدل تجانس عينات الصفات المدروسة .

كذلك يوضح الجدول 3 إن قيم التباين الوراثي لأغلب الصفات المدروسة كان أكبر من التباين البيئي، وهذا يعني إن التباين بين الأصناف المدروسة، كان أغلبه بسبب وراثي وإن للبيئة تأثيراً قليلاً عليها، باستثناء صفات عدد أيام التزهير الذكري، وارتفاع النبات، وعدد الأوراق، وعدد حبوب الصف، كانت قيم تباينها البيئي أكبر من الوراثي، وهذا يعني إن نسبة انخفاض التباين الوراثي عن البيئي لهذه الصفات بلغت 23.21% و 54.35% و 36.82% و 63.99% بالتتابع، وهذا يدل على إن مساهمة البيئة في إظهار تباين تلك الصفات كانت كبيرة ، كما أظهرت هذه الصفات الأربع انخفاضاً في نسبة التباين الوراثي إلى البيئي، إذ كان أقل من واحد، وبلغ 0.7679 و 0.4565 و 0.6318 و 0.3601 للصفات الأربعة بالتتابع، لذلك في مثل هذه الصفات يكون الانتخاب صعباً بسبب عدم تمييز تباين الصفة، إذا كان ناتجاً عن البيئة أو الوراثة.

إما في الصفات الأخرى، فإن نسبة التباين الوراثي من المظهري فقد كانت كبيرة، لصفات عدد أيام التزهير الأنثوي، وارتفاع العرنوص، ومساحة الأوراق، ودليلها، وطول العرنوص وعدد الصفوف، وعدد حبوب العرنوص، وعدد العرائيص في النبات الواحد، ووزن 100 حبة، ووزن المادة الجافة، وعدد أيام النضج الفسلجي، ومعدل نمو المحصول، وحاصل النبات الفردي، وحاصل وحدة المساحة، وإن نسبة التباين الوراثي إلى البيئي

للصفات السابقة كانت عالية وأكثر من واحد، تراوحت بين 1.02 لصفة طول العرنوص و 164.85 لصفة المساحة الورقية، وإن هذه الصفات كانت قيم PCV (معامل الاختلاف المظهري) لها قريبة جداً من قيم GCV (معامل الاختلاف الوراثي)، وإن هذه الصفات كان تباينها الوراثي أعلى من البيئي، وهذا دليل على إن التباين المظهري لها كان أغلبه من التباين الوراثي، أي إن هذه الصفات تحكمها الوراثة (الجينات) في انتقالها من جيل لآخر، وإن تأثرها بالبيئة قليل.

أما الصفات الأربع التي كان التباين الوراثي فيها أقل من التباين البيئي (عدد أيام التزهير الذكري، وارتفاع النبات، وعدد الأوراق، وعدد حبوب الصف)، فكان معامل الاختلاف المظهري فيها بعيد عن معامل التباين الوراثي، وإن هذه الصفات محكومة بالبيئة، وإن نسبة التوريث بالمعنى الواسع لهذه الصفات كانت متوسطة وبلغت 43.43 % و 31.34 % و 38.72 % و 26.47 %،

أما صفات عدد أيام التزهير الأنثوي، وارتفاع العرنوص، ومساحة الأوراق، ودليلها، وطول العرنوص وعدد الصفوف، وعدد حبوب العرنوص، وعدد العرائيص في النبات الواحد، ووزن 100 حبة، ووزن المادة الجافة، وعدد أيام النضج الفسلجي، ومعدل نمو المحصول، وحاصل النبات الفردي، وحاصل وحدة المساحة، فكانت نسبة التوريث بالمعنى الواسع فيها عالية بلغت 95.68 % و 65.63 % و 99.40 % و 99.40 % و 50.55 % و 66.57 % و 72.51 % و 94.01 % و 89.27 % و 98.37 % و 95.53 % و 98.55 % و 93.38 % و 93.38 % بالتتابع، وذلك دليل على إمكانية تحسين هذه الصفات بطريقة الانتخاب، بسبب تباينها الوراثي العالي، وهذا يؤكد نتائج Hadi و Wuhaib (2015) و Al-Rawi وآخرون (2016) و Abed وآخرون (2017)، الذين وجدوا أن أغلب الصفات في الذرة الصفراء، كان تباينها الوراثي أعلى من التباين البيئي.

جدول 3. بعض المعالم الوراثية للصفات المدروسة عند موعد الزراعة 1 آب في موقع بغداد.

الصفات	SE	C.V	σ^2g	σ^2e	σ^2p	σ^2g/σ^2e	P.C.V	G.C.V	$h^2.b.s$
عدد أيام التزهير الذكري	0.2789	1.1461	0.2389	0.3111	0.5500	0.7679	1.5239	1.0043	0.4343
عدد أيام التزهير الأنثوي	0.2582	0.9504	5.9000	0.2667	6.1667	22.1222	4.5704	4.4705	0.9568
ارتفاع النبات (سم)	4.2147	3.8051	32.4376	71.0564	103.4940	0.4565	4.592176	2.5709	0.3134
ارتفاع العرنوص (سم)	0.0786	6.1398	127.0416	66.5394	193.5810	1.9093	10.4723	8.4837	0.6563
عدد الأوراق	0.2794	3.6991	0.1973	0.3123	0.5097	0.6318	34.725	2.9402	0.3872
مساحة الأوراق	19.4233	0.6325	248780.86	1509.06	250289.92	164.8576	8.1459	8.1214	0.9940
دليل مساحة الأوراق	0.0139	0.6325	0.1269	0.0008	0.1277	158.625	8.1459	8.1214	0.9940
طول العرنوص (سم)	0.4278	4.2690	0.7482	0.7320	1.4802	1.0221	6.0705	4.3158	0.5055
عدد الصفوف	0.3432	4.3858	0.9382	0.4711	1.4093	1.9915	7.5856	6.1893	0.6657
عدد حبوب الصف	0.7059	3.6421	0.7177	1.9931	2.7108	0.3601	4.2475	2.1855	0.2647
عدد حبوب العرنوص	14.5840	4.8078	2244.5480	850.7750	3095.3230	2.6382	9.1706	7.8092	0.7251
عدد العرائيص (نبات)	0.0271	4.5150	0.0461	0.0029	0.0491	15.8966	18.4504	17.8894	0.9401
وزن 100 حبة	0.4883	2.8294	7.9394	0.9539	8.8933	8.3231	8.6391	8.1627	0.8927
وزن المادة الجافة	5.3877	2.7489	7000.3959	116.1102	7116.5061	60.2909	21.5209	21.3446	0.9837
عدد أيام النضج الفسلجي	0.2357	0.5387	4.7444	0.2222	4.9667	21.3519	2.5470	2.4893	0.9553
معدل نمو المحصول	0.0570	2.5467	0.8831	0.0130	0.8961	67.9308	21.1497	20.9958	0.9855
حاصل النبات الفردي	5.8571	5.4809	1936.8987	137.2241	2074.1228	14.1149	21.3087	20.5918	0.9338
حاصل وحدة المساحة	0.4184	5.4809	9.8825	0.7002	10.5827	14.1138	21.3087	20.5918	0.9338

إن قيمة الخطأ القياسي (SE) لأغلب الصفات المدروسة كانت تزداد عند موعد (15 تموز) عما كانت عليه عند موعد (1 تموز)،

عند ملاحظة المعلمات الوراثية عند المواعيد الثلاثة (1) تموز و 15 تموز و 1 آب) في موقع بغداد (جدول 1 و 2 و 3) نجد

ثم عادت لتتخفص عند الموعد الأخير (1 أب)، اما معامل التباين (CV) فقد انخفض لأغلب الصفات في الموعد الثاني مقارنة بالأول، وعادت لتتخفص أكثر عند الموعد الأخير، وعلى العموم كانت قيم الخطأ القياسي ومعامل التباين، عند المواعيد الثلاثة منخفضة ومقبولة احصائياً.

ان عدد الصفات التي كان تباينها الوراثي اعلى من البيئي كان 13 و 12 و 14 للمواعيد الثلاثة بالتتابع، اي ان التباين المظهري اقل من التباين الوراثي، اي ان التقدم بموعد الزراعة باتجاه شهر آب جعل النباتات اقل تأثراً بالبيئة، لان تزهيرها في وقت مناسب من درجات الحرارة (حرارة منخفضة)، كذلك نجد ان الصفات التي كان تباينها البيئي اعلى من الوراثي تقل مع تقدم موعد الزراعة، وان اغلب تلك الصفات هي صفات النمو الخضري، كذلك سلك معامل الاختلاف المظهري (PCV) والوراثي (GCV) السلوك نفسه، اذ انخفض لأغلب النمو الخضري، فيما زاد لصفات الحاصل ومكوناته الاولية والثانوية ومعامل التباين (وزن المادة الجافة الكلية TDM و عدد الايام الى بعض المعالم الوراثية للصفات المدروسة عند موعد الزراعة) 1 تموز (في موقع ديالى

تشير بيانات الجدول (4) الذي يخص بعض المعالم الوراثية للصفات قيد الدراسة عند الموعد الأول 1 تموز في موقع ديالى، إلى ان قيم الخطأ القياسي (SE) للصفات المدروسة، كانت منخفضة وضمن الحدود المقبولة (اقل من 20)، باستثناء صفة المساحة الورقية، اذ كانت قيمة الخطأ القياسي لها مرتفعة بلغت 46.50، ان انخفاض جميع قيم قيمة الخطأ القياسي للصفات المدروسة دليل على ان بيانات الصفات متماثلة وقريبة من المتوسط الحسابي، وان قيمة الخطأ القياسي العالية لصفة المساحة الورقية سببها ان قيم المساحة الورقية ارقامها كبيرة وعالية بسبب قياسها بوحدة الـ سم². كذلك يبين جدول 4 ان قيم معامل التباين (CV) كانت منخفضة أيضاً واقل من الخطأ القياسي، ولجميع الصفات المدروسة، وان قيمتها كانت اقل من عشرة، وهي ضمن الحدود ومقبولة احصائياً، وهذا يدل على تجانس عينات الصفات المدروسة.

كذلك يوضح الجدول (4) ان قيم التباين الوراثي لأغلب الصفات المدروسة (16 صفة) كانت اكبر من التباين البيئي، وهذا يعني ان التباين بين الأصناف المدروسة، كان اقل من سبب وراثي وان للبيئة تأثيراً قليلاً عليها، باستثناء صفة طول العنوص ووزن حبة، كانت قيم تباينها البيئي اكبر من الوراثي، وهذا يعني ان النسبة المئوية لانخفاض التباين الوراثي عن البيئي لهاتين الصفتين بلغت 83.78% و 9.32% بالتتابع، وهذا يدل على ان مساهمة البيئة في إظهار تباين هاتين الصفتين كانت كبيرة، كما أظهرت الصفات انخفاضاً في نسبة التباين الوراثي إلى البيئي، والذي كان اقل من واحد، وبلغ 0.1622 و 0.9068 بالتتابع، لذلك يكون الانتخاب صعباً للصفتين السابقتين، بسبب عدم تمييز تباينها، إذا كان ناتجاً عن البيئة أو الوراثة.

بينما نجد ان نسبة التباين الوراثي من المظهري كانت كبيرة، في صفات، عدد أيام التزهير الذكري، والأنثوي، وارتفاع

95% نضج فسليجي DTM و معدل نمو المحصول CGR) مع تقدم مواعيد النمو باتجاه شهر آب.

اما التوريث بالمعنى الواسع فقد كانت اعلى قيم له لأغلب الصفات (عدد ايام التزهير الانثوي، ومساحة الاوراق، ودليلها، وعدد حبوب العنوص، وعدد العرائيص، ووزن 100 حبة، ومعامل التباين وهي وزن المادة الجافة الكلية (TDM) ، و عدد الايام الى 95% نضج فسليجي (DTM) و معدل نمو المحصول (CGR) وحاصل النبات ووحدة المساحة) عند الموعد الأخير (1 أب)، وهذا دليل على ان النمو الخضري تأثر بالبيئة بشكل كبير، اما الحاصل ومكوناته ومعامل التباين فان تأثرهم بالبيئة قليل، وان التباين الوراثي هو المتحكم فيها وبصورة اكبر من التباين البيئي، وهذا يؤكد نتائج Hadi و Wuhaaib (2015) و Al-Rawi وآخرون (2016) و Abed وآخرون (2017) الذين وجد وان اغلب صفات الذرة الصفراء، كان تباينها الوراثي اعلى من التباين البيئي

النبات، وارتفاع العنوص، وعدد الأوراق، ومساحة الأوراق، ودليلها، وعدد صفوف العنوص، وعدد حبوبه، وعدد حبوب العنوص، وعدد العرائيص، ووزن المادة الجافة، وعدد أيام النضج الفسليجي، ومعدل نمو المحصول، وحاصل النبات الفردي، ووحدة المساحة، وان نسبة التباين الوراثي إلى البيئي للصفات السابقة، كانت عالية وأكثر من واحد، وتراوحت قيمها بين 1.0304 لصفة ارتفاع النبات و 74.84 لصفة عدد أيام النضج الفسليجي، وان هذه الصفات كانت قيم PCV (معامل الاختلاف المظهري) لها قريبة جداً من قيم GCV (معامل الاختلاف الوراثي)، وان تباينها الوراثي اعلى من البيئي، وهذا دليل على ان التباين المظهري لها كان اقل من التباين الوراثي، وان هذه الصفات تحكمها الوراثة (الجينات) في انتقالها من جيل لآخر وانها تتأثر بالبيئة بشكل قليل، أما صفتا طول العنوص، ووزن 100 حبة، والتي كان التباين الوراثي فيها اقل من التباين البيئي، فكان معامل التباين المظهري فيها بعيداً عن معامل التباين الوراثي، وان هذه الصفة محكومة بيئياً، وان نسبة التوريث بالمعنى الواسع لهاتين الصفتين كان قليلاً لصفة طول العنوص بلغ 13.96% ومتوسط لصفة وزن 100 حبة بلغ 47.56%.

أما صفات عدد أيام التزهير الذكري، والأنثوي، وارتفاع النبات، وارتفاع العنوص، وعدد الأوراق، ومساحتها، ودليلها، وعدد صفوف العنوص، وعدد حبوب الصف، وعدد حبوب العنوص، وعدد العرائيص، ووزن المادة الجافة، وعدد أيام النضج الفسليجي، ومعدل نمو المحصول، وحاصل النبات الفردي، وحاصل، وحدة المساحة، فكانت نسبة التوريث بالمعنى الواسع فيها عالية بلغت 63.16% و 61.35% و 50.75% و 76.06% و 54.93% و 92.31% و 55.99% و 54.93% و 63.07% و 65.28% و 80.30% و 98.68% و 71.53% و 73.58% و 73.58% بالتتابع وحسب وصف Al-athari (1982)، وذلك دليل على إمكانية تحسين هذه الصفات بطريقة الانتخاب، بسبب تباينها الوراثي العالي، وهذا يؤكد نتائج Hadi و Wuhaaib (2015) و Al-Rawi وآخرون (2016)

جدول 4. بعض المعالم الوراثية للصفات المدروسة عند موعد الزراعة 1 تموز في موقع ديبالي.									الصفات
h ² .b.s	G.C.V	P.C.V	σ^2g/σ^2e	σ^2p	σ^2e	σ^2g	C.V	SE	
0.6316	1.0120	1.2734	1.7143	0.4750	0.1750	0.3000	0.7729	0.20916	عدد ايام التزهير الذكري
0.6135	1.6358	2.0885	1.5871	1.7750	0.6861	1.0889	1.2985	0.4142	عدد ايام التزهير الانثوي
0.5075	4.0796	5.7267	1.0304	116.9393	57.5929	59.3464	4.0189	3.7945	ارتفاع النبات (سم)
0.7606	10.9750	12.5844	3.1768	202.3987	48.4582	153.9404	6.1576	3.4806	ارتفاع العرنوص (سم)
0.5493	3.2530	4.3892	1.2184	0.4013	0.1809	0.2204	2.9467	0.2127	عدد الاوراق
0.9231	5.2626	5.4776	11.9969	112445.06	8651.65	103793.4	1.5194	46.5071	مساحة الاوراق
0.9231	5.2626	5.4776	12.0454	0.0574	0.0044	0.0530	1.5194	0.0332	دليل مساحة الاوراق
0.1396	2.3767	5.7484	0.1622	1.2165	1.0468	0.1698	5.5811	0.5354	طول العرنوص (سم)
0.5599	5.3289	7.1215	1.2723	1.0566	0.4650	0.5916	4.7243	0.3410	عدد الصفوف
0.5493	7.2446	9.7753	1.2185	10.3516	4.6660	5.6856	6.5630	1.0800	عدد حبوب الصف
0.6307	10.3423	13.0226	1.7080	3836.4153	1416.6867	2419.7286	7.9136	18.8194	عدد حبوب العرنوص
0.6528	4.9958	6.1833	1.9	0.0087	0.0030	0.0057	3.6436	0.0275	عدد العرائص (نبات)
0.4756	5.7616	8.3550	0.9068	5.6157	2.9451	2.6706	6.0505	0.8581	وزن 100 حبة
0.8030	7.9268	8.8459	4.0760	1159.8895	228.5059	931.3837	3.9263	7.5582	وزن المادة الجافة
0.9868	2.1304	2.1446	74.8399	4.2167	0.0556	4.1611	0.2462	0.1179	عدد ايام النضج الفسلجي
0.7153	6.3764	7.5395	2.5172	0.0918	0.0261	0.0657	4.0231	0.0808	معدل نمو المحصول
0.7358	12.8419	14.9712	2.7847	559.2643	147.7689	411.4953	7.6955	6.0780	حاصل النبات الفردي
0.7358	12.8419	14.9712	2.7845	2.8535	0.7540	2.0995	7.6955	0.4342	حاصل وحدة المساحة

بعض المعالم الوراثية للصفات المدروسة عند موعد الزراعة 15 تموز في موقع ديبالي

تشير بيانات الجدول (5) لبعض المعالم الوراثية للصفات المدروسة عند الموعد الثاني 15 تموز في موقع ديبالي، إلى أن قيم الخطأ القياسي (SE) للصفات المدروسة كانت منخفضة وضمن الحدود المقبولة (أقل من 20)، باستثناء صفة المساحة الورقية، إذ كانت قيمة الخطأ القياسي لها مرتفعة، إن قلة قيمة الخطأ القياسي للصفات المدروسة دليل على أن بيانات الصفات متماثلة وقريبة من المتوسط الحسابي. كذلك يبين جدول 5 أن قيم معامل التباين (CV) كانت منخفضة أيضاً، وأن قيمتها كانت أقل من عشرة، باستثناء صفة ارتفاع العرنوص كانت قيمة معامل التباين له 10.14 وهي ضمن الحدود ومقبولة إحصائياً، وهذا يدل على تجانس عينات الصفات المدروسة.

كذلك يشير الجدول (5) إلى أن قيم التباين الوراثي لنصف الصفات المدروسة (9 صفات) هي مساحة الأوراق، ودليلها، وعدد العرائص للنبات، ووزن 100 حبة، ووزن المادة الجافة، وعدد أيام النضج الفسلجي، ومعدل نمو المحصول، وحاصل النبات الفردي، وحاصل وحدة المساحة، كانت أكبر من التباين البيئي، وهذا يعني أن التباين بين الأصناف لهذه الصفات، كان أغلبه بسبب وراثي وأن للبيئة تأثيراً قليلاً فيها، أما صفات عدد أيام التزهير الذكري، والأنثوي، وارتفاع النبات، وارتفاع العرنوص، وعدد الأوراق، وطول العرنوص، وعدد الصفوف في العرنوص، وعدد حبوب الصف، وعدد حبوب العرنوص، فقد كانت قيم تباينها البيئي أكبر من الوراثي، وهذا يعني أن التباين بين الأصناف المدروسة لهذه الصفات، أغلبه بسبب بيئي وأن للوراثة تأثيراً قليلاً، فيها وأن النسبة لانخفاض التباين الوراثي عن البيئي لهذه الصفات بلغت 46.45% و 17.76% و 80.37% و 78.42% و 27.82% و 72.55% و 42.23% و 57.73% و 67.92% بالتتابع، وهذا يدل على أن مساهمة البيئة في إظهار

تباين تلك الصفات كانت كبيرة، كما أظهرت هذه الصفات انخفاصاً في نسبة التباين الوراثي إلى البيئي، إذ كان أقل من واحد، وبلغ 0.5355 و 0.8224 و 0.1963 و 0.2158 و 0.7218 و 0.2745 و 0.5777 و 0.4226 و 0.3208 للصفات التسع بالتتابع، لذلك في مثل هذه الصفات يكون الانتخاب صعباً بسبب عدم تمييز تباين الصفة، إذا كان ناتجاً عن البيئة أو الوراثة.

بينما نسبة التباين الوراثي إلى المظهري كانت كبيرة، في صفات مساحة الأوراق، ودليلها، وعدد العرائص، ووزن 100 حبة، ووزن المادة الجافة، وعدد أيام النضج الفسلجي، ومعدل نمو المحصول، وحاصل النبات الفردي، وحاصل وحدة المساحة، وأن نسبة التباين الوراثي إلى البيئي للصفات السابقة كانت عالية وأكثر من واحد، تراوحت بين 2.25 لصفة معدل نمو المحصول، و 83.23 لصفة عدد أيام النضج الفسلجي، وأن هذه الصفات كانت قيم PCV (معامل الاختلاف المظهري) لها قريبة جداً من قيم GCV (معامل الاختلاف الوراثي)، وأن تباينها الوراثي أعلى من البيئي، وهذا دليل على أن التباين المظهري كان أغلبه من التباين الوراثي، وأن هذه الصفات تحكمها الوراثة (الجينات) في انتقالها من جيل لآخر وأنها تتأثر بالبيئة بشكل قليل.

أما الصفات التسع التي كان التباين الوراثي فيها أقل من التباين البيئي (عدد أيام التزهير الذكري، والأنثوي، وارتفاع النبات، وارتفاع العرنوص، وعدد الأوراق، وطول العرنوص، وعدد الصفوف فيه، وعدد حبوب الصف، وعدد حبوب العرنوص) فكان معامل الاختلاف المظهري فيها بعيداً عن معامل الاختلاف الوراثي، وأن هذه الصفات محكومة بالبيئة، وأن نسبة التوريث بالمعنى الواسع لهذه الصفات كانت قليلة إلى متوسطة، وبلغت 34.87% و 45.13% و 16.41% و 17.75% و 41.92% و 21.53% و 36.62% و 29.71% و 24.29% بالتتابع، أما صفات مساحة الأوراق، ودليلها، وعدد العرائص، ووزن 100 حبة، ووزن المادة الجافة، وعدد أيام النضج الفسلجي، ومعدل نمو

المحصول، وحاصل النبات الفردي، وحاصل وحدة المساحة، فكانت نسبة التوريث بالمعنى الواسع فيها عالية بلغت 90.15% و90.15% و70.73% و73.36% و70.09% و98.81% و69.26% و82.91% و82.91% بالتتابع، وذلك دليل على إمكانية تحسين هذه الصفات بطريقة الانتخاب، بسبب تغيرها الوراثي العالي، وهذا يؤكد نتائج Najeeb وآخرون (2009)

الذي وجد في دراسته ان بعض الصفات يكون تغيرها البيئي اعلى من الوراثي، وانه يشكل نسبة عالية من التغير المظهري، كذلك يؤكد نتائج Hadi وWuhaaib (2015) وAl-Rawi وآخرون (2016) وAbed وآخرون (2017) الذين وجد وان اغلب صفات الذرة الصفراء كان تباينها الوراثي أعلى من التباين البيئي.

الصفات	SE	C.V	σ^2g	σ^2e	σ^2p	σ^2g/σ^2e	P.C.V	G.C.V	$h^2.b.s$
عدد ايام التزهير الذكري	1.2360	4.3369	3.2722	6.1111	9.3833	0.5355	5.3741	3.1736	0.3487
عدد ايام التزهير الانثوي	1.1081	3.4270	4.0389	4.9111	8.9500	0.8224	4.6263	3.1078	0.4513
ارتفاع النبات (سم)	5.4095	5.5606	19.8318	101.0516	120.8833	0.1963	5.6509	1.9061	0.1641
ارتفاع العنوص (سم)	5.4053	10.1484	25.2173	116.8697	142.0870	0.2158	11.1899	4.7141	0.1775
عدد الاوراق	0.3125	4.5401	0.2820	0.3907	0.6727	0.7218	5.9576	3.8574	0.4192
مساحة الاوراق	55.2145	2.1776	111627.78	12194.55	123822.33	9.1539	6.9389	6.5883	0.9015
دليل مساحة الاوراق	0.0394	2.1776	0.0570	0.0062	0.0632	9.1935	6.9389	6.5883	0.9015
طول العنوص (سم)	0.2302	2.3929	0.0582	0.2120	0.2702	0.2745	2.7013	1.2534	0.2153
عدد الصفوف	0.2854	3.7758	0.1882	0.3258	0.5140	0.5777	4.7427	2.8700	0.3662
عدد حبوب الصف	0.9882	5.0666	1.6509	3.9061	5.5570	0.4226	6.0431	3.2938	0.2971
عدد حبوب العنوص	18.4203	6.2500	435.459	1357.236	1792.695	0.3208	7.1830	3.5402	0.2429
عدد العرائيص (نبات)	0.0424	7.1427	0.0174	0.0072	0.0246	2.4167	13.2034	11.1046	0.7073
وزن 100 حبة	0.5813	4.0623	3.7227	1.3517	5.0744	2.7541	7.8709	6.7416	0.7336
وزن المادة الجافة	9.7834	5.4161	897.2646	382.8560	1280.1206	2.3436	9.9036	8.2914	0.7009
عدد ايام النضج الفسلجي	0.1179	0.2457	4.6278	0.0556	4.6833	83.2338	2.2562	2.2428	0.9881
معدل نمو المحصول	0.1020	5.4150	0.0937	0.0416	0.1353	2.2524	9.7663	8.1277	0.6926
حاصل النبات الفردي	4.6103	5.0592	412.3707	85.0187	497.3894	4.8504	12.2371	11.1423	0.8291
حاصل وحدة المساحة	0.3293	5.0593	2.1040	0.4338	2.5378	4.8502	12.2371	11.1423	0.8291

بعض المعالم الوراثية للصفات المدروسة عند موعد الزراعة 1 آب في موقع ديالى

تشير بيانات الجدول (6) لبعض المعالم الوراثية للصفات المدروسة عند الموعد الثاني 1 آب في موقع ديالى، إلى ان قيم الخطأ القياسي (SE) للصفات المدروسة كانت منخفضة وضمن الحدود المقبولة (أقل من 20)، باستثناء صفة المساحة الورقية، إذ كانت قيمة الخطأ القياسي لها مرتفعة بلغت 53.71، إن قلة قيمة الخطأ القياسي للصفات المدروسة دليل على ان بيانات الصفات متماثلة وقريبة من المتوسط الحسابي. كذلك أظهرت نتائج الجدول 6 ان قيم معامل التغير (CV) كانت منخفضة أيضاً، ولجميع الصفات المدروسة، وان قيمتها كانت أقل من عشرة، وهي ضمن الحدود المقبولة إحصائياً، وهذا يدل تجانس عينات الصفات المدروسة.

كذلك يوضح الجدول (6) ان قيم التغير الوراثي لأغلب الصفات المدروسة (13 صفة) كانت اكبر من التغير البيئي، وهذا يعني ان التغير بين الأصناف للصفات المدروسة، كان أغلبه بسبب وراثي وان للبيئة تأثيراً قليلاً عليها، باستثناء صفات ارتفاع النبات، وعدد الاوراق، وطول العنوص، وعدد حبوب الصف، ووزن 100 حبة، كانت قيم تغيرها البيئي اكبر من الوراثي، وهذا يعني ان النسبة لانخفاض التغير الوراثي عن البيئي لهذه الصفات بلغت 15.25% و79.75% و61.41% و52.04% و72.90% للصفات الخمس بالتتابع، وهذا يدل على ان مساهمة البيئة في إظهار تغير تلك الصفات كانت كبيرة، كما أظهرت هذه الصفات الخمس انخفاضاً في نسبة التغير الوراثي إلى البيئي، إذ كان أقل

من واحد، وبلغ 0.8475 و0.2025 و0.3859 و0.4796 و0.2709 بالتتابع، لذلك في مثل هذه الصفات يكون الانتخاب صعباً بسبب عدم تمييز تغير الصفات، إذا كان ناتجاً عن البيئة أو الوراثة.

بينما نسبة التغير الوراثي من المظهري كانت كبيرة، في صفات عدد أيام التزهير الذكري، والأنثوي، وارتفاع العنوص، ومساحة الأوراق، ودليلها، وعدد الصفوف، وعدد حبوب العنوص، وعدد العرائيص في النبات، ووزن المادة الجافة، وعدد أيام النضج الفسلجي، ومعدل نمو المحصول، وحاصل النبات الفردي، وحاصل وحدة المساحة، وان نسبة التغير الوراثي إلى البيئي للصفات السابقة كانت عالية وأكثر من واحد، تراوحت بين 1.28 لصفة عدد حبوب العنوص و10.03 لصفة مساحة الأوراق، وان هذه الصفات كانت قيم PCV (معامل الاختلاف المظهري) لها قريبة جداً من قيم GCV (معامل الاختلاف الوراثي)، وان تغيرها الوراثي أعلى من البيئي، وهذا دليل على ان التغير المظهري كان أغلبه من التغير الوراثي، وان هذه الصفات تحكمها الجينات (الوراثة) في انتقالها من جيل لآخر وان تأثرها بالبيئة قليل، أما الصفات الخمس التي كان التغير الوراثي فيها أقل من التغير البيئي (ارتفاع النبات، وعدد الأوراق، وطول العنوص، وعدد حبوب الصف، ووزن 100 حبة) فكان معامل التغير المظهري فيها بعيداً عن معامل التغير الوراثي، وان هذه الصفات محكومة بالبيئة، وان نسبة التوريث بالمعنى الواسع لهذه الصفات كانت قليلة إلى متوسطة وبلغت 45.87% و16.83% و27.85% و32.41% و21.32%.

أما صفات عدد أيام التزهير الذكري، والانثوي، وارتفاع العرنوص، ومساحة الأوراق، ودليلها، وعدد الصفوف في العرنوص، وعدد حبوب العرنوص، وعدد العرائيص، ووزن المادة الجافة، وعدد ايام النضج الفسلجي، ومعدل نمو المحصول، وحاصل النبات الفردي، وحاصل وحدة المساحة، فكانت نسبة التوريث بالمعنى الواسع فيها عالية بلغت 84.52% و 88.14% و 62.40% و 90.93% و 90.93% و 69.65% و 56.24% و 69.43% و 64.03% و 86.35% و 72.11% و 80.67% و 80.67% بالتتابع، وذلك دليل على إمكانية تحسين هذه الصفات

بطريقة الانتخاب، بسبب تباينها الوراثي العالي، وهذا يؤكد نتائج Hadi و Wuhaaib (2015) و Abed و آخرون (2017) وكذلك Abed Alamir (2018) و Almowsawi (2019) وصلا الى نفس النتائج والذين وجد وان اغلب صفات الذرة الصفراء كان تباينها الوراثي أعلى من التباين البيئي. كذلك تتفق هذه النتائج مع نتائج Al-Rawi و آخرون (2016) إذ وجدوا ان أغلب الصفات كانت محكومة وراثياً و نسب التوريث بالمعنى الواسع كانت مرتفعة .

الصفات	SE	C.V	σ^2g	σ^2e	σ^2p	σ^2g/σ^2e	P.C.V	G.C.V	$h^2.b.s$
عدد ايام التزهير الذكري	0.6078	1.9793	8.0722	1.4778	9.5500	5.4623	5.0317	4.6260	0.8452
عدد ايام التزهير الانثوي	0.5211	1.5761	8.0722	1.0861	9.1583	7.4323	4.5766	4.2967	0.8814
ارتفاع النبات (سم)	3.3045	3.6087	37.0169	43.6781	80.6950	0.8475	4.9050	3.3221	0.4587
ارتفاع العرنوص (سم)	3.4368	6.9978	78.4093	47.2457	125.6550	1.6596	11.4122	9.0149	0.6240
عدد الاوراق	0.2667	3.8977	0.0576	0.2844	0.3420	0.2025	4.2739	1.7533	0.1683
مساحة الاوراق	53.7168	2.1867	115739.58	11541.96	127281.55	10.0277	7.2617	6.9247	0.9093
دليل مساحة الاوراق	0.0384	2.1867	0.0591	0.0059	0.0649	10.0169	7.2617	6.9247	0.9093
طول العرنوص (سم)	0.3475	3.8528	0.1864	0.4830	0.6694	0.3859	4.5360	2.3939	0.2785
عدد الصفوف	0.2981	3.9446	0.8158	0.3556	1.1713	2.2942	7.1595	5.9749	0.6965
عدد حبوب الصف	0.7343	4.0928	1.0344	2.1569	3.1913	0.4796	4.9784	2.8344	0.3241
عدد حبوب العرنوص	15.8926	5.8591	1298.6626	1010.3034	2308.9660	1.2854	8.8576	6.6429	0.5624
عدد العرائيص (نبات)	0.0372	6.8367	0.0126	0.0055	0.0181	2.2909	12.3655	10.3036	0.6943
وزن 100 حبة	0.6798	4.3970	0.5008	1.8483	2.3492	0.2709	4.9570	2.2888	0.2132
وزن المادة الجافة	5.6583	3.3873	227.9560	128.0667	356.0227	1.7710	5.6478	4.5192	0.6403
عدد ايام النضج الفسلجي	0.2173	0.4182	1.1944	0.1889	1.3833	6.3229	1.1318	1.0517	0.8635
معدل نمو المحصول	0.0550	3.4176	0.0312	0.0121	0.0433	2.5785	6.4717	5.4957	0.7211
حاصل النبات الفردي	5.4516	6.7797	496.0563	118.8813	614.9377	4.1727	15.4194	13.8490	0.8067
حاصل وحدة المساحة	0.3894	6.7797	2.5310	0.6066	3.1376	4.1724	15.4195	13.8490	0.8067

عند ملاحظة المعلومات الوراثية في موقع ديالى عند المواعيد الثلاثة، 1 تموز و 15 تموز و 1 آب، (جدول 4 و 5 و 6) نجد ان قيمة الخطأ القياسي (SE) لأغلب صفات النمو الخضري كعدد ايام التزهير الذكري والانثوي وارتفاع النبات والعرنوص وعدد الاوراق ومساحتها ودليلها قد زادت قيمها عند موعد الزراعة الثاني عن الموعد الاول، كذلك زادت عند الموعد الاخير 1 آب عن موعد 1 تموز، باستثناء ارتفاع النبات والعرنوص، مما يشير الى التجانس العام عند الموعد الاول، اما الصفات المتعلقة بالحاصل كعدد الصفوف والعرائيص ومعايير النمو (وزن المادة الجافة الكلية TDM و عدد الايام الى 95% نضج فسلجي DTM ومعدل نمو المحصول CGR) وحاصل النبات ووحدة المساحة، فقد زادت قيمة الخطأ القياسي لها في الموعد الثاني عما هي عليه في الموعد الاول، وعادت لتتخفض عنه في الموعد الاخير 1 آب، باستثناء صفة عدد ايام النضج الفسلجي. اما معامل التباين CV فقد كانت قيمه مشابهة في سلوكها لقيم الخطأ القياسي، وعلى العموم كانت قيم الخطأ القياسي ومعامل التباين، عند المواعيد الثلاثة منخفضة ومقبولة احصائيا. كذلك نلاحظ ان عدد الصفات التي كان تباينها الوراثي اعلى من البيئي 16 و 9 و 13 للمواعيد الثلاثة بالتتابع،

اي ان التباين المظهري اغلبه من التباين الوراثي، اي ان التقدم بموعد الزراعة باتجاه شهر آب جعل النباتات اقل تأثراً بالبيئة، لان تزهيرها في وقت مناسب من درجات الحرارة، كذلك نجد ان الصفات التي كان تباينها البيئي اعلى من الوراثي، تزداد بصورة كبيرة، اذ كانت صفتان في الموعد الاول (طول العرنوص ووزن 100 حبة) وزادت في الموعد الثاني لتصبح 9 صفات ثم تعود لتتخفض في الموعد الاخير وتصبح 5 صفات، مع تقدم موعد الزراعة الى 1 آب، وان اغلب تلك الصفات هي صفات النمو الخضري في الموعد الثاني. كذلك سلك معامل الاختلاف المظهري (PCV) والوراثي (GCV) السلوك نفسه اذ انخفضا في الموعد الثاني عن الموعد الاول، وعادا ليرتفعا في الموعد الاخير، اذ انخفضا لأغلب النمو الخضري، فيما زاد لصفات الحاصل ومكوناته ومعايير النمو (وزن المادة الجافة الكلية TDM و عدد الايام الى 95% نضج فسلجي DTM ومعدل نمو المحصول CGR) مع تقدم مواعيد النمو باتجاه شهر آب، اما التوريث بالمعنى الواسع فقد كانت اعلى قيم له لأغلب الصفات (عدد ايام التزهير الذكري والانثوي، ومساحة الاوراق، ودليلها، وعدد العرائيص، ومعايير النمو (TDM و DTM و CGR) وحاصل النبات ووحدة المساحة) عند الموعد الاخير 1

ان سلوك اغلب معايير النمو كان متشابهاً في الموقعين بغداد وديالى، باستثناء ان الموعد الاول كان افضل في موقع ديالى عن موقع بغداد، اما الموعد الاخير فانه بالعكس تفوق في موقع بغداد عن موقع ديالى لأغلب الصفات.

Reference

- Abed Alamir, A. N. 2018. Evaluating of Five Inbred Lines of Maize and Their Single Crosses And Double Crosses Under Two Plant Densities. MSc. Thesis, Dept. of Field Crop, Coll. Of Agricultural Engineering Science, University of Baghdad Pp: 89.
- Abed, N.Y., B.H. Hadi, W.A. Hassan and K.M. Wuhaib.2017. Assessment Yield and Its Components of Italian Maize Inbred lines by Full Diallel Cros . Al-Anbar J. Agric. Sci. 15(Special Issue):114-124.
- Al-athari, A.H.M. 1982. Fundamentals of Genetics. University of Al-Mosul. Directorate of Dar Al-Ketub for printing and publishing .PP.82.
- Al-Khazaali ,H.A.,M.M. Elshahookie and F.Y.Baktash.2013. Genetic variation of some traits of maize under population densities 1-Field traits. The Iraq J.Agric Sci.44(3):289-299.
- Almowsawi, S. H. T. 2019. Evaluating the performance of triple, Single hybrids and their inbred lines of maize Under Two Plant Densities. M. Sc. Thesis, Dept. of Field Crop, Coll. Of Agricultural Engineering Science, University of Baghdad Pp: 128.
- Al-Rawi, A.R.M., O.I.M.Al-Dulaimi , E.Kh.KH.Al-Qaisi and A.H.A. Anees .2016. Estimate of some genetic parameters and stability in half diallel crosses of corn (*Zea mays L.*) . Tikrit J.Agric. Sci., 16(1):1-20.
- Dhannoon,O.M. and A.M.Al-Jumaily .2014.Estimation of gene action and some genetic parameters in maize using triple test cross. Al-Anbar J.Agric.Sci.12(2):182-190.
- Hadi , B.H and K.M. Wuhaib.2015.Estimation of genetic parameters of growth and yield characters of yellow maize(*Zea mays L.*) Under two levels of

آب، وهذا دليل على ان النمو الخضري تأثر بالبيئة بشكل كبير، اما الحاصل ومكوناته ومعايير النمو فان تأثرها بالبيئة قليل، وان التغاير الوراثي هو المتحكم فيها وبصورة اكبر من التغاير البيئي، لذا هذا مما يشير الى اعتماد مكونات الحاصل كمعايير انتخاب.

- nitrogen and plant density. Egypt.J.of A p p l . s c i . 3 0 (2) : 1 0 8 - 1 2 9 .
- Harba,N., M. Al-samara and N.Asaad.2017.Genetic parameter study for yield parameters and its components studied for three hybrids of maize (*Zea mays*) under artificial infestation with the large corn stem borer *sesamia cretica* .Arab Journal of plant protection .35(2):67-77.
- Latheeth,H.R.and A.M.Kazem.2016. Study of epistasis gene action using triple test cross procedure in maize .Karbala J.Agric.sci.12(4):192-201.
- Najeeb, S., A.G. Rather, G.A. Parray, F.A.Sheikh and S.M.Razvi .2009. Studies on genetic variability, genotypic correlation and path coefficient analysis in maize under high altitude temperate ecology of Kashmir. Maize Genetics Cooperation Newsletter Vol. 83: 1-8.
- Sing,R.K. and B.D.Chaudhary.1985.Biometrical Methods in Quantitative Genetic Analysis Kalyani Publishers,New Delhi,Ludhiana. Pp: 318.
- Steel,R.G.B and J.H.Torri .1980. Principles and procedures of statistics.A biometric approach.2nd edition. MCG raw-Hill Book company. NewYork, USA.Pp:20-90.