

دراسة عن جرثومة *Peptostreptococcus anaerobius* المعزولة من التهابات قرح الفراش

بشرى علي كاظم

ياسمين حسن علي

جامعة بغداد / كلية التمريض

الخلاصة :

جمعت (٦٠) مسحة من التهابات قرح الفراش من المرضى الراقدين ، عزلت جرثومة *Peptostreptococcus anaerobius* بنسبة (٣٤,٧%) من هذه الالتهابات، فضلا عن عزل جراثيم اخرى هوائية ولا هوائية منها *Escherichia coli* و *Pseudomonas aeruginosa* و *Bacteroides fragilis* ، أظهرت الأنواع الجرثومية المعزولة هوائياً ولا هوائياً تبايناً واضحاً في حساسيتها للمضادات الحيوية فكانت المضادات *Metronidazole* و *Ciprofloxacin* و *Augmentin* هي افضل المضادات الحيوية لعلاج قرح الفراش، حيث تراوحت حساسية العزلات لها ما بين (66.6%) الى (١٠٠%) . أكدت نتائج التحري عن عوامل الضراوة لجرثومة *P.anaerobius* ان العزلات الجرثومية اظهرت نتيجة موجبة لإختبار انتاج الهيمولاسين وانزيمات البيتالاكتاميز واللايبيز والبروتيز وانتاج الغشاء الحيوي وبنسبة (١٠٠% ، ٦٤,٧% ، ٧٠,٥% ، ١٠٠%) . على التوالي .

الكلمات المفتاحية : قرح الفراش ، *Peptostreptococcus* .

المقدمة :

تعد التهابات قرح الفراش من الإصابات المهمة جدا والتي تؤدي الى نسبة عالية من الوفيات نتيجة للمضاعفات التي تحدث بتطور القرحة والتي تصيب المرضى الراقدين لفترات طويلة [١، ٢] . وتعرف قرح الفراش (Pressure Sores , bed Sores) بأنها القرحة التي تحدث نتيجة للضغط المسلط على الأنسجة الرخوة ، مما يؤدي الى منع سريان الدم لتلك الأنسجة واخيرا فقدانها لوظيفتها الفسيولوجية [٣، ٤] . تحدث هذه القرحة في

دراسة عن جرثومة *Peptostreptococcus anaerobius* المعزولة من التهابات قرح الفراش..
بشرى علي كاطم، ياسمين حسن علي

مناطق مختلفة من الجسم مثل الظهر وجانبيه والبطن وجوانب الرأس ومنطقة الاكتاف والساق والركبة وظاهر القدمين ومنطقة المقعد ولأسيما في المرضى الذين يستخدمون الكرسي المتحرك [٥ ، ٦] . وتمزق قرح الفراش بدءا من حدوث الإصابة الى حين فقدان العضو لوظيفته وحدث مضاعفات أخرى بأربعة مراحل وتعد المرحلة الثالثة من المراحل المهمة جدا ، والخطرة ، حيث تكون القرح عرضة للغزو من الأحياء المجهرية الممرضة المختلفة ومن ثم حدوث مضاعفات وتعقيدات أخرى منها وصول القرحة الى العظم والتهاب السحايا و الشلل الجزئي وتجرثم ولتسم الدم وحدث الوفاة في حالة عدم السيطرة على الالتهاب في الوقت المناسب [٧ ، ٨] . إن التهابات قرح الفراش تسببها العديد من الجراثيم الهوائية مثل *Escherichia coil* و *Pseudomonas aeruginosa* و *Staphylococcus aureus* فضلا عن جراثيم أخرى لاهوائية [٩] ، وتعد جرثومة *Peptostreptococcus anaerobius* من الجراثيم اللاهوائية المسببة لهذه الإلتهابات فضلا عن إحداثها لإصابات أخرى مثل التهاب المسالك البولية والتناسلية والتهاب غشاء سقف الفم ولأسيما في الأطفال ، حيث عزلها العالم Lewkowicz عام ١٩٠١ لأول مرة من هذه الإصابات [١٠ ، ١١ ، ١٢] ، كما تعد إحدى المسببات المهمة لحمى النفاس Purperal fever [١٣ ، ١٤] ، وهذه الجرثومة تعود الى عائلة Clostridiaceae ، وتتميز بكونها لاهوائية مجبرة وحجم خلاياها يتراوح ما بين ٣,٠ - ٢ مايكرومتر وذات شكل كروي وقد تتواجد أحيانا بشكل أزواج أو رباعيات أو تجمعات أو سلاسل قصيرة مؤلفة من ٧ - ٨ خلايا وموجبة لصبغة كرام ولها القدرة على النمو في الأوساط الصلبة الغنية مثل أكار الدم وتتميز مستعمراتها بكونها مدورة مرتفعة قليلا عن الوسط وذات لون أبيض لماع أو رصاصي مخضر [١٥ ، ١٦] ، ونظرا لكون الدراسات والبحوث على هذه الجرثومة قليلة جدا وغالبية تلك الدراسات مهتمة بالجراثيم الهوائية ولتسليط الضوء على هذه الجرثومة لذلك ارتأينا عزلها من إصابات قرح الفراش ودراسة بعضها من عوامل ضراوتها .

المواد وطرق العمل

جمع العينات :

جمعت (٦٠) مسحة من إصابات قرح الفراش من المرضى الراقيدين في ردهات مستشفى بغداد التعليمي والذين تجاوزت فترة رقدتهم ثلاثة أشهر فما فوق باستخدام

دراسة عن جرثومة *Peptostreptococcus anaerobius* المعزولة من التهابات قرح الفراش..
بشري علي كاظم، ياسمين حسن علي

مسحات معقمة للفترة من ٢٠١٤/٣/١ ولغاية ٢٠١٤/٦/١١ ، وضعت هذه المسحات بعد اخذ العينات في انابيب حاوية على الوسط الناقل مرق نقيع المخ والقلب المعقم ، ثم نقلت الى المختبر لغرض زرعها .

زرع العينات :

١. التحضين الهوائي :

زرعت العينات على وسطي أكار الدم وأكار الماكونكي بطريقة التخطيط وحضيت هوائياً بدرجة ٣٧م لمدة ٢٤ ساعة لغرض عزل الجراثيم الهوائية [١٧].

٢. التحضين اللاهوائي :

زرعت العينات على وسطي أكار الدم وأكار الدم المسخن بطريقة التخطيط وحضنت لاهوائياً باستخدام المرطبان اللاهوائي (anaerobic jar) ووضع نظام التحضين اللاهوائي Gas pak داخل هذا المرطبان مما يوفر ظروف لاهوائية لعزل الجراثيم اللاهوائية، ثم حضنت الاطباق بدرجة ٣٧م لمدة ٢٤ ساعة [١٨].

العزل والتشخيص :

أخذت جميع العزلات الجرثومية النامية في التحضين الهوائي واللاهوائي ونقيت بطريقة التخطيط الرباعي ، ثم زرعت على موائ الأكار المغذي في حالة العزل الهوائي وعلى موائ أكار الدم المسخن في حالة العزل اللاهوائي لغرض حفظها واستخدامها في اجراء الإختبارات اللاحقة ، بعدها شخّصت هذه العزلات باجراء الفحوصات المجهرية والكيميائية والتي اجريت طبقاً لما جاء في [١٩ ، ٢٠ ، ٢١] ، ثم سجلت النتائج بشكل جدول .

فحص الحساسية للمضادات الحيوية :

اجريت على الجراثيم المعزولة في هذا البحث إختبارات الحساسية لمجموعة من المضادات الحيوية والمستخدمه بشكل واسع لعلاج إصابات قرح الفراش مثل (Augmentin ، Amoxicillin،Cephalothin،Cefoxitine،Ciprofloxacin) ، (Ticarcillin ، Cloxacillin ، Metronidazole ، Kanamycin ، Amikacin) ، اذ استخدمت اقراص المضادات المذكورة اعلاه والمحضرة تجارياً وحسب التراكيز الموصى بها من قبل منظمة الصحة العالمية ، اجري هذا الفحص على وسط أكار مولر - هنتون في حالة الجراثيم الهوائية، بينما على وسط أكار الدم المسخن في حالة الجراثيم

دراسة عن جرثومة *Peptostreptococcus anaerobius* المعزولة من التهابات قرح الفم...
بشري علي كاطم، ياسمين حسن علي

اللاهوائية وباستخدام المرطبان اللاهوائي ، ثم حضنت جميع الاطباق بدرجة ٣٧م لمدة ١٨ ساعة ثم قيست اقطار مناطق التثبيط وقورنت مع الجداول القياسية وطبقا لما جاء في [٢٢] ، ثم سجلت النتائج بشكل جدول .

التحري عن عوامل الضراوة لجرثومة *Peptostreptococcus anaerobius*

انتخبت العزلات الجرثومية والتي شخّصت على انها تابعة للنوع *Peptostreptococcus anaerobius* للتحري عن بعضاً من عوامل ضرورتها وشملت ما يأتي :

١. التحري عن انتاج السموم المحللة لكريات الدم الحمر

Haemolysin

اجري هذا الإختبار بتلقيح العزلات الجرثومية على وسط أكار الدم المعقم ، اذ لقحت هذه الاطباق بطريقة التخطيط الرباعي ، ثم حضنت لاهوائياً في المرطبان اللاهوائي وباستخدام نظام التحضين اللاهوائي Gas pak بدرجة ٣٧م لمدة ٢٤ ساعة ، ثم قرئت النتائج وسجلت [٢٣] .

٢. التحري عن انتاج إنزيم Betalactamase :

اجري هذا الإختبار باستخدام طريقة اليود القياسية السريعة للتحري عن قابلية العزلات الجرثومية على انتاج هذا الانزيم ، وكما جاء في [٢٤] ، ثم قرئت النتائج وسجلت .

٣. التحري عن انتاج إنزيم Lipase :

درست قابلية العزلات الجرثومية على إنتاج هذا الإنزيم ، اذ زرعت هذه العزلات على وسط أكار صفار البيض (egg yolk agar) بشكل خطوط متوازية ، حضنت الاطباق بعدها لاهوائياً بدرجة ٣٧م لمدة ٢٤ ساعة ، ثم قرئت النتائج وسجلت [٢٥] .

٤. التحري عن انتاج إنزيم Protease :

اجري التحري عن إنتاج هذا الإنزيم بتلقيح العزلات الجرثومية على وسط أكار حليب الفرز المعقم Skimmed milk agar بشكل خطوط متوازية ، ثم حضنت الاطباق لاهوائياً بدرجة ٣٧م لمدة ١٨ - ٢٤ ساعة وقرئت النتائج وسجلت [٢٦] .

٥. التحري عن انتاج الكتلة الحيوية Biofilm :

اختبرت قابلية العزلات الجرثومية على انتاج التكتلات الحيوية Biofilm وذلك بتلقيح العزلات الجرثومية من انابيب حاوية على وسط مرق التريبتون والصويا Tryptone soya broth ثم حضنت هذه الانابيب لاهوائيا لمدة ٢٤ ساعة ، وبعد انتهاء فترة التحضين لوحظت تكتلات الغشاء الحيوي ولتوضيح النتيجة اكثر سكب العالق الجرثومي واذيف الى الانابيب (امل) من محلول صبغة الكريستال البنفسجية والمحضر بتركيز ١% ، ثم قرئت النتائج وسجلت [٢٧] .

النتائج والمناقشة :

جمعت (٦٠) مسحة من إصابات قرح الفراش من المرضى الراقيدين ، وحضنت العينات هوائياً ولاهوائياً لعزل الجراثيم (الهوائية واللاهوائية) المسببة لإلتهابات قرح الفراش ، ومن ثم اخضعت المزارع الجرثومية الى الفحوصات المجهرية والكيميا حيائية لغرض تشخيصها . اظهرت النتائج في حالة العزل الهوائي أن جرثومة *P.mirabilis* هي الممرض السائد حيث عزلت بنسبة (١٨,٢٩%) تليها جرثومة *S.aureus* حيث عزلت بنسبة (١٤,٦٣%) تليها الجراثيم *P.aeruginosa* و *P.vulgaris* و *E.coli* و *S.pyogenes* و *E.cloacae* و *K.pneumoniae* والتي عزلت بنسبة (١٣,٤١%) و (١٢,١٩% و ١٠,٩٧% و ٧,٣١% و ٦,١% و ٦,١%) على التوالي ، فيما تأتي الجراثيم (*S.epidermidis* و *E.faecalis* و *K.oxytoca*) بالمراتب الاخيرة وبنسبة عزل (٤,٨٧% و ٣,٧% و ٢,٤٣%) ، هذه النتائج تشير ان التهابات قرح الفراش تسببها جراثيم هوائية مختلفة ، تلك الجراثيم استطاعت بما تملكه من خصائص وعوامل إمراضية على غزو انسجة القرع والتغلغل في داخلها وإحداث الإلتهابات التي في حالة عدم علاجها وبوقت قياسي تؤدي الى فقدان النسيج وظيفته البايولوجية وحدث حالة الوفاة وهذا يتفق مع [٢٨] والجدولان (١) و (٢) يوضحان هذه النتائج ومن الجدير بالذكر أن بعض العينات أظهرت وجود أكثر من نوع واحد من الجراثيم لذا اعطيت العزلات ارقاما اضافية مما جعل عدد العزلات يرتفع من (٦٠) الى (٨٢) .

دراسة عن جرثومة *Peptostreptococcus anaerobius* المعزولة من التهابات قرح الفراش..
بشرى محلي، كاظم، ياسمين حسن محلي

جدول رقم (1) نتائج الفحوصات المجهرية والكيميائية للجراثيم المعزولة هوائيا

الفحوصات	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١
شكل خلايا تخت المجهر	كروية عصوية	عصوية	كروية	كروية	عصوية كروية	عصوية كروية	عصوية	عصوية	كروية	كروية	عصوية
تفاعلها مع صبغة كرام	-	-	+	+	-	-	-	-	+	+	+
الكتاليز	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+
اليوريز	-	-	+	+	+	+	+	+	-	+	+
الحركة	+	+	-	-	+	+	-	-	-	-	+
انتاج الاندول	+	-	+	+	+	-	-	+	-	-	-
المثيل الاحمر	+	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-
فوكس بروس كاور	-	-	+	+	-	-	+	+	+	-	+
استهلاك المسترات	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
تخمير الكلوكوز	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
تخمير اللاكتوز	+	-	-	-	-	-	+	+	+	-	+
تخمير السكرور	+	+	-	-	-	+	-	-	+	-	+
تخمير المانيتول	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-
الاوكسيديز	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-

النتيجة السالبة / - و النتيجة الموجبة / +

1. *Escherichia coli*
2. *Pseudomonas aeruginosa*
3. *Staphylococcus aureus*
4. *Staphylococcus epidermidis*
5. *Proteus vulgaris*

6. *Proteus mirabilis*
7. *Klebsiella pneumoniae*
8. *Klebsiella oxyto*
9. *Enterococcus faecalis*
10. *Streptococcus pyogenes*
11. *Enterobacter cloacae*

دراسة عن جرثومة *Peptostreptococcus anaerobius* المعزولة من التهابات قرح الفراش..
بشري حلي، كاظم، ياسمين حسن حلي

جدول رقم (2) الجراثيم المعزولة هوائيا مع النسب المئوية للعزل

النسبة المئوية	عدد العزلات	نوع الجرثومة
١٠,٩٧	٩	<i>Escherichia coli</i>
١٣,٤١	١١	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>
١٤,٦٣	١٢	<i>Staphylococcus aureus</i>
٤,٨٧	٤	<i>Staphylococcus epidermidis</i>
١٢,١٩	١٠	<i>Proteus vulgaris</i>
١٨,٢٩	١٥	<i>Proteus mirabilis</i>
٦,١	٥	<i>Klebsiella pneumoniae</i>
٢,٤٣	٢	<i>Klebsiella oxytoca</i>
٣,٧	٣	<i>Enterococcus faecalis</i>
٧,٣١	٦	<i>Streptococcus pyogenes</i>
٦,١	٥	<i>Enterobacter cloacae</i>
١٠٠	٨٢	العدد الكلي للعزلات

اما في حالة العزل اللاهوائي فقد بينت الدراسة عزل مجموعة من الجراثيم اللاهوائية ، حيث تصدرت جرثومة *P.anaerobius* المرتبة الاولى اذ عزلت بنسبة (٣٤,٧%) تلتها جرثومة *B.fragilis* والتي عزلت بنسبة (٢٤,٤٨%) ، بينما تاتي الجراثيم *C.butyricum* و *B.urealyticum* و *Fusobacterium ssp.* بنسب عزل مختلفة (٢٠,٤% و ١٠,٢% و ٦,١٢%) على التوالي ، بينما عزلت جرثومة *P.freudenreichii* بنسبة ٤,١% وهي أقل نسبة عزل تم الحصول عليها في هذه الدراسة وتشير هذه النتائج الى أن قرح الفراش من الإصابات التي تكون مسبباتها جراثيم لاهوائية لكون هذه الجراثيم تتمركز إصابات في الجزء العميق من القرع بعيداً عن تعرضها للأكسجين الجوي ولهذا نجد أن غالبية القرع في المرحلة الثالثة والرابعة والتي يقترب فيها الإلتهاب من العظم تسببها جراثيم لاهوائية ذات فوعة عالية لإحداث الإصابة وهذه النتائج تتفق مع [٢٩] بينما لا تتفق مع [٣٠] والذي عزل جرثومة *P.anaerobius* بنسبة ١٦% من قرح الفراش وقد يعود هذا الى إختلاف الموقع الجغرافي الذي اجريت فيه الدراسة والى طبيعة طرق التعقيم المستخدمة في العراق عن تلك المستخدمة في الدول الاجنبية فضلا عن إختلاف ضراوة الجراثيم تبعاً لموقع عزلها

دراسة عن جرثومة *Peptostreptococcus anaerobius* المعزولة من التهابات قرح الفراش..
بشرى علي كاطم، ياسمين حسن علي

ومكان إجراء الدراسة ، والجدولان (٣) و (٤) يوضحان تلك النتائج ومن الجدير بالذكر ان (١١) عينة لم يظهر فيها نمو في العزل اللاهوائي لهذا حسب نسبة العزل على ضوء (٤٩) عينة موجبة ظهر فيها نمو جرثومي .

جدول رقم (٣) الجراثيم المعزولة لاهوائياً مع النسب المئوية للعزل

نوع الجرثومة	عدد العزلات	النسبة المئوية للعزل
<i>Peptostreptococcus anaerobius</i>	١٧	٣٤,٧
<i>Bacteroides fragilis</i>	١٢	٢٤,٤٨
<i>Bacteroides urealyticum</i>	٥	١٠,٢
<i>Fusobacterium ssp.</i>	٣	٦,١٢
<i>Clostridium butricum</i>	١٠	٢٠,٤
<i>Propionabacterium freudenreichii</i>	٢	٤,١
العدد الكلي للعزلات	٤٩	١٠٠

جدول رقم (٤) نتائج الفحوصات المجهريّة والكيميائية للجراثيم المعزولة لاهوائياً

١	٢	٣	٤	٥	٦
الفحوصات	١	٢	٣	٤	٥
شكل خلايا تحت المجهر	خلايا مفردة كروية مع وجود أزواج	عصوية	عصوية منتظمة مع وجود خلايا غير منتظمة	عصوية غير منتظمة مع وجود أشكال خيطية	عصوية غير منتظمة لوجود السبورات الداخلية
تفاعلها مع صبغة كرام	+	-	-	-	+
الحركة	-	-	-	-	+
إنتاج السبورات	-	-	-	-	+
الكاتاليز	-	+	-	-	+
تخمير الكلوكوز	+ / حامض غاز	+ / غاز	-	+ / حامض فقط	+ / حامض / غاز
تخمير اللاكتوز	+ / حامض غاز	+ / حامض غاز	-	+ / حامض فقط	+ / حامض / غاز
تخمير السكروز	+ / حامض غاز	+ / حامض غاز	-	+ / حامض فقط	+ / حامض / غاز
إنتاج الاندول	+	-	-	-	+
اليوريز	-	-	+	-	-

النتيجة السالبة / - والنتيجة الموجبة / +

1. *Peptostreptococcus anaerobius* 4. *Fusobacterium ssp*

دراسة عن جرثومة *Peptostreptococcus anaerobius* المعزولة من التهابات قرح الفراش..
بشرى علي كاظم، ياسمين حسن علي

2. *Bacteroides fragilis*

5. *Clostridium butyricum*

3. *Bacteroides urealyticum*

6. *Propionibacterium freudenreichii*

دراسة عن جرثومة *Peptostreptococcus anaerobius* المعزولة من التهابات قرح الفراش..
بشري حلي، كاظم، ياسمين حسن حلي

أما فيما يخص إختبار الحساسية للمضادات الحيوية ، ففي حالة الجراثيم المعزولة هوائياً نلاحظ أن غالبية العزلات أظهرت حساسية للمضادات ، Cefoxitine و Ciprofloxacin وبنسبة تراوحت ما بين (٦٣,٦% الى ١٠٠%) وهذه نسبة جيدة تشير الى أن هذان المضادان يمكن استعمالها في علاج التهابات قرح الفراش وبنسبة شفاء تصل الى ٦٣,٦% وهذه النتيجة تتفق مع [٣١] ، كما نلاحظ ان المضادات Augmentin و Metronidazole كانا مناسبين لعلاج قرح الفراش ، حيث أظهرت غالبية العزلات حساسيتها لهما وبنسبة تراوحت ما بين ٦٦,٦% الى ١٠٠% ، فيما نلاحظ أن المضاد Amikacin أبدت غالبية العزلات الجرثومية حساسيتها له وبنسبة تراوحت ٢٥% الى ٦٦,٦% وهذه النتائج اتفقت مع [٣٢] ، اما المضادات Cephalexin و Amoxicilin و Kanamycin و Cloxacillin و Ticarcillin ، فقد أظهرت غالبية الجراثيم حساسية متوسطة الى ضعيفة لها مما يشير أن تلك المضادات نتيجة للاستعمال الخاطئ والعشوائي لها قد زادت من مقاومة الجراثيم المسببة لالتهابات القرع لها نتيجة لإمتلاك تلك الجراثيم القدرة على إنتاج إنزيمات تؤدي الى تحطيم التركيب الفعال للمضاد الحيائي او تغيير في نفاذية الغشاء البلازمي بالنسبة للمضاد الحيوي مما يشير الى ضرورة إجراء إختبار الحساسية للمضادات الحيوية قبل الشروع بإعطاء العلاج للمريض مما يزيد نسبة نجاح خطة العلاج وشفاء القرع وهذه النتائج تتفق مع [٣٣ ، ٣٤] ، وفيما يتعلق بنتائج إختبار الحساسية للمضادات الحيوية بالنسبة للجراثيم المعزولة لاهوائياً فقد أظهرت غالبية العزلات الجرثومية حساسيتها للمضادات Ciprofloxacin و Cefoxitine و Cephalothing وبنسبة تراوحت ما بين ٧٠% الى ١٠٠% تليها المضادات Amoxicillin و Augmentin و Amikacin وبنسبة تراوحت ما بين ١٧,٦% الى ١٠٠% ، حيث أظهرت العزلات تبايناً في حساسيتها لتلك المضادات ، فيما نلاحظ ان المضاد Metronidazole يعد من الادوية المناسبة جداً لعلاج التهابات قرح الفراش المتسببة عن جراثيم لاهوائية ، حيث أبدت غالبية العزلات حساسية له وبنسبة عالية تراوحت ما بين ٩٠% الى ١٠٠% ، فيما نجد أن العزلات التابعة لجرثومة *P.anareobius* و *B.fragilis* أظهرت مقاومة وبنسبة 100% لمضاد Ticarcillin مما يعطي إشارة واضحة الى ان تلك الجراثيم لها القدرة على مقاومة مضادات البيتا لاكمات لإمتلاكها عوامل ضراوة فضلاً عن قدرتها على تحطيم المركب الفعال في تركيب تلك

دراسة عن جرثومة *Peptostreptococcus anaerobius* المعزولة من التهابات قرح الفراش..
بشرى علي كاطم، ياسمين حسن علي

المضادات وجميع هذه النتائج قد اتفقت مع [٣٥ ، ٣٦ ، ٣٦] ، والجدول رقم (٥) و
(٦) يوضحان هذه النتائج .

الجدول رقم (٥) نتائج اختبار الحساسية للمضادات الحياتية للجراثيم المعزولة هوائياً

عدد (%) لل عزلات الحساسية للمضادات الحياتية										نوع الجرثومة
TIC *(75)	CX *(1)	MET *(10)	K *(30)	AK *(30)	AMC *(30)	AM *(30)	Cl *(30)	Ce *(30)	Cf *(5)	
(٠)٠	(٠)٠	(٧٧,٧)٧	(٥٥,٥)٥	(٦٦,٦)٦	(٨٨,٨)٨	(٢٢,٢)٢	(٣٣,٣)٣	(١٠٠)٩	(١٠٠)٩	<i>E.coli</i>
(١٨,١)٢	(١٨,١)٢	(١٠٠)١١	(٣٦,٣)٤	(٥٤,٥)٦	(١٠٠)١١	(٥٤,٥)٦	(٥٤,٥)٦	(٦٣,٦)٧	(٧٢,٧)٨	<i>P.aeruginosa</i>
(٨,٣)١	(٠)٠	(٦٦,٦)٨	(٤١,٦)٥	(٢٥)٣	(١٠٠)١٢	(١٦,٦)٢	(٦٦,٦)٨	(٦٦,٦)٨	(٧٥)٩	<i>S.aureus</i>
(٠)٠	(٥٠)٢	(١٠٠)٤	(٢٥)١	(٢٥)١	(١٠٠)٤	(٥٠)٢	(٥٠)٢	(١٠٠)٤	(١٠٠)٤	<i>S.epidermidis</i>
(١٠)١	(٢٠)٢	(٨٠)٨	(٥٠)٥	(٥٠)٥	(٩٠)٩	(٣٠)٣	(٥٠)٥	(٧٠)٧	(٨٠)٨	<i>P.vulgaris</i>
(١٣,٣)٢	(١٣,٣)٢	(86.6)١٣	(٣٣,٣)٥	(٦٦,٦)١٠	(٩٣,٣)١٤	(٣٣,٣)٥	(٨٠)١٢	(٨٠)١٢	(١٠٠)١٥	<i>P.mirabilis</i>
(٨٠)٤	(٨٠)٤	(١٠٠)٥	(٦٠)٣	(٦٠)٣	(١٠٠)٥	(٤٠)٢	(٨٠)٤	(٨٠)٤	(١٠٠)٥	<i>K.pneumoniae</i>
(٠)٠	(٥٠)١	(١٠٠)٢	(٠)٠	(٠)٠	(١٠٠)٢	(٥٠)١	(١٠٠)٢	(١٠٠)٢	(١٠٠)٢	<i>K.oxytoca</i>
(٠)٠	(٦٦,٦)٢	(١٠٠)٣	(٦٦,٦)٢	(٣٣,٣)١	(٦٦,٦)٢	(٣٣,٣)١	(٦٦,٦)٢	(٦٦,٦)٢	(٦٦,٦)٢	<i>E.faecalis</i>
(٨٣,٣)٥	(٨٣,٣)٥	(١٠٠)٦	(٦٦,٦)٤	(٦٦,٦)٤	(١٠٠)٦	(٣٣,٣)٢	(١٠٠)٦	(١٠٠)٦	(١٠٠)٦	<i>S.pyogenes</i>
(٤٠)٢	(٤٠)٢	(١٠٠)٥	(٦٠)٣	(٦٠)٣	(٨٠)٤	(٦٠)٣	(١٠٠)٥	(١٠٠)٥	(١٠٠)٥	<i>E.cloacae</i>

* تركيز المضاد مقاساً بالميكروغرام لكل قرص.

Cloxacillin / CX , Augmentin / AMC, Ciprofloxacin /Cf

Ticarcilliin/ TIC, Amikacin / AK, Cefoxitine / Ce

Kanamycin / K, Cephalixin/ Cl

Metronidazole / MET, Amoxicillin /

الجدول رقم (٦) نتائج اختبار الحساسية للمضادات الحياتية للجراثيم المعزولة لاهوائياً

عدد (%) لل عزلات الحساسية للمضادات الحياتية										نوع الجرثومة
TIC *(٧٥)	CX *(١)	MET *(٣٠)	K *(٣٠)	AK *(٣٠)	AMC *(٣٠)	AM *(٣٠)	Cl *(٣٠)	Ce *(٣٠)	Cf *(٥)	
(٠)٠	(٠)٠	(١٠٠)١٧	(٢٩,٤)٥	(٢٩,٤)٥	(٥٨,٨)١٠	(١٧,٦)٣	(١٠٠)١٧	(١٠٠)١٧	(١٠٠)١٧	<i>P.anaerobius</i>
(٠)٠	(٤١,٦)٥	(١٠٠)١٢	(٥٨,٣)٧	(٤١,٦)٥	(٧٥)٩	(٥٨,٣)٧	(٧٥)٩	(٩١,٦)١١	(١٠٠)١٢	<i>B.fragilis</i>
(٨٠)٤	(٦٠)٣	(١٠٠)٥	(٦٠)٣	(٦٠)٣	(٨٠)٤	(٦٠)٣	(١٠٠)٥	(١٠٠)٥	(١٠٠)٥	<i>B.urealyticum</i>
(٦٦,٦)٢	(٦٦,٦)٢	(١٠٠)٣	(٦٦,٦)٢	(٣٣,٣)١	(٦٦,٦)٢	(٦٦,٦)٢	(١٠٠)٣	(١٠٠)٣	(١٠٠)٣	<i>Fusobacterium ssp.</i>
(٨٠)٨	(٨٠)٨	(٩٠)٩	(٥٠)٥	(٩٠)٩	(٩٠)٩	(٧٠)٧	(٧٠)٧	(٨٠)٨	(٨٠)٨	<i>C.butyricum</i>
(١٠٠)٢	(١٠٠)٢	(١٠٠)٢	(٥٠)١	(٥٠)١	(١٠٠)٢	(١٠٠)٢	(١٠٠)٢	(١٠٠)٢	(١٠٠)٢	<i>P.freudenreichii</i>

* تركيز المضاد مقاساً بالميكروغرام لكل قرص.

Cloxacillin / CX , Augmentin / AMC, Ciprofloxacin /Cf

Ticarcilliin/ TIC, Amikacin / AK, Cefoxitine / Ce

Kanamycin / K, Cephalixin/ Cl

Metronidazole / MET, Amoxicillin / A

التحري عن عوامل الضراوة لجرثومة *P.anaerobius* .

تم التحري في هذه الدراسة عن إمتلاك جرثومة *P.anaerobius* بعضاً من عوامل الضراوة ،حيث أختبرت عزلات هذه الجرثومة حول قابليتها على إنتاج السموم المحللة لكريات الدم الحمر Haemmolysin فكانت منتجة له وبنسبة ١٧ (١٠٠ %) وهذه النتيجة تتفق مع [38]، حيث يعد عامل ضراوة مهم جداً للجرثومة إذ يحلل كريات الدم الحمر وبالتالي يساعد على الإنتشار وإحداث الإصابة مسبباً نخر وتحطم للانسجة .


كما بينت النتائج قدرة هذه الجرثومة على إنتاج إنزيم Betalactamase وبنسبة ١٧ (١٠٠ %) ، حيث يعد هذا الإنزيم مهماً جداً في ضراوة الجرثومة ومقاومتها لمضادات البيتا لاكتام ،حيث يعمل هذا الإنزيم على تحطيم حلقة البيتا لاكتام في نواة البنسلينات والسيفالوسبورينات وكسر آصرة الأمايد مما يجعل الجرثومة أكثر مقاومة لهذه المضادات علماً أن تشفير هذه الانزيمات قد يكون كروموسومياً أو بلازميدياً وهذه النتيجة تتفق مع (٨) الذي اشار انه ٩٠ % من عزلات جرثومة *P.anaerobius* منتجة لهذا الإنزيم .

كما أظهرت النتائج أن هذه الجرثومة لها القدرة على إنتاج إنزيمات محللة للانسجة بتأثيرها على المكونات الدهنية والبروتينية الموجودة في الانسجة مما يزيد من قابليتها على غزو النسيج وإحداث قرح الفراش العميقة وبالمرحلة الرابعة، حيث أكدت النتائج ان ١١ (٦٤,٧ %) من عزلات *P.anaerobius* لها قابلية إنتاج إنزيم اللايباز وأن ١٢ (٧٠,٥ %) منتجة لإنزيم البروتياز وهما إنزيمان مهمان جداً في غزو النسيج وإحداث الإصابة ، كما تساهم هذه الإنزيمات في حماية الجرثومة من دفاعات الجسم مثل الكلوبولينات المناعية عن طريق تحليلها [٣٩] ، كما بينت النتائج قدرة جرثومة *P.anaerobius* على إنتاج الغشاء الحيوي Biofilm والذي يعد من عوامل الضراوة التي تساعد الجرثومة على غزو النسيج وتحطيمه والإفلات من عمليات البلعمة ومن تأثير المضادات الحياتية والمطهرات ولاسيما الموضعية منها ، حيث كانت العزلات ١٧ (١٠٠ %) منتجة لهذا الغشاء وهذه النتيجة تتفق مع [٤٠] والجدول رقم (٧) والصور من (١-٦) توضح هذه النتائج ، مما تقدم يتبين أن جرثومة *P.anaerobius* تمتلك من عوامل الضراوة مايمكنها من إحداث التهابات قرح الفراش حيث كانت الممرض السائد من بين الجراثيم اللاهوائية المعزولة في هذه الدراسة .

دراسة عن جرثومة *Peptostreptococcus anaerobius* المعزولة من التهابات قرح الفراش..
بشري علي كاطم، ياسمين حسن علي

جدول رقم (٧) نتائج التحري عن عوامل الضراوة لجرثومة *P.anaerobius*

اسم الإختبار	النتيجة الموجبة	العزلات الموجبة عدد (%)
١. انتاج Haemolysin	ظهور مناطق شفافة من التحليل الكامل لكريات الدم الحمر حول المستعمرات	١٧ (١٠٠%)
٢- انتاج انزيم Betalactamase	تحول لون المحلول من الازرق الى الابيض خلال دقيقه من رج الانابيب	١٧ (١٠٠%)
٣- انتاج انزيم Lipase	ظهور مناطق رائقة حول المستعمرات	١١ (٦٤,٧%)
٤- انتاج انزيم Protease	ظهور مناطق رائقة حول المستعمرات	١٢ (٧٠,٥%)
5- انتاج Biofilm	ظهور تكتلات من النمو الجرثومي على جدران الانابيب	١٧ (١٠٠%)




الصورة رقم (٢) النتيجة الموجبة لاختبار الهيموليسين



الصورة رقم (١) مستعمرات *P. anaerobius*
النامية على وسط أكار الدم



الصورة (٤) النتيجة الموجبة لاختبار انتاج Biofilm



الصورة رقم (٣) اختبار البيتا لكتاميز
١- النتيجة الموجبة ٢- اختبار السيطرة

دراسة عن جرثومة *Peptostreptococcus anaerobius* المعزولة من التهابات قرح الفراش..
بشرى محلي، كاظم، ياسمين حسن محلي



الصورة رقم (٦) النتيجة الموجبة لاختبار البروتينيز



الصورة رقم (٥) النتيجة الموجبة لاختبار اللايباز

المصادر

- 1- Lozano , R . (2012) . Global and regional mortality From 235 causes of deathfor 20 age groups in 1990 and 2010 : asystematic analysis for the Global Burden Disease . Lancet , 380 (9859) : 2095 -2128 .
- 2- Vanderwee , K P Clark , M. , Dealey . C . , Gunningberg , L.and Defloor , T . (2007) . P ressure ulcer Pre Valence in Europe . J. Eval . Clinic . Practic 13 (2) : 227 -235 .
- 3- Ubaishat , A. ; Anthony , D. I. and Saleh , M. (2010). Pressure Ulcers in Jordan ; Apoint Pre Valence Study . J. Tissu . Viab . 19 (4) : 132 -136 .
- 4- Montroy , R. E. and Eltorai . I . (2003) Complications of Pressure sore Neglect . Demos . Medical Pupllishing Neglect . D. Medical Pupllishing , INC .
- 5- Thomas , D. R. ; Diebold , M.R. and Eggemeyr , L.M.(2005) . Acontyolled , Randomized and Comparative , Study of aradiant heat Bandage on the healing of 3-4 Pressure Ulcers . J.Am . Med . Dir . Assoc . 6 (1) : 46 -55 .
- 6- Bain , D.s. and Ferguson , P.M.(2002). Remote Monitoring of Sitting behavior of People with Spinal Cold injury . J. Rehabil . Res . Dev . 39 (4) : 513-520 .
- 7- Raahave , D.: Friis , M. A. : Thiis , K.J.and Rasmussen , L. B. (2002) . The infective dose of aerobic and anaerobic Bacteria in postoperative wound sepsis . J. Arch . Surg . 121 : 924-929 .
- 8- Aldridage , K. E. and Armstronge , K.C. (2003) . Anaerobes in PolymicrobiSurgical infections : incidence , Pathogenecity And Anti mivrobial res :stance . Eur . J . Surg , 2(4): 573-580 .
- 9- Ryan , K . J . and Ray , C. G . (2004) . Systematic , Medical Miorbiology . 4 th . ed . Me Grouw Ltill .
- 10- Hibaki , S., K . Tagawa , T. , Kagoura , M. , Moro ha shi , M. and Yamagi shi , T . (2000) . Character ization of Peptostreptococcus Species in Skin infections . J. Int , Med , Res . 28 (3) : 143 -147.
- 11- Melvin , L. S. (2000) . Studies on the Anaerobic Strep to cocci , Certain biochemical and immunological Properities of Anaerobic Strepto cocci . J. Bacteriol . 39 (5) :559 -570

دراسة عن جرثومة *Peptostreptococcus anaerobius* المعزولة من التهابات قرح الفراش..
بشري محلي، كاظم، ياسمين حسن محلي

- 12- Arak , H. : Kuriyama , T. , Naka gawa , K. and Kara ssaea , T. (2004) . The microbial Synergy of Pepto Strep to coccus and Prevotella intermedia in aurine abscess model , oral . Microbiol . Immunol . 19 (3): 177-181 .
- 13- White , E. (2003) . Source of pnerperal infections with anaerobic Streptococci . J. Obstet . Gynaecol . Brit , Empire : 40 (630 -632).
- 14- Colebrook , L . and Hard , R . (2002) . Anaerobic Streptococci associated with puerperal ferer , J. Obstet . Gynaecol Brit . Empire : 25 (609 - 629).
- 15- Montejo , M . : Ruiz , G. , Amutio , E. and Hernandez , J . L . (2000) . Prosthetic Valve endo Carditis Caused by Pepto strepto coccus anaerobius . Clin . Infect . Dis . 20: 1431-1436 .
- 16- Vander , K. A. J . and Bakker , D. J . (2000) . Soft Tissue in fections including Clostridial Myonecrosis : Diagnosis and Treatrnt in Hand book of hyper baric Uedicine . Springer Verlag , K , G. , Berlin , Germany .
- 17- Murray , E . : Anderson , D . and Abba , I . (2003) . Manual of Clinical Microbiologh . . 8th ed . Washington D C : ASM Press. .
- 18- Helen , E. M. : Morello , J . A. and Paul , A. G . (2006) . Laboratory Manual and work book in Microbiology , Application To patient care . 8 th ed . The MC Grae Hill Company . P. 224 .
- 19- Chernecky , C.C. and Berger , B. J. (2008) . Laboratory Tests and Diagnostic Procedure . 5 th . ed . St . Liuis : Saunders .
- 20- Fischbach , F . T . and Dunning , M . B . (2009 n) . Manual of Laboratory and Diagroctic Tests . 8 th . ed . Philadel phia : Lippin cott Williams and wilkins
- 21- Pagana , K . D . and Pagana , T. J . (2010) . Mosby 's Manual of Diagnostic and Laboratory tests . 4 th . ed . St . Iouis : Mosby Elseerie .
- 22- NCCLS . , (2004) . Performance Stardards For antimicrobial Susceptibility Testirg 40 th informational Supplement , M 100 – S14 . Wayne , PA.
- 23- Hamando , M.M. and Farg , D. N. (2010) . The effect of aqueous and Alcoholic Extracts of Punica Granata . L. Pericarp on Hemo;ysin Production of Several Bacter : al Species . J . Science . 1 (7) : 309 -316 .
- 24- Chanal , C. : Bonnt , R . : Champs , C. D. : Sirot , D. : Labia , R . and Sirot , J . (2000) . Prevalence of Bata – Lactamase among 1 , 072 Clinical Strains of Proteus mirabilis : a 2year , Survey in afrench Hospital . Ant. Micro , Agent , Chemo . Therap . , 44 (7), 1930 -1935 .
- 25- Isenberg , H. D. (2004) . Essential Procedures for clinical microbiology 2 nd ed . Wa Shing tone , DC : ASM Press .
- 26- Forbes , B . A . : Sabm D. E . and Weissfeld , A. S . (2002) . Baily and Scott's Diagroctic Microbiology , 11 th ed . St. Louis : Mosby .
- 27- Percival , S. L. : Walker , H. T. and Hunter , P.R. (2000). Microbiological aspects of Biofilms and Drinking water . Baca Raton , Fl : CRC press .
- 28- Edwards , D. J . and Elvans , D. G. (2000) . colonization Factor antigens of human Pathogenes , Curr . Top . Micvobiol . Immunol 151 (2) : 129 -133.

دراسة عن جرثومة *Peptostreptococcus anaerobius* المعزولة من التهابات قرح الفراش..
بشري محلي، كاظم، ياسمين حسن محلي

- 29- Greif , R . ; Akca , O. , Horn , E. p . ; Kurz , A. and Sessler , D. I . (2000) . Supplemented Perioperative Oxygen to reduce the incidence of Surgical Wound in Fectian S . N. Eng l . J . Med . 342 : 161 – 167 .
- 30- Hambraeus , A . : Bengtsson , S. and Grurell , L . (2000) . Anaerobic Bacteria Causing Wound infections after Surgery in amodern operating Suite . Cl . Bacterio . epidemio . Finding . J . Hyg. Cam . 83 : 41 – 56 .
- 31- Ameri car Famoly Physician (Report) . (2012) . Pressure Ullcers : Preretion , Evaluation and management . 7 th Rep . P (210- 225)
- 32- Niezgoda , J . A . and Mendez , E. S. (2006) . The effective managements of Pressure Ulcers . Adv . Skin Wound Care . 19 (1) : (3-15)
- 33- Guy , H . (2004) . Preventing Pressure Ulcers Choosing amatress . Professional Nurse : 20 (4) : 43 -46 .
- 34- Baker , P. G. and Haig , G. (2001) . Methonidazole in the Freatment of Chronic Pressure Sores and Wcerces . J . M. Microbiol 225 : 569 -573 .
- 35- Brook , I . (2007) . Treatment of anaerobic infection . Expert . Rev . Ant , Infect . Ther . 5 : (991 -1006) .
- 36- Kaley , Z . M ; Zebad , G . M . and Tang , A . T . (2006) . Susceptibility of anaerobic Bacteria to beta Lactam antibiotic and Beta Lactamasa Production . J . Med . Microbiol . Ther . 5 (7) : 301-311 .
- 37- Vander , K . A . J . and Bakker , D. J. (2000) . Soft Hssue infections inclnding Clostridial myo necrosis : diagnoses and Treatment in Hard book of hyperbaric Medicine , Springer Ver lag , K. G. Berlin , Germany
- 38- Osek , J . (2003) . Derection of enterog gregativeE .cali geat Stable enterotoxin gene and its relationshio with fimbrial and enterotoxin markers in E , coli isolated From pigs with diarrhea . Vet . Microbio 91(1) : 65 – 72 .
- 39- Omran , R . (2005) . The virnlence factors of P . aeruginosa isolated froeye in fections . J. Kav . Microbiol . 3 : 143-155 .
- 40- Matt , M . and Abdul , N. (2014) . Next Science Wound Gel Technology , Anovel agent that inhibit Biofilm developed by Gram Positive and Gram negative Wound pathogenesis . J. Antimicrob , Aagent , Chem . Therap . 58 (6) : 3060 -3072

Study on *Peptostreptococcus anaerobius* bacterium ISolated from Bed Sores Infections

Bushra Ali Kadhim*

Yasameen Hassan Ali*

*** University of Baghdad / College of Nursing**

Summary

Sixty swabs Were Collected from inpatients with bed sores infection , The bacterium *Peptostreptococcus anaerobius* was isolated from these infection at Percentage (34.7%) , as well as, others bacteria which isolated aerobically and anaerobically Such as *Escherichia coli* , *Pseudomonas aeruginosa* and *Bacteroides fragilis* . The bacteria which isolated aerobically and anaerobically showed clearing differences in their Susceptibility to antibiotics , So the antibiotics Metronidazole , Ciprofloxacin , Cefoxitine and Augmentin were the best antibiotics to treat the bed sores infection , So their Susceptibility to them were between (66.6 % to 100 %) in percentage . The results of Screening on virulence factors of *Peptostreptococcus anaerobius* Confirmed that the Bacterial isolates showed the positive results of haemolysin , Betalactamase , Lipase , Protease and the production of biofilm with Percentage (100%, 100 % , 64 .7 % , 70.5% and 100%) respectively.

Key words : bed sores , *Peptostreptococcus*