الفيروسي نوعي B C ضمن المتبرعين بالدم

2009 2008.

. سعد سلمان هميم

قسم علوم الحياة - كلية العلوم -

:

هدفت الدراسة الحالية إلي تحديد النسب المئوية للتبرع بالدم في العراق والكشف عن الإصابة بالتهابي الكبد الفيروسي نوعي B C ضمن المتبرعين بالدم للأعوام 2008 2009.

شملت الدراسة الحالية 871973 متبرعا بالدم والذين راجعوا مراكز نقل الدم الرئيسية في عموم 2008 2009 حيث خضعوا للكشف عن التهابي الكبد الفيروسي

B C باستخدام تقنية المعايرة الامتصاصية المرتبطة بالأنزيم ELISA.

أظهرت النتائج نسا مئوية للتبرع بالدم بلغت (1.389%) (1.423%) 2008

2009 . سجلت محافظة البصرة اعلي نسبة من المتبرعين بالدم بـ

53653 (2.128%) , فيما كان لمحافظة صلاح الدين أقل نسبة من المتبرعين بـ 7950

من المتبرعين بـ 2009 (0.655 %).

152477 (2.208%) وكان لمحافظة أربيل أقل نسبة للتبرع بـ 21342

(0.139%).

أظهرت نتائج الكشف المصلي للمتبرعين بالدم لعامي 2008 2009 6787

موجبا لالتهاب الكبد الفيروسي نوع B وبنسبة مئوية بلغت (0.778%) ع المتبرعين

بالدم في عموم محافظات القطر في حين كان مجموع الكشوفات الموجبة لالتهاب الكبد

الفيروسى نوع C 3254 إصابة وبنسبة مئوية بلغت (0.373%) وبنسبة إصابة كلية للفيروسين بلغت 68.45% 31.55% للعامين على التوالي ($p < 0.01$).

2008 أظهرت محافظتي دهوك والنجف أعلى نسبة مئوية للمصابين بالتهاب الكبد الفيروسى نوعى HBV HCV وبنسب مئوية بلغت (3.538%) (2.201%). وسجلت محافظتي الديوانية وصلاح الدين أقل نسبة مئوية للمصابين بكلا النوعين من الفيروسات وبنسب مئوية بلغ 0.264% 0.025%. 2009 فقد كان لمحافظة الأنبار وكركوك أعلى نسب للمصابين بـ HBV HCV 3.194% 1.765%. في حين كان لمحافظة ذي قار وصلاح الدين أقل الحصص من المصابين بالمرضى وبنسب بلغت 0.220% 0.034% ($p < 0.001$). قد تستنتج الدراسة الحالية أن هناك نسبة مقبولة من التبرع بالدم في العراق 2008 2009 , وأن التهاب الكبد الفيروسى النوع B

C ضمن المتبرعين بالدم في عموم محافظات العراق مما يؤكد أهمية إجراء الفحوصات المصلية للمتبرعين بالدم من جهة , وأهمية السيطرة على انتشار هذين المرضين الخطيرين من

:
التهاب الكبد الفيروسى Hepatitis هو مرض يصيب الكبد ويتسبب بواسطة عدة فيروسات تعود لـ Hepadnaviridae Flaviviridae , وقد تم لحد الآن تشخيص ثمانية أنواع من هذه الفيروسات المسببة لهذا المرض وهي أنواع A B C D E F G TT . بأن أكثر الأنواع شيوعاً على مستوى العالم هما نوعى B C (Fejza and Telaku, 2009). ويلاحظ أن كلا من الفيروس B (HBV) لفيروس C (HCV) ينتشران بصورة أساسية عبر الدم الملوث أو منتجاته أو الإبر الملوثة أو الاتصال الجنسي (Rikabi et al., 2009).

تؤدي الإصابة بالتهاب الكبد الفيروسى نوع B (HBV) في مرحلة مبكرة من العمر إلى تزايد خطر الإصابة بالعدوى المزمنة حيث يمكن أن يتعرض الم

تشتمع الكبد وسرطان الكبد الأولي ، ويتشابه احتمال تطور المرض إلي عدوي مزمنة سواء . ويقدر عدد المصابين بفيروس الالتهاب الكبدي

B 2000 مليون شخص علي مستوي العالم منهم 350 مليون مصاب بالعدو (WHO, 2009).

تعد الإصابة بالتهاب الكبد الفيروسي نوع C (HCV) من المشكلات الصحية ذات النطاق الواسع علي مستوي العالم حيث قدرت منظمة الصحة العالمية WHO إصابة ما يزيد علي ثلث سكان العالم بهذا الفيروس (WHO, 2003). في واقع الحال فان الإصابة بفيروس (HCV) من أهم الأسباب التي أدت إلي انتشار الاهتمام بعمليات زراعة الكبد علي مستوي العالم (Kalil et al., 2010). وقد لوحظ إن التعرض للدم المصاب نتيجة لاستخدام أدوات الحقن الغير معقمة أو نقل مشتقات دم المصابين تسبب نحو مليوني إصابة بفيروس الالتهاب الكبدي نو C سنويا ، وان تعاطي المخدرات بالحقن يمثل اكبر معدلات الإصابة بالتهاب الكبدي نوع C وقد وجد إن معدلات انتشاره لدى الأشخاص اللذين يبلغون عن ممارستهم لهذا السلوك تتراوح بين 30% - 60% (WHO, 2009).

هدفت الدراسة الحالية إلي تحديد النسب المئوية للمتبرعين

الفيروس نوعي B C ضمن المتبرعين بالدم للأعوام 2008 2009.

:

شملت الدراسة الحالية 871973 متبرعا بالدم واللذين راجعوا مراكز نقل الدم الرئيسية في عموم

2008 2009 . يت 10 مل من كل عينة دم للمتبرعين إلي

أنابيب اختبار معقمة وتترك بدرجة حرارة الغرفة لمدة 30 دقيقة وبعدها يتم عزل المصل باستخدا

(Centrifuge) 1500 / دقيقة ولمدة 5 .

20 C° - لحين الاستخدام.

Created with

nitroPDF professional

download the free trial online at nitropdf.com/professional

تم الكشف عن التهاب الكبد الفيروسي النوع B باستخدام تقنية ELISA عن طريق الكشف عن المستضد السطحي للفيروس (HBsAg) لأمصال المتبرعين بالدم وحسب تعليمات الشركة . وقد استخدمت نفس التقنية في الكشف عن التهاب الكبد الفيروسي النوع C وعن طريق لمضادة لفيروس HCV في أمصال المتبرعين بالدم وحسب تعليمات الشركة (Biokit, Spain).

, بعدها حللت النتائج إحصائيا باستخدام مربع كاي وعند مستويات معنوية $p < 0.05$ (Al-Rawi and Khalafallah, 1989) $p < 0.01$.

:

أظهرت نتائج الدراسة المسحية للمتبرعين بالدم في العراق نسبة مئوية بلغت (1.389%) (1.423%) 2008 2009 , ولم يظهر إحصائيا وجود فرق معنوي بين نسب المتبرعين بالدم في هذين العامين . 2008 بلغ العدد الكلي للمتبرعين 388985 متبرع، وسجلت محافظة البصرة أعلى نسبة من المتبرعين بالدم بـ 53653 (2.128%) تلتها محافظات النجف وبغداد ودهوك وينسب مئوية 1.867% 1.857% 1.822% . في حين كان لمحافظة صلاح الدين أقل عدد من لمتبرعين بالدم وبلغ 7950 متبرع وبنسبة مئوية (0.655%) ولم يظهر إحصائيا وجود أية فروق معنوية بين نسب التبرع بالدم في عموم محافظات القطر خلال هذا العام (1).

المتبرعين بالدم للعام 2009 482988 (1.423%).

(1) فقد أظهرت النتائج زيادة ملحوظة في عدد المتبرعين في العاصمة بغداد وبـ

152477 (2.208%) تلتها محافظات البصرة والنجف ودهوك وينسب مئوية للتبرع

1.987% 1.886% 1.764% . في حين سجل أقل عدد من المتبرعين

لهذا العام في محافظة أربيل و بـ 21342 (0.139%) . 2008

فلم يظهر إحصائياً وجود فرق معنوي بين نسب المتبرعين بالدم خلال هذا العام أو بين عموم المتبرعين خلال عامي 2008 2009 .

إن عملية نقل الدم تعتبر من العوامل الهامة التي تسهم في إنقاذ حياة الكثير من المرضى في

العناية الصحية. وقد صادقت كل الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية في

1975 2005 علي ضرورة أن تلتزم هذه الدول بإمداد كميات كافية وآمنة من

الدم أو منتجاته بصورة سهلة الوصول إلي المرضى إما لإنقاذ حياتهم أو لتحسين وضعهم

. (WHO, 2010)

سلامة الدم أو منتجاته من المتبرعين أصبحت ذات أهمية طبية كبيرة خاصة أن انتشار

Created with

nitroPDF professional

download the free trial online at nitropdf.com/professional

Transfusion-Transmitted)

HIV/AIDS

Infections (TTI

الفيروسي (وبالأخص النوعين B C) إضافة إلي جراثيم السفلس، وقد قدرت منظمة الصحة

العالمية أن ما بين 5 - 10 % HIV

(WHO, 2002). وبما أن المتبرعين بالدم قد يكونون عرضة للإصابة أو الحمل لأيا

من هذه الممرضات التي قد تصيب جميع الأعمار فان عملية المسح المختبري لها تكتسب أهمية صحية عامة كبيرة (Dirisu et al., 2011).

يوضح الجدول (1) 2008 2009 6787

الفيروسي نوع B وبنسبة مئوية بلغت (0.778%) من مجموع المتبرعين بالدم في عموم

محافظات القطر في حين كان مجموع عدد المصابين بالتهاب الكبد الفيروسي نوع C 3254

إصابة وبنسبة مئوية بلغت (0.373%). وقد أظهرت نتائج التحليل الإحصائي فروقا معنوية بين

أعداد المصابين بفيروسي HBV HCV خلال العامين المشمولين بالدراسة ($p < 0.01$).

(1): عدد المصابين بالتهاب الكبد الفيروسي نوعي B C 2008

.2009

	2009	2008	
6787	3226	3561	Hepatitis B
3254	1613	1641	Hepatitis C
10047	4839	5202	

$P < 0.01$

لكل شخصين في العالم يحتاج أحدهما لعملية نقل الدم علي الأقل لمرة واحدة خلال حياته.

علما بأن هناك حالات سريرية تكون فيها عملية نقل الدم ضرورية جدا ومن أهمها الجراحة

Created with

nitroPDF professional

download the free trial online at nitropdf.com/professional

والرضوض وسرطان الدم وفقر الدم الحاد و تعقيدات الحمل , والحالتين الأخيرتين هما الأكثر (WHO, 2004).
شارا في البلدان النامية

إن المصابين بالتهابي الكبد الفيروسي نوعي B C والحاملين لهما هما مصادر العدوي الوحيدة
للمرضين علما بأن انتشار الإصابة بـ HBV 0.1% - 20% مع ارتفاع كبير
لهذه النسب في المناطق الاستوائية.
HCV

(Mahoney,1999 ; David et al., 2004 ; Fezja and

Telaku, 2009)

إن فايروس HBV يصنف كأحد فيروسات DNA ويعود لعائلة Hepadnaviridae
(Pungpapong et al., 2007). علما بأن هذا الفيروس

يعد أكثر انتشارا من فايروس HIV بما يقدر بـ 50 - 100 وبعشرة أضعاف انتشار الفيروس
HCV ومعظم حامله يكونون بدون أعراض الإصابة حتى سمي بالقاتل الصامت Silent killer
HBV تكفي لإحداث الإصابة تكون قلي (Samuel et al., 2004).

بحيث أن عدة عوامل من هذه الفيروسات ملتصقة بفرشاة أسنان أو شفرة حلاقة تكون كافية
(Chang, 2008). علما بأن هذا الفيروس قد عثر عليه في الخلايا وحيدة النواة و

أنسجة كلا من البنكرياس والطحال والكلي والجلد , كما ثبت وجوده في سوائل الجسم المختل
كاللعاب والسائل المنوي والعرق والحليب و الدموع و الإدرار والافرازات المهبلية (Chen et al.,
2009).

أما فايروس HCV فهو أحد فيروسات RNA ويعود لعائلة Flaviviridae
للشبانزي إضافة للإنسان كنوعين وحيدتين قابلين للإصابة ويقدر عدد المصابين بهذا الفيروس
170 مليون مصاب حول العالم (Liu and Hou, 2006; Sahajian et al., 2007).

Human

أصبح من الواضح الآن أن فيروسات HCV

Created with

nitroPDF professional

download the free trial online at nitropdf.com/professional

carcinogen حيث تبين أن الإصابة المزمنة لهذا الفيروس تسبب أورام سرطانية للكبد
Hepatocellular carcinogen (NTP, 2003).

2008 شهدت محافظتي دهوك والنجم الأشرف أعلى نسبة مئوية للمصابين بالتهابي
الكبد الفيروسي HBV HCV وينسب مئوية بلغت 3.538% 2.201%
المتبرعين بالدم علي التوالي ، في حين سجلت محافظتي الديوانية و صلاح الدين أقل نسبة
وية للمصابين بكلا النوعين من الفيروسات وبلغت 0.264% 0.025% HBV HCV
(2) . أما انتشار الإصابة الفيروسية بين المتبرعين بالدم في عام 2009
فقد شهدت تغيرا جغرافيا واضحا حيث سجلت محافظتي الأنبار وكركوك أعلى نسب للمصابين
HBV HCV 3.194% 1.765% . في حين كان لمحافظة ذي قار
وصلاح الدين أقل الحصص من المصابين بالمرضين وبنسب بلغت 0.220% 0.034%
HBV HCV (3) . بصورة عامة أظهرت النتائج فروقا معنوية كبيرة بين
انتشار الإصابة بنوعي الفيرو (p<0.001).

أجريت العديد من الدراسات المحلية حول انتشار فيروسات التهاب الكبد الفيروسي ،
ولكنها اقتصرت علي محافظات أو مناطق معينة مثل دراسة (Al-Hilli, 2000)
نسبة مئوية للإصابة بـ HBV 1.59% من مجموع المتبرعين .
أظهرت هذه النتائج نسبا أقل للإصابة بـ HBV التي أظهرتها الدراسة الحالية (3 4)
.

(Al-Saaedi, 2001) في دراسته في محافظة الديوانية لـ HBV HCV
1% 0.45% . وهي كذلك أقل مما سجلته الدراسة الحالية.
(Abdul-Kareem et al., 2001) أظهرت نسبا مئوية لـ HBV
HCV 0.66% 0.34% . وكانت هذه النسب مقارنة لانتشار الإصابة بـ
HBV في الدراسة الحالية، وعلي الـ HCV
2008 (2.201%) 2009 (1.705%) .

References:

- Abdul-Kareem, A ; Salman, A ; Addose, H ; Salih, AM and Al-Khaldi. (2001). Seroprevalence of HBcAg and Anti-HCV positive blood donors, Najaf Governorate, Iraq. J. Comm. Med.; 14(1): 29-33.

- Al-Hilli, JM. (2000). Prevalence of serological markers of HBV and HCV among blood donors and certain risk groups in Baghdad. J. Fac. Med. Bag.; 40(1).
- Chang, MH. (2008). Hepatitis B virus infection. Foetal. Neon. Med.; 12: 160-167.
- Chen, L ; Liu, F ; Fan, X ; Gao, J ; Chen, N ; Wong, T ; Wu, J and Wen, SW. (2009).Detection of hepatitis B surface antigen, hepatitis B core antigen and hepatitis B virus DNA in parotid tissues. Int. J. Infect. Dis.; 13: 20-23.
- David P, Charles G, David M and Gray JA. (:2004). Oxford handbook of public health practice. Oxford press. Chapter 1.2.
- Dirisu, JO ; Alli, TO ; Adegoke, AO and Osazuwa, F. (2011). A Survey of prevalence of serum antibodies to human immunodeficiency deficiency virus (HIV), hepatitis B virus (HBV) and hepatitis C virus (HCV) among blood donors. North. Am. J. Med. Sci.; 3(1): 35-38.
- Fejza, H and Telaku, S. (2009). Prevalence of HBV and HCV among blood donors in Kosovo. Virology J.; 6(21): 1-5.
- Kalil, KA ; Fargally, HS ; Hassanein, KM ; Abd-Elseyed, AA and Hassanein, FE. (2011). Hepatitis C virus infection among paediatric patients attending University of Assiut Hospital, Egypt. East. Med. Health J.; 6(4): 356-361.
- Liu Z, Hou, J. (2006). Hepatitis B virus (HBV) and Hepatitis C virus (HCV) dual infection. Int. J. Med. Sci.; 3: 57-62.
- Mahoney, FJ. (1999). Update on Diagnosis, Management, and Prevention of Hepatitis B Virus Infection Clinical Microbiology Review.; 12(2):351-366.
- NTP. (2003). Report on Carcinogens Background Document for Hepatitis C. National Toxicology Program. <http://ntp-server.niehs.nih.gov>.

-Pungpapong, S, Kim, WR and Poterucha, JJ. (2007). Natural History of Hepatitis B Virus Infection: An Update for Clinicians. Mayo Clin. Proced.; 82: 967-975.

-7-

- Al-Rawi KM and Khalafallah AM. (1989). Design and analysis of Agricultural Experiment. Al-Mousal University press. Iraq.

- Rikabi, A ; Bener, A ; Al-Marri A and Al-Thani, S. (2009). Hepatitis B and C viral infections in chronic liver disease: a population based study in Qatar. East. Med. Health J.; 15(4): 778-784.

-Al-Saaedi, AA. (2001). A seroepidemiological survey on hepatitis B surface antigen (HBsAg) and antibodies to hepatitis C virus (anti-HCV) in Al-Qadisiya governorate. M.Sc. thesis. College of medicine. University of Kufa.

- Sahajian, F ; Venhems, P ; Bailly, F ; Fabry, J ; Trepo, C and Sepatjam, M. (2007). Screening campaign of Hepatitis C among underprivileged people consulting in health centers of Lyon area, France. Eur. J. Pub. Health; 17: 263-271.

- Samuel, D ; Muller, R and Alexander, G. (2004). Educational Research, National Hepatitis B Virus Programme. Infect. Dis.; 234: 221-332.

-WHO/BCT/02.03.(2002). Blood safety. Available from: www.who.int/bct.

-WHO/CDS/CSR/LYO/(2003). Hepatitis C. Available from: <http://www.who.int>.

-WHO. (2004). Blood Transfusion Safety. Department of Essential Health Technologies. Available from: URL: <http://www.who.int/eh>.

Created with

nitro^{PDF} professional

download the free trial online at nitropdf.com/professional

-WHO. (2009). Viral Hepatitis. A62/22. World Health Organization. WHO press. Geneva.

-WHO. (2010). Screening Donated Blood for Transfusion- Transmissible Infections. World Health Organization. WHO press. Geneva.

Seroprevalence of Hepatitis B and C among blood voluntaries in Iraq for 2008 and 2009

Dr. Saad S. Hamim

Biology Department-Science College-Thi-Qar university-Thi-Qar-Iraq

Abstract:

The aim of the present study was to determine the percentages of blood voluntaries in Iraq and detect the infection of Hepatitis B and C among them during 2008 and 2009.

A total of 871973 blood voluntaries were enrolled in the present study, whom consulted the main blood transfusion units in Iraq and

subjected to the detection of Hepatitis A and B tests by ELISA technique.

The results showed a blood voluntary percentages of (1.389%) and (1.423%) for 2008 and 2009 years, respectively. In 2008, Basrah province showed a highly blood voluntary percentage with 53563 voluntary (2.128%), while Salah-Al-Deen province had the lowest percentage with 7590 voluntary (0.655%). In 2009 Baghdad province recorded the highest blood voluntary percentage with 152477 voluntary (2.208%), while Arbeel province showed the lowest ones with 21342 voluntary (0.139%).

The results of serological assays for blood voluntaries for 2008 and 2009 years showed that 6787 of them were positive for Hepatitis B

Created with

nitro^{PDF} professional

download the free trial online at nitropdf.com/professional

with a percentage of (0.778%) from the total blood voluntaries in all Iraq provinces, while the total positive tests for Hepatitis C were 3254 with a percentage of (0.373%), with a total percentages of 68.45% and 31.55% for the two years respectively ($p < 0.01$).

In 2008, Duhook and Al-Najaf Al-Ashraf provinces showed the highest percentages of HBV and HCV with a percentages of (3.538%) and (2.201%), respectively. Al-Dewaniah and Salah-Al-Deen provinces recorded the lowest percentages for both types of viruses with a percentages of (0.264%) and (0.025%), respectively. In 2009, Al-Anbar and Karkuk provinces showed the highest percentages of HBV and HCV with a percentages of (3.194%) and (1.765%), respectively. While Thi-Qar and Salah-Al-Deen provinces had the lowest percentages for both diseases with a percentages of (0.220%) and (0.034%), respectively.

The present study may conclude that there were an acceptable percentages of blood voluntary in Iraq, and Hepatitis B was more prevalence than Hepatitis C among blood voluntaries, which indicates the importance of such serological assays for blood voluntaries on one hand and the control processes for these two dangerous diseases on the other hand.