

دراسة واقعية بيئية مناخية ومورفولوجية لأهوار الوسطى الجنوبية الشرقية الغربية في محافظة ميسان

المهندس الزراعي الاقدم
مهدي حنون نويظ
وزارة الزراعة – مديرية زراعة ميسان

الملخص

توصف الاهوار الوسطى الجنوبية الشرقية الغربية بأنها من المناطق البيئية المهمة ذات الصفات المتفردة بالسيادة المناخية بما تحتوي من المياه العذبة ، تمتاز هذه الدراسة البيئية المتواجدة حالياً بتقييم الوضع المورفولوجي لأراضي اهوار الوسطى الجنوبية الشرقية الغربية والبيئي والمناخي ، من خلال إجراء بعض تحليلات خصائص التربة الأولية لوحظ ازدياد كاربونات الكالسيوم وتركيز المادة العضوية وقيمة التوصيل كهربائي وانخفاض قيمة (PH) التربة ، دراسة تغيرات بعض مؤشرات نوعية المياه في مواقع مختلفة. اشارت هذه الدراسة الى الوضع البيئي المتردي بسبب عمليات التجفيف والى الوضع المورفولوجي للأهوار .

المقدمة

تنتشر في جنوب العراق من محافظة ميسان كثير من المسطحات المائية التي ينبت فيها القصب والبردي ويمكن ان ينطبق عليها مفهوم (الاهوار) ، لكن هذه الوقفة جاءت بالدرجة الاولى للأهوار في جنوب العراق بأقسامها الثلاث الرئيسية ، الاهوار الوسطى ، هور الحمار ، والاهوار الشرقية . وذلك نظراً لاتساع الرقعة الجغرافية التي تشكلها تلك الاهوار، اضافة الى ما تتمتع به من اهمية تاريخية ونموذج لازال حتى وقت قريب يحتفظ بشي من نمط الحياة القديمة للشعوب التي مرت في تلك المنطقة على مدى تاريخها الطويل . الاهوار الوسطى " الاهوار المركزية " هي المثلث الواقع داخل الاراضي العراقية بين المحافظات الجنوبية الثلاثة (ميسان ، ذي قار ، البصرة) ، ومن اهم مناطقها الصحين ، الجدي ، السنية ، الشطانية ، العكر ، الطار ، الصكيل ، ابو الزور ، قرية ام الشويج ، زجري . تمثل الاهوار الوسطى العمق الاساسي للأهوار ، فيها تتركز الكثافة السكانية حيث في تلك المنطقة يقع ثقل التنوع البيولوجي المورفولوجي لأهوار العراق ، تأخذ هذه المنطقة مياهها بشكل اساس من الانهر المتفرعة عن نهر دجلة ، الاهوار الشرقية هي اهوار شرق دجلة الممتدة من شمال شرق محافظة ميسان نزولا الى قضاء القرنة ، وهي اهوار ملاصقة للجانب الايراني ومنها هور الحويضة الذي يغطي المساحة الواقعة شرق نهر دجلة ضمن الاراضي العراقية وتبدأ من منطقة الشيب / العمارة شمالاً وحتى السويب / البصرة جنوباً. المساحة الاجمالية للأهوار الشرقية (٦٠٠، ١٢٢٠) دونم تشمل (ناحية العزيز ، قضاء قلعة صالح ، ناحية بني هاشم ، ناحية المشرح) المساحة الاجمالية للأهوار الغربية (٤١٧، ١٠٩) دونم تشمل (ناحية العدل ، ناحية الخير ، ناحية السلام ، ناحية الميمونة) . ان المصادر المائية الاكبر لهذه الاهوار تأتي من فروع نهر دجلة الشرقية في محافظة ميسان ، وكميات اخرى تأتي من نهر الكرخة في الاراضي

الايروانية .بالمجمل العام ان المساحة التي تتمدد فيها الاهوار الثلاثة الاساسية جنوب العراق تكاد تكون مساحة واحدة وان تخللتها مسافات من اليابسة او بعض السدود المصطنعة التي فرضتها اما ضرورات العيش او طغيان السياسة وجبروت الدكتاتورية .ام الاهوار رقعة جغرافية تمسك بأطرافها استقرار البيئة الطبيعية للمنطقة وتمتد جذورها الى عمق التاريخ حتى العقود الاخيرة من القرن العشرين فان مساحة الاهوار الملاصقة لبعضها تؤكد ذلك . تلك الاهوار هي الوريث الطبيعي من ملامح العيش في الحضارات القديمة لبلاد ما بين النهرين ، انها قديمة قدم الزمان والانسان ، وبقيت حتى العقود الاخيرة تحافظ على جزء كبير من موروثها القديم من العادات والتقاليد وطريقة العيش .تعد مناطق الاهوار الجنوبية في العراق من اكثر الأقاليم البيئية ثراء فرغم التخلف والإهمال المتعمد لهذه المنطقة ثقافيا ، واجتماعيا، وصناعيا تمتاز اهوار الجنوب والمناطق المحيطة بها بتوفر المياه وصلاحيات المناخ لزراعة المحاصيل (١٩٩٤ ، الاقتصادية والخضر)المياح وتعتبر الاهوار البيئة الطبيعية لمعيشة الجاموس الذي لا يتيسر له العيش في غير هذه المناطق حتى إن المنطقة قبل الثمانينات كانت تضم عشرات الآلاف من هذه الحيوانات . إلا انها تضررت كثيرا بسبب عملية تجفيف الاهوار (٦) . وتعد الأسماك من أهم عناصر الثروة الحيوانية في منطقة الاهوار وتتمتاز بتعدد انواعها ووفرتها كما وتعتبر مصدر الدخل لكثير من الصيادين الذين يسكنون المنطقة (٥) . تعتبر مناطق الاهوار جنوب العراق أهم البيئات لتكاثر الطيور وسكنها وهجرتها من مناطق العالم المختلفة كالمناطق الباردة مثل سيبيريا وشمال أوربا خصوصا في أيام الشتاء والربيع وتضم الطيور في اهوار العراق أهم الفصائل النادرة من هذه الثروة العظيمة حسين.(١٩٩٤) إضافة إلى ما تقدم فان اهوار الجنوب تحتوي على ثروة البردي والجولان والقصب التي كانت تستعمل لصناعة الحصر المتنوعة فضلا عن إن بعضها يعد غذاء غنيا للحيوانات، كما تعتبر هذه المواد عجينة لصناعة الورق (٦) . تشغل الاهوار نسبة كبيرة من مساحة القسم الجنوبي من السهل الرسوبي للعراق وهي المنطقة المحصورة بين مدينة العمارة شمالا والبصرة جنوبا وشرقاً وسوق الشيوخ غرباً ، شكل (١) خارطة مياه الاهوار الوسطى الجنوبية الشرقية الغربية في ميسان .



شكل (١) خارطة مياه الأهوار الوسطى الجنوبية الشرقية الغربية في ميسان

تبلغ مساحة الاهوار حوالي ٢٠٠٠٠ كم^٢ (١٠). تعتبر من أغنى مناطق العالم ، من حيث تنوع الحياة المائية أو البرية وهو الخزان المائي الكبير للمياه العذبة التي يمكن أن يستفاد من مياهها للشرب و الذي سكنه الإنسان واعتاش عليه وعلى خيراته وهذه ميزة لم تكن لتتوفر في البحيرات العذبة الواقعة خلف السدود لانعدام هذه الأنشطة أو صعوبتها تعتبر الأهوار مناطق غنية بالموارد المائية والثروات الاقتصادية التي لا ينضب معينها فهي غنية بكسائها الخضري وثرواتها الحيوانية والسمكية والطيور ولاشك ان توفر الغطاء النباتي والطبيعي وازدهاره في هذه المنطقة هو العامل الاساس في ازدهار الثروات الاخرى وتطويرها فبالإضافة الى الدور الهام الذي تلعبه بيئة خصبة ومراعي طبيعية غنية للحيوانات المائية والبرية كالأسمك والبط والجاموس ، فمنابت القصب والبردي تغطي مساحات شاسعة من هذه المنطقة بطائح خضراء كثيرة البهجة والسرور في نفوس الناظرين وان كثافة النباتات المائية في المنطقة يضيف عليها اهمية علمية وصناعية وطبية بالإضافة الى الاهمية السياحية والجمالية.

هدف الدراسة : يهدف البحث الحالي الى دراسة توزيع ملوحة وحموضة مياه الاهوار جغرافياً وتحديد تأثير العوامل الجغرافية في احداث هذا التباين الزمني والمكاني لملوحة مياه الاهوار من خلال مقارنة بين ثمانية مناطق على طول مجرى نهر دجلة (للأهوار الوسطى الجنوبية الشرقية الغربية) خلال المدة التي حددها البحث للعوام (٢٠٠٧-٢٠١٥). ترجع اسباب اختيار هذا الموضوع ولمدة المحددة ١٩٨٣-١٩٩٣ الى تباين مسببات التلوث الملحي لمياه الاهوار بوضعها مدة تمثل حقيقتين متباينتين من حيث مسببات التلوث الملحي والحامضي كون المدة الأولى تمتد الى عام ١٩٨٨ وهي تمثل مدة تعرض الاهوار للتلوث الملحي والحامضي . والمدة الثانية تمتد من ١٩٨٩ - ١٩٩٤ التي تميزت بانتهاء الفعاليات والعمليات العسكرية ، هذا من جانب وتوفر المعلومات الخاصة بالموضوع للمدة المحددة من جانب اخر . احتلت الاهوار مكاناً بارزاً في العديد من المشاريع والدراسات البحثية لأهمية الكبيرة حيث تمثل حداً سياسياً بين العراق وايران على النطاق الدولي ، وعلى النطاق المحلي حيث تعد هذه الاهوار المصدر الرئيسي للاستخدامات البشرية في مدينة العمارة . وبما ان مياه الاهوار احد المكونات الاساسية للبيئة الحيوية ، اصبح تحديد الطبيعة الكيماوية لهذه الاهوار امراً ضرورياً لتحديد صلاحيتها للاستخدام البشري من خلال تحديد كمية ونوعية الاملاح المذابة والحموضة في مياه الاهوار التي تتعرض بدورها الى التغير المستمر نتيجة لأسباب طبيعية او بشرية ، تعد مياه الاهوار عالية الملوحة عند مقارنتها ببعض مياه الانهر العالية ، وتتعرض هذه الاهوار لخطر التلوث الملحي لأسباب طبيعية واخرى بشرية الامر الذي اثر بشكل مباشر على استخدام هذه المياه في عموم المناطق التي يخترقها هذا النهر .

التغير الطبيعي والتوزيع الجغرافي للآلية تجفيف الاهوار

وضح (٨) ، نتوقع أن تجفيف مساحة تقدر (١٥٠٠٠ كم^٢) من المسطحات المائية والمتمثلة بأهوار جنوبي العراق سيكون له اثر مهم وكبير في تحويل مناخ المنطقة الجنوبية من العراق على اقل تقدير إن لم يكن التأثير أوسع من ذلك ، وان صح ذلك فهذا يعني أن مناطق الاهوار والمناطق المجاورة لها ستحدث فيها اختلافات واضحة في عناصر وظواهر مناخ المنطقة وقد تكون هذه الاختلافات متباينة من عنصر لآخر فبعض العناصر والظواهر يتوقع استجابتها بشكل أسرع من العناصر والظواهر الأخرى .ومن هنا أتت فكرة هذه الدراسة في البحث عن طبيعة الاختلافات الحاصلة في خصائص مناخ المنطقة الجنوبية من العراق كونها تمثل منطقة الاهوار والمناطق المحاذية لها وتحديد أي العناصر والظواهر تأثر وبشكل واضح ، وطبيعة الاختلافات الحاصلة وذلك من خلال تحليل البيانات المسجلة لهذه العناصر والربط بينها وبين العناصر الأخرى . يمكن تقسيم الاهوار إلى اهوار دائمية وأخرى فصلية فالأهوار الدائمة تستقر فيها مساحة الاهوار . أما ¼ المياه طيلة العام وهي لا تشكل خلال موسم الفيضان سوى الاهوار الفصلية فتمثل المناطق المرتفعة المجاورة للمنخفضات الدائمة إذ لا تستطيع الأخيرة استيعاب مياه الفيضان فترتفع المياه لتغطي المناطق المجاورة مكونة مسطحات مائية ضحلة لا يتجاوز ارتفاع الماء فيها المتر الواحد وتشكل مساحتها ٣/٤ مساحة الاهوار.

تمول هذه المساحات بالمياه في موسم الفيضان من نهري دجلة والفرات وفروعهما وأيضا من الأنهار المنحدرة من المرتفعات الإيرانية بالنسبة للأهوار الواقعة شرق نهر دجلة. إن السهل الرسوبي للأهوار الذي تغمر المياه بعض أجزائه طول العام وتغمر فصليا أجزائه أخرى يعتبر اقليم الأهوار الجنوبية (٦). بعد عام ١٩٩١ ونتيجة لقرارات سياسية وضعت خطة لتجفيف الأهوار وتم تنفيذها بجهود هندسي لعدد من الوزارات ذات العلاقة الزراعة، النفط والصناعة، الإسكان والتعمير والتصنيع العسكري حيث تم تنفيذ هذه العملية في محافظة ميسان وذلك بإنشاء سدود ترابية تتراوح أطوالها بين ٦-١٨ كم لكل سدة ترابية على جانبي الأنهار الرئيسية التي تغذي أهوار ميسان وهي كالاتي (نهر العدل ، ونهر الكفاح ، نهر مسبح ، نهر ام جرى ، نهر الوادية ، نهر الشرمخية) حيث تم الانجاز خلال شهر تموز ١٩٩٢ . إذ رافق تكثيف الأنهار السبعة قطع ما نسبته ٩٥% من مياهها بنواظم خاصة على نهر دجلة تقطع مياه نهري المجر الكبير ونهر البتيرة اللذان يزودان الأنهار السبعة بالمياه. إذ تم قطع المياه عن عش ا رت الروافد والجداول وعدم وصول المياه إلى الهور (٧). إذ تمت عملية تقسيم الأهوار في محافظتي ميسان والبصرة بعمل سدود ترابية لتجزئة الأهوار بعدة سدود ليسهل تجفيفها، وتم الاستفادة من عدد من السداد التي انشأت خلال الحرب العراقية الإيرانية في الثمانينات. وقامت هذه العملية وحدها بتجفيف مساحة تقدر بألف وخمسمائة كيلومتر مربع (9)



شكل (٢) أهوار جنوب العراق (UNEP,1994)

اثار الخصائص المناخية للأهوار

حدوث أي تغيير في عنصر أو أكثر من عناصر هذا النظام وأدى ذلك إلى اضطراب النظام المناخي الذي هو مجموع العلاقات المتبادلة بين العناصر المشكلة له والذي يتضمن المادة ضمن نفس النظام وتبادل الطاقة وهذا لأن الأثر المناخي للمسطح المائي يختلف ما بين الليل والنهار فيكون أثره نهارا مهما في عدم ارتفاع الحرارة وتطرفها إضافة إلى عدم انخفاضها ليلا لذلك نحتاج إلى متابعة الاختلافات الحاصلة في معدلات الحرارة العظمى النهارية ومعدل الحرارة الصغرى الليلية زيادة نسبة بخار الماء في الجزء الجنوبي من العراق كان ناتجا عن عملية تجفيف الأهوار.

المواد وطرائق العمل:

التحاليل الاولية للمياه وتربة الأهوار

طريقة قياس التوصيل الكهربائي (الملوحة) Electric Conductivity

يتم أخذ نموذج من التربة ومياه الـاهوار بنسبة (١:١) أو (٢:١) بعد تجفيف العينة وسحقها وإخراج الشوائب منها ، رج المزيج لمدة نصف ساعة ثم يرشح المستخلص باستعمال ورقة الترشيح ، نأخذ قراءة الـ EC-meter جهاز قياس التوصيل الكهربائي واستخراج النتيجة بوحدة المليموز / سم تم قياس كل الاختبارات في مختبر مديرية زراعة ميسان كما موضح في الشكل أدناه :



شكل (٣) جهاز قياس التوصيل الكهربائي EC-meter

طريقة قياس القاعدية والحامضية (PH)

بعد قياس EC الملوحة لعينات التربة والمياه يتم قياس الـ PH باستعمال جهاز PH-meter لنفس نموذج مستخلص التربة او عينة المياه التي تم قياس لها EC تم تقدير الخصائص الاولية للتربة كما موضح في جدول (١) وكما يلي:- قدر التوصيل الكهربائي لمستخلص عينة التربة المشبعة باستخدام EC-meter وقدرت درجة تفاعل التربة لعجينة التربة المشبعة باستعمال جهاز PH-meter وحسب الطرق الوارد ذكرها في (Page et al. ١٩٨٢). حسبت كاربونات الكالسيوم حسب طريقة Volumetric Calcimeter التي شرحها Allison and Modie والمذكورة في (١٢) قدرت المادة العضوية حسب طريقة (Walkely & Black) من خلال تقدير الكاربون العضوي باستخدام طريقة دايكرومات البوتاسيوم والتي ذكرها (١٣) تم قياس كل الاختبارات في مختبر مديرية زراعة ميسان كما موضح في الشكل أدناه :



شكل (٤) جهاز PH-meter

مواقع الوحدات الإدارية الدراسة

تم دراسة التغيرات المتنوعة للنظام المناخي والمجال البيئي لمناطق الأهوار الوسطى الجنوبية الشرقية الغربية في محافظة ميسان والخصائص المورفولوجية لعشرة أفضية (مناطق الدراسة) التي تصب بها نهر دجلة للأعداد دراسة مناخية بيئية مورفولوجية للأهوار ولمعرفة مناسيب ارتفاع وانخفاض مياه الأهوار كما مبينه في الجدول الخاص بنتائج تحاليل المياه والتربة التابعة الى الشعب الزراعية / مديرية زراعة ميسان للسنوات ادناه ، تضمنت الخصائص المورفولوجية للوحدات الإدارية المتضمنة للدراسة كما مبينة في الجدول (١) ادناه :

نوع التربة	صنف التربة (النسجة)	التعرية	المناخ	الانحدار	الفيزيوغرافية	نوع الرواسب
طينية						
غرين						
رمل						

مجلة أبحاث ميسان ، المجلد الثالث عشر ، العدد السادس والعشرون ، السنة ٢٠١٧

الجدول (٢) الخاص بنتائج تحاليل المياه التابعة الى الشعب الزراعية / مديرية زراعة ميسان للسنوات ادناه

الشعب الزراعية	٢٠٠٧			٢٠٠٨			٢٠٠٩			٢٠١٠			٢٠١١			٢٠١٢			٢٠١٣			٢٠١٤			٢٠١٥		
	معدل EC	معدل ل PH	عدد العينات	معدل EC	معدل ل PH	عدد العينا ت	معدل EC	معدل ل PH	عدد العينا ت	معدل EC	معدل ل PH	عدد العينا ت	معدل EC	معدل ل PH	عدد العينا ت	معدل EC	معدل ل PH	عدد العينا ت	معدل EC	معدل ل PH	عدد العينا ت	معدل EC	معدل ل PH	عدد العينا ت	معدل EC	معدل ل PH	عدد العينا ت
علي الغربي	1.1	٧,٤	١	٢,٣	٧,٣	٢١	١,٥	٧,٧	٢٠	١	٧,٧	٢٧	١,١	٧,٦	٣٧	١,٩	٧	٦	١,٦	٧,٢	٤	١,٣	٧,٤	٣	١,٢	٧	١٠
الكحلاء	١,٨	٧,٦	١	٢,٧	٧,٦	٤	٢	٧,٣	٦	٢	٧,٥	١١	١,٢	٨,١	٤	١,٧	٧,٢	٢	١,٢	٧,٥	٢	١,١	٧,٢	٢	١,٣	٧	٤
بني هاشم	١,٤	٧,٢	٢	٢	٧,٢	٢	٢	٧,٧	٨	٢,٨	٧,٤	٤	١,٣	٧,٥	١٢	٢,٣	٧,٢	٧	١,٦	٧,٤	٦	٢,٢	٧,٤	٦	٢,٩	٧	٦
المشرح	١,٥	٧	٤	٢,٣	٧,٤	٣	٢,٥	٧,٩	٣	١,٨	٧,٤	٣	١,٢	٧,٦	٦	٢,٥	٧,١	٣	١,٧	٧,٤	٣	٣,١	٧,٧	٢	٢,١	٣	٨
العزير	١,٩	٧,٨	٧	٢,٨	٧,٣	٥	١,٩	٧,٢	٣	١,٦	٧,٢	٥	١,٧	٧,٢	١	٢,٣	٧,٦	٣	١,٣	٧,٤	٢	١,٦	٧,٧	١	١,٣	٧	٣
السلام	١,٦	٧,٣	٢	٢,٣	٧,٣	٥	٢,٥	٧,٩	٤	١,٤	٧,٩	٢	١	٧	١	٢,٢	٧,١	٢	٢	٧	١	٢,٣	٧,١	٢	١,٨	٧	٢
قلعة صالح	١,٣	٧,٣	٢	٢,٢	٧,١	٢	٣,١	٧,٨	١	٢,٤	٧,١	٣	٢,١	٧,٤	٧	٢,٣	٧,٦	٩	٢,٧	٧,٢	٣	٢,٧	٧,٢	٤	١,٩	٧	٨
العدل / الخير	١,٢	٧	١	٢	٧,٧	١	١,١	٧,٤	٢	١,٢	٧,٢	٣	١,٢	٨	٢	٢,٣	٧,٥	١	١,٣	٧,١	١	١,٤	٧,٦	١	٢,٤	٧	١٠

مجلة أبحاث ميسان ، المجلد الثالث عشر ، العدد السادس والعشرون ، السنة ٢٠١٧

الجدول (٣) الخاص بنتائج تحاليل التربة التابعة الى الشعب الزراعية / مديرية زراعة ميسان للسنوات ادناه

الشعب الزراعية	٢٠٠٧			٢٠٠٨			٢٠٠٩			٢٠١٠			٢٠١١			٢٠١٢			٢٠١٣			٢٠١٤			٢٠١٥		
	معدل EC	معدل PH	عدد العينات	معدل EC	معدل PH	عدد العينات	معدل EC	معدل PH	عدد العينات	معدل EC	معدل PH	عدد العينات	معدل EC	معدل PH	عدد العينات	معدل EC	معدل PH	عدد العينات	معدل EC	معدل PH	عدد العينات	معدل EC	معدل PH	عدد العينات	معدل EC	معدل PH	عدد العينات
علي الغربي	4.7	٧,٦	١٢	٥,٢	٧,٦	٢٦	٦,٤	٧,٩	١٩	٦,٩	٧,٩	١٥	٣,٩	٨	٢٠	٢,٩	٧,٢	١٠	٢,١	٧,٤	٥١	٣,١	٧,٢	٧	٥,١	٧,٦	٣
الكحلاء	٣,٨	٧,٨	٧	٥,٨	٧,٧	٦	٤,٢	٧,٥	٥	٤,٨	٨	٤	٥,١	٧,٩	٣٣	٣,٩	٧,٤	٩	٤,٢	٧,٤	١٦	٤,٦	٧,٦	٣	٤,٨	٧,٦	٥
بني هاشم	٤,٢	٧,٤	٩	٤,٣	٧,٥	٨	٥,٢	٧,٣	٦	٥,٩	٨	١٥	٧,٦	٨	١٠	٣,١	٨	٢	٢,٩	٧,٨	٤	٦,٨	٧,٦	٥	٥,٦	٧,٢	٣
المشرح	٤,٦	٧,١	٤	٤,٣	٧,٣	٦	٧,٣	٧,٥	٥	٥,٥	٨	٤	٣,٩	٧,٣	٩	٦,٥	٧,٤	٧	٦,٧	٧,٢	٨	٦,٢	٧,١	٦	٥,٨	٧,٢	٥
العزير	٣,٤	٧,٤	١١	٣,٢	٧,٢	٩	٣,٣	٧,٣	٧	٣,٥	٧,٥	٨	٣,٧	٧,٦	٩	٢,٦	٧,٢	١٠	٥,١	٧,٣	٢٥	٣,٩	٧,٦	١٨	٤,١	٧,٢	١٥
السلام	٩,٦	٧,٨	٤	٩,١	٧,٤	٣	٣,٦	٧,٨	٨	٥,٧	٧,٣	٧	٤,٢	٧,٨	١٣	٤,٩	٧,٤	٣٤	٣,٦	٧,٤	٨	٣,٢	٧,٢	٥	٣,٥	٧,٢	١٢
قلعة صالح	٤,٦	٧,٦	٧	٤,٤	٧,٨	٥	٤,٩	٧,٤	٤	٤,٧	٧,٣	٦	٣,٩	٧,٣	١٠	٤	٧,٣	١٦	٤	٧,٢	١٢	١,٤	٧,٥	١	٢,٦	٧,٢	٥

مجلة أبحاث ميسان ، المجلد الثالث عشر ، العدد السادس والعشرون ، السنة ٢٠١٧

٧	٧,٣	٤,٤	١٥	٧,٥	٢,٨	٢	٧,٤	٣,٥	٨	٧,٦	٣	٢١	٨	٥,٨	١	٨	١٠,٨	٨	٧,٩	٨,١	١٢	٧,٥	٣,٢	١٨	٧,٩	٥,١	العدل / الخير
---	-----	-----	----	-----	-----	---	-----	-----	---	-----	---	----	---	-----	---	---	------	---	-----	-----	----	-----	-----	----	-----	-----	------------------

الخصائص المورفولوجية للوحدات الإدارية المتضمنة للدراسة كما مبينة في الجداول (١، ٢، ٣، ٤، ٥، ٦، ٧، ٨، ٩، ١٠) ادناه :

مجلة أبحاث ميسان ، المجلد الثالث عشر ، العدد السادس والعشرون ، السنة ٢٠١٧

الاسم المنوع	الوحدة الإدارية	المقاطعة	المساحة	حلي /	غرين /	رمل /	النسبة
١- جسر محمد	قلعة صالح			٢٩	٢١,٥	٤١,٥	lay loam
٢- باب كهلاني كاظم	المرير			٥	٢٢	٢٧	clay
٣- جسر نهضات	الاحلام			٤١	٢٤	٢٥	clay
٤- نهر سعد	نهر سعد			٢٢		٧٧	d clay bam
٥- نهر نوري	الميمون	مناجاة ١٥ الوسيع والمشار		١٩,٥		٨١,٥	sand loam
٦- نهر يوسف	الاحلام			٢١	١٨	٥١	nd clay loam
٧- نهر عبد القادر	سيد احمد البراني			١,٥		٨١,٥	sand
٨- نهر عزير	سيد احمد البراني			١٢	٤	٨٢	Loam sand
٩- نهر خانقار	قلعة صالح			٢٧	٢٢	٤٠	Loam
١٠- نهر صالح	سيد احمد			١٤	٢	٨٤	oam sand
١١- نهر راضي محمد	الاحلام			٢٢	٢١	٢٦	clay loam
١٢- نهر راعي ميسان	المديرية			٢٨	٢٧	٢٥	y loam
١٣- نهر احمد				٢١,٥	٥٤,٢	٢١,٢	منجيب

رقم	اسم افلاحة	الوحدة الادارية	المحافظة	المساحة الهكتار	غرين / م	السنوية
١٤-	الطبيب / مقاطعة ١١ الاستثمار	الطبيب	مقاطعة ١١	٦٥,٥	٢٢	١٢,٥ clay
١٥-	علي لشرقي / موقع رقم ١٣	علي لشرقي	مقاطعة ١١	٤٩,٢	٨,٨	٤١ clay
١٦-	علي لشرقي / موقع رقم ٧	علي لشرقي	مقاطعة ١١	٥١,٤	٨,١	٤٠,٥ clay
١٧-	حسن نفيس زهير			٢٢,٧	٤٩,٧	٢,٦ مزيجية - حميرية
١٨-	جبر حرام	بن هاشم		١٥,٢	٤٨,٢	٢٦,٥ مزيجية - غرينية
١٩-	محمد حليم خلف	قلعة حاج		٤٠	٢٠	٢٠ مزيجية - حميرية clay loam
٢٠-	عبد الرضا صبيح	الكلخلاء		٢٢,٨	٢٨,٢	٢٨ clay loam
٢١-	مجمع البيوت البلاستيكية	الوقاية		١٩	١٧	٦٤ مزيجية - رملية sandy loam
٢٢-	حسن نفيس زهير			٣٩,٦	٤٩	١١,٤ silt clay loam
٢٣-	حسن زهران	الكلخلاء		٢١	٥	٦٤ sandy clay loam
٢٤-	قسم الاستثمار الزراعي			٤	٢٦	٢٠

ن	اسم الفلاح	الوحدة الادارية	المحافظة	المساحة	الطين / الغرين / الرمل	الغرين / الرمل	الغرين / الرمل
٢٥-	عبدلرزاق ياسين	الاحلام			٢٦	٢٢	٢١
							clay loam
٢٦-	خلف هليل علي	قلعة صالح			٢٤,٦	١٧,٤	٥٠
							sandy clay loam - sandy loam
٢٧-	علي هادي ناصر	قلعة صالح		٤٠ دونم	١٠,٤	١٤,٤	٧٥,٤
							clay loam
٢٨-	لبيد ثوري سيلان	كوت			٢٠	٢٢	٢٧
							طينية غرينية
٢٩-	خالد دشر حساب	سيد احمد البرقاني					طينية
٣٠-	مهاج موسى غعل	علي لغزير	٢٦ اطربة والشمرات				طينية
٣١-	محمد جبر هادي	المشرع / قلعه		٤٠			طينية مزجبة
٣٢-	فاصل زهير	المشرع /		٦			طينية غرينية
٣٣-	كاظم هادي رشيد	المشرع /		٥			طينية غرينية

ك. اسم المزارع	الوحدة الإدارية	المحافظة	المساحة	الطين	الرمال	الغرين	المسبوبة
٢٤- دونه محمدان	كسبي						حبيبة
٢٥- رسول خضر جيب	العدل						عزينة مزينة
٢٦- نوره حسن محمد	العدل						عزينة مزينة
٢٧- محمد عاقل مرحان	علي الشرف						حبيبة
٢٨- الكحداء	الكحداء						عزينة مزينة
٢٩- نوال جبري علي	المطيب	مقاطعة ١٧					عزينة
٣٠- ثابت عاكول	المركز	مقاطعة (٥) (العويصة)	٥٠٠ دونم	٤١٪	٣١,٣	٧,٧	طينية
٣١- نعمه صبيح فكري	المركز	مقاطعة (٩) جربا	٢٥٠ دونم	٤٤٪	٢٥,٨	٢,٢	طينية

ن	الاسم	المقاطعة	المساحة	حطب /	عل /	غزير /	الوحدة الاواري	النتيجة
٤٢-	غاية الحجر الكبير	الحجر الكبير		١٠٠	١٦,٨	١٠٠	الحجر الكبير	silt clay loam
٤٢-	ملاح حسين حميد	سيد محمد لقراني		٢٦,١	١٦,٥٢	٤٧,٢٧	سيد محمد لقراني	silt clay loam
٤٤-	الكحلدة	مقاطعة ٢		٢٢	١٠	٥٧	الكحلدة	silt clay loam
٤٥-	زهره حسين صالح			٢٦,١	٤٦	٢٢,٤	مكتبة	موزجسية
٤٦-	البجبة			٥٥	٥,٧	٢٩,٢	حاشية	
٤٧-	غاية مكتبة	مقاطعة ٩		٢٥,٢	٢٦,٥	٤٨,٢	مكتبة	loam
٤٨-	غاية مكتبة	مقاطعة ٩		٢٥,٢	٢٦,٥	٤٨,٢	مكتبة	
٤٩-	فرغل عبد الكريم	مقاطعة ٢		١٨,٧	٦٦,١	١٥,٢	علي لقراني	sandy loam
٥٠-	عبد الرحمن فاخر	علي لقراني		٤٩	٩,٥	٤١,٥	علي لقراني	

١٣٦ / الكبير والكبير

الترتيب	اسم المزارع	الوحدة الإدارية	المقاطعة	المساحة	الطينية	الترابية	الرملية	الاستيعاب
٥١-	حسين حورس	علي الغزالي	مقاطعة كركوك	٢٠٠ دونم	٢٠	٨,٢	٦٩	حديقة خيرية خيرية
٥٢-	حسن فليفل	علي الغزالي				٥٤,٥	٢٠,٢	حديقة
٥٣-	مردوس عبد الرحمن	علي الغزالي	مقاطعة كركوك	٢٠٠ دونم	٢٠	٦,٧	٧٢,٢	حديقة خيرية
٥٤-	حسن كاظم نوري	علي الغزالي	مقاطعة كركوك		٤٤	٢٠	٢٦	حديقة
٥٥-	جبار جبار كرم	علي الغزالي		٢٠٠ دونم	١٥	٢١	٦٤	sandy loam
٥٦-	سيد حسن سيد شريف	علي الغزالي	مقاطعة كركوك	١٥٠٠ دونم	٥١	٢١,٧	١٧,٢	حديقة
٥٧-	هادي شحني	علي الغزالي	مقاطعة كركوك	١٢٠٠ دونم	٤٦	٢٤	٢٠	حديقة
٥٨-	عبدان عبد الكريم	سيد محمد الرضاوي	مقاطعة كركوك		٢٩	٢٩,٦	٢١,٤	clay loam
٥٩-	حسنين عزيز كاظم	سيد محمد الرضاوي	مقاطعة كركوك		٢٧	١٧,٨	٤٥,٢	حديقة
٦٠-	مستورع لغايات	المطيرة			٦٨	٢٨,٥	٢,٥	حديقة

ت	اسم المزارع	لوحة إدارية	المقاطعة	المساحة	الطينية	الغرينية	الرملي	الشنكية
٦١-	حسين طاهر	سيد احمد الرناي	مقاطعة ١١		٦٠	١٢,٤	٢٦,٨	طينية
٦٢-	هاشمية حساب	سيد احمد الرناي	مقاطعة ١١		٤٥,٤	٢٦	٢٨,٦	طينية
٦٣-	حسينه حسين خلف	سيد احمد الرناي	مقاطعة ١١		٢٢,٥	٢٦	٤١,٥	طينية
٦٤-	نهر سعد	نهر سعد			٤١,٢	١٥,٨	٢٦	طينية
٦٥-	محمدان ذبيان	مكتبة			٢٢,٢	٢٢,١	٢٤,٥	مزرعية طينية
٦٦-	شعبة تقويم ابار النفع العام				٢٤,٦	٢٥,٤	٢٨,٨	مزرعية
٦٧-	المركز / الطبيب خالد عيسى عيون	المركز			٢٥,٤	٢٥,٢	٤٨,٢	طينية
٦٨-	علي لشرقي	علي لشرقي			١٢,٤	٢٠,٩	٦٥,٧	مزرعية رملية sandy loam
٦٩-	نهر سعد	نهر سعد			٤٢,٧	٢٢	٢٢,٢	طينية
٧٠-	عدنان محمد حسن	علي لفرعي	٤٤ مقاطعة ١١		٢٤,٧	٢٢,٨	٤١,٤	مزرعية

ن	اسم المزارع	الوحدة الإدارية	المقاطعة	المساحة	الطين / الغرين / الرملي / المنجبة
٧١ -	نجيل صالح ابو عوجه	سيد احمد لرفائي	مقاطعة ١١		١٤ < ٨٤
٧٢ -	علوان حافظ موسى انشاء دبستان	قلعه صالح			٤٧ < ٢٢
٧٣ -	عليه لبستنه / الحافه الكحلده				٤٧,٦ < ١١,٨
٧٤ -	علي لفرزي / البراي البقيعه	علي لفرزي			
٧٥ -	علي لفرزي / البراي البقيعه	علي لفرزي			
٧٦ -	سيد احمد لرفائي / مشروع الريادي	سيد احمد لرفائي			٤٨,٢ < ١٨,٤
٧٧ -	احمد جابر حسن احمد	علي لفرزي / هويزان	مقاطعة ١٢		٥٩,٤ < ١٨,٧
٧٨ -	عليه جابر مرخان	سيد احمد لرفائي	مقاطعة ١١		٤٨,٢٩ < ٩,٤٤
٧٩ -	ابراهيم علي علوان				٤١,٤٩ < ٤٤,٤٥

ت. اسم المزارع	الوحدة الإدارية	المقاطعة	المساحة	الطين /	الرمال /	نسبة الرية
٨٠- حماد بن غضبان	علي لزي			٢٩,٥٨	٢١,١٨	٤٩,٤٠
٨١- عذنان حسن حسن	علي لزي	مقاطعة البيك		٢٩,٧	٢٢,٨٢	٤١,٤٧
٨٢- نجم عبد الله محمد	علي لزي	مقاطعة هور الخراب		٤٨,١٨	٤٤	٤٧,٤
٨٣- علي عبد الرضا محيي	الجزيرة ونهر سعد	مقاطعة		٢٩,٨	٥٠,١٠	١٠
٨٤- آل كريمة احمد	المشوح	مقاطعة		٤٢	٤٧	١٠
٨٥- حنظل صافي حنينة	المركز					
٨٦- الميمونة / اللالكه	الميمونة			٤٢	٢١	٤٧
						clay

ت	اسم المزارع	الوحدة الإدارية	المساحة	المقاطعة	الطين / الغرين / الرمل / مذبة لري	سجل المزارع
٨٧-	باسم هادي زري	المركز / الطيبة			٨١, ٨١	١٧, ١٦
٨٨-	جواد قاسم كايد	المركز / الطيبة			١٨, ١٨	٢٢
٨٩-	مناوشة في	علي لفر		مقاطعة الغابة	١٢	٢٥
٩٠-	خلع سعدون	علي لفر				
٩١-	كاظم داخر بدن	المشراح			١١	١٦
٩٢-	حسن فطير بيل	٤ درغم		مقاطعة الكبير	١٥, ١٧	٨, ١٧
٩٣-	سعد طخاخ	كبي			٢٠, ١٢	٢٢, ١٢
٩٤-	ندوة محمد حاسن	علي لفر		مقاطعة ٤٥	١٧, ١٧	٢٠, ٢

النتائج والمناقشة :

الآثار البيئي :

بعد تجفيف الاهوار يتوقع حدوث تغيرات بيئية مهمة وخصوصا في المنطقة الجنوبية من العراق وذلك كون اكبر مساحات الاهوار المجففة تقع ضمنها ولذلك تم دراسة التغيرات المتنوعة للنظام المناخي والمجال البيئي لمناطق أهوار العراق

التغيرات المتنوعة للنظام المناخي والمجال البيئي لمناطق أهوار العراق

النظام المناخي :

لعب تجفيف الاهوار دورا مؤثرا في التغيرات المناخية والتي لها علاقة مباشرة للتربة و للطبيعة الزراعية فدرجات الحرارة بدأت بالارتفاع عن معدلاتها الاعتيادية بعد التجفيف بشكل واضح كذلك معدلات الرطوبة بدأت بالانخفاض هي الاخرى مما ادى الى تصحر المناطق كون الرياح السائدة في المنطقة هي الرياح الشمالية الغربية تكون جافة غير محملة بالرطوبة مما تحول دون انخفاض درجات الحرارة كما هو الحال قبل التجفيف كل هذه الامور مجتمعة ادت الى ازالة الغطاء النباتي وعدم تماسك حبيبات التربة ادى ان تتعرض مناطقنا الى العواصف الترابية المتلاحقة خلال السنين الحالية أن الجداول التي تحدد العناصر المناخية تثبت الاثر الواضح للسنوات العشر ما بعد مرحلة تجفيف الأهوار التي تخص المعدلات الشهرية والسنوية لدرجات الحرارة ومعدلات الحرارة العظمى والرطوبة النسبية ، إن تجفيف الأهوار لعب دوراً مؤثراً في تغير الأحوال المناخية التي لها تأثير على الاحوال الزراعية والحياة البشرية ، حيث تجد الفروقات الكبيرة فمعدلات الحرارة للسنوات العشر التي سبقت التجفيف كانت ٢٣،٩ م° أصبحت في التسعينيات ٢٥،١٧ م° ومعدلات الحرارة العظمى كانت ٣١،٦ م° أصبحت ٣٣،٢ م° ومقدار الرطوبة كانت ٦١% أصبحت ٤١% وكل هذا يعود الى ان الرياح الشمالية الغربية السائدة في المنطقة أصبحت تجري على ارض جافة فلا رطوبة فيها لكي تكون الضابط في عدم ارتفاع درجات الحرارة . (٤) بأن المناخ يتصف بصورة عامة في مناطق الاهوار بالتطرف الكبير في درجات الحرارة والامطار القليلة والرطوبة الواطئة وكذلك بنسبة سطوع الشمس العالي وبصورة عامة يكون اتجاه الرياح السائد شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة.



شكل (٥) صورة عن قطاع مياه الأهوار الوسطى الجنوبية الشرقية الغربية في ميسان

المجال البيئي :

في تسعينات القرن الماضي اقدم النظام القائم في العراق آنذاك الى ارتكاب اكبر كارثة بيئية في العالم ، ان تجفيف مساحة عشرين الف كيلو متر مربع من الاهوار والتي تعد من اغنى مناطق العراق بالتنوع الاحيائي تعد كارثة بيئية ما بعدها كارثة حيث لحقت بهذا التنوع اضرار كبيرة بانقراض مجموعة من الحيوانات والنباتات المتوطنة في المنطقة منذ مئات السنين بالإضافة الى التغيرات الكبيرة في المناخ ويمكن ان نجل التغيرات التي احدثتها التجفيف بما يلي:- بيئة الاهوار التي كانت تجود بها النباتات الطبيعية المعمرة مثل القصب والبردي والشمبلان والكاط والجولان والكعبية وغيرها ولكل من هذه النباتات الطبيعية استخداماتها الخاصة لسكان الاهوار ، اختفت هذه النباتات بعد عملية التجفيف مما اثرت على طبيعة المنطقة احيائيا واصبحت ارض جرداء تذررها الرياح ، اما في الجانب الحيواني فان الاهوار تعد مناطق جذب طبيعية لأنواع مختلفة من الطيور المهاجرة والمتوطنة بالإضافة الى خزين الاهوار من الثروة السمكية والتي كانت تغطي ٦٥% من حافة العراق من الاسماك ناهيك عن الاصناف الجيدة من هذه الاسماك كالبنّي والكطان والشبوط والتي اختفت من الاسواق العراقية بعد جريمة التجفيف ولكن بعد ان بدأت الحياة تدب في الاهوار ثانية بعد السقوط بدأت هذه النباتات والحيوانات تظهر مجددا في الاهوار ولكن بكميات محدودة نأمل ان تعود جنة عدن الى الاهوار العراقية المتمثلة بأهوار الجنوب بعد ان تتظافر كل الجهود بإعادة المياه الى مجاريها والاهوار الى ماضيها جنة الله (جل وعلا) على الأرض . ان سرعة التغيرات التي حدثت في بيئة الأهوار يمكن مقارنتها على حد تعبير احد الخبراء مع سرعة ازالة الغابات في منطقة الامزون او تجفيف بحر آرال ففي اقل من عقد واحد من الزمان تم تجفيف اكبر مجمع مائي للمياه العذبة في العالم ، أن تجفيف هذه المنطقة التي تبلغ مساحتها ٢٠,٠٠٠ الف كيلومتر تعد من اغنى مناطق البلاد بالتنوع الاحيائي والبيولوجي واكبر نظام بيئي للمسطحات المائية في الشرق الاوسط مثلت اكبر الكوارث البيئية في العالم ، بالإضافة الى الاضرار الكبيرة التي لحقت بالتنوع الحيوي وانقراض مجموعة من الحيوانات المتوطنة في الأهوار ، ومن الامور المهمة التي تلعبها الأهوار دخولها كحلقة اساسية في الهجرة الداخلية بين القارات للطيور والاسماك بالإضافة الى ان هذه البيئة من المسطحات المائية التي تحتوي على ارث طبيعي استثنائي ومخزون جيني مهم وعالمي ، بالإضافة الى التغيرات الكبيرة التي لحقت بالمناخ وانخفاض نسبة التبخر

والرطوبة الجوية وقد شهد نظام الامطار في المنطقة تغيرات كبيرة وازدادت نسبة العواصف الترابية وحدث انخفاض كبير في اعداد الأبقار والجاموس في منطقة الأهوار كما ان الحالة الصحية والمناعية للأعداد المتبقية من الحيوانات قد تردت بسبب نقص العلف الاخضر . تؤلف الأراضي المغطاة بالمياه مساحة شاسعة في أرض جنوب العراق وتؤمن هذه البيئة المكان المناسب لتجمعات مهمة من الحياة البرية المستوطنة والمهاجرة ولكون هذه البيئة المائية محاذية للمحيط الصحراوي فان لذلك تأثيراً كبيراً على الحد من التصحر في المنطقة



شكل (٦) صورة عن قطاع مياه الأهوار الوسطى الجنوبية الشرقية الغربية في ميسان




شكل (٧) صورة عن قطاع مياه الأهوار الوسطى الجنوبية الشرقية الغربية في ميسان

وضح (١١) ، لم تعد انطقه الاهوار كما وصفت من ناحية الوضع الجغرافي الطبيعي البيئي ، فبعد اعمال التجفيف التي بدأت ذروتها في عقد التسعينيات اصبحت أراضي قاحلة معرضة للتصحر ، أذ أدت الى فقدان كميات ضخمة من المياه غيرت من النظام الطبيعي البيئي لحوض وادي الرافدين الاسفل منذ تشكل المنظومة النهرية لوادي الرافدين في نهاية العصر الرباعي (Quaternary) وبداية الترسيب الحديث لعصر الهولوسين (Holocene).

نتائج التحاليل الكيميائية الأولية :

درجة نسبة المادة العضوية (O.M)

تمتاز اهورار جنوب العراق ومنها الاهوار الوسطى الجنوبية الشرقية الغربية في محافظة ميسان باحتوائها على نسبة عالية من المادة العضوية ويعود سبب ذلك الى تحليل المخلفات العضوية المتراكمة الناتجة من بقايا بعض النباتات (البردي ، القصب) والاحياء الاخرى التي كانت تعيش عندما كانت الاراضي مغمورة بالمياه (٤)، تختلف كمية المادة العضوية اختلافاً كبيراً بين أنواع الأتربة المختلفة فبينما قد لا تتجاوز الآثار في الطبقة السطحية لبعض الأراضي المعدنية قد تصل إلى ١٥ % في الأراضي وتحت ظروف خاصة فبصورة عامة نجد أن الأراضي خشنة القوام تحتوي على كمية من المادة العضوية أقل من الأراضي الناعم القوام نظراً لأن كثافة النباتات النامية في الأراضي خشنة القوام أقل وتهويتها أحسن لأكسدة المادة العضوية السريعة ورشحها أسرع كما هو عليه في الأراضي ناعمة القوام. إذ تقل المادة العضوية في الأراضي المحروثة بحوالي ٣٠-٦٠% منها في الأراضي غير المعرضة لعمليات الحراثة كأراضي المراعي والغابات كما أن انجراف التربة السطحية من شأنه أن يزيل نسبة كبيرة من المادة العضوية المتراكمة في هذه الطبقة فالمادة العضوية تشكل جزءاً رئيسياً من الأراضي الخصبة soils Productive فهي إلى جانب تحسينها للخواص الطبيعية للأرض فإنها كمخزن لكثير من العناصر الغذائية اللازمة للنبات وخاصة عناصر الكربون والنيتروجين إلى درجة كبيرة والفوسفور والحديد والكبريت بدرجة أقل كما وتتأثر صلاحية كثير من هذه العناصر في صورتها غير العضوية بالمادة العضوية نظراً للتفاعلات الكثيرة التي تتم بينهما عموماً فإن الأراضي الموجودة في ساحة معينة تزداد خصوبتها بزيادة محتواها من المادة العضوية إلا أن الأراضي المنخفضة في محتواها العضوي ليست دائماً غير خصبة إذ أن الكثير من الأراضي الصحراوية المنخفضة في محتواها من المادة العضوية تكون ذات خصوبة عالية عند وضعها تحت نظام الزراعة . الشكل أدناه يوضح مساحات الأراضي الصالحة والغير الصالحة للزراعة لمحافظة ميسان



شكل (٨) يوضح مساحات الاراضي الصالحة والغير الصالحة للزراعة لمحافظة ميسان

درجة تقدير (PH) تفاعل التربة

Determination of Soil Reaction PH

يؤثر أيون الهيدروجين (PH) بالتربة تأثيرات كيميائية هامة مثل تأثيرها على مدي تيسر العناصر والتبادل الكاتيوني بالتربة وكذلك تحلل المواد العضوية والنشاط الحيوي بها. التربة الزراعية لها (PH) منخفض نتيجة لعمليات إضافة الأسمدة باستمرار مثل نترات الامونيوم والأسمدة المحتوية على الكبريت. توضح النتائج في الجدول (١،٢) انخفاض قيمة درجة تفاعل التربة حيث كانت حامضية لجميع مناطق الدراسة. ويعود سبب ذلك الى وجود احماض الهيومك اسد والفولفك اسد الناتجة من تحلل المادة العضوية المتراكمة في التربة (٤) ، وتختلف التربة في حموضتها ويرجع سبب الاختلاف بنسبة كبيرة إلي اختلاف محتواها من الأملاح المختلفة و كاتيوناتها المتبادلة والذائبة في محلول التربة (ففي حالة زيادة الصوديوم المتبادل في محلول التربة يرتفع الرقم الهيدروجيني ويصبح تفاعل التربة قاعديا وخاصة في المناطق الجافة ولكن عند زيادة أيونات الهيدروجين أو الألومنيوم المتبادلين ينخفض الرقم الهيدروجيني ويصبح تفاعل التربة حامضيا) وكذلك التغير في المحتوى المائي للتربة. يختلف رقم حموضة التربة (PH) في المناطق المختلفة ففي تربة المناطق الرطبة وشبه الرطبة يكون الرقم الهيدروجيني منخفضا و تكون التربة حامضية بخلاف تربة أراضي المناطق الجافة ذات الرقم الهيدروجيني المرتفع.

٣-١ الايصالية الكهربائية للتربة Electrical Conductivity EC

أن درجة التوصيل الكهربائي لمحلول التربة يتأثر كثيراً بالتخفيف. وأن درجة الحرارة لها تأثير على قراءة الجهاز وذلك لان الحرارة تؤدي دور مهم في فعالية الأيونات في محلول التربة وقد صمم الجهاز أن تكون (٢٥ م) هي الدرجة المتفق عليها عند القياس. يلاحظ من النتائج ادناه ارتفاع قيم الايصالية الكهربائية للتربة لبعض مناطق الدراسة ويعود سبب ذلك الى ان تجفيف الاهوار عمل على تراكم الاملاح التي كانت تحملها المياه التي كانت تغمر المنطقة وتراوحت القيم بين اعلى قيمة لهور لناحية السلام $9,6 (ds/m)$ الى اقل قيمة لهور قلعة صالح حيث بلغت $1.4 (ds/m)$. وتعتمد هذه الطريقة على قابلية محلول التربة او المحلول الملحي على التوصيل الكهربائي او المقاومة الكهربائية - وهي من اكثر الطرق استعمالا في الوقت الحاضر. وبالإمكان استعمال هذه الطريقة لان هناك علاقة خطية بين التوصيل الكهربائي والتركيز الملحي في المحاليل دون ان يكون لنوع المحلول الملحي او نوع الاملاح تأثير على شكل تلك العلاقة. ويستخدم لهذا الغرض جهاز يدعى جهاز قياس الايصالية الكهربائية (Electrical Conductivity EC) (ويعطي الجهاز القراءة مباشرة (بالمليموز/سم أو ديسيمنز/م-١ $ds \cdot m^{-1}$).

الاستنتاجات والتوصيات :

- ١- إعادة تنظيم السدود وقنوات الري والخزانات بما يتوافق وطبيعة استخدام الأرض. لغرض تجنب حصول خلل في توزيع المياه في مناطق الاهوار نتيجة سوء ادارة قنوات الري .
- ٢- ان عودة المياه لبعض مناطق الاهوار الوسطى الجنوبية الشرقية الغربية في محافظة ميسان أو جزء منها يكون ضرورياً ولا بد منه، والممثل بشكل رئيس بنطاق أهوار محافظة ميسان .
- ٣- تحديد إمكانية ضرورة دراسة الظروف البيئية للمنطقة وتحديد إمكانية استثمارها من الناحيتين الاقتصادية والسياحية.
- ٤- ضرورة استغلال الموارد الزراعية بشقيها النباتي والحيواني من خلال استصلاح الأراضي التي يمكن زراعتها والواقعة على أطراف الاهوار الوسطى الجنوبية الشرقية الغربية في محافظة ميسان كما يمكن استغلال مساحات كبيرة من الأراضي في تربية الأبقار والجاموس حيث البيئة ملائمة لهذه الأغراض ، كما ويمكن إنشاء مزارع الأسماك على مساحات شاسعة .
- ٥- فتح قنوات مائية لتزويد مناطق الاهوار المجففة بالمياه من نهري دجلة والفرات وروافدهما اعتمادا على الحالة الطبيعية من مد وجزر في تجهيز الاهوار ومحاولة تقليل كميات المياه المسربة الى شط العرب لكي تتمكن الاهوار الوسطى الجنوبية الشرقية الغربية في محافظة ميسان من الحصول على حصة مائية اكبر.
- ٦- التأثيرات السلبية الناتجة من أعمال التجفيف محدودة في الوقت الحالي، إلا إنها ممكن أن تكون ظاهرة مستقبلية مؤثرة على حالة الاستقرار التكتوني للبيئة. لذا تحتاج منطقة حوض وادي الرافدين الأسفل إلى دراسة جيولوجية تركيبية لتخمين مقدار الهبوط التكتوني الحاصل بدقة فضلاً عن تقدير سمك الترسبات التي تضيفها الاهوار وذلك للتوصل إلى تقييم دقيق لمقدار حالة التوازن وعدم التوازن.
- ٧- حصل تجفيف لمساحات واسعة من الاهوار الوسطى الجنوبية الشرقية الغربية في محافظة ميسان ، إذ تم تجفيف ٩٠ % (من المساحة الأصلية).

المصادر :

- ١- العرود إبراهيم (٢٠٠١). التغير المناخي في الميزان ، جامعة مؤته ، عمان. ص ٥٤-٧٠.
- ٢- الخياط ، حسن (١٩٧٥). جغرافية اهورار ومستنقعات جنوبي العراق . المطبعة العالمية ، القاهرة. ص ٤-١٧.
- ٣- الهذال ، يوسف محمد علي حاتم (٢٠٠٩). كلية التربية ابن رشد / قسم الجغرافية ، العدد الحادي والاربعون ، مجلة ديالى.
- ٤- الربيعي ، ايمن عبد اللطيف كويس (٢٠٠٨). دراسة بيئية ومورفولوجية لأهورار جنوب العراق ، مركز علوم البحار، جامعة البصرة، العراق ، ٤٥٣-٤٣٧ : ٢٣ (٢) .
- ٥- محمد، عبد الرزاق محمود، وثامر سالم علي (١٩٩٤). أهمية الأهورار في حياتية بعض أنواع الأسماك. أهورار العراق دراسات بيئية ص (٢٠٥-٢١٥).
- ٦- حسك ، عامر (١٩٧٩) . أهورار جنوب العراق مطبعة المعارف بغداد .
- ٧- حسين، نجاح عبود (١٩٩٤) . أهورار العراق دراسات بيئية. منشورات مركز علوم البحار.
- ٨- عبد الرضا (١٩٩٤) . النباتات المائية في اهورار جنوب العراق. أهورار العراق دراسات بيئية ص (١٢٧-١٤٣).
- ٩- وزارة الموارد المائية (٢٠٠٥) . اهورار بلاد الرافدين منشورات مركز انعاش الاهورار ص (٩-٧).

USAID. (2003). Strategies for assisting the marsh dwellers and restoring the marshland in southern Iraq. Interim Status report.

11-Buringh, P. (1960). Soil and Soil Conditions in Iraq. Ministry of Agriculture Baghdad.

12-Black, C.A., Evans, D.D., Willter, L.L., Ensminger, L.E., and Clark, E.E.(1965) . Method of Soil analysis. Part 1 and 2. In Agronomy series. No.9, Am. Soc. Agron.

13-Jackson, M.L. (1958). Soil chemical analysis. Prentice-Hall In. Englewood Cliffs. Newjersey.

14-Page, A.I., Miller R.H. and Kenny D.R.(1982). Method of Soil analysis.Part II. Chemical and Biological Properties. Amer.Soc. Agron. Inc. Publishers, Wisconsin. USA.

**Study of Realistic Climatic and Environmental Morphology
Marshes of the Southern of East Central Western in Province of
Maysan**

Agricultural engineer

Mahdi Hanoon Nwaedh

Department of Development Marshes

Mobil: 009647705570501

Mail: mahdihanoonnwaedh@gmail.com

Iraq - Maysan - Amarah

**Republic of Iraq - Ministry of Agriculture - Directorate of
Agriculture of Maysan**

ABSTRACT

Is described south central marshes east of western as one of the unique attributes of sovereignty, including climatic features of the freshwater important environmental areas , These existing environmental study characterized currently assessing morphological status of the territory of south central marshes of the east of western, environmental and climate, by making some analyzes of the initial soil properties of the observed increase in calcium carbonate and the concentration of organic matter and the value of conductivity for electric and low value ((PH soil) . The study of changes in some water quality indicators in different locations. The study pointed to the deteriorating environmental situation due to the drying processes and morphological marshland situation.