

## تغاير تراكيز الحديد و المنغنيز و النحاس و الزنك في المياه الجوفية لخزان الدبدة الرملية لمنطقة سفوان - الزبير جنوب العراق-

م.د محمود عبد الحسن جويهل  
جامعة الكوفة \ كلية التربية للبنات

م.د سعدي عبد الجبار موسى الدّهان  
جامعة الكوفة \ كلية العلوم

### المستخلص :

إن النتائج المستحصلة بالنسبة لهذه العناصر هي أقل من الحدود السمية بالنسبة لمياه الري بل تعد ذوات نقص في محتوى هذه العناصر كتغذية للنبات عن طريق الري .

تمت دراسة تراكيز عناصر الحديد و المنغنيز و النحاس و الزنك في المياه الجوفية للطبقة العليا من خزان الدبدة مع الزمن و لفترة ستة أشهر . أوضحت الدراسة بوجود ترابط بين هذه العناصر مع عمر المزرعة إذ تبين بأن مياه بئر المزرعة الحديثة تحتوي على تراكيز منخفضة، مما يظهر بأن المياه الجوفية وبشكل أساسي تحتوي على نسب قليلة من هذه العناصر. وان زيادة التراكيز ما هي إلا نتيجة للتسميد وبإعادة تسرب مياه الري مجدداً للخزان الجوفي فضلاً عن وجود تراكيز محدودة في العدسات الطينية للخزان الجوفي .

### المقدمة :

قبل الدخول في التفاصيل الدقيقة لمعرفة الأسباب والآثار، في العناصر موضوعة البحث فلا بد لنا من معرفة الموقع الجغرافي والفلكي والإداري لمنطقة الدراسة. إذ تقع في ضمن دائرتي عرض ( ٢٩,٩° - ٣٠,٤٣° ) شمالاً، وقوسي طول ( ٤٦,٣٠° - ٤٧,٥٥° ) شرقاً شكل ( ١ )

وجد بأن هنالك ارتباط للتغاير بالنسبة للزنك و النحاس كمعدل عام بحدود ( ٦٨ % )، أي إنه يمكن تفسير تغاير الزنك و النحاس مع الزمن بحدود ( ٤٦ % )، في حين وجد بأن تغاير الزنك كارتباط مع تغاير للنحاس غير متوافق . كما ظهر بأن المنغنيز في هذه المياه ذو معامل ارتباط وبنسبة ( ٣٤ % ) مع الزمن وهو غير معنوي في حين وجد بأن الحديد ذو ارتباط ( ٩٠ % ) كتغاير مع الزمن، و تم التوصل إلى وجود علاقة إرتباطية بين الحديد م المنغنيز بحيث ان زيادة تراكيز الحديد مع الزمن يصاحبها عادة زيادة في المنغنيز وهذه عكس الحالة المستنبطة ما بين النحاس و الزنك و التي بموجبها تقل قيمة الزنك عند زيادة قيمة النحاس . و بصورة عامة فإن التقييم النوعي لتواجد هذه العناصر من الناحية الصحية هو أقل من الحد المسموح به لشرب الإنسان .

يحد منطقة الدراسة جغرافياً من الشمال قضائي القرنة والمدينة ومحافظة ذي قار . ومن الجنوب دولة الكويت ومن الشرق قضاء الفاو وأبي الخصيب . ومن الشمال الشرقي قضاء البصرة . ومن الغرب قضاء السلطان في محافظة المثنى . شكل ( ١ ) . تشغل منطقة الدراسة حوالي ( ١٠٠٦٠ كم<sup>٢</sup> ) من أجمالي محافظة البصرة البالغة ١٩٠٧٠ كم<sup>٢</sup> .

تحتل منطقة الدراسة الجزء الجنوبي الغربي من محافظة البصرة و الجزء الجنوبي الشرقي من الهضبة الغربية من العراق . وتمثل الأراضي الغدقة من الشرق والمطلّة على خور الزبير . والأراضي الرطبة المحاذية إلى هور الحمار من الشمال . أما من الغرب والجنوب فتعد امتداداً للهضبة الصحراوية التي تعد جزءاً من هضبة شبه الجزيرة العربية . يحدد تواجد العناصر النادرة و الثانوية في المياه

العرض هو الذي يحدد قيم الإشعاع الشمسي الواصل إلى مدينة البصرة . ووفق ذلك فأن مقدار زاوية الإشعاع الشمسي الواصلة إلى سطح المحافظة يختلف من شهر إلى آخر. إذ يرتبط ذلك مع حركة الشمس الظاهرية وان مقدار الحرارة يتناسب طردياً مع كبر زاوية الإشعاع الشمسي حيث تكون زاوية سقوط الإشعاع الشمسي فيها أكثر من ٥٠ درجة لثمانية أشهر.

وقد رافق كبر زاوية الإشعاع الشمسي زيادة في ساعات النهار حيث بلغت ما بين (١٢-١٤) ساعة زيادة خلال المدة الواقعة بين شهر آذار وأيلول.

جدول ( ١ ) المعدلات الشهرية للعناصر المناخية في منطقة الدراسة للفترة من ١٩٧٧- ٢٠٠٧

الأشهر	الإمطار التبخر		سرعة الرياح م/ثا	درجة الحرارة °C
	mm	mm		
.Oct	٦,٢	٣٠٨,١٥	٣,٨٠	٢٣,٥
.Nov	١٩,٤٥	١٦٢,٨٥	٣,٩٠	١٧,٩٠
.Dec	٢٢	١٠٢,٦٥	٣,٦٠	١٢,٥٠
.Jan	٢٩,٦	٩٢,٨٠	٣,٦	١٠,٧٠
.Feb	٢٠,٢٥	١٢١,٥٠	٤,٢	١٣,١٥
.Mar	٢٢,١	١٩٧,٣٥	٤,٤	١٧,٢٥
.Apr	١١,٧٥	٣٠١,٠٥	٤,٦	٢٣,٦٥
.May	٥,٨	٤٤١,٩٠	٤,٨٥	٢٩,٨٥
.Jun	٠,٠	٥٩٥,٦٠	٦,٢٠	٣٣,٨٥
.Jul	٠,٠	٦٦٥,٧٥	٦,٣٥	٣٥,٨
.Aug	٠,٠	٦٣٠,٢٠	٥,٧٥	٣٥,٠٠
.Sep	٠,٠	٤٧٥,٥٥	٤,٥	٣١,٤٥

#### درجة الحرارة

تعد درجة الحرارة من أهم العناصر المناخية المؤثرة تأثيراً مباشراً وغير مباشر على بقية العناصر المناخية. إذ من خلال معرفة قيم الأشعة الشمسية الواصلة إلى ارض المنطقة تحدد مقادير درجة الحرارة وكمية التبخر. وهي تتحكم في اختلاف وتباين قيم الضغط الجوي الذي ينسحب تأثيره في نظام واختلاف سرعة واتجاه حركة الرياح والمنخفضات الجوية والكتل الهوائية وما يرافقها من خصائص التساقط والجفاف.

ويعتمد الفرق بين أعلى درجات الحرارة وأقلها يومياً وسنوياً على الموقع سواء أكان قريباً من البحر ام اليابسة. ويعد معدل ارتفاع درجات الحرارة اليومي والسنوي من الخصائص البارزة لظواهر المناخ القاري وقد تم تقسيم معدلات درجات

الجوفية و تبايرها مع الزمن إمكانية استغلال هذه المياه للأغراض المختلفة. لذا تم المسح لـ (٧٥) موقعا لغرض تحديد العناصر ذوات التراكيز الأكثر وضوحاً فيما بينها. حيث جرت الدراسات على هذه المواقع ولمدة ستة أشهر.

يهدف البحث الحالي إلى متابعة تباير العناصر النادرة والثانوية مع الزمن لأجل معرفة تذبذب التراكيز و بيان الإمكانية حول صلاحية هذه المياه للأغراض المختلفة من ناحية تواجد هذه العناصر.

#### الطرائق ومواد البحث :

تمت متابعة اخذ النماذج المائية لمدة ستة أشهر و ابتداءً من شهر كانون الثاني من عام ٢٠٠٧ لـ ٧٥ موقعاً مختاراً شكل ( ١ ) . كما تم تحليل العناصر النادرة وهي النحاس والحديد والمنغنيز والزنك في مختبرات مركز الفرات للدراسات والتصاميم التابع الى وزارة الزراعة و الري .

إن عدد العينات التي تم تحليلها بلغ (٢٥) نموذجاً لكل عنصر فضلاً عن (٥) نموذجاً عشوائياً يمثل ثلاث مكررات للنماذج لـ ٦ أشهر و لأربعة عناصر حيث تم استعمال عدد من الجداول القياسية الخاصة بالمقارنات الإحصائية للتراكيز وتذبذبها كما تم تحديد الفروقات النسبية.

تتضمن الدراسة تركيب الدببة الرملي كخزان مائي يستغل منذ القدم و لحد الآن كمصدر مائي للزراعة و لشرب الحيوانات بصورة عامة. وفي عدد من المواقع لشرب الإنسان. و يتكون تركيب الدببة الرملي و خاصة الجزء العلوي منه من الرمل بالإضافة إلى الحصى و عدد من الطبقات الطينية محدودة الامتداد. و إن الخزان الجوفي للدببة يتكون من طبقتين مائيتين الأولى منها وهي السائدة ذات ملوحة أكثر من (١٠) ds/m. و الطبقة الثانية والتي هي أقل ملوحة نسبياً ناتجة عن جمع مياه الأمطار و السيول فوق الطبقة المالحة و بملوحة تتراوح بين اقل من (١٠) إلى أكثر من (٢) ds/m .

شكل (١) الموقع الجغرافي والفلكي لمنطقة الدراسة موزعاً عليها الآبار

#### أولاً: الخصائص المناخية

تقع محافظة البصرة في أقصى الجنوب الشرقي من العراق وهي البوابة الوحيدة التي تطل على الحد الشمالي لمياه الخليج العربي. يتصف مناخها بصورة عامة بالتطرف الكبير في درجات الحرارة وما لجم عنه في زيادة عدد الايام ذات الحرارة المرتفعة وأيام الخريف مع أيام الفصل البارد وبما لا شك فيه فأن موقع محافظة البصرة بالنسبة لدوائر

الحرارة شهرياً إلى ثلاث مدد وهي :

المدة الرطبة : وتمتد هذه المدة من تشرين الثاني (١٧,٩٠) ولغاية آذار (١٧,٢٥) وأوطأ معدل درجة حرارة كانت في كانون الثاني (١٠,٧٠).

المدة الجافة : وتمتد هذه المدة من حزيران (٣٣,٨٥) ولغاية أيلول (٣١,٤٥) وسجلت أعلى معدل درجة حرارة في شهر تموز (٥٣,٠٠).

المدة الانتقالية : وتتمثل هذه المدة بالأشهر نيسان ومايس وتشرين الأول وتعد فترة انتقالية بين المدتين .  
الرياح :

تتسم الرياح الهابة على العراق بصورة عامة وعلى منطقة الدراسة بشكل خاص بقلّة معدلات سرعتها نتيجة لوقوعها تحت تأثير نطاق الضغط العالي شتاءً والمنخفض الحراري صيفاً. يتراوح متوسط سرعة الرياح ما بين ٥,٦٥ م/ثا في شهر مايس إلى شهر آب بقيم بلغت (٤,٨٥ - ٤,٤) م/ثا (العبد الله, ٢٠٠٦) ولسرعة الرياح دور فاعل في التأثير على عدد من خصائص التربة إذ أن زيادة سرعة الرياح وبخاصة تلك الرياح التي تهب خلال أشهر الجفاف فأنها تؤدي إلى زيادة مقدار التبخر من سطح الأرض .

الأمطار :

يبدأ تساقط الأمطار في منطقة الدراسة خلال المدة الممتدة من شهر تشرين الأول حتى نهاية نيسان. وذلك لقدم المنخفضات الجوية المتوسطة إلى العراق بصورة عامة وإلى منطقة الدراسة بشكل خاص. وينقطع تساقط الأمطار وتبدأ فترة الجفاف ابتداءً من شهر حزيران وحتى نهاية شهر أيلول وذلك يعود إلى أن المنطقة تصبح تحت تأثير نطاق الضغط العالي شبه المداري، فضلاً عن قلّة وصول المنخفضات الجوية المتوسطة التي تغير مسارها عن العراق درست المعدلات الشهرية للأمطار للمدة المذكورة أعلاه جدول (١) الذي من خلاله يمكن تقسيم السنة المائية إلى ثلاث مدد وهما :-

-المدة الجافة: تتمثل هذه المدة بالأشهر حزيران وتموز وآب وأيلول. حيث كانت المعدلات الشهرية ٠,٠ ملم .

-المدة الانتقالية: تتمثل هذه المدة بالأشهر تشرين الأول وأيار حيث يكون معدل الأمطار اقل من ١٠ ملم .

-المدة الرطبة : وتتمثل هذه المدة بالأشهر تشرين الثاني وكانون الأول وشباط وآذار ونيسان. وقد تراوحت المعدلات الشهرية من ١٩,٤٥ ملم إلى ١١,٧٥ ملم. الملاحظ أن فترة سقوط الأمطار تبدأ من شهر تشرين الثاني لتصل إلى أعلى معدلاتها في شهر

كانون الأول ثم تبدأ بالتناقص وبصورة متناظرة .

التبخر:

تتفاوت قيم التبخر الشهرية في منطقة الدراسة تبعاً لتفاوت المتغيرات المؤثرة عليها. وخاصة كمية الإشعاع الشمسي ودرجات الحرارة وسرع الرياح التي تناسبت معها بعلاقة طردية ومقدار الرطوبة النسبية التي ارتبطت معها بعلاقة عكسية. تتدنى المعدلات الشهرية للتبخر خلال الفترة الممتدة من شهر تشرين الثاني إلى نهاية شباط . ثم تزداد المعدلات تدريجياً اعتباراً من شهر آذار لتصل ذروتها خلال الفترة الممتدة من شهر مايس إلى نهاية شهر أيلول. ويعزى ذلك إلى ارتفاع درجات الحرارة وزيادة كمية الإشعاع الشمسي مع انخفاض مقدار الرطوبة النسبية. ومن دراسة المعدلات الشهرية جدول (١) للمدة المذكورة أعلاه فقد تم تقسيم معدلات التبخر شهرياً إلى ثلاث :

- المدة الأولى: حيث يكون التبخر اقل من ٢٠٠ ملم شهرياً وتتمثل بالمدة من تشرين الثاني ولغاية آذار .

- المدة الثانية: حيث يكون التبخر اكبر من ٣٠٠ ملم شهرياً وتتمثل بالمدة من شهري نيسان وتشرين الأول.

- المدة الثالثة: حيث يكون التبخر أعلى من ٣٥٠-٧٠٠ ملم شهرياً وتتمثل بالمدة من مايس ولغاية أيلول.

ثانياً: المياه الجوفية

تتأثر نوعية المياه الجوفية بالتكوينات الجيولوجية وخاصة عملية الترشيح مع سيادة التكوينات الغنية بالأملاح المختلفة مع زيادة ملوحة مياه القنوات والجداول الأروائية وزيادة ملوحة الطبقة السطحية من التربة وانحدار السطح ونسجه التربة.

ويعتمد مدى مساهمة المياه الجوفية في تملح التربة بالدرجة الأساس على عمق اوبعد المياه الجوفية عن سطح التربة. فالمياه الجوفية البعيدة من سطح الأرض لا تساهم كثيراً في تملح التربة. في حين ترى مساهمة المياه الجوفية القريب من سطح التربة في عملية التملح. ويطلق على العمق الذي يبدأ فوقه المياه الجوفية بالمساهمة في عملية التملح بالعمق الحرج وذلك من خلال صعود الماء إلى سطح التربة بالخاصية الشعرية. ويعتمد العمق الحرج للمياه الجوفية على عدة عوامل منها مرتبط بالظروف المناخية كدرجات الحرارة وشدة التبخر وقلّة أو انعدام تساقط الأمطار ومنها مرتبط بصفات التربة الفيزيائية وخاصة نسجه التربة ومنها مرتبط بصفات المياه وخصوصاً كمية ونوعية الأملاح الذائبة فيها.

النتائج و المناقشة :

مع الزمن كمعدل يمثل ٣٤٪ لمعامل الارتباط وهو أقل من النحاس و الزنك بينما تباير الحديد مع الزمن كمعدل هو ٩٠٪ أي إن هنالك ارتباط مباشر بين تركيز الحديد و تبايره مع الزمن بحيث من الممكن أن نفسر العلاقة ل) ٪ (٨) توافق .

جدول (٢)

معدل دقة التحاليل معيرة كانحراف معياري لثلاث مكررات

العناصر	الانحراف المعياري	المعدل (جزء من المليون)	التباير ٪
Fe	٠,٠٠٤	٠,٠٣	١٣,٣
Mn	٠,٠٠٧	٠,٠٨	٨,٨
Cu	٠,٠٠٣	٠,٠٩	٣,٣
Zn	٠,٠٠١	٠,٠١	١٠,٠

الانحراف المعياري

$$\frac{\text{التباير}}{\text{المعدل}} \times 100 =$$

لأجل معرفة دقة التحاليل تم استخدام الانحراف المعياري كمقياس كما هو موضح في الجدول (٢) و الذي يمثل معدل دقة التحاليل لـ (٦) أشهر للعناصر بثلاثة مكررات لكل شهر ووجد بأن الانحراف المعياري هو جزء من الألف ما يدل بأن التحاليل كانت دقيقة جداً .

ويتضح من الجدول (١) بأن المعدل بالنسبة للحديد هو أعلى من النحاس ويليه المنغنيز ومن ثم الزنك وان التباير في المنغنيز هو أعلى من النحاس ومن ثم الزنك و الحديد وهذا يعني بان التباير في الحديد هو الأقل و الأكثر دقة .

درست المعطيات الهيدروكيميائية وتبايرها مع الزمن وتم إيجاد المعدل للتراكيز و الانحراف المعياري و الحد الأدنى و الأعلى مع الزمن جدول (٣) ويتضح من الجدول ايضاً بان الحد الأدنى هو صفر بالنسبة للزنك وخلال طول الفترة الزمنية بينما الحديد يكون الحد الأدنى أيضاً صفر من كانون الثاني إلى مايس و يصل إلى ٠,٠٤٨ في شهر حزيران بينما المنغنيز و النحاس تظهر لها قيم تراكيز في شهري شباط و حزيران فقط إن عدم تواجد هذه العناصر ممثلة كحد أدنى مترابط مع المزارع الحديثة التكوين حيث يعكس فكرة تواجد هذه العناصر في المياه الجوفية هو أصلاً قليل بينما الحد الأدنى لهذه العناصر يظهر في المزارع الأقدم ما يوضح فكرة تسرب هذه العناصر في الطبقات الطينية العدسية في هذه الآبار .

لا يوجد أي اتجاه للزيادة و النقصان بصورة عامة للتراكيز مع الزمن وهذا بالطبع ناتج عن التأثير المتبادل بين مياه الري المتغلغلة إلى المياه الجوفية و إعادة استخدامها مرة أخرى للزراعة .

إن العلاقة الارتباطية بين التباير مع الزمن بالنسبة للزنك كمعدل للتراكيز هو ٦٨٪ وهو ما يعادل ٤٦٪ توافق بين التباير و الزمن (شكل ٢) أي انه من الممكن إن تفسر ٤٦٪ من تباير التراكيز إلى عامل الزمن خلال فترات السقي .

إن الانحراف المعياري هو أعلى من المعدل ما يدل على إن التباير في هذا المعدل كبير جداً أكثر من ١٠٠٪ فعليه لا يوجد نظام خاص يتحكم بالتواجد الطبيعي للزنك بل يعتمد أساساً على تحرر هذا العنصر من السماد الحيواني و الكيماوي إلى المياه الجوفية .

بالنسبة للنحاس نرى بأن نفس علاقة الزنك و تبايره مع الزمن موجودة ما يدل على وجود ترابط بين الزنك و النحاس . وعند معاملة الزنك مع النحاس كمتغير وجد أن معامل الارتباط هو بحدود ٢٤٪ أي إن هنالك ارتباط ضعيف بين النحاس و الزنك وبمعنى آخر ان تباير الزنك غير مترتب معنويًا بتباير النحاس أن تباير المنغنيز

جدول رقم (٣) الحد الأدنى والأعلى و المعدل والانحراف المعياري للحديد و المنغنيز و النحاس و الزنك

الأشهر	الحد الأعلى						الحد الأدنى						الأشهر
	Mn	Cu	Zn	Fe	Mn	Fe	Mn	Cu	Zn	Fe	Mn	Cu	
كانون الثاني	٠,٠٢	٠,٠١٤	٠,٠٠٣	٠,٠٧	٠,٠٦	٠,٠٤	٠,٠١٤	٠,٠٠٧	٠,٠١٢	٠,٠١٠	٠,٠٤	٠,٠٢١	٠,٠٠٠
شباط	٠,٠٢	٠,٠٤	٠,٠٠٧	٠,١٢٤	٠,١٢	٠,٠٦٠	٠,٠١٤	٠,٠٠٧	٠,١٢٤	٠,٠١٠	٠,٠٤	٠,٠٥٢	٠,٠٠٠
آذار	٠,٠٢	٠,٠٢	٠,٠١٣	٠,١٦١	٠,١٠	٠,٠٨١	٠,٠١٤	٠,٠١٤	٠,١٦١	٠,١٠	٠,٠٨١	٠,١١٥	٠,٠٠٠
نيسان	٠,٠٨	٠,٠٥١	٠,٠٢	٠,٠٦	٠,٠٢	٠,٠٢	٠,٠١٤	٠,٠٢٤	٠,٠٢	٠,٠٢	٠,٠٤	٠,٠٣٠	٠,٠٠٠
مايس	٠,١٥٤	٠,٠٣	٠,٠٢	٠,٠٤	٠,٠٢	٠,٠٤	٠,٠٣١	٠,٠٥٥	٠,١٦٠	٠,٠٧١	٠,٠٥٠	٠,١٠	٠,٠٠٠
حزيران	٠,١٣	٠,٠٠٢	٠,٠٠٢	٠,٠٣	٠,٠٧	٠,٠٥	٠,٠٥٠	٠,٠٠٦	٠,٠٩١	٠,٠١٤	٠,٠٩٠	٠,٠٨١	٠,٠٠٠
	٠,٠٧٠	٠,٠١٠	٠,٠٠٧	٠,٠١٢	٠,٠١٠	٠,٠٠٧	٠,٠٠٧	٠,٠٠٦	٠,٠١٠	٠,٠٠٧	٠,٠٠٧	٠,٠٠٦	٠,٠٠٠
	٠,٠٩	٠,٠٢١	٠,٠١٣	٠,٠١٤	٠,٠١٠	٠,٠٠٦	٠,٠٠٦	٠,٠٠٦	٠,٠١٠	٠,٠٠٧	٠,٠٠٧	٠,٠٠٦	٠,٠٠٠

العلاقة بين الحد الأدنى و الأعلى  
العلاقة بين المعدل و الانحراف

\*\*معامل الارتباط=(الحد الأعلى للمعدل \_معدل ك٠٠٠٢)÷(الحد الأعلى للمعدل \_ معدل شباط \* ١٠٠)  
.....(الحد الأعلى للمعدل \_معدل حزيران \* ١٠٠)÷٦٨%

به لشرب الحيوانات هو ٠,٥ (جزء بالمليون) وهذا الحد أعلى بكثير من تباير النحاس مع الزمن عدا شهر نيسان وفي موقع واحد فقط . و الذي لا يمثل إلا نسبة ١,٢٥٪ فقط .

إن الحد الأعلى للحديد والمنغنيز في مياه الشرب هو (٠,٣ و ٠,٥) (جزء بالمليون) (شكل ٤) حيث نرى أن تواجد الحديد والمنغنيز هي أقل بكثير من هذين الحديدين وبهذا فلا تعد خطورة من تباير تراكيز الحديد والمنغنيز في المياه الجوفية لسفوان والزبير بل تعتبر نقص أيضا . كذلك فان تباير الحديد والمنغنيز في هذه المياه غير سمي للنبات والحيوان.

لغرض معرفة العلاقة بين مياه وتربة منطقة الدراسة تم تحليل (٢٠) نموذجاً مختاراً من أصل ٧٥ موقعاً وأجريت عليها تحاليل الحديد والزنك والمنغنيز والنحاس .

وتبين بان الحديد والمنغنيز هما أعلى نسبة من الزنك والنحاس , فمثلا الحديد والمنغنيز يتراوح بين أكثر من ١ ملغم كغم و اقل من ٦ ملغم كغم . في حين ان الزنك يتراوح بين أكثر من ٠,٢ ملغم كغم إلى اقل من ١,٥ ملغم كغم ويتراوح تركيز النحاس في ترب سفوان - الزبير بين أكثر من ملغم كغم و اقل من ٠,٥ ملغم كغم . وتؤيد هذه النتائج إلى ما توصلنا إليه من استنتاج حول أصل العناصر النادرة في المياه الجوفية هو من الرسوبيات وان الزيادة العظمى هي نتيجة التسميد .

#### References :

- ١- Ayob , M.S. , Al-Arri , S.A. and Salih ,A.E.Y. Groundwater quality variation during pumping / jolak basin , J. Agrio Water Reso. Res. , -١١١ : (٣)٤ (١٧٩) ١٩٨٥) .
- ٢- Hassan , H.A. , Al-Ani , S.A. and Musa , S.A. , Groundwater pollution of Altun-Kupri Basin ( trar elements and mjnnor elements ) ,JBSR, -١٠١ : (١)١٧ (١١٢) ١٩٨٦) .
- ٣- Brown ,e. ,Skougsted ,M.W. and Fishman ,M.J. ,Methods for collection and analysis of water samples for dissolved minerals and gases ,Books , chapter A,Techniques of Water Resources Investigations of the U.S. Geological Survey, ١٦٠ p. (١٩٧٠) .
- ٤- Hassan , H.A. ,Hydrogeological conditions of the central part of the Erbil Basin ,unpublished

تباير التراكيز إلى عامل الزمن = (الحد الأعلى ك٢ \_ معدل ك٢)+(الحد الأعلى لشبباط \_ معدل شبباط).....+(الحد الأعلى لحزيران \_ معدل حزيران)=٤٦٪

يزداد الحد الأعلى للتركيز من شهر كانون الثاني إلى نيسان ثم يقل بعد ذلك .وان العلاقة الارتباطية بين الحديد والمنغنيز هي ٤١٪ وهناك اتجاه عام بالارتباط بين الزيادة والنقصان أي عند زيادة الحديد تزيد قيمة المنغنيز وهي عكس الحالة ما بين النحاس والزنك. اذ عند زيادة النحاس تقل قيمة الزنك .

إن الحد المسموح به لتواجد الزنك في مياه الشرب هو (٥ جزء بالمليون) حسب المواصفات العالمية. أما بالنسبة للنحاس فان الحد المسموح به هو (١ جزء بالمليون) و ان هذا الفرق بالحدود ناتج عن احتمالية حاجة الإنسان إلى الزنك أكثر من النحاس وتأثيره غير المرغوب به, إن (شكل ٣) يمثل الحد الأعلى والمعدل مقارنة بالقيم المذكورة أعلاه والحد المسموح به لتواجدها من الناحية الصحية في المياه .

ويتضح من الشكل ايضا بان تباير الزنك مع الزمن هو اقل بكثير من الحد الأعلى المسموح به للشرب ولهذا فان هذه المياه تعد مياه ذوات نقص في تواجد الزنك. في حين نجد بان تواجد النحاس يكون اقل من نصف جزء بالمليون خلال فترة الدراسة وهي اقل من الحد المسموح به للشرب . وبهذا فان هذه المياه من ناحية تباير الزنك والنحاس تعتبر مياه ذات نقص في هذين العنصرين .

إن تواجد النحاس في المياه هو في عدد من الأشهر يكون أعلى من ٠,٢ (جزء بالمليون) مما يؤثر في نمو عدد من النباتات وخاصة إذا كان هنالك إضافة من المحاليل المغذية (أي التسميد) و بالتالي تكون المياه خلال شهر نيسان فقط ذات محتوى من النحاس أعلى من الحد المسموح به بالنسبة للنبات اما المواقع الباقية فهي أقل من ٠,١ (جزء بالمليون) .

أما بالنسبة لتواجد الزنك فان الأكاديمية العلمية الوطنية الأمريكية و الأكاديمية العلمية الهندسية أعطت الحد السمي لتواجد الزنك في المياه للنبات و بحدود ٢ (جزء بالمليون) وان تواجد الزنك في هذه المياه هو اقل بكثير لهذا تعتبر هذه المياه ذات نقص في تواجد الزنك بالنسبة للنبات .

وأوضحت الأكاديمية أيضا بان الحد الأعلى لتواجد الزنك في مياه لشرب الحيوانات هو ٢٤ (جزء بالمليون) و أيضا من هذا المنطلق فان مياه سفوان - زبير تمثل نقصا في تواجد الزنك أما النحاس فان الحد الأعلى المسموح

The Variation of Fe, Mn, Cu and Zn Concentrations in The Groundwater of The Dibdiba Sandy Aquifer ,Safwan -Zubair S. Iraq

S.A. J. M. Al-Dahaan  
Jwaehl

M.A.H.

Kufa Uni. - Sciences College  
Education College

Kufa Uni. -

Physical Part  
Part

Geographical

:Abstract

The concentration of Fe ,Mn ,Cu &Zn in groundwater for the upper part of dibdiba aquifer . were studied with time for six mounth

The result reflect a considerable relation with the age of the well, where the new far groundwater has relatively low trace element concentration while the old farms groundwater has relatively high concentration due the applied fertilizers and vercylic irrigation water the aquifer as well as the extistance of these elements in the clayey lenses . in the Dibdiba Formation

Further more , the Zn and Cu variation with time is as a general mean . while can expain ٪٨٦ about of time- concentration variation. The (Zn ,Cu ٪٤٦ ) function is not cross correlated as they are not . related

correlation with ٪٩٠ . While the Fe variation has time and positive correlation was found between Fe & Mn while the reverse is true between Zn and .Cu

A regional evaluation of the groundwater for irrigation and drinking purpose was made according to the international standared for the elements Fe,Mn,Cu and Zn and it was found to good water for all purposes a and it is free from .the pollution with these four trace elements

Ph.d. thesis , Baghdad University , ١٧٩ p. (١٩٨١) .

-٥ National Academy of Science , Drinking Water and Health , Washington D.C. (١٩٧٧) .

-٦ National Academy of Science and National Academy of Engineering ,Water quality criteria , U.S. Environnental protection Agency , Washington Dc. Report No. EPA-R ٠٣٣,٥٩٢-٣٧٣ p. (١٩٧٢) .

المصادر العربية

١- علي ، مقداد حسين ، محمد ، خليل إبراهيم ، حسون ، نضير عباس ، ٢٠٠٠ . علوم مياه ، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر، بغداد ، ٢٠٠٠ .

٢- هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي معلومات مناخية محطة البصرة

٣ - العبد الله ، نجم عبد الله رحيم.(٢٠٠٦) الخصائص الفيزيائية والكيميائية لتربة محافظة ذي قار وتأثيراتها في الإنتاج الزراعي (دراسة في جغرافية التربة). أطروحة دكتوراه(غير منشورة). جامعة البصرة / كلية الآداب .

