

التوزيع الجغرافي لزراعة وإنتاج محاصيل الخضر الصيفية في قضاء عفك

لعام ٢٠١٩

أ. م. د. انتظار إبراهيم الموسوي

م. م. أركان مظهر راضي

ملخص البحث:

يدرس البحث التوزيع الجغرافي لزراعة الخضر الصيفية في قضاء عفك لمعرفة أهم العوامل الجغرافية المؤثرة على ذلك التوزيع ودرجة التباين في المساحات المزروعة بحسب المقاطعات الزراعية وكمية الانتاج والانتاجية للمحاصيل. وقد توصل البحث الى استنتاجات علمية كان من أهمها إن نسبة (٧٢,٤%) من المساحة المزروعة بمحاصيل الخضر الصيفية في القضاء تركزت في أربع مقاطعات هي (١٧ و ١٨ و ١٦ و ٢٤) وبنسبة (٢٧,٣% و ١٧,٩% و ١٥,١% و ١٢,١%) لكلٍ منها على الترتيب ، بينما لم تزرع هذه المحاصيل في مقاطعتي (٢٦ و ٢١) الأولى لشحة المياه والثانية لصغر مساحتها وتخصصها بزراعة بساتين النخيل. في حين كانت أقل مساحة مزروعة في مقاطعتي (٢٣ و ١٩) وبنسبة (٣,٥% و ٥,٤%) لكلٍ منهما على الترتيب. وإن أكبر كمية إنتاج تحققت في محصولي الرقي والبطيخ بينما تحقق أقل كمية إنتاج في محصولي اللوبياء والطماطة وإن أعلى إنتاجية كانت لمحصول البطيخ والبالغة (٦٧٦٥ كغم/دونم)، تلتها بالمرتبة الثانية إنتاجية محصول الرقي ب(٥٦٩٩ كغم/دونم)، ثم إنتاجية محصول الطماطة (١٢١٤ كغم/دونم)، وأقل إنتاجية حصلت في محاصيل ثلاثة هي (اللوبياء والبالما والخيار) بواقع (٣٢٢ و ٥٢٨,٤ و ٥٧٧,٩) كغم/دونم لكل منها على الترتيب. وضع البحث بعض المقترحات التي من شأنها تحسين إنتاج وإنتاجية تلك المحاصيل لسد الحاجة المحلية والاقليمية منها مثل توفير الدعم الحكومي وتوفير القروض الزراعية للمزارعين بما يسهم في التشجيع على زراعتها وتوفير البذور والأسمدة والمبيدات التي تسهم في زيادة وتحسين نوعية المنتج وزيادته. واخيراً توعية الفلاحين من قبل المرشدين الزراعيين على أهمية زراعة تلك المحاصيل ليساهم بزيادة جودة المنتج الزراعي المحلي.

Assistant Professor Dr. Ainthar Abraham Al-musawy

Assistant Lecturer. arkan mazhar rady

Geography Department / College of Arts

University of Al-Qadisiya


Research Summary:

The research studies the geographical distribution of summer vegetable cultivation in Afak district to find out the most important geographical factors affecting that distribution and the degree of variation in the cultivated areas according to the agricultural provinces and the amount of their production and productivity. The research reached scientific conclusions, the most important of which was that (72.4%) of the area planted with summer vegetable crops in district was concentrated in four provinces (17, 18, 16 and 24) and by (27.3%, 17.9%, 15.1% and 12.1%). While the lowest cultivated area was in the provinces (23 and 19) and by (3.5% and 5.4%) each, respectively. The largest production was achieved in the crops of watermelon and watermelon, while the smallest amount of production was achieved in the beans and tomato crops. The highest productivity was for watermelon crop (6765 kg/dunum), followed by the second highest yield of grazing crop (5699 kg/dunum), then tomato crop yield (1214 kg/dunum), and the lowest productivity was in three crops (cowpea, okra, and cucumber) According to (322, 528.4 and 577.9) k/dunum each, respectively. The research forward some proposals that improve the production and productivity of these crops to meet the local and regional needs, such as providing government support and providing agricultural loans to farmers, which contributes to encouraging their cultivation and providing seeds, fertilizers and pesticides that contribute to increasing and improving the quality and increase of the product. Finally, farmers are educated by the agricultural extension agents on the importance of cultivating these crops to contribute to increasing the quality of the local agricultural product.

المقدمة :

أن الجغرافية علم مكاني يدرس تباين الظواهر الجغرافية ويوضح العلاقات السببية لتغيرات خصائص المكان لذلك فدراسة استعمالات الأرض الزراعية تهدف إلى تحليل وتوضيح كيفية استغلال الإنسان للأرض وإظهار مستوى استثماره لها في نطاق معين من خلال مدة زمنية محددة لمعرفة مدى التوافق بين الإمكانيات الجغرافية المتاحة من ناحية والاستعمال من حيث مستواه وحجمه ونوعيته وخصائص أدوات الإنتاج المختلفة ومدى كفايتها من ناحية أخرى. ويمكن صياغة مشكلة البحث: بالتساؤل الرئيس الآتي (ما هو التوزيع الجغرافي لمحاصيل الخضر الصيفية في قضاء عفاك؟) وتتطلب من هذا التساؤل تساؤلات فرعية تتمثل بـ(ماهي العوامل الجغرافية المؤثرة على ذلك التوزيع؟ وهل هناك تباين في المساحات المزروعة بحسب المقاطعات الزراعية؟ وما هي كميات انتاج المحاصيل الزراعية في القضاء؟) ويمكن صياغة فرضية البحث: الرئيسة بـ(تتوزع زراعة محاصيل الخضر الصيفية في معظم مقاطعات القضاء. أما الفروض الفرعية فتمثلت بـ(تتأثر زراعة محاصيل الخضر بمجموعة من العوامل الطبيعية والبشرية. وتتباين المساحات المزروعة من مقاطعة إلى أخرى. وهناك تباين في كميات الإنتاج والإنتاجية لتلك المحاصيل) يهدف البحث: إلى الوقوف على واقع حال التوزيع الجغرافي للمساحات المزروعة بمحاصيل الخضر الصيفية وتحديد العوامل المؤثرة في هذا التوزيع مع تحديد كميات انتاج كل محصول في منطقة الدراسة. أما مبررات البحث: فتمثلت بالحد من ظاهرة الاعتماد على استيراد محاصيل الخضر فمنطقة الدراسة من المناطق الزراعية المهمة في محافظة القادسية والتي تنتج العديد من المحاصيل الزراعية لتوافر الظروف الطبيعية والبشرية لها ولاسيما محاصيل الخضر الصيفية لتوفير كميات تغطي حاجة المحافظة منها وتصدير قسم منها إلى المحافظات المجاورة ، بينما تمثل منهج البحث: بالمنهجين النظامي والتحليلي لدراسة وتحديد العوامل الجغرافية المؤثرة في التوزيع الجغرافي لزراعة محاصيل الخضر وتحليل هذا التوزيع بحسب المقاطعات الزراعية. أما حدود البحث: فتمثلت بالحدود الزمانية للموسم الصيفي في عام ٢٠١٩. أما الحدود المكانية فيقع القضاء فلكياً بين دائرتي عرض (٣١,٥٢,٤٠ و ٣٢,١٣,٢٠) شمالاً وخطي طول (٤٥,٠٨,٤٥ و ٤٥,٣٣,٣٠) شرقاً ، ويحده من الشمال والشمال الغربي ناحية نقر ومن الغرب قضاء الديوانية ومن الشرق محافظة واسط ، أما من الجنوب والجنوب الشرقي فتحده ناحية البدير خريطة (١). وتضمنت هيكلية البحث: مقدمة ومبحثين تناول المبحث الأول (العوامل الجغرافية المؤثرة في زراعة محاصيل الخضر الصيفية لعام ٢٠١٩) ، فيما تناول المبحث الثاني (واقع التوزيع الجغرافي لزراعة الخضر في قضاء عفاك)، بالإضافة إلى الاستنتاجات والمقترحات وقائمة بالهوامش والمصادر المستعملة بالبحث.

خريطة (١) موقع منطقة الدراسة



المصدر: اعتماداً على: ١. وزارة الموارد المائية، المديرية العامة للمساحة، قسم إنتاج الخرائط الرقمية M.P.D، خارطة محافظة القادسية بمقياس ١ / ٥٠٠٠٠٠ عام ٢٠٠٧. ٢. جمهورية العراق، وزارة الزراعة، مديرية زراعة محافظة القادسية، خارطة مقاطعات محافظة القادسية بمقياس ١ / ٥٠٠٠٠٠ عام ٢٠١٢.

جدول (١) أرقام وأسماء المقاطعات في منطقة الدراسة

رقم المقاطعة	أسم المقاطعة	رقم المقاطعة	أسم المقاطعة	رقم المقاطعة	أسم المقاطعة
١	قصبه عفاك	١٨	الخمسات والهورة	٢٣	أم الطوس وصويلة
٢	أم العظام	١٩	العويجة	٢٤	الكفيشة والجبسة
٣	الطيانيات	٢٠	بساتين شط حسين	٢٦	جزيرة شط النيل والدمج
١٦	الجزرة	٢١	بساتين الشجير		

		الكوفياية والشريبية	٢٢	والصكراوية العشرة والسحل	١٧
--	--	------------------------	----	-----------------------------	----


المصدر: اعتماداً على خريطة (١).

المبحث الأول: العوامل الجغرافية المؤثرة في زراعة محاصيل الخضر الصيفية

تعطي معرفة العوامل الجغرافية إمكانية إقامة العمل الزراعي وتجنبه التذبذب وعدم الانتظام فضلاً على كونها تسهل عملية استعمال الآلات والمكائن في مختلف عمليات الإنتاج الزراعي.^(١)
أولاً: العوامل الطبيعية:

١. التركيب الجيولوجي: يكشف العامل الجيولوجي عن نوعية وطبيعة وتركيب الصخور التي تحددها العصور الجيولوجية التي مرت بها المنطقة والتي تحدد بدورها الوضع الطبوغرافي فيها،^(٢) وتعد منطقة الدراسة من التكوينات الحديثة ضمن سهل العراق الفيضي وساعد هذا التكوين على أن تتميز بخصوبة التربة وسهولة أداء العمليات الزراعية من حراثة وشق قنوات المياه مما كان له دور في إضفاء الصفة الزراعية على منطقة الدراسة، كما توجد فيها بعض تكوينات ترسبات المستنقعات في الجزء الأوسط منها وترسبات المنخفضات المطمورة في الجهات الجنوبية الغربية، وبعض الترسبات الريحية والكثبان الرملية في جزئها الشرقي خريطة (٢)


خريطة (٢) التركيب الجيولوجي في منطقة الدراسة



المصدر: اعتماداً على جمهورية العراق، وزارة البلديات والأشغال العامة، المديرية العامة للتخطيط العمراني، مديرية التخطيط العمراني في محافظة القادسية، الخطة الهيكلية لمحافظة القادسية، الخارطة الجيولوجية بمقياس ١ / ٥٠٠٠٠٠، عام ٢٠١٢.

٢. السطح : يعد السطح من العوامل المؤثرة في الإنتاج الزراعي، إذ يتحدد تأثيره بارتفاعه وانخفاضه عن مستوى سطح البحر بالإضافة لدرجة الانحدار التي تؤثر على التربة،^(٣) حيث يؤثر في نوع التربة ومدى ملائمتها للإنتاج الزراعي. وتعد السهول من أهم أقسام السطح ملائمة للإنتاج الزراعي، وتتميز أغلب أراضي منطقة الدراسة بكونها تنتمي لأراضي السهل الرسوبي باستثناء بعض المساحات الرملية وأراضي المنخفضات المطورة في الجزء الشمالي الشرقي خريطة (٣)

خريطة (٣) أقسام مظاهر السطح في منطقة الدراسة



المصدر: اعتماداً على جمهورية العراق، وزارة البلديات والأشغال العامة، المديرية العامة للتخطيط العمراني، مديرية التخطيط العمراني في محافظة القادسية، الخطة الهيكلية لمحافظة القادسية، خارطة مظاهر السطح بمقياس ١ / ٥٠٠٠٠٠، عام ٢٠١٢.

٢. المناخ : يؤدي المناخ بعناصره المختلفة دوراً رئيسياً مهماً في تحديد أنماط ومناطق الإنتاج الزراعي، إذ إن كل نوع من المحاصيل له متطلبات مناخية محددة تنتشر زراعته بتوفرها، فالمناخ هو الذي يساهم في تحديد مواسم زراعة كل محصول بحسب فصول السنة.^(٤) وتقع منطقة الدراسة ضمن إقليم المناخ الصحراوي. وتعد الحرارة من أهم عناصر المناخ المؤثرة في جميع العمليات الفسيولوجية والحيوية للنبات، ويكون تأثيرها بصورة مباشرة وغير مباشرة إذ تؤثر في عملية البناء الضوئي وعملية امتصاص المواد الغذائية من التربة وكذلك في نشاط الجذور وعملية التنفس وسرعة عمليات التبخر والنتح، وهناك متطلبات حرارية ينمو فيها المحصول فكل محصول له حدود عليا وحدود دنيا ومثالية للنمو لدرجة الحرارة اللازمة وإذا زادت عن الحد المطلوب يؤدي ذلك إلى تغير في النبات يبدأ من المظهر الخارجي ، ويبين جدول (٢) إن أدنى درجة حرارة لنمو محاصيل الخضر الصيفية هي (١٠م) وهي الحد الأدنى من درجة الحرارة لنمو محصول الطماطة ، بينما تراوحت درجة الحرارة الدنيا لباقي محاصيل الخضر بين (١٥ - ١٦م)، في حين إن أعلى درجة حرارة يتحملها النبات هي (٤٠م) لكل من محاصيل الرقي والخيار والبااميا، بينما تراوحت لباقي محاصيل الخضر بين (٣٥ - ٣٨م)، أما درجة الحرارة المثالية لمحاصيل الخضر الصيفية فكانت (٢٥م) لمحصول الشجر وبين (٢٩-٣٠م) لمحاصيل البطيخ والفلل والبادنجان والطماطة في حين بلغت (٣٥م) لكل من الرقي والخيار.

جدول (٢) المتطلبات الحرارية لمحاصيل الخضر الصيفية


المحصول	الرقي	البطيخ	الفلل	البادنجان	الخيار	الطماطة	الشجر	اليام
درجة الحرارة الدنيا(م)	-١٥	-١٥	١٦-١٥	١٦-١٥	-١٥	١٠	١٦	١٥
درجة الحرارة العليا(م)	٤٠	٣٨	٣٨-٣٥	٣٨-٣٥	٤٠	-٣٥	٣٨	٤٠
درجة الحرارة المثالية(م)	٣٥	٣٠	٢٩,٥	٢٩,٥	٣٥	٢٩,٥	٢٥	٣٥
الحرارة المتجمعة/ وحدة حرارية مئوية (م)	١١٠٠	١١٢٥	١٠٥٠	١٩٧٨,٥	١١١٥	١٦٠٠	١٠٥	١١٢

المصدر: اعتماداً على: ١. وفاء موحان عجيل، أثر المناخ في إنتاج محاصيل الخضر الصيفية في محافظة القادسية، رسالة ماجستير (غير منشورة)، مقدمة إلى كلية الآداب، جامعة القادسية، ٢٠٠٨، ص ٢٨-٣٤. ٢. علياء حسين سلمان، حساب قيم الحرارة اللازمة لزراعة ونمو محاصيل الخضروات في قضاء الكوفة، مجلة معين، جامعة الكفيل، العدد ٤، ٢٠١٥، ص ٢١١.

٣. التربة: تعد التربة عبارة عن مركب أو خليط مفتت من مواد عضوية وصخرية وماء وهواء تنمو فيها النباتات وتستمد منها غذائها وعليها تعيش الحيوانات،^(٥) إذ ساهمت العوامل الطبيعية (الماء والهواء) في تفتت الصخور وحولتها لطبقة هشة يختلف سمكها من منطقة إلى أخرى ويتراوح هذا السمك بين بضعة سنتيمترات إلى عدة أمتار،^(٦) وتعد التربة المزيجية الغرينية الخصبة الجيدة الصرف أفضل أنواع الترب لزراعة الخضر،^(٧) وتغطي معظم مساحات منطقة الدراسة تربة أحواض الأنهار، كما تغطي تربة أكتاف الأنهار جانبي شط الدغارة ، مع وجود تربة الكثبان الرملية في بعض المساحات في الجزء الشمالي والشمالي الشرقي خريطة (٤).


٤. الموارد المائية: لا يمكن تصور قيام أي نشاط زراعي بدون الموارد المائية التي تشمل مياه الأمطار والمياه الجوفية والمياه السطحية الجارية،^(٨) وتستخدم الزراعة ما نسبته (٧٠%) من المياه العذبة في العالم،^(٩) وتختلف حاجة المحاصيل الزراعية من المياه تبعاً إلى نوع التربة وطبيعة المناخ ونوع المحصول،^(١٠) وتحتاج محاصيل الخضر الصيفية إلى كميات كبيرة من المياه تقدر بنحو (٥٨١٩ م^٣/دونم). وتتميز منطقة الدراسة بامتداد شط الدغارة في منتصفها بالإضافة إلى بعض الأنهار والقنوات الإروائية التابعة له التي ساهمت في زراعة المحاصيل الزراعية في منطقة الدراسة وبضمنها محاصيل الخضر الصيفية التي تركزت أغلب مساحاتها المزروعة في المقاطعات التي تمتد فيها الأنهار الفرعية والقنوات الإروائية خريطة (٥).

خريطة (٤) أصناف الترب في منطقة الدراسة



المصدر: اعتماداً على: جمهورية العراق، وزارة البلديات والأشغال العامة، المديرية العامة للتخطيط العمراني، مديريةية التخطيط العمراني في محافظة القادسية، الخطة الهيكلية لمحافظة القادسية، خارطة التربة بمقياس ١/٥٠٠٠٠٠، عام ٢٠١٢.

خريطة (٥) الموارد المائية السطحية في منطقة الدراسة



المصدر:

اعتماداً على وزارة الري، مديريةية الموارد المائية في محافظة القادسية، شعبة ري عفك، خريطة الارواء في قضاء عفك عام ٢٠١٨.

ثانياً: العوامل البشرية:

١. اليد العاملة: يعد السكان من أهم مقومات الإنتاج فهو العامل الرئيسي الذي يشكل جميع الموارد فهو منتج وموزع ومستهلك لهذه الموارد،^(١١) كما تعد الايدي العاملة من المتغيرات العامة التي يعتمد عليها الإنتاج الزراعي ، وأهم ما يمثل سكان الريف هو القوى العاملة الزراعية التي تعطي مؤشراً هاماً عن مدى فعالية القطاع الزراعي.^(١٢) ويمثل الإنسان ركناً أساسياً في العملية الزراعية ، أما الأرض والآلة فتكملا معه دائرة الإنتاج لكنهما أقل منه مرتبةً وأهميةً كونه المحرك الأساس للعملية الإنتاجية وهدفها النهائي.^(١٣) وقد تميز المزارعين في منطقة الدراسة بالخبرة المتراكمة أو المكتسبة خلال مزاولتهم لمهنة الزراعة مما كان له أثر في تطوير مهاراتهم في الزراعة وبلغت نسبة ذو الخبرة بين (٢٥- أكثر من ٤٠ سنة) (٦٠,٧%)، بينما كانت نسبة الفئات الأخرى

مجتمعة نحو (٣٩,٧%)^(١٤)، وقد بلغت نسبة الكثافة الزراعية في منطقة الدراسة (٧,٣٠ نسمة/كم^٢) في عام ٢٠١٥، في حين بلغت الكثافة الريفية (٥٧,٥ نسمة/كم^٢) والكثافة العامة (١٦٧,٥ نسمة/كم^٢).^(١٥) جدول (٣)

جدول (٣) تصنيف الكثافات الزراعية بحسب الدرجة المعيارية على مستوى المقاطعات الزراعية في منطقة

الدراسة لعام ٢٠١٥

٠ - ٥٠ - فأقل	٠,٤٩ - ٠,٠١ -	٠,٠١ - ٠,٤٩	٠,٥٠ + فأكثر
جزيرة شط النيل والدمج	-	الكفيشة والجبسة	الجزراوية
أم الطوس وصويلة	-	الكفياية والشريبية	الطيانيات
-	-	العشرة والسحل	بساتين شط حسين
-	-	-	بساتين الشجير
-	-	-	الخمسات والهورة
-	-	-	أم العظام
-	-	-	العويجة
٢	٠	٣	٧
المجموع			
١٦,٦٧	٠	٢٥	٥٨,٣٣
			النسبة %

المصدر: عباس حمزة علي الشمري، التخطيط الاستراتيجي للتنمية الريفية في قضاء عفك، أطروحة دكتوراه (غير منشورة) مقدمة إلى كلية الآداب، جامعة القادسية، ٢٠١٧، ص ٧٤.

٢. **الحياسة الزراعية:** يقصد بالحياسة الزراعية وحدة اقتصادية لإنتاج زراعي معين وتشمل كل الأراضي المستعملة كلياً أو جزئياً في أغراض الإنتاج الزراعي (النباتي أو الحيواني) بغض النظر عن الموقع الجغرافي والحجم والملكية والشكل القانوني، وقد تُدار بواسطة شخص أو أكثر وقد تتكون من قطعة أرض واحدة أو أكثر وفي منطقة واحدة أو أكثر بشرط اشتراكها بنفس وسائل الإنتاج^(١٦)، كما يقصد بالحياسة وضع اليد على الأرض وممارسة سلطة فعلية عليها من قبل الحائز بصفته مالكة أو صاحب حق فيها^(١٧)، وتتباين الحياسة الزراعية في منطقة الدراسة كما مبين في الجدول (٤).

جدول (٤) حجم الحياسة الزراعية في منطقة الدراسة (دونم)

اقل من ١٥	%	١٦ - ٣٠	%	٣١ - ٦٠	%	٩٠ - فأكثر	%
-----------	---	---------	---	---------	---	------------	---

٢٤,٧	١٥	٤,٥	٢	٢٧,٣	١٢	٣٤	١٥
------	----	-----	---	------	----	----	----

المصدر: حسين نياب محمد وعباس حمزة علي، تقييم التنمية الزراعية في ريف مركز قضاء عفك في ظل المبادرة الزراعية، مجلة أروك للعلوم الإنسانية، العدد ١، المجلد ٩، ٢٠١٦، ص ٦٦٦.

٣. **المكننة الزراعية:** تسهم في اختزال كلفة ومشاق العمل اليدوي، كما يترتب على استعمالها رفع إنتاجية وكفاءة العمل إذ تساعد على انخفاض كلفة العمل وتزيد من الإنتاج وتحسن نوعيته كما يمكنها المساهمة في زيادة المساحات الزراعية التي تستعمل العمل اليدوي فيها، ويقتصر دورها على حراثة الأرض ، وسقي المحاصيل في بعض المقاطعات التي لا تروى سياً.

٤. **السياسة الزراعية:** يقصد بها البرامج العملية المخصصة لتطوير القطاع الزراعي بما تتضمنه من وسائل وخطط زراعية مناسبة لتحقيق أكبر قدر من الرفاهية المادية والمعنوية للسكان بوجه عام للعاملين بالزراعة بوجه خاص من خلال رفع مستوى إنتاجية الأرض وتحسين نوعية المنتج وزيادة دخل العاملين في الزراعة،^(١٨) وتعاني منطقة الدراسة بقلة الاهتمام والدعم الحكومي في الوقت الحاضر.

٥. **طرق النقل:** تعد طرق النقل من العوامل المهمة في الإنتاج الزراعي إذ تعد متممة للإنتاج حيث تحدد المنفعة المكانية للمنتجات في الوقت المناسب بنقلها من مناطق إنتاجها إلى مناطق الاستهلاك للإنتاج أياً كانت طبيعته يكون عديم أو محدود القيمة إذا لم تتوافر وسائل نقله لأسواقه ، وتمتد في منطقة الدراسة شبكة من الطرق البرية المعبدة والترابية، تتمثل بالطريق الرئيس الذي يربطها بقضاء الديوانية وناحية البدير، بالإضافة إلى طريق ثاني هو طريق الكفيشة وهناك طريق يمتد مع مشروع الثريمة يربطها بناحية البدير والثاني طريق الثريمة رقم واحد ويربطها بناحية البدير أيضاً بالإضافة إلى بعض الطرق الريفية غير المعبدة خريطة (٦).


المبحث الثاني : التوزيع الجغرافي لزراعة الخضر في قضاء عفك

تشمل محاصيل الخضر مجموعة كبيرة من النباتات ذات القيمة التجارية والغذائية. وتحتوي محاصيل الخضر على الفيتامينات والمعادن الضرورية لجسم الإنسان ، فضلاً عن احتوائها على الكربوهيدرات والدهنيات والبروتينات ولذلك تأتي بالمرتبة الثانية بعد الحبوب من حيث أهميتها الغذائية.

أولاً: المساحات المزروعة بمحاصيل الخضر:

١. **التوزيع النسبي لمجموع المساحات المزروعة بمحاصيل الخضر الصيفية:** بلغ مجموع المساحات المزروعة بمحاصيل الخضر الصيفية في منطقة الدراسة (٣٠٩٦ دونماً) وتباينت نسب هذه المساحة بحسب المقاطعات الزراعية فيها وتوزعت هذه المساحات في (٩ مقاطعات) في منطقة الدراسة والبالغ عددها (١٣ مقاطعة) حيث لم تتم زراعة محاصيل الخضر في كلٍ من (مقاطعة ١) بوصفها المركز الحضري في عفك وكذلك لم تزرع هذه المحاصيل في مقاطعتي (٢٦ و ٢١) بسبب شحة المياه فيها.

خريطة (٦) شبكة طرق النقل في منطقة الدراسة



المصدر: اعتماداً على مرئية القمر الاصطناعي لمنطقة الدراسة باستخدام برنامج Arc GIS10.4 وبرنامج sasplanet بدقة ٦٠ سم لعام ٢٠١٨.

أما من حيث نسب المساحات المزروعة بمحاصيل الخضر فقد تبوأَت (مقاطعة ١٧) المرتبة الأولى بمساحة مزروعة بلغت (٨٤٥ دونماً) وبنسبة (٢٧,٣%) من مجموع المساحة المزروعة بمحاصيل الخضر الصيفية ، تلتها (مقاطعة ١٨) بمساحة مزروعة بلغت (٥٥٥ دونماً) وبنسبة (١٧,٩%) من مجموع المساحة المزروعة بمحاصيل الخضر الصيفية ، ثم (مقاطعة ١٦) التي بلغت المساحة المزروعة فيها (٤٦٧ دونماً) وبنسبة (١٥,١%) من المساحة المزروعة بمحاصيل الخضر الصيفية ، بينما حلت (مقاطعة ٢٤) بالمرتبة الرابعة بمساحة بلغت (٣٧٤ دونماً) وبنسبة (١٢%) من مجموع المساحة المزروعة بمحاصيل الخضر الصيفية ، في ما كانت أقل مساحة مزروعة في منطقة الدراسة في (مقاطعة ٢٣) بمساحة بلغت (١٠٨ دونماً) وبنسبة (٣,٥%) من المساحة المزروعة بمحاصيل الخضر الصيفية ، وحلت (مقاطعة ١٩) بالمرتبة قبل الأخيرة من حيث المساحة المزروعة بمحاصيل الخضر الصيفية بمساحة بلغت (١٦٦ دونماً) وبنسبة (٥,٤%) وقبلها

(مقاطعة ٢) بمساحة بلغت (١٧٤ دونماً) ونسبة (٥,٦%) و(مقاطعة ٣) بمساحة بلغت (٢٠١ دونماً) ونسبة (٦,٥%) من المساحة المزروعة بمحاصيل الخضر الصيفية وكما موضح في جدول (٥) والشكل (١).


جدول (٥) مجموع المساحات المزروعة بمحاصيل الخضر الصيفية حسب المقاطعات الزراعية ونسبتها المئوية في منطقة الدراسة عام ٢٠١٩

رقم المقاطعة	مجموع المساحة المزروعة بمحاصيل الخضر الصيفية	%	رقم المقاطعة	مجموع المساحة المزروعة بمحاصيل الخضر الصيفية	%
٢	١٧٤	٥,٦	١٩	١٦٦	٥,٤
٣	٢٠١	٦,٥	٢٢	٢٠٦	٦,٦
١٦	٤٦٧	١٥,١	٢٣	١٠٨	٣,٥
١٧	٨٤٥	٢٧,٣	٢٤	٣٧٤	١٢,١
١٨	٥٥٥	١٧,٩	المجموع	٣٠٩٦	١٠٠

المصدر: اعتماداً على مديرية زراعة القادسية، شعبة زراعة عفك، قسم الإنتاج النباتي، ٢٠١٩، بيانات غير منشورة.

شكل (١) التوزيع النسبي لمجموع المساحات المزروعة بمحاصيل الخضر الصيفية على مستوى

المقاطعات عام ٢٠١٩



المصدر: اعتماداً على بيانات جدول (٥).

٢. التوزيع النسبي لمجموع المساحات المزروعة بكل محصول:

يتبين من الجدول (٦) والشكل (٢) إن أكبر مساحة مزروعة بمحاصيل الخضر الصيفية في منطقة الدراسة شغلها محصول الرقي بمساحة بلغت (١٥٠٠ دونماً) من مجموع المساحة المزروعة بمحاصيل الخضر الصيفية في منطقة الدراسة والبالغة (٣٠٩٦ دونماً) ونسبة بلغت (٤٨,٥%)، ثم بالمرتبة الثانية المساحة المزروعة بمحصول البطيخ بمساحة بلغت (١٠٠٠ دونماً) ونسبة (٣٢,٣%) من مجموع المساحة المزروعة بمحاصيل الخضر الصيفية في منطقة الدراسة ، بينما جاء محصول الباذنجان بالمرتبة الثالثة من حيث المساحة المزروعة بمساحة بلغت (٢٥٠ دونماً) ونسبة (٨,١%) من مجموع المساحة المزروعة بمحاصيل الخضر الصيفية في منطقة الدراسة ، ثم محصول الباميا بمساحة بلغت (١٤٠ دونماً) ونسبة (٤,٥%) ثم محصول الخيار بمساحة بلغت (٨٦ دونماً) ونسبة (٢,٨%) من مجموع المساحة المزروعة بمحاصيل الخضر الصيفية.

جدول (٦) التوزيع النسبي للمساحات المزروعة بمحاصيل الخضر الصيفية بـ (الدونم) ونسبها المئوية

حسب المحصول في منطقة الدراسة عام ٢٠١٩


المحصول	المساحة	%	المحصول	المساحة	%
رقي	١٥٠٠	٤٨,٥	لوبياء	٥٠	١,٦
بطيخ	١٠٠٠	٣٢,٣	طماطة	٢٠	٠,٦
باميا	١٤٠	٤,٥	فلفل	١٠	٠,٣
خيار	٨٦	٢,٨	شجر	١٠	٠,٣
باذنجان	٢٥٠	٨,١	خضر ورقية	٣٠	١
المجموع			٣٠٩٦	المساحة	١٠٠

المصدر: اعتماداً على مديرية زراعة القادسية، شعبة زراعة عفاك، قسم الإنتاج النباتي، ٢٠١٩، بيانات غير منشورة.

شكل (٢)

التوزيع النسبي للمساحات المزروعة بمحاصيل الخضر بحسب المحصول في منطقة الدراسة عام

٢٠١٩



المصدر: اعتماداً على بيانات جدول (٦)

أما أقل المساحات المزروعة بمحاصيل الخضر الصيفية فقد شغلها محصولي الفلفل والخضر الورقية وبمساحة (١٠ دونماً) لكلٍ منها ونسبة (٠,٣%) من المساحة المزروعة بمحاصيل الخضر الصيفية، وبالمرتبة قبل الأخيرة حل محصول الطماطة بمساحة بلغت (٢٠ دونماً) ونسبة (٠,٦%) من مجموع المساحة المزروعة بمحاصيل الخضر الصيفية ، أما محصول اللوبياء فبلغت المساحة المستثمرة بزراعته (٥٠ دونماً) ونسبة (١,٦%) من مجموع المساحة المزروعة بمحاصيل الخضر الصيفية.

٣. التوزيع العددي لمجموع المساحات بمحاصيل الخضر الصيفية بحسب المحصول على مستوى المقاطعات الزراعية:

أ. محصولي الرقي والبطيخ: بلغ مجموع المساحة المزروعة بمحصولي الرقي والبطيخ (٢٥٠٠ دونماً) بواقع (١٥٠٠ دونماً) بمحصول الرقي و(١٠٠٠ دونماً) بمحصول البطيخ وبذلك شكلا أكبر مساحة مزروعة بمحاصيل الخضر الصيفية مقارنةً مع غيرهما من المحاصيل. أما على مستوى كل محصول من المحصولين فيتبين من خريطة (٧) وبيانات جدول (٧) إن أكبر مساحة مزروعة بمحصول الرقي كانت في (مقاطعة ١٧) وبواقع (٣٩٩ دونماً) ونسبة (٢٦,٦%) من مجموع المساحة المزروعة بمحصول الرقي في منطقة الدراسة ، تلتها بالمرتبة الثانية (مقاطعة ١٨) حيث بلغت المساحة المزروعة بمحصول الرقي فيها (٢٧٧ دونماً) ونسبة (١٨,٥%) من مجموع المساحة المزروعة بمحصول الرقي في منطقة الدراسة ، ثم (مقاطعة ١٦) بمساحة (٢٢٤ دونماً) ونسبة (١٤,٩%) من المساحة المزروعة ، ثم حلت (مقاطعة ٢٤) بالمرتبة الرابعة بواقع (١٧٩ دونماً) ونسبة بلغت (١١,٩%) من مجموع المساحة المزروعة ، أما أصغر مساحة مزروعة بمحصول الرقي


في منطقة الدراسة فكانت في (مقاطعة ٢٣) بواقع (٥٤ دونماً) ونسبة بلغت (٣,٦%) من مجموع المساحة المزروعة بمحصول الرقي في منطقة الدراسة ، و(مقاطعة ١٩) بواقع (٧٣ دونماً) ونسبة (٤,٩%) من مجموع المساحة المزروعة بهذا المحصول في منطقة الدراسة.

جدول (٧) مجموع المساحات المزروعة بمحصولي الرقي والبطيخ بـ (الدونم) ونسبها المئوية حسب المقاطعات الزراعية في منطقة الدراسة عام ٢٠١٩

رقم المقاطعة	مساحة	النسبة المئوية من مجموع	مساحة	النسبة المئوية من مجموع
المساحة المخصصة للمحصول				
٢	٩٢	٦,٢	٥٠	٥
٣	٩٥	٦,٣	٦٤	٦,٤
١٦	٢٢٤	١٤,٩	١٣٧	١٣,٧
١٧	٣٩٩	٢٦,٦	٢٨٨	٢٨,٨
١٨	٢٧٧	١٨,٥	١٨٩	١٨,٩
١٩	٧٣	٤,٩	٥١	٥,١
٢٢	١٠٧	٧,١	٦٥	٦,٥
٢٣	٥٤	٣,٦	٣٣	٣,٣
٢٤	١٧٩	١١,٩	١٢٣	١٢,٣
المجموع	١٥٠٠	١٠٠	١٠٠٠	١٠٠

المصدر: اعتماداً على مديرية زراعة القادسية، شعبة زراعة عفك، قسم الإنتاج النباتي، ٢٠١٩، بيانات غير منشورة.

خريطة (٧) التوزيع النسبي للمساحات المزروعة بمحصولي الرقي والبطيخ في منطقة الدراسة



المصدر: اعتماداً على بيانات جدول (٧).

أما محصول البطيخ فظهرت أكبر مساحة مزروعة بهذا المحصول في (مقاطعة ١٧) وبنسبة (٢٨,٨%) من مجموع المساحة المزروعة بمحصول البطيخ على مستوى منطقة الدراسة ، تلتها (مقاطعة ١٨) وبنسبة بلغت (١٨,٩%) من مجموع المساحة المزروعة بمحصول البطيخ ، ثم (مقاطعة ١٦) وبنسبة (١٣,٧%)، بينما كانت أصغر مساحة مزروعة بمحصول البطيخ في المقاطعات (٢٣ و ٢ و ١٩) وبنسبة (٣,٣% و ٥% و ٥,١%) من المساحة المزروعة بمحصول البطيخ في منطقة الدراسة.

ب. محاصيل الباميا والخيار والباذنجان واللوبياء:


يتضح من خريطة (٨) والجدول (٨) أن أكبر المساحات المزروعة بمحاصيل الباميا والخيار والباذنجان واللوبياء زُرعت بمحصول الباذنجان في مقاطعات القضاء تركزت في المقاطعات (١٧ و ١٦ و ١٨ و ٢٤)، حيث شكل مجموعها (١٤٠ دونماً) وبنسبة (٥٦%) من مجموع المساحة المزروعة بمحصول الباذنجان والبالغة (٢٥٠ دونماً) في عامة مقاطعات منطقة الدراسة وكانت نسبها المئوية بواقع (٢٤,٤% و ١٦% و ١٥,٦% و ١٠%) لكل منها على الترتيب من مجموع المساحة المزروعة بمحصول الباذنجان في عامة مقاطعات منطقة الدراسة ، أما أصغر مساحة تمت زراعتها بمحصول الباذنجان فكانت في (مقاطعة ٢٣) وبنسبة بلغت (٤,٤%) من مجموع المساحة المزروعة بالمحصول على مستوى منطقة الدراسة و(مقاطعة ٢ ومقاطعة ٢٢ بواقع (١٥) دونماً) وبنسبة (٦%) لكلاً منهما.

جدول (٨) مجموع المساحات المزروعة بمحاصيل الباميا والخيار والباذنجان واللوبياء ب(الدونم) ونسبها المئوية على مستوى المقاطعات الزراعية عام ٢٠١٩

رقم المقاط	مساحة	% من المساحة	مساحة محصو	% من المساحة	مساحة	% من المساحة	مساحة	رقم المقاط
٢	٦	٤,٣	١٥	٧	٦	١	٢	٢
٣	٧	٥	٢٢	٢,٣	٢	٧	١٤	٣
١٦	٢٥	١٧,٩	٤١	١٧,٥	١٥	١١	٢٢	١٦
١٧	٣٨	٢٧,١	٦١	٢٤,٤	٢١	١٥	٣٠	١٧
١٨	٢٦	١٨,٦	٣٩	١٥,١	١٣	٥	١٠	١٨
١٩	١١	٧,٩	٢١	٥,٨	٥	٠	٠	١٩
٢٢	٨	٥,٧	١٥	٥,٨	٥	٢	٤	٢٢
٢٣	٢	١,٤	١١	٥,٨	٥	٢	٤	٢٣
٢٤	١٧	١٢,١	٢٦	١٦,٣	١٤	٧	١٤	٢٤
المجم	١٤٠	١٠٠	٢٥٠	١٠٠	٨٦	٥٠	١٠٠	المجم

المصدر: اعتماداً على مديرية زراعة القادسية، شعبة زراعة عفك، قسم الإنتاج النباتي، ٢٠١٩، بيانات غير منشورة.

خريطة (٨) التوزيع النسبي للمساحات المزروعة بمحاصيل الباميا والخيار والباذنجان واللوبياء في منطقة الدراسة عام ٢٠١٩



المصدر: اعتماداً على بيانات جدول (٨).

أما محصول الباميا الذي بلغت مساحة زراعته (١٤٠ دونماً) في مقاطعات منطقة الدراسة فتركزت النسبة الأكبر من المساحة في أربع مقاطعات هي (١٧ و ١٨ و ١٦ و ٢٤) وبنسبة (٢٧,١% و ١٨,٦% و ١٧,٩% و ١٢,١%) لكلٍ منها على الترتيب ، بينما كانت أصغر مساحة في المقاطعات (٢٣ و ٢ و ٣) وبنسبة (١,٤% و ٤,٣% و ٥%) لكل منها على الترتيب من مجموع المساحة المزروعة بمحصول الباميا. أما محصول الخيار الذي بلغت مساحة زراعته (٨٦ دونماً) في عامة المقاطعات توزعت النسبة الأكبر منها في المقاطعات (١٦ و ١٧ و ٢٤ و ١٨) وبنسبة (٢٤,٤% و ١٧,٥% و ١٦,٣% و ١٥,١%) لكل منها على الترتيب من مجموع المساحة المزروعة بمحصول الخيار، بينما كانت أصغر المساحات في (مقاطعة ٣) وبنسبة (٢,٣%) والمقاطعات (١٩ و ٢٢ و ٢٣) وبنسبة (٥,٨%) لكل منها من مجموع المساحة المزروعة بمحصول الخيار. أما محصول اللوبيا فبلغت المساحة المزروعة (٥٠ دونماً) فكانت أكبر مساحة في مقاطعتي (١٧ و ١٦) وبنسبة (٣٠% و ٢٢%) من مجموع المساحة المزروعة بالمحصول لكل منهما على الترتيب. وتوزعت باقي المساحات في مقاطعتي (٣ و ٢٤) وبنسبة (١٤%) لكلاهما من مجموع المساحة المزروعة بالمحصول. ولم يزرع في (مقاطعة ١٩) بينما كانت أصغر مساحة في (مقاطعة ٢) بواقع (دونماً واحداً فقط) وهو ما شكل نسبة (٢%) من مجموع المساحة المزروعة بالمحصول. بينما بلغت النسبة (٤%) من مجموع المساحة المزروعة بمحصول اللوبيا في منطقة الدراسة. في كلاً من مقاطعتي (٢٢ و ٢٣).

ج. محاصيل الطماطة والفلفل والشجر والخضر الورقية:

يتبين من الخريطة (٩) وبيانات الجدول (٩) إن مجموع المساحة المزروعة بالخضر الورقية والبالغة (٣٠) دونماً) تركزت أكبر نسبة منها في المقاطعات (١٧ و ١٦ و ٢٤) بواقع مساحة بلغت (١٠ و ٦ و ٥) دونم لكل منها على الترتيب ، وينسب بلغت (٣٣,٣% و ٢% و ١٦,٧%) من مجموع المساحة المزروعة بالخضر الورقية لكل منها على الترتيب. بينما لم تتم زراعتها في (مقاطعة ٢٣) وكانت أقل مساحة مزروعة بها في مقاطعتي (١٩ و ٢٢) بمساحة بلغت (دونماً واحداً فقط) وهو ما نسبته (٣,٣%) من المساحة المزروعة بالخضر الورقية. أما مجموع المساحة المزروعة بمحصول الطماطة والبالغة (٢٠) دونماً) تركزت أكبر نسبة في المقاطعات (١٧ و ١٦ و ٣) وبنسبة (٣٥% و ٢٥% و ١٠%) من مجموع المساحة المزروعة لكلٍ منها على الترتيب ، بينما توزعت باقي المساحة بواقع (دونماً واحداً) وبنسبة (٥%) لكلٍ من المقاطعات الباقية. وبالنسبة لمحصولي الفلفل والشجر اللذان بلغت المساحة المزروعة لكل منهما (١٠) دونماً) في منطقة الدراسة فقد تركزت النسبة الأكبر لمحصول الفلفل في مقاطعتي (١٦ و ١٧) وبواقع (٣) دونماً) لكلاً منهما وهو ما نسبته (٣٠%) من مجموع المساحة المزروعة بمحصول الفلفل ، ولم تتم زراعته في المقاطعات (٢ و ٣ و ٢٣)، وكانت أقل مساحة مزروعة في المقاطعات (١٨ و ١٩ و ٢٢) وبنسبة (١٠%) من مجموع المساحة المزروعة بالمحصول على مستوى المقاطعات في كلٍ منها.


جدول (٩) مجموع المساحات المزروعة بمحاصيل الطماطة والفلفل والشجر والخضر الورقية ب(الدونم) ونسبها المئوية على مستوى المقاطعات الزراعية عام ٢٠١٩

رقم المقاط	الطماطة	% من المساحة	الفلفل	% من المساحة	الشجر	% من المساحة	خض ر	% من المساحة
٢	١	٥	٠	٠	١	١٠	٢	٦,٧
٣	٢	١٠	٠	٠	٠	٠	٢	٦,٧
١٦	٥	٢٥	٣	٣٠	١	١٠	٦	٢٠
١٧	٧	٣٥	٣	٣٠	٣	٣٠	١٠	٣٣,٣
١٨	١	٥	١	١٠	١	١٠	٣	١٠
١٩	١	٥	١	١٠	٢	٢٠	١	٣,٣
٢٢	١	٥	١	١٠	١	١٠	١	٣,٣
٢٣	١	٥	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٢٤	١	٥	١	١٠	١	١٠	٥	١٦,٧
المجموع	٢٠	١٠٠	١٠	١٠٠	١٠	١٠٠	٣٠	١٠٠

المصدر: اعتماداً على مديرية زراعة القادسية، شعبة زراعة عفك، قسم الإنتاج النباتي، ٢٠١٩، بيانات غير منشورة.

خريطة (٩)

التوزيع النسبي للمساحات المزروعة بمحاصيل الطماطة والفلفل والشجر والخضر الورقية عام ٢٠١٩



المصدر: اعتماداً على بيانات جدول (٩)

أما محصول الشجر فإن المساحة المزروعة به تركزت (٥٠%) منها في مقاطعتي (١٧ و١٩) وبنسبة (٣٠%) و٢٠% لكل منهما على الترتيب، في حين لم تتم زراعته في مقاطعتي (٣ و٢٣)، وكانت أصغر مساحة في المقاطعات (٢ و١٦ و١٨ و٢٢ و٢٤) وبواقع (دونماً واحداً) في كلٍ منها وهو ما نسبته (١٠%) من مجموع المساحة المزروعة بالمحصول لكل مقاطعة.

ثانياً: إنتاج محاصيل الخضر:


يتبين من الجدول (١٠) إن أعلى كمية إنتاج كانت في محصول الرقي بواقع (٨٩٤٩ طن) وذلك لكبر المساحة المزروعة والبالغة (١٥٠٠ دونماً)، وتلاه بالمرتبة الثانية محصول البطيخ (٦٧٦٥ طناً) والذي كانت مساحة زراعته (١٠٠٠ دونماً)، ثم حل بالمرتبة الثالثة محصول الباذنجان بكمية إنتاج (١٩١ طن) وبمساحة بلغت (٢٥٠ دونماً)، ثم محصول الباميا بكمية إنتاج (٧٣,٩٨ طن) ومساحة بلغت (١٤٠ دونماً)، في ما بلغت كمية إنتاج الخيار (٤٩,٧ طن) وبمساحة (٨٦ دونماً)، بينما تحقق أقل كمية إنتاج في محصولي اللوبياء والطماطة حيث بلغت لمحصول اللوبياء (١٦,١ طن) وبمساحة (٥٠ دونماً)، وبلغت كمية إنتاج الطماطة (٢٤,٢٨ طن) وبمساحة (٢٠ دونماً)، ولم يتم الإشارة لإنتاج محاصيل الفلفل والشجر والخضر الورقية لعدم توافر البيانات الخاصة بإنتاجها في الشعب الزراعية

جدول (١٠) كميات إنتاج محاصيل الخضر الصيفية في قضاء عفك عام ٢٠١٩

المحصول	الإنتاج (طن)	المحصول	الإنتاج (طن)
رقى	٨٩٤٩	باذنجان	١٩١
بطيخ	٦٧٦٥	لوبياء	١٦,١
باميا	٧٣,٩٨	طماطة	٢٤,٢٨
خيار	٤٩,٧		

المصدر: اعتماداً على مديرية زراعة القادسية، شعبة زراعة عفك، قسم الإنتاج النباتي، ٢٠١٩، بيانات غير منشورة.

شكل (١٠) كميات إنتاج محاصيل الخضر الصيفية ب (الطن) في منطقة الدراسة عام ٢٠١٩



المصدر: اعتماداً على بيانات جدول (١٠).

ثالثاً: إنتاجية محاصيل الخضر:

يتبين من الجدول (١١) إن أكبر غلة إنتاجية كانت في محصول البطيخ حيث بلغت (٦٧٦٥ كغم/دونم)، وحل محصول الرقي بالمرتبة الثانية بعده من حيث الإنتاجية وواقع (٥٩٦٦ كغم/دونم)، وحل بالمرتبة الثالثة محصول الطماطة بإنتاجية بلغت (١٢١٤ كغم/دونم)، وتلاه محصول الباذنجان بغلة إنتاجية بلغت (٧٦٤ كغم/دونم)، فيما كانت أقل غلة إنتاجية في المساحات المزروعة بمحصول اللوبياء (٣٢٢ كغم/دونماً) والباميا (٥٢٨,٤ كغم/دونم).

جدول (١١)

إنتاجية محاصيل الخضر الصيفية في قضاء عفك عام ٢٠١٩


المحصول	الإنتاجية كغم/دونم	المحصول	الإنتاجية كغم/دونم
رقى	٥٩٦٦	باذنجان	٧٦٤

٣٢٢	لوبياء	٦٧٦٥	بطيخ
١٢١٤	الطماطة	٥٢٨,٤	باميا
		٥٧٧,٩	خيار

المصدر: اعتماداً على مديرية زراعة القادسية، شعبة زراعة عفك، قسم الإنتاج النباتي، ٢٠١٩، بيانات غير منشورة.

شكل (١١)

إنتاجية محاصيل الخضر الصيفية في منطقة الدراسة



المصدر: اعتماداً على بيانات جدول (١١)

الاستنتاجات:

١. استنتج البحث إن النسبة (٧٢,٤%) من المساحة المزروعة بمحاصيل الخضر الصيفية تركزت في أربع مقاطعات (١٧ و ١٨ و ١٦ و ٢٤) ونسبة (٢٧,٣% و ١٧,٩% و ١٥,١% و ١٢,١%) لكلٍ منها على الترتيب ، بينما لم تزرع في مقاطعتي (٢٦ و ٢١) الأولى لشحة المياه والثانية لصغر مساحتها وتخصصها ببساتين النخيل. وكانت أقل مساحة في مقاطعتي (٢٣ و ١٩) ونسبة (٣,٥% و ٥,٤%) لكلٍ منهما على الترتيب من مجموع المساحة المزروعة بمحاصيل الخضر الصيفية.

٢. بلغ مجموع المساحة المزروعة بمحاصيل الخضر الصيفية في منطقة الدراسة (٣٠٩٦ دونماً) وكانت أكبر مساحة لمحصولي الرقي والبطيخ وبنسبة (٤٨,٥% و ٣٢,٣%) لكل منهما على الترتيب. وإن المساحات المزروعة بمحصولي الفلفل والشجر هي أصغر نسبة وبالباقي (٠,٣%).

٣. إن نسبة (٧١,٩%) من المساحة المزروعة بمحصول الرقي تركزت في المقاطعات (١٧ و ١٨ و ١٦ و ٢٤) وبنسبة (٢٦,٦% و ١٨,٥% و ١٤,٩% و ١١,٩%) على الترتيب لكلٍ منها ، بينما كانت أقل نسبة مساحة في مقاطعتي (٢٣ و ١٩) وبنسبة (٣,٦% و ٤,٩%).

٤. إن نسبة (٧٣,٧%) من المساحة بمحصول البطيخ تركزت في نفس المقاطعات التي تركز فيها محصول الرقي وبنسبة (٢٨,٨% و ١٨,٩% و ١٣,٧% و ١٢,٣%) على الترتيب لكلٍ منها ، بينما كانت أقل نسبة من المساحة المزروعة بالمحصول في (مقاطعة ٢٣) وبنسبة (٣,٣%) من مجموع المساحة المزروعة بالمحصول في منطقة الدراسة. وإن نسبة (٦٦,٤%) من المساحة المزروعة بمحصول الباذنجان تركزت في المقاطعات المذكورة أعلاه وبنسبة (٢٤,٤% و ١٥,٦% و ١٦% و ١٠,٤%) على الترتيب لكلٍ منها ، بينما كانت أقل نسبة من المساحة في (مقاطعة ٢٣) وبنسبة (٤,٤%) ومقاطعتي (٢ و ٢٢) وبنسبة (٦%). وإن أعلى نسبة من المساحة المزروعة بمحاصيل الباميا والخيار والطماطة واللوبياء تركزت في مقاطعتي (١٧ و ١٦).

٥. إن أكبر كمية إنتاج لمحاصيل الخضر تحققت في محصول الرقي (٨٩٤٩ طن) ثم البطيخ (٦٧٦٥ طن)، بينما تحقق أقل كمية إنتاج في محصول اللوبياء (١٦,١ طن) ، ومحصول الطماطة (٢٤,٢٨ طن) وذلك لصغر المساحة المزروعة بالمقارنة مع باقي محاصيل الخضر الصيفية. أما الإنتاجية فكانت المرتبة الأولى لمحصول البطيخ والبالغة (٦٧٦٥ كغم/دونم)، والمرتبة الثانية لمحصول الرقي (٥٦٩٩ كغم/دونم)، ثم محصول الطماطة (١٢١٤ كغم/دونم)، فيما كانت أقل إنتاجية في محاصيل (اللوبياء والباميا والخيار) (٣٢٢ و ٥٢٨,٤ و ٥٧٧,٩ كغم/دونم).

المقترحات:

١. توفير الدعم الحكومي المتمثل بتوفير القروض الزراعية للمزارعين لتشجيعهم في زراعة محصول الخضر الصيفية وتوفير البذور والأسمدة والمبيدات التي تسهم في زيادة إنتاجها وتحسين نوعيتها. وفرض الرسوم والتعريفات الكمركية على المنتجات الزراعية المستوردة لتقليل منافستها للمنتج المحلي.

٢. تعاني منطقة الدراسة من قلة المساحات المزروعة ببعض محاصيل الخضر الصيفية ومنها الطماطة واللوبياء والشجر والفلفل ولكن بالإمكان زيادة هذه المساحات من خلال توفير أراضي صالحة للزراعة وموارد مائية كافية. ولا سيما في المقاطعات الواقعة على ضفاف شط الدغارة وعلى جانبي القنوات الإروائية. ويتم ذلك من خلال توعية الفلاحين من قبل المرشدين الزراعيين على أهمية زراعة محاصيل الخضر الصيفية وتخصص المزارعين في محاصيل معينة منها بما يسهم في اكتساب الخبرة وزيادة جودة المنتج المحلي الزراعي.

هوامش البحث:

- (١) محمد خضير كلف الحويس، التحليل المكاني للإنتاج الزراعي(النباتي) وعلاقته بالموارد المائية في محافظة القادسية، رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة إلى كلية الآداب جامعة القادسية، ٢٠١٥، ص ١٢.
- (٢) منيرة محمد مكي، الخصائص الجغرافية في منطقة الفرات الأوسط وعلاقتها المكانية بالتخصص الإقليمي، رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة إلى كلية التربية للبنات جامعة الكوفة، ٢٠٠٦، ص ٢١.
- (٣) علي أحمد هارون، جغرافية الزراعة، دار الفكر العربي، القاهرة، ٢٠٠٠، ص ١٠٥-١٠٦.
- (٤) عبد العزيز طريح شرف، الجغرافية المناخية والنباتية (القواعد العامة)، الجزء الأول، ط ٢، منشأة المعارف، الإسكندرية، ١٩٨٥، ص ٢.
- (٥) علاء داود مختار وحسين مجاهد مسعود، أساسيات الجغرافية الطبيعية، دار زهران للنشر والتوزيع، ط ١، عمان، الأردن، ٢٠١١، ص ١٧٢.
- (٦) خلف حسين الدليمي، الجيومورفولوجيا التطبيقية (علم أشكال سطح الأرض التطبيقي)، الطبعة العربية الأولى، الأهلية للنشر والتوزيع، عمان، ٢٠٠١، ص ٨٤.
- (٧) خلود علي حسين العبيدي، التحليل المكاني لاستعمالات الأرض الزراعية في قضاء عفك، رسالة ماجستير (غير منشورة)، مقدمة إلى كلية الآداب، جامعة القادسية، ٢٠٠٩، ص ١٤٩.
- (٨) شمخي فيصل الأسدي، الاتجاهات المكانية لتغير استعمالات الأرض الزراعية في قضاء المناذرة، أطروحة دكتوراه غير منشورة مقدمة إلى كلية التربية ابن رشد، جامعة بغداد، ١٩٩٦، ص ١٩٠.
- (٩) سلام هاتف أحمد الجبوري، الموارد المائية، ط ١، ٢٠١٨، ص ٣٥٧.
- (١٠) رباب حسن كاظم الجياشي، تحليل جغرافي لمعوقات التنمية الزراعية في محافظة المثنى، رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة إلى كلية التربية للعلوم الانسانية، جامعة المثنى، ٢٠١٨، ص ٤٤.
- (١١) علي أحمد هارون، أسس الجغرافية الاقتصادية، دار الفكر العربي، القاهرة، ٢٠٠٠، ص ٩٩.
- (١٢) كاظم شنته سعد وأياد عبد علي الشمري، قطاع الزراعة في العراق (دراسة جغرافية للمقومات والمشاكل والحلول)، ط ١، الساقى للطباعة والتوزيع، مركز العراق للدراسات، ٢٠١٧، ص ٢١٣.
- (١٣) عباس فاضل السعدي، الأمن الغذائي في العراق الواقع والطموح، الموصل، مؤسسة دار الكتب للطباعة، جامعة الموصل، ١٩٩٠، ص ١٣٢.
- (١٤) حسين نياز محمد وعباس حمزة علي، تقييم التنمية الزراعية في ريف مركز قضاء عفك في ظل المبادرة الزراعية، مجلة أوروک للعلوم الإنسانية، العدد ١، المجلد ٩، ٢٠١٦، ص ٦٦٥.
- (١٥) عباس حمزة علي الشمري، التخطيط الاستراتيجي للتنمية الريفية في قضاء عفك، أطروحة دكتوراه (غير منشورة) مقدمة إلى كلية الآداب، جامعة القادسية، ٢٠١٧، ص ٧٢.
- (١٦) عبد الوهاب مطر الدهري، الاقتصاد الزراعي، دار الكتب للطباعة والنشر، الموصل، ١٩٨٦، ص ٣٢٦.
- (١٧) كاظم شنته سعد وأياد عبد علي الشمري، مصدر سابق، ص ٢٢٦.

(١٨) محمد خميس الزوكه، جغرافية النقل، ط٣، دار المعرفة الجامعية، القاهرة، ٢٠٠٤، ص ٢١.

مصادر البحث:

١. جمهورية العراق، وزارة البلديات والأشغال العامة، المديرية العامة للتخطيط العمراني، مديرية التخطيط العمراني في محافظة القادسية، الخطة الهيكلية لمحافظة القادسية، الخارطة الجيولوجية بمقياس ١ / ٥٠٠٠٠٠، عام ٢٠١٢.
٢. جمهورية العراق، وزارة الزراعة، مديرية زراعة محافظة القادسية، خارطة مقاطعات القادسية بمقياس ١ / ٥٠٠٠٠٠ عام ٢٠١٢.
٣. حسين ذياب محمد وعباس حمزة علي، تقييم التنمية الزراعية في ريف مركز قضاء عفك في ظل المبادرة الزراعية، مجلة أروك للعلوم الإنسانية، العدد ١، المجلد ٩، ٢٠١٦.
٤. خلف حسين الدليمي، الجيومورفولوجيا التطبيقية (علم أشكال سطح الأرض التطبيقي)، ط١، مكتبة الأهلية، عمان، ٢٠٠١.
٥. خلود علي حسين العبيدي، التحليل المكاني لاستعمالات الأرض الزراعية في قضاء عفك، رسالة ماجستير (غير منشورة)، مقدمة إلى كلية الآداب، جامعة القادسية، ٢٠٠٩.
٦. رباب حسن كاظم الجياشي، تحليل جغرافي لمعوقات التنمية الزراعية في محافظة المثنى، رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة إلى كلية التربية للعلوم الإنسانية، جامعة المثنى، ٢٠١٨.
٧. سلام هاتف أحمد الجبوري، الموارد المائية، ط١، ٢٠١٨.
٨. شمخي فيصل الأسدي، الاتجاهات المكانية لتغير استعمالات الأرض الزراعية في قضاء المناذرة، أطروحة دكتوراه غير منشورة مقدمة إلى كلية التربية ابن رشد، جامعة بغداد، ١٩٩٦.
٩. عباس حمزة علي الشمري، التخطيط الاستراتيجي للتنمية الريفية في قضاء عفك، أطروحة دكتوراه (غير منشورة) مقدمة إلى كلية الآداب، جامعة القادسية، ٢٠١٧.
١٠. عباس فاضل السعدي، الأمن الغذائي في العراق الواقع والطموح، مؤسسة دار الكتب للطباعة، جامعة الموصل، ١٩٩٠.
١١. عبد العزيز طريح شرف، الجغرافية المناخية والنباتية (القواعد العامة)، الجزء الأول، ط٢، منشأة المعارف، الإسكندرية، ١٩٨٥.
١٢. عبد الوهاب مطر الدهري، الاقتصاد الزراعي، دار الكتب للطباعة والنشر، الموصل، ١٩٨٦.
١٣. علاء داود مختار وحسين مجاهد مسعود، أساسيات الجغرافية الطبيعية، دار زهران للنشر والتوزيع، ط١، عمان، الأردن، ٢٠١١.
١٤. علي أحمد هارون، أسس الجغرافية الاقتصادية، دار الفكر العربي، القاهرة، ٢٠٠٠.
١٥. علي أحمد هارون، جغرافية الزراعة، دار الفكر العربي، القاهرة، ٢٠٠٠.

١٦. علياء حسين سلمان، حساب قيم الحرارة اللازمة لزراعة ونمو محاصيل الخضروات في قضاء الكوفة، مجلة معين، جامعة الكفيل، العدد ٤، ٢٠١٥.
١٧. كاظم شنته سعد وأياد عبد علي الشمري، قطاع الزراعة في العراق (دراسة جغرافية للمقومات والمشاكل والحلول)، ط١، الساقى للطباعة والتوزيع، مركز العراق للدراسات، ٢٠١٧.
١٨. محمد خضير كلف الحويس، التحليل المكاني للإنتاج الزراعي(النباتي) وعلاقته بالموارد المائية في محافظة القادسية، رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة إلى كلية الآداب جامعة القادسية، ٢٠١٥.
١٩. محمد خميس الزوكه، جغرافية النقل، ط٣، دار المعرفة الجامعية، القاهرة، ٢٠٠٤.
٢٠. مديرية زراعة القادسية، شعبة زراعة عفك، قسم الإنتاج النباتي، ٢٠١٩، بيانات غير منشورة.
٢١. منيرة محمد مكي، الخصائص الجغرافية في منطقة الفرات الأوسط وعلاقتها المكانية بالتخصص الإقليمي، رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة إلى كلية التربية للبنات جامعة الكوفة، ٢٠٠٦.
٢٢. وزارة الري، مديرية الموارد المائية في محافظة القادسية، شعبة ري عفك، خريطة الارواء في قضاء عفك عام ٢٠١٨.
٢٣. وزارة الموارد المائية، المديرية العامة للمساحة، قسم انتاج الخرائط الرقمية M.P.D، خارطة محافظة القادسية بمقياس ١/ ٥٠٠٠٠٠٠ عام ٢٠٠٧.
٢٤. وفاء موحان عجيل، أثر المناخ في إنتاج محاصيل الخضر الصيفية في محافظة القادسية، رسالة ماجستير (غير منشورة)، مقدمة إلى كلية الآداب، جامعة القادسية، ٢٠٠٨.