

(



الخصائص المورفومترية لحوض ابو حضير

المدرس الدكتور

جاسب عبد الحسين

جامعة ذي قار- كلية الاداب

المستخلص

تحتل دراسة الأحواض المائية جانبا كبيرا من اهتمامات الجيومورفولوجين ذات الاتجاه الحديث ، لكون الحوض النهري الواحد وحدة مساحية تتحدد بموجبها خصائص ومعطيات قابلة للقياس الكمي ، وهو موضوع قابل للمقارنة والتحليل ، لذا ركز هذا البحث على حوض ابو حضير الذي يقع في الجزء الشمالي الشرقي من الصحراء الجنوبية الغربية من العراق ، بين دائرتي عرض (١٠ ٣٠ ° - ٣١ °) شمالا وقوسي طول (٤٥ ° - ٤٥ ٤٠ °) شرقاً ، يحده من الشمال منطقة السلطان ومن الجنوب حوض الأشعلي ، اما من جهة الشرق فيصب في منخفض جليب الأخوية ، اما في اجزائه الجنوبية فيتكون من عدة احواض ثمانية قريبة من الحدود العراقية السعودية. وادارياً يقع ضمن قضاء السلطان التابع الى محافظة المثنى. أن الحوض جاف لمعظم فصول السنة وتجري فيه المياه أثناء الموسم المطير من السنة ، حيث رسمت ملامح الحوض وشبكته النهرية في ظل الظروف المطيرة التي تعود الى العصر البلايستوسين.

المقدمة

تحتل دراسة الأحواض المائية جانبا كبيرا من اهتمامات الجيومورفولوجين ذات الاتجاه الحديث ، بعد ان كانت الدراسة الجغرافية تركز على موضوع الأنهار من ناحية اقليمية والكمية ، لكن الان أصبح الاتجاه الحديث يركز على دراسة الحوض المائي كونه يمثل وحدة طبيعية متكاملة جيومورفولوجياً وهيدرولوجياً ، لكون الحوض النهري الواحد وحدة

أوروك للعلوم الإنسانية

المجلد ٦- العدد ٣ - السنة ٢٠١٣

مساحية تتحدد بموجبها خصائص ومعطيات قابلة للقياس الكمي وهو موضوع قابل للمقارنة والتحليل.

والواقع في هذا البحث محاولة لألقاء الضوء على واحد من الأحواض الجافة الموجودة في محافظة المثنى هو حوض ابو حضير، الذي يقع في الهضبة الغربية الجنوبية من العراق، ان هذه الدراسة الجيومورفولوجية تمثل محاولة تفصيلية شاملة لدراسة الحوض ، مع رسم خرائط جيومورفولوجية وجيولوجية ذات مقياس كبيراًذ تفتقر منطقة الدراسة اليها. معتمداً على نظم المعلومات الجغرافية كونها تعتمد اساساًعلى كم كبير من الظاهرات الجغرافية التي ترتبط بها كميات هائلة من البيانات والمعلومات الخاصة ، وهي أما أن تكون معلومات مكانية (Spatial Information) أو معلومات وصفية (descriptive information) توضح العلاقات المكانية لهذه الظاهرات وتحدد مواقعها الجغرافية على سطح الارض ، لذاإستخدام هذا النظام نظراً لأهميته في سهولة العمل وتوفير الوقت والدقة والسرعة وإمكانية التحديث والتجديد والأضافة أوالحذف فضلاًعن إمكانية التحليل والقياس من الخرائط وإجراء العمليات الإحصائية والربط بين المعلومات المختلفة والتغطية والتداخل مع إستخدام الخرائط أي أنه يمكن وضع عدد كبير من الخرائط الموضوعية فوق بعضها البعض. وفي ضوء ذلك تم دراسة هذا الحوض النهري والتركيزعلى تحليل خصائصه المورفومترية المختلفة في الحوض سواء كانت هذه الخصائص مساحية او شكلية او تحليل الشبكة المائية والخصائص التضاريسية ودرجة الانحدار.

هدف البحث

تهدف الدراسة الى تسليط الضوء على مراحل التطور الجيومورفولوجي لحوض ابو حضير، من خلال دراسة الخصائص المورفومترية والأصل والنشأة ، وتحديد خصائصها الشكلية والمساحية ودراسة خصائص الشبكة المائية مورفومترياً بأستخدام نظم المعلومات الجغرافية ، فضلاً عن تحديد العلاقات الوصفية والكمية لخصائص شبكة التصريف للوادي .

مشكلة البحث

المشكلة البحثية هي مشكلة علمية تحتاج الى حل علمي يفسر طبيعة الأشكال وخصائصها وأسباب تكوينها ، فضلاً عن العوامل التي أدت الى تشكيلها وإيجاد الحلول الأساسية لها، أذ حددت مشكلة الدراسة بالسؤال الآتي . هل للعوامل الجغرافية دور في تحديد معالم شكل الحوض في منطقة الدراسة والتي تكونت معالمها الرئيسة من جراء العمليات التي حدثت في عصر البلايستوسين ، مادور تلك العوامل في سير العمليات الجيومورفية للأحوض.

فرضية البحث فتنص بالآتي:

- ١- إن للمناخ القديم المتمثل في عصر البلايستوسين أحد أقسام العصر الرباعي دوراً في تشكيل الحوض في منطقة الدراسة.
- ٢- ساهمت بعض العوامل الجيولوجية والمناخية الحالية في تغيير بعض معالم الخريطة الجيومورفية لمنطقة الدراسة.

منهجيته البحث

يلقي البحث الضوء على مراحل التطور الجيومورفولوجي للحوض من خلال تحليل الخصائص المورفومترية للحوض وتشمل الآتي.

- ١- الخصائص المساحية للحوض.
- ٢- الخصائص الشكلية.
- ٣- خصائص التضرس والانحدار.
- ٤- خصائص شبكة الصرف المائية.

طرق واساليب البحث

أعتمدت هذه الدراسة على اسلوب تفسير المرئيات الفضائية الى جانب التحليل المورفومتري لخصائص الحوض وشبكة التصريف ، لغرض رسم خريطة جيومورفولوجية للمظهر الحالي لسطح ارض الحوض : معتمداً على

- ١- الأستعانة في هذه الدراسة بالخرائط الطبوغرافية ذات مقياس ١:١٠٠٠٠٠ الصادرة من هيئة المساحة في بغداد عام ١٩٨٩.
- ٢- الخرائط الجيولوجية ذات المقياس ١:٢٥٠٠٠٠ الصادرة من هيئة المسح والتعدين الجيولوجي في العراق عام ١٩٩٢ .
- ٣- المرئيات الفضائية في تفسير شبكة التصريف المائي.
- ٤- خريطة الأشكال الخطية (Lineaments) مستمدة من تفسير المرئيات الفضائية.
- ٥- التحليل المورفومتري لخصائص الحوض وشبكة التصريف المائي، باستخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS).

الوصف الطبيعي لمجرى الحوض

حوض أبو حضير هو احد الأحواض الجافة الذي يجري من الجنوب الغربي الى الشمال الشرقي من الهضبة الغربية من ارتفاع (٢٥٠) متر، ويصب في الجانب الشمالي من منخفض جليب الأخوية على ارتفاع (٢٠) متر، وتبلغ مساحة حوض ابو حضير الكلية حوالي (١٢٤٨,٨٨) كم^٢ .


حدود حوض النهر

حددة منطقة الحوض بالأعتماد على الخرائط الطبوغرافية والخرائط الجيولوجية والمرئيات الفضائية، ويقع الحوض في الجزء الشمالي الشرقي من الصحراء الجنوبية الغربية من العراق، من الناحية الفلكية يقع حوض ابو حضير بين دائرتي عرض (٣٠° - ٣١°) شمالاً وقوسي طول (٤٥° - ٤٥° ٤٠°) شرقاً، اما الموقع الجغرافي يقع الحوض ضمن نطاق السلمان والسهل الرسوبي. وهذه المنطقة تعود الى الرصيف المستقر وغير المستقر على التوالي، يحده من الشمال منطقة السلمان ومن الجنوب حوض الأشعلي، اما من جهة الشرق فيصب في منخفض جليب الأخوية، اما في اجزائه الجنوبية فيتكون من عدة احواض ثمانية قريبة من الحدود العراقية السعودية خارطة (٢,١). وادارياً يقع ضمن قضاء

الخصائص المورفومترية لحوض أبو حضير..... (٣٦٥)

السلمان التابع الى محافظة المثنى، في حين يقع مناخياً ضمن المنطقة الجافة ،حيث رسمت ملامح الحوض وشبكته النهرية في ظل الظروف المطيرة التي تعود الى العصر البلايستوسين.

خارطة (١) موقع منطقة الدراسة من العراق




المصدر: الهيئة العامة للمساحة العراقية، قسم المساحة، خرائط طبوغرافية، ١٩٩٢، مقياس

١:١٠٠٠٠٠.

أوروك للعلوم الإنسانية

المجلد: ٦- العدد: ٣ - السنة: ٢٠١٣

خارطة (٢) حوض أبو حضير



المصدر: بالاعتماد على الخرائط الطبوغرافية ذات مقياس ١:١٠٠٠٠٠ باستخدام (GIS.9)

جيولوجية الحوض (Basin Geology)

أولاً: التكوين الجيولوجي Geological Litho logy

يتكون الحوض من أربع تكاوين مرتبة من الأقدم الى الاحداث وتتراوح في اعمارها من الايوسين الاوسط الى البلايستوسين وهي الدمام، والغار، والزهرة وتكوين الدبدبة. اما ترسبات العصر الرباعي فهي تمثل المراوح الغرينية، ترسبات الشرفات النهرية، ترسبات المستنقعات، ترسبات ملاء المنخفضات، ترسبات ملاء الوديان وترسبات الكثبان الرملية .

١- تكوين الدمام Dammam Formation

يظهر هذا التكوين في منطق الدراسة ، في الأجزاء الغربية والجنوبية والوسطى وكذلك الأجزاء الشمالية والشرقية منه ، ويغطي هذا التكوين في منطقة الدراسة بترسبات الالواح الرملية . ويقسم هذا التكوين الى عضوين (Two members) ، أذ يتواجد العضو العلوي في الاجزاء الشرقية من منطقة الدراسة ذات مساحة واسعة ، ويستمر بالامتداد نحو الجنوب الغربي، ويشكل إنتشاره في وسط منطقة الدراسة حزام ضيق ، فضلاً عن إنتشار واسع أخر قرب منابع الحوض ، ويتألف من حجر كلسي رصاصي إلى رصاصي مصفر كتلي مصمت صخاري التكوين ويحتوي على المتحجرات مع حزم سيليكية وعقد من حجر الصوان في الجزء العلوي ، اما العضو الاسفل ينتشر في وسط الحوض ويتكون من الحجر الطيني البني المحمر الغريني او من حجر الكلس ذات اللون الوردي او الاصفر وهو من حجر الكلس معاد التبلور مصمت واسفل هذا الحجر يوجد الحجر الدولوميتي ناعم التبلور جيد التطبيق ، سمك التكوين المكشوف يتراوح ما بين (٧-١٢) متر . اما عمر هذا التكوين يكون في عصر الأيوسين الأعلى^(١).

٢- ١-٢ تكوين الغار Ghar Formation

يظهر هذا التكوين في الأجزاء الشرقية من منطقة الدراسة أي قرب المصب ، وهو مغطى بالترسبات الهوائية^(٢) ، ويتكون تكوين الغار من حجر الكلس المدملك (١-٥) متر، المتكون من قطع حجر كلسية مدورة وشبه مدورة ، وحجر كلسي رملي البريشا

مصمت (٦-١) متر، مع قطع صغيرة جدا من حجر الكلس الرملي ، وتصبح الطبقات في الأعلى كلسية رملية (٥-٤) متر، مع بقع من حجر الكلس الرملي إلى الطفلي مع عقد من حجر الصوان ، والتي تعلوها طبقات سميكة من حجر الكلس العقدي والصوان وتلاشى هذا التكوين في الأعلى مع الحجر الكلسي العقدي المصمت مع حجر الصوان (١-١,٥) متر، ويتراوح السمك الكلي المكشوف (١٧,٥) متر.


٢- تكوين الزهرة Zahra Formation

ينكشف هذا التكوين في الاجزاء الشمالية الشرقية والوسطى وكذلك في الأجزاء الجنوبية الغربية من منطقة الدراسة، أما في الاجزاء الشمالية الشرقية فيتكون هذا التكوين من حجر طيني رملي مصمت ذات لون بني محمر يلية حجر رملي كلسي يلية حجر رملي كلسي مغطى بسمك (٠,٥) متر من حجر كلس رصاصي اللون. في حيناً لأجزاء الوسطى تكون على شكل مساحة صغيرة تقع وسط منطقة الدراسة، ويتكون هذا الجزء من حجر طيني رملي جبسي مصمت ذو لون بني محمر وكذلك من حجر رملي كلسي ناعم التبلور ذو لون رصاصي وردي تغطي بسمك (٠,٥-١) متر، من حجر الكلس، بينما الأجزاء الجنوبية الغربية تتكون من حجر رملي كلسي حصوي يغطي بحجر كلسي ذو مياه عذبة ذات سمك (٢,٥) متر ، ويعد عصر (البلايوسين - البلايستوسين) هو عمر هذا التكوين^(٣).

٣- تكوين الدببة Dibdibba Formation

يعد هذا التكوين من اكثر التكاوين انتشاراً في منطقة الدراسة، ويتكون هذا التكوين من الحجر الرملي المدملك ذات اللون الرصاصي المبيض والحجر الطيني مع تعاقب من طبقات الحجر الرملي الحصوي . ويزداد سمك هذا التكوين باتجاه الجنوب والشرق من منطقة الدراسة حيث يتراوح ما بين (٢-٩) متر يغطي هذا التكوين بترسبات الكثبان الرملية^(٤). خارطة (٣)

الخارطة (٣) الجيولوجية لحوض ابو حضير



المصدر: بالأعتماد على الخرائط الجيولوجية، ١٩٩٦، مقياس ١: ٢٥٠٠٠٠ باستخدام (GIS.9.3).

أوروك للعلوم الإنسانية

المجلد ٦- العدد ٣ - السنة ٢٠١٣

ثانيا- تكوينات العصر الرباعي Quaternary Sediments

يوجد نوعين من ترسبات العصر الرباعي من حيث العمرهما ترسبات عصر البلايستوسين والهولوسين وكما يلي:

١- ترسبات المراوح الفيضية

توجد هذه المراوح في مصبات الأودية النهرية فترسب ما تحمله المياه من أحجام مختلفة من الحصى الغير متماسك وقطع من الصخور الكاربونية فضلا عن مختلف أحجام الرمال نتيجة لأنحدار السطح باتجاه مناطق المصب ، وهي مراوح صغيرة تنشأ من خلال تساقط الأمطار وتترك ترسباتها في ذلك المنخفض . وتكونت هذه المراوح الفيضية في عصر البلايستوسين.

٢- ترسبات الشرفات النهرية

تتواجد هذه الترسبات على طول وديان الأشعلي ، وهي خليط من الحصى والرمل والغرين والقشرة الجبسية ، وتتراوح أقطار الحصى ما بين (٣-١٠) سم ، أذ يكون سهل الفرز وشبه مدور وتكونت هذه الشرفات خلال عصر البلايستوسين المتأخر^(٥).

٣- ترسبات ملء المنخفضات

تعد المنخفضات ذات تكوين وذات تضاريس واطئة نشأت ترسباتها من المواد التي تجرفها الأمطار والسيول نحو هذه المنخفضات المنتشرة في منطقة الدراسة ، ويكون إتجاهها شمالي غربي وجنوب شرقي ، وهذه الترسبات تكون على نوعين ترسبات نهرية من الطين والغرين والرمل أو ترسبات ريحية ، وتختلف هذه الترسبات من مكان إلى آخر تبعا لنوعية الصخور المشتقة منها ، وتكونت هذه الترسبات عصر الهولوسين.

٤- ترسبات الكثبان الرملية

تنشأ هذه الترسبات بفعل التعرية الريحية وتختلف هذه الترسبات من مكان إلى آخر حسب السمك والنوع بالنسبة للصخور التي انشقت منها تلك الترسبات ، وتتكون هذه الترسبات من الغرين والرمل المحتوي على الجبس ، وإتضح ذلك في منطقة الدراسة

، لاسيما في منطقة مصب الأودية في منطقة الرحب ، أذ يسميها سكان المنطقة بجبل الرمال. وتكونت هذه الكثبان الرملية في عصر الهولسين

ثالثا- سطح منطقة الدراسة

يمتاز سطح الحوض بصورة عامة بالإنحدار التدريجي نحو الشمال باتجاه السهل الرسوبي ، ونظراً للتباين في أعمار التكوينات الجيولوجية وإختلاف تراكم صخورها وتأثر بعض أجزائه بالعوامل التكتونية وعمليات التجوية والتعرية، فضلا عن العوامل الطبيعية الأخرى سبباً في تميز أجزاء سطح الحوض ، إذ نجد إن سطح منطقة الدراسة متبايناً في الارتفاع وتوجد فيه العديد من الانخفاضات كالبحيرات الجافة التي تعرف بالبلايا والخسفات الكارستية والفيضات ذات الانخفاض الضحل فضلا عن تعدد الوديان الجافة وشبكات التصريف الشائعة في المنطقة وهي موسمية الجريان ذات أنماط شجرية أو متوازية ^(٦) ، والارتفاعات المتمثلة بالجروف الصخرية وحافات الأودية والهضاب والشواهد والموائد الصخرية وتمتاز المنطقة بالأنبساط مع ميلان تدريجي وحتى يقاس بأجزاء الدرجة باتجاه السهل الرسوبي أي من الجنوب باتجاه الشمال، هذا ما وضحته الخرائط الطبوغرافية والخرائط الكنتورية ، أذ يبدأ التدرج بالارتفاع من منخفض جليب الأخوية بارتفاع (٢٠) متر شمالاً وينتهي جنوباً على ارتفاع (٢٥٠) متر عن مستوى سطح البحر، وقد تمثلت بتسعة مقاطع للارتفاع فتمثل المقطع الأول (٢٥٠-٢٢٤) متر، في حين إحتل المقطع الثاني (٢٢٤-١٩٨) متر، أما المقطع الثالث فكان (١٩٨-١٧٣) متر، بينما المقطع الرابع فكان (١٧٣-١٤٧) متر، والمقطع الخامس تراوح (١٤٧-١١٢) متر ، المقطع السادس (١١٢-٩٦) متر ، والمقطع السابع (٩٦-٧١) متر، والمقطع الثامن (٧١-٤٥) متر، والمقطع التاسع (٤٥- ٢٠) متر وتتميز المنطقة بمظاهر جيومورفولوجية كثيرة ، وتبين من جدول (١) أن معدل انحدار الحوض (٢,٧٧) م/كم ، خارطة (٤).


الخصائص المورفومترية لحوض ابو حضير..... (٣٧٢)

جدول (١) معدل انحدار الأحواض الرئيسة في منطقة الدراسة

ت	اسم الحوض	طول الحوض (كم)	فرق الارتفاع (م)	معدل الانحدار (م/كم)
١	حوض ابو حضير	١٠٨	٢٣٠	٢.١٢

المصدر: بالأعتماد على الخرائط الطبوغرافية، ١٩٩٢، مقياس ١:١٠٠٠٠٠٠ باستخدام (GIS.9.3).

خارطة (٤) إنحدار سطح منطقة الدراسة



المصدر: بالأعتماد على الخرائط الطبوغرافية، ١٩٩٢، مقياس ١:١٠٠٠٠٠٠ باستخدام (GIS.9).

الخصائص المورفومترية لحوض ابو حضير

يقصد بالتحليل المورفومتري (Morphometric Analysis) هو التحليل الكمي لنظم التصريف النهري للشبكة المائية والاشكال الارضية في الوحدة المساحية لحوض التصريف، لأن الحوض يضم مجموعة من المراتب النهرية التي يمكن قياسها كمياً ومن ثم تحليلها وتصنيفها وترتيبها ، اذا هي عملية ربط بين الخصائص المختلفة لشبكة التصريف بعضها مع البعض الاخر وربطها بالخصائص الهيدرولوجية للمجرى المائي. والتحليل المورفومتري له أهمية كبيرة في التعرف على خصائص شبكة التصريف فضلاً عن العمليات المؤثرة في تشكيل سطح الأرض، وترتبط الخصائص المورفومترية ارتباطاً مباشراً بالعوامل الطبيعية كالبنية الجيولوجية، ونوعية الصخر، والمناخ، والتربة، والغطاء النباتي فضلاً عن الزمن، وبعد ذلك تم تطبيق المعادلات التجريبية واجريت القياسات لتحديد الخصائص الجيومورفية للحوض المتمثلة بالخصائص والمتغيرات المساحية والشكلية والتضاريسية والانحدارية وخصائص الشبكة المائية.

أولاً- الخصائص المساحية

الخصائص المساحية تؤثر بشكل كبير في الخصائص الهيدرولوجية لاسيما حجم التصريف المائي في الحوض من خلال علاقتها بتطور اعداد الشبكة النهرية (Drainage Network) وهذا تعكس العلاقة الطردية بين المساحة الحوضية وكمية التصريف المائي والناتج الرسوبي. وتبلغ المساحة الكلية لمنطقة الدراسة (١٢٤٨,٨٨) كم^٢ (٧). في حين كان للمناخ السابق في عصر البلايستوسين تأثيراً كبيراً في منطقة الدراسة، إذ كانت المنطقة تتعرض الى امطار غزيرة مما ساعد على تطوير هذه المساحة، ما ادى ذلك الى تكوين الشبكة المائية. اما في الوقت الحالي يمتاز المناخ بالجفاف الذي ليس له اي تأثير على مساحة الحوض باعتبار ان كمية الامطار الساقطة غير قادرة على شق الوديان مجاريها ضمن التكوينات الصلبة والتي لم تساعد على زيادة مساحة الحوض، لذلك يمكن تسميتها بالاودية العاجزة (٨). وان اغلب الخصائص المورفومترية التي تكونت في اراضي الهضبة

الغربية تعود الى ظروف مناخية غابرة ليس لها علاقة بالمناخ الحالي، فضلا عن الآثار المترتبة على الانحدار فله تأثير كبير على سرعة جريان مياه الأمطار الساقطة ومدى مساهمتها في زيادة عمليات الحث المائي والذي يؤدي الى اتساع مساحة الحوض .علما هناك علاقة قوية بين الانحدار ومسامية التربة من خلال النفاذية العالية والتي جعلت منها سهلة التعرية، في حين للغطاء النباتي تأثير كبير باعتباره مؤشرا قويا للظروف المناخية وما يتمتع به من امور ايجابية في التقليل من عمليات الحث والانجراف من خلال تأثيره على معدلات التسرب المائي ،اي هناك علاقة عكسية قوية بين النبات الطبيعي وعمليات الحث والانجراف لكن ذلك لا ينطبق على حوض الأشعلي لقلة تساقط الامطار فيه مما أنعكس سلباً على الغطاء النباتي .وترتبط بالمساحة صفات اخرى منها(طول الحوض، ومتوسط عرض الحوض، ومحيط الحوض)

أ- طول الحوض

يعد من العناصر المورفومترية المهمة التي له ارتباطات عديدة مع الخصائص المورفومترية الاخرى ، لما له علاقة بحوض التصريف، اذ حدد هذا العامل من قبل (Schumn) حيث قاس بخط يمتد من نقطة المصب النهري الى اعلى نقطة عند منطقة خط تقسيم المياه^(٩)، اذ بلغ طول الحوض (١٠٨) كم، في حين امتاز الحوض بالشكل الطولي هذا يدل على ارتفاع المعامل الهيسومري ، اي ازدياد نسبة التعرية الحتية في الصخور الكلسية والجبسوية التي تعد سريعة التعرية بالمياه، وهذا مما يدل على اتساع نشاط التعرية بشكل كبير في هذا الحوض ، فضلا عن انعكاس الظواهر الخطية من حيث الطول والقصر ونشاط العمليات الجيومورفية والحركات التكتونية المتمثلة بالصدوع والانكسارات والالتواءات، جدول(٢).

ب- عرض الحوض

نظرا لأختلاف والتباين في الشكل وكثرة التعرجات في محيط الحوض، لذا فقد تم الاعتماد في استخراج متوسط عرض الحوض على العلاقة الرياضية الآتية:

أوروك للعلوم الإنسانية

المجلد ٦- العدد ٣ : السنة ٢٠١٣

$$\text{متوسط العرض}^{(١٠)} = \frac{\text{مساحة الحوض كم}^2}{\text{طول الحوض كم}}$$

ومن خلال العلاقة السابقة ، امكن معرفة متوسط عرض الحوض والبالغة (١١,٥٦) كم، وبطبيعة الحال فان عرض الحوض يتاثر بعوامل عديدة منها نوعية الصخر والمناخ فضلا عن التراكيب الخطية وطبيعة التربة والنبات الطبيعي^(١١). جدول (٢).

ج- محيط الحوض

يعد محيط الحوض من المتغيرات المورفومترية التي ترتبط به العديد من الخصائص المورفومترية الاخرى مثل الاستدارة والاستطالة ومعامل شكل الحوض فضلا عن العلاقة الطردية مع المساحة لانه يمثل خط تقسيم المياه للحوض والذي يفصله عن الأحواض الأخرى المجاورة^(١٢)، أي كلما ازداد طول محيط الحوض رافقته زيادة في اتساع المساحة، وهذا الأتساع متاتيا من انعكاس جملة من العوامل الطبيعية التي اثرت في اتساع الحوض والمتعلقة بالبنية الصخرية او الظواهر الخطية فضلا عن العوامل المناخية . فقد بلغ محيط الحوض (٢٧٨,٨٩) كم جدول (٢).

جدول (٢) الخصائص المساحية لحوض ابو حضير

ت	اسم الحوض	المساحة كم ^٢	طول الحوض كم	متوسط عرض الحوض كم	محيط الحوض كم
١	ابو حضير	١٢٤٨,٨٨	١٠,٨	١١,٥٦	٢٧٨,٨٩

المصدر: بالاعتماداً على الهيئة العامة للمساحة العراقية ، قسم المساحة، خرائط طبوغرافية، ١٩٩٢، مقياس ١: ١٠٠٠٠٠ و ١: ٢٥٠٠٠ ، بإستخدام برنامج (GIS.9.3).

ثانياً- الخصائص الشكلية

يعد الحوض المائي بانه المساحة الكلية التي تستوعب كمية الامطار الساقطة ، والتي تغذي المراتب النهرية بالمياه اللازمه لجريانها ، لان لها اهمية كبيرة في معرفة قياس معدلات الحث المائي ، أذ تجري بفعل الانحدار الأرضي والجاذبية الأرضية لتلتقي في مجرى رئيس

ينتهي في بيئة المصب، لذا تعد العمليات الجيومورفية هي المسؤولة عن طبيعة تحديد الأشكال المورفومترية في الحوض، وهذا يعتمد على التدرج الزمني في العمليات الجيومورفية^(١٢). أي تلعب التجوية الميكانيكية دوراً فعالاً في الحوض بسبب الجفاف لفترات طويلة، اذ يؤدي التفاوت في درجات الحرارة الى تمدد القاع والجوانب مما يؤثر على تفتيت اجزاء من السطح وانجرافه مع المياه في اول جريان مائي، لذا نلاحظ هناك تباين واضح في أشكال الاحواض النهرية، لان الهدف من تطبيق الخصائص المورفومترية على شكل الحوض هو معرفة التطور الجيومورفولوجي له فضلاً عن العمليات التي شكلته وموضحا الشكل الذي اتخذه الحوض ومدى تأثيره على حجم التصريف النهري، اي اعتمد على القوانين والمعادلات الرياضية لتحديد الخصائص المورفومترية الشكلية للحوض^(١٣)، منها الاستدارة والاستطالة ومعامل شكل الحوض،

١- نسبة الاستدارة (Basin Circularity)

نسبة الاستدارة تشير الى مدى اقتراب الحوض من الشكل الدائري، جاء بهذا القانون (Melton, 1958) ليصف مدى اقتراب محيط الحوض من الشكل الدائري^(١٤)، وهي تقاس وفق المعادلة الآتية:

مساحة الحوض كم^٢

نسبة الاستدارة^(١٥) =

مساحة دائرة يساوي محيطها محيط الحوض نفسة كم

اذ بلغت نسبة الاسدارة للحوض (٠,٢٠١) اي ابتعاده الحوض عن الواحد الصحيح، مما يشير الى ابتعاد الحوض عن الشكل الدائري، هذا ما تعكسه ارتفاع نسبة الاستطالة نتيجة للتراكيب الخطية واتجاه الصدوع ذات الاتجاه العمودي المتوافق مع اتجاه الحوض، فضلاً عن طبيعة البنية الصخرية التي تمتاز بقلّة الصلابة، لاسيما الصخور الدولومايتية التي تتعرض الى عمليات الاذابة جدول (٣).

أوروك للعلوم الإنسانية

المجلد ٦- العدد ٣ - السنة ٢٠١٣

٢- نسبة الاستطالة (Elongation Ratio)

تعرف نسبة الإستطالة بأنها إقتراب مساحة الحوض من الشكل المستطيل أي إقتراب نسبتها من الواحد الصحيح وترتفع هذه النسبة في الأحواض الطولية ، وكلما أبتعدت النسبة عن الواحد الصحيح أبتعد شكل الحوض عن الشكل المستطيل ، وتتضح هذه النسبة في الأحواض التي يختلف عرضها مع إمتدادها أو التي يكون عرضها أكثر زيادة أو مساويا لطول الحوض جاء بهذه المعادلة شوم (Schumm,1956) والتي تنص على الآتي:

طول قطر دائرة بنفس مساحة الحوض (كم)

نسبة الاستطالة ^(١٦) =

أقصى طول للحوض (كم)

بلغت نسبة الاستطالة للحوض (٠,٣٦٩) كان الحوض قريب من الشكل المستطيل وذلك لأقتراب نسبة الأستدارة من الواحد الصحيح وهذا يدل على إن إستطالة هذا الحواض متأثرةً بالتراكيب الخطية المتعددة الاتجاهات فضلا عن الصدوع والفوالق متمثلة بفالق بصية الممتد من الجنوب الى الشمال مع حوض أبوغار، فضلا عن العمليات الجيومورفولوجية الأخرى كالعمليات المناخية والتضاريسية والتي كان لها التأثير الكبير في إستطالة الحواض ، جدول (٣) ، في حين تكون مناطق تقسيم المياه في الأحواض ذات الشكل المستطيل أكثر إنتظاماً وأقل تعرجاً منها في الأحواض ذات الشكل الدائري لضعف نشاط الحث الجانبي فضلا عن إعتدال إنحدار الحوض وقلة التضرس في الأحواض التي تقترب من الواحد الصحيح، لكن هناك مشكلة تأخر وصول مياه الأمطار من المنبع الى المصب تؤدي الى فقدان كمية كبيرة في عملية التبخر والتسرب لبعد المسافة، لاسيما وإن المنطقة جافة وسقوط الأمطار فيها لمدة زمنية قصيرة^(١٧).

٣- معامل شكل الحوض (Basin form Factor)

هذا المعامل يشير الى مدى تناسب الشكل العام للحوض المائي على طول إمتداده من المنبع حتى بيئة المصب. إن إنخفاض قيمة معامل الشكل يدل على إقتراب شكل الحوض من

الشكل المثلث والعكس صحيح ، وهذا ناجم عن تغير بين رأس المثلث وقاعدته بين المنبع والمصب ومع ثبات الطول وتغير في عرض الحوض، ويمكن استخراج المعامل على وفق القانون الآتي:-

مساحة الحوض (كم^٢)

معامل شكل الحوض ^(١٨) = -----

مربع طول الحوض (كم)

وعند تطبيق المعادلة أعلاه على حوض ابو حضير إتضح إن الحوض قريب من الشكل المثلث ، حيث بلغ معامل شكل الحوض (٠,٠١٦)، أن هذا المؤشر هو مؤشر منخفض يدل على إقتراب هذه الأحواض من الشكل المثلث .

القيمة الهيدرولوجية المترتبة على انخفاض قيمة معامل شكل الحوض تأثيراً على نظام الصرف ، إذ يتخذ شكل الحوض حالتين ، الأولى عندما يكون رأس المثلث منطقة المنبع وقاعدة المثلث عند المصب فأن التصريف المائي يبلغ الذروة بعد سقوط الأمطار مؤدياً إلى ارتفاع مستوى المياه في المجرى الرئيسي وذلك لقرب الجداول والمسيلات من المصب ، إذ تصل موجات الفيضان إلى المجرى بسرعة ، أما الإنعكاسات الجيومورفولوجية على الحواض جعل رأس المثلث يكون عند المنابع ، فذلك يؤدي إلى حدوث حتم مائي كبير وإقتراب مجاري الرتب الدنيا مع بعضها البعض فضلاً عن تراجع المنحدرات مما يؤدي إلى ضيق منطقة تقسيم المياه. أما الحالة الثانية فهي عندما يكون رأس المثلث عند المصب وقاعدته عند خط تقسيم المياه فيلاحظ وصول المياه بشكل متعاقب وغير سريع مثل الحالة الأولى وذلك لبعدها الجداول والمسيلات عن المصب وقلة خطر الفيضان مع إتساع مساحة الأحواض عند المنابع وضيقها عند المصب ، وهذا ينطبق على حوض ابو حضير جدول (٣).

جدول (٣) الخصائص الشكلية

ت	اسم الحوض	نسبة الاستدارة	نسبة الاستطالة	معامل شكل الحوض
١	ابو حضير	٠.٢٠١	٠.٣٦٩	٠.٠١٦

الخصائص المورفومترية لحوض أبو حضير..... (٣٧٩)

المصدر: اعتماداً على الهيئة العامة للمساحة العراقية، قسم المساحة، خرائط طبوغرافية، ١٩٩٢، مقياس ١: ١٠٠٠٠٠ و ١: ٢٥٠٠٠ ، بإستخدام برنامج (GIS.9.3).

ثالثاً- الخصائص التضاريسية

دراسة تضرسا لحوض النهري له أهمية كبيرة عند الجيومورفولوجي والهيدرولوجي، لما تعكسه من تأثير عملية التعرية المائية وزيادة نشاط عمليات تراجع على السفوح وعمليات التجوية والإنهيارات الأرضية في المنطقة.

ويعد مؤشراً في معرفة الدورات الحثية التي مر بها الحوض باعتبارها إنعكاس للخصائص التضاريسية البنيوية وأنواع الصخور^(١٩)، إذ توجد مجموعة من الخصائص التي يمكن قياسها وهي تعكس طبيعة تضاريس الحوض، والتي تضمنت الخصائص الآتية:

١- معدل التضرس ودرجة الإنحدار

يعد معدل التضرس مؤشر لقياس معدل انحدار الحوض الرئيسي، لتأثيراته الكبيرة والمهمة على الخصائص المورفومترية لأي حوض نهري ، ويمثل إنعكاساً للظواهر الطبوغرافية ودرجة إنحدار الحوض ، إذ إن هناك علاقة طردية بين معدل التضرس ودرجة تضرس الحوض ، ويتم إستخراج معدل التضرس على وفق المعادلة الآتية :

تضاريس الحوض (الفرق بين أعلى وأدنى نقطة في الحوض) (م)

معدل التضرس^(٢٠) = -----

طول الحوض (كم)

لخصائص التضرس في الحوض النهري تأثيرات كبيرة على الكثير من الفعاليات الجيومورفولوجية داخل الحوض النهري. أي كلما ازداد معدل الإنحدار أدى الى سرعة عمليات الحث المائي مؤدياً الى تكوين أشكال جيومورفولوجية متعددة مثل المراح الفيزية^(٢١). أما انخفاض هذه القيمة يؤدي الى قلة عمليات الحث المائي ، وزيادة عمليات الحث والأرساب الريحي ، ومن خلال تطبيق المعادلة التجريبية على منطقة الدراسة ، يتضح بأن معدل التضرس في الحواض بلغ (٢,١٢) م/كم ، جدول (٤) ، إن إنخفاض قيم التضرس هو انعكاس لسطح الهضبة الصحراوية بإستواء سطحها وإنحدارها التدريجي وهو إنعكاس لطبيعة الهضبة المتميز باتجاه الشرق. فالأحواض ذات المساحات الكبيرة تنخفض فيها

أوروك للعلوم الإنسانية

المجلد ٦- العدد ٣ : - السنة ٢٠١٣

معدلات التضرس، بينما تزداد في المساحات الصغيرة، هذا من جانب ومن جانب آخر نلاحظ ارتفاع معدلات التضرس نتيجة لقلة الأمطار الساقطة ما قلل من عمليات التعرية المائية باستثناء العمليات الريحية، أما العامل الآخر الذي يؤثر في معدلات التضرس يعود إلى الطبيعة الصخرية، إذ يلاحظ إن الحوض التي يرتفع فيها معدل التضرس تمتاز بصخور صلبة مقاومة لعمليات التعرية المائية فضلا عن البنية التركيبية.

جدول (٤) خصائص التضاريس للاحواض الرئيسة في منطقة الدراسة

ت	اسم الحوض	طول الحواض (كم)	أعلى ارتفاع - أدنى ارتفاع (م)	فرق الارتفاع (م)	معدل التضرس (م)
١	حوض أبو حضير	١٠,٨	٢٥٠-٢٠	٢٣٠	٢,١٢

المصدر: اعتمادا على الهيئة العامة للمساحة العراقية، قسم المساحة، خرائط طبوغرافية، ١٩٩٢، مقياس ١: ١٠٠٠٠٠ و ١: ٢٥٠٠٠ ، بإستخدام برنامج (GIS.9).

٢- المعامل الهيسومتري Hypsometrie Index

المعامل الهيسومتري ، هو مقياس للمراحل الحتية التي يمر بها الحوض المائي أو أي جزء من أجزائها خلال مدة زمنية ، مع بيان كمية المواد الصخرية التي تنتظر دورها تباعاً في العملية الحتية^(٢٢). ويمكن الإستدلال من هذا المعامل على المراحل المورفولوجية التي وصل إليها الحوض كلياً أو أي تباينات أخرى في أجزاء الحوض نفسه ، ومع إستمرار الدورة الحتية يحدث تناقص في قيمة المعامل ، هذا ما أكد عليه (ديفز) في رأيه على إن الأجزاء التي تمتاز بأنحدارات شديدة تدل على إن المنطقة في مرحلة الشباب، بينما الأجزاء التي يكون فيها الإنحدار قليل تدل على إن المنطقة في مرحلة الشيخوخة من الدورة الحتية^(٢٣) ، وهناك تصنيف آخر (لهارتون 1945 Horton) يصف فيه مرحلة الشباب بأنها المرحلة التي تكون فيها عمليات ألت أكبر من عمليات الترسيب فضلا عن الأجزاء الكبيرة التي لازالت في بداية دورتها الحتية . أما حالة تعرض الحوض لعمليات ألت وبنسبة تعرية تبلغ (٤٥٪) من مساحة الحوض يعد الحوض في مرحلة الشيخوخة ، بينما مرحلة النضج تمتاز بالتوازن بين العمليتين (ألت والترسيب) مع إزالة نسبة قدرها (٥٥٪) فأكثر من مساحة الحوض، ويمكن إستخراج هذا المعامل من خلال المعادلة الآتية.

الإرتفاع النسبي

$$\text{المعامل الهيسومتري}^{(٢٤)} = \frac{\text{المساحة النسبية}}{\text{المساحة الكلية (كم)}} \times 100$$

المساحة النسبية

ويستخرج الأرتفاع النسبي من المعادلة الآتية:

النسبة بين إرتفاع أي خط كتور مختار (م)

$$\text{الأرتفاع النسبي} = \frac{\text{أقصى إرتفاع في الحوض (م)}}{\text{المساحة النسبية فتستخرج بالطريقة الآتية:}}$$

أقصى إرتفاع في الحوض (م)

أما المساحة النسبية فتستخرج بالطريقة الآتية:

النسبة بين المساحة المحصورة بين أي خط كتور ومحيط الحوض

$$\text{المساحة النسبية} = \frac{\text{المساحة الكلية لنفس الحوض (كم)}}{\text{المساحة النسبية}}$$

المساحة الكلية لنفس الحوض (كم)

ويوضح الجدول (٥)، إن المعامل الهيسومتري لحوض ابو حضير بلغ (٤٣,٢٤٪) من مجموع المواد الصخرية المكونة له، وأنه قد أزال منه نسبة قدرها (٥٦,٧٦٪) من صخوره ويرجع ذلك إلى التكوينات الصخرية فضلا عن زيادة التعرية ضمن أجزاء الحوض.

جدول (٥) المعامل الهيسومتري لحوض ابو حضير

أسم الحوض	الأرتفاع المختار (م)	الأرتفاع النسبي (م)	المساحة المحصورة بين خط الكفاف (كم)	المساحة النسبية	المساحة الكلية (كم)	المعامل الهيسومتري
حوض ابو حضير	٢٢٤-٢٥٠	٠,٩٤	١١٤,٦٥	٠,٠٩١	١٢٤٨,٨٨	١٠,٣٢
	١٩٨-٢٢٤	٠,٨٤	١٩٥,٥٩	٠,١٥٦		٥,٣٨
	١٧٣-١٩٨	٠,٧٤	١٨٩,٤٩	٠,١٥١		٤,٩٠
	١٤٧-١٧٣	٠,٦٤	١٦٦,٥٦	٠,١٣٣		٤,٨١
	١١٢-١٤٧	٠,٥١	١٦٥,٨٨	٠,١٣٢		٣,٨٦
	٩٦-١١٢	٠,٤١	٩٨,٨٥	٠,٠٧٩		٥,١٨
	٧٦-٩٦	٠,٣٣	٨٢,٥٧	٠,٠٦٦		٥
	٤٥-٧٦	٠,٢٣	١٢١,٥٤	٠,٠٩٧		٢,٣٧
	٢٠-٤٥	٠,١٣	١١٣,٧٥	٠,٠٩١		١,٤٢
المجموع						٤٣,٢٤

المصدر: اعتماداً على الهيئة العامة للمساحة العراقية، قسم المساحة، خرائط طبوغرافية، ١٩٩٢، مقياس ١: ١٠٠٠٠٠ و ١: ٢٥٠٠٠، بإستخدام برنامج (GIS.9.3).

٣- التضاريس النسبية Relative Relief

هو مقياس نسبي اخريوضح شدة التضرس في الحوض، وفي حالة ثبات الأحوال المناخية نجد علاقة إرتباط سالبة بين التضاريس النسبية ودرجة مقاومة الصخور لعمليات التعرية^(٢٥). وتقاس بالمعادلة الآتية .

تضاريس الحوض (م)

$$\text{التضاريس النسبية}^{(٢٦)} = \frac{\text{محيط الحوض (كم)}}{10 \times \text{م/كم}}$$

محيط الحوض (كم)

بلغت التضاريس النسبية لحوض ابو حضير (٨,٢٤) م/كم، أن هذه القيمة المرتفعة تشير الى مدى العلاقة بين مساحة الأحواض ودرجة مقاومة الصخور لعمليات الحث، إلى حد ما وهذا يدل على قلة معدلات الانحدار للأحواض كون المنطقة مستوية أو هضبة متدرجة في الارتفاع وتقل فيها الأشكال الأرضية المتضرسة، فضلاً عن قلة تساقط كمية الأمطار التي تزيد من العمليات الجيومورفية في الأحواض، في حين يلاحظ إن هناك علاقة عكسية بين التضاريس النسبية ومحيط الحوض، أي كلما قلت مساحة الحوض ازدادت نسبة التضاريس النسبية في الحوض اما العكس يؤدي الى قلة نسبة التضرس جدول(٦).

جدول(٦) التضاريس النسبية لحوض ابو حضير

ت	اسم الحوض	محيط الحوض (كم)	تضاريس الحوض		التضاريس النسبية (م/كم)
			أعلى ارتفاع (م)	أدنى ارتفاع (م)	
١	حوض ابو حضير	٢٧٨,٨٩	٢٥٠	٢٠	٨,٢٤

المصدر: اعتماداً على الهيئة العامة للمساحة العراقية، قسم المساحة، خرائط طبوغرافية، ١٩٩٢، مقياس ١: ١٠٠٠٠٠ و ١: ٢٥٠٠٠، بإستخدام برنامج (GIS.9.3).

٤- التكامل الهيسومتري

وهو مقياساً اخرشبيه بالمعامل الهيسومتري لكن الإختلاف في المساحة حيث تستخدم المساحة النسبية في المعامل الهيسومتري بينما تعتمد المساحة الكلية في التكامل الهيسومتري،

أوروك للعلوم الإنسانية

المجلد: ٦- العدد: ٣ - السنة: ٢٠١٣

الخصائص المورفومترية لحوض ابو حضير..... (٣٨٣)

هو يستخدم لإيجاد العلاقة بين المساحة الحوضية وتضاريس الحوض من خلال تحديد المدة الزمنية التي قطعتها الدورة الحثية في أي حوض نهري. إن الزيادة في قيم التكامل تدل على زيادة مساحة الحوض وانخفاض في تضرس الحوض وهذا ينعكس على زيادة أعداد المراتب النهرية ، لاسيما المراتب الأولى والثانية ، مما يؤدي إلى زيادة كثافة الصرف فضلا عن نشاط العمليات الحثية التي تعمل على انخفاض نسبة التضرس في أغلب أجزاء الحوض ، ويمكن إستخراجه من خلال المعادلة الآتية:-

مساحة الحوض (كم^٢)

التكامل الهيسومري^(٢٧) = -----

تضاريس الحوض (م)

وعند تطبيق تلك المعادلة على حوض ابو حضير، إتضح إن قيمة التكامل الهيسومري مرتفعة، إذ سجلت قيمة قدرها (٥,٤٢) كم^٢/م على التوالي، بسبب إتساع مساحات الأحواض الكبيرة يقابلها تضرس أكثر بسبب عدم تقدم دورتها الحثية نتيجة للجفاف الذي تمر به المنطقة، جدول (٧).

جدول (٧) التكامل الهيسومري لحوض ابو حضير

ت	إسم الحوض	مساحة الحوض (كم ^٢)	تضاريس الحوض (م)		التكامل الهيسومري (كم ^٢ /م)
			أعلى ارتفاع	أدنى ارتفاع	
١	حوض ابو حضير	١٢٤٨,٨٨	٢٥٠	٢٠	٥,٤٢

المصدر: إعتماًداً على البيئة العامة للمساحة العراقية، قسم المساحة، خرائط طبوغرافية ، ١٩٩٢ ، مقياس ١: ١٠٠٠٠٠ و ١: ٢٥٠٠٠ ، بإستخدام برنامج (GIS.9.3).

٥- قيمة الوعورة Ruggedness Value

تشير قيمة الوعورة الى معرفة مدى العلاقة بين تضاريس الحوض وكثافة الصرف الطولية للحوض ، وتقاس على وفق المعادلة الآتية^(٢٨):

تضاريس الحوض (م) × الكثافة الطولية (كم)

قيمة الوعورة = -----

محيط الحوض (كم)

أوروك للعلوم الإنسانية

المجلد: ٦- العدد: ٣ - السنة: ٢٠١٣

مجموع أطوال المجاري (كم)

كثافة الصرف الطولية = -----

المساحة الكلية للحوض (كم^٢)

وعند تطبيق المعادلة أعلاه على الحوض، يتضح إن قيمة الوعورة فيه تشير إلى انخفاض هذه القيمة حيث سجلت (٠,٨٢) كم، وهذا يرجع الى طبيعة الصخور الكلسية المكونة لهذه الحوض والتي تمتاز بأستجابتها السريعة لعمليات التعرية المائية، أذ تشير انخفاض قيمة الوعورة في بدايات الدورة الحتية للحوض وتزداد هذه القيمة حتى تصل أوج مرحلة هي مرحلة النضج ثم تعاود الانخفاض مرة ثانية عند نهاية الدورة الحتية، أي هناك تناسب طردي ما بين الصخور الضعيفة والتضرس بينما يحدث تناسباً عكسياً مع صلابة الصخور، كل هذا حدث في السنوات المطيرة الغابرة وليست الآن، كما هو مبين في جدول(٧).

جدول (٧)

قيمة الوعورة للأحواض الرئيسة في منطقة الدراسة

ت	إسم الحوض	محيط الحوض (كم)	تضاريس الحوض (د)		كثافة الصرف الطولية (كم)	قيمة الوعورة (كم)
			أعلى ارتفاع	أدنى ارتفاع		
١	حوض أبو حضير	٢٧٨,٨٩	٢٥٠	٢٠	٠,٦٧	٠,٥٥

المصدر: اعتماداً على الهيئة العامة للمساحة العراقية، قسم المساحة، خرائط طبوغرافية، ١٩٩٢، مقياس ١: ١٠٠٠٠٠ و ١: ٢٥٠٠٠، بإستخدام برنامج (GIS.9.3).

رابعاً- الخصائص التصريفية لأحواض الأودية الجافة

لتحليل خصائص الشبكة المائية أهمية كبيرة في معرفة المظهر العام لشكل الشبكة النهرية بترتيبها المختلفة داخل الحوض، وإبراز أثر خصائص العوامل الطبيعية والعمليات الجيومورفية

والأشكال الناتجة عنها في درجة التطور الجيومورفولوجي لأحواض الأودية ، والتي يمكن أن تتمثل بدرجة صلابة الصخور ونفاذيتها والإنحدار العام للسطح والتراكيب الخطية المتمثلة بالصدوع والفواصل والشقوق والظروف المناخية القديمة والحالية ، يمكن دراسة خصائص الشبكة المائية من خلال دراسة خصائصها المتمثلة بالمراتب النهرية ونسب التشعب ، مجموع أطوال وأعداد المراتب النهرية ، فضلا عن كثافة التصريف بأنواعها الطولية والعديدية .

١- المراتب النهرية Stream Orders

تعرف المراتب النهرية بأنها المسيلات والروافد التي تتكون منها الشبكة المائية والتي تجري داخل الحوض بحسب مراتبها وحجمها وصلتها ببعضها البعض في معرفة حجم التصريف المائي وعلاقتها في زيادة عمليات الحت والترسيب في الحوض ، وهناك عدة طرق اقترحت لتحديد هذه المراتب النهرية من قبل العديد من العلماء مثل (هورتن, 1945) Horton ، وستريلر, 1952 Strahler وشريف, 1957 Shreve و شايديكر (Scheidegger, 1965) ، ويعتبر هورتن (Horten, 1945) هو أول من بدأ بتحليل الكمي للشبكة المائية وإخضاع هذا النظام الى التطوير ، من أجل إجراء مقارنات بين الأحواض ، لكن النظام الذي إعتمده لتصريف المراتب النهرية يمتاز بالتعقيد بسبب إعتماده على المراتب الكبيرة ومن ثم إتباع المراتب الى المنبع أي يتخذ المراتب النهرية بشكل كامل وعلى العكس من ستريلر الذي يتبع الترتيب الجزئي في نظام التصريف ، بينما الطريقة الثالثة التي طبقها شريف (Shreve, 1957) تختلف عن الطريقتين السابقتين حيث تتكون من جمع المراتب الدنيا عند نقطة الالتقاء للوصول الى رتبة النهر أسفل تلك النقطة (٢٩).

ويعد ترتيب ستريلر (Strahlar, 1952) الأكثر تطبيقا في قياس الشبكة النهرية ، إذ تم الإعتداد عليها في تصنيف المراتب النهرية والخصائص المورفومترية للشبكة النهرية لحوض


ابو حضير. تعد طريقة ستريلر في قياس المراتب النهرية من أكثر الطرق شيوعاً وأسهلها، وتتلخص هذه الطريقة بان تحتل المرتبة الأولى الروافد الصغيرة الأولية التي لا تتفرع او تشعبولا تصب فيها أي مسيلات أخرى، ويتكون النهر من المرتبة الثانية من تجمع انهار من المرتبة الأولى، وتتكون انهار من المرتبة الثالثة من تجمع انهار من المرتبة الثانية، وتتكون أنهار من المرتبة الرابعة من تجمع أنهار من المرتبة الثالثة وهكذا، ومن خلال الجدول (٨) وخارطة (٥). حيث بلغ المجموع الكلي للمراتب كافة في الحوض (٣٩١) وادي وكانت حصة المرتبة الأولى منها (٢٩٤) وادي ونسبة (٧٤,٤٢) ٪، بينما سجلت المرتبة الثانية (٧٥) وادي ونسبة (١٩,١٨) ٪ في حين سجلت المرتبة الثالثة (١٨) وادي ونسبة (٤,٦٠) ٪. أما المرتبة الرابعة فكان عدد اوديتها (٣) ونسبة (٠,٧٦) ٪، بينما سجلت المرتبة الخامسة (١) ونسبة (٠,٢٥) ٪، وأعداد الأودية في المنطقة يرجع الى عدة عوامل منها عوامل متغيرة وأخرى ثابتة منها ما يتعلق بجيولوجية المنطقة وطبيعة صخورها وتأثيرها بالتركيبة الخطية، وكمية الأمطار الساقطة والتي تعد العامل الأساس في زيادة أعداد المجاري المائية للحوض وإتساع عمليات الحت الجانبي والرأسي وحدوث عمليات الأسر النهرية مع حدوث إندماج بين الأحواض المجاورة.

جدول (٨) المراتب النهرية في حوض ابو حضير

ت	اسم الحوض	اعداد ورتب المجاري المائية في الحوض					اجمالي عدد المراتب
		١	٢	٣	٤	٥	
١	ابو حضير	٢٩٤	٧٥	١٨	٣	١	٣٩١

المصدر اعتماداً على الهيئة العامة للمساحة العراقية، قسم المساحة، خرائط طبوغرافية، ١٩٩٢، مقياس ١: ١٠٠٠٠٠ و ١: ٢٥٠٠٠ ، بإستخدام برنامج (GIS.9).

خارطة (٥) المراتب النهرية في منطقة الدراسة



المصدر: بالأعتماد على الخرائط الطبوغرافية، ١٩٩٢، مقياس ١:١٠٠٠٠٠٠ باستخدام (GIS.9.3).

٢- أطوال الوديان الجافة في حوض ابو حضير
بلغ مجمل أطوال المجاري المائية لجميع المراتب في حوض ابو حضير (٨٤٨,٥٧) كم، إذ سجلت المرتبة الأولى مجموع طول (٣٥٤,٧١) كم ، من مجموع أطوال المجاري المائية في الحوض ونسبتها (٤١,٨٠٪) جدول (٧١)، أما مجموع أطوال المجاري المائية في المرتبة الثانية فقد بلغ (٢٦٣,٢١) كم ونسبة (٣١,٠١٪) في حين سجلت المرتبة الثالثة (١٢٥,١٥) كم ونسبة (١٤,٧٤٪) وكانت حصة المرتبة الرابعة (١٠٤,١٤) كم ونسبة (١٢,٢٧٪) بينما سجلت المرتبة الخامسة (١,٣٦) كم ونسبة (٠,١٦٪) جدول (٩)، ويشير هذا التباين بصورة عامة الى معدلات الأنحدار وأعداد هذه المراتب النهرية والتي تؤثر بشكل كبير في المراحل الجيومورفولوجية لكل مرتبة نهريّة ودرجة نشاطها في عمليات الحت والتعرية مما نتج عنه زيادة في أطوال تلك المراتب النهرية فضلاً عن العوامل الجيولوجية وطبيعة تركيب الصخور التي هي الأخرى لها تأثير كبير في زيادة تلك الظاهرة.

جدول (٩) أطوال المراتب النهرية في حوض ابو حضير

ت	اسم الحوض	أطوال المجاري المائية بحسب رتبها في الحوض / كم					أجمالي أطوال المجاري
		١	٢	٣	٤	٥	
١	ابو حضير	٣٥٤,٧١	٢٦٣,٢١	١٢٥,١٥	١٠٤,١٤	١,٣٦	٨٤٨,٥٧

المصدر اعتماداً على الهيئة العامة للمساحة العراقية، قسم المساحة، خرائط طبوغرافية، ١٩٩٢، مقياس ١: ١٠٠٠٠٠ و ١: ٢٥٠٠٠ ، بإستخدام برنامج (GIS.9.3).

٣- كثافة الصرف الطولية: Drainage Density

فسرت كثافة التصريف من قبل الجيومورفولوجي الأمريكي (R.E.Aorton) بأنها مجموع أطوال المجاري المائية في حوض تصريف معين على مساحة ذلك الحوض^(٣٠)، والتي تستخرج على وفق المعادلة الآتية^(٣١).

الطول الكلي للمجاري المائية في كل المراتب المختلفة (كم)

كثافة الصرف الطولية = -----

المساحة الكلية للحوض (كم^٢)

أوروك للعلوم الإنسانية

المجلد ٦- العدد ٣ - السنة ٢٠١٣

إذ توجد مجموعة من العوامل لها تأثير في كثافة الصرف الطولية ومن أهم هذه العوامل كمية الأمطار الساقطة في الحوض النهري إذ هناك علاقة طردية بين الأمطار وكثافة الصرف الطولية. بينما تكون تلك العلاقة عكسية مع درجة الانحدار إذ كلما زاد من درجة الانحدار أدى ذلك الى صغر أطوال المجاري النهرية كما تؤثر طبيعة التكوين الصخري ودرجة نفاذيته ومساميته في التسرب المائي وما له من تأثير على شق القنوات النهرية وزيادة أطوالها^(٣١)، وعند تطبيق المعادلة السابقة على الأحواض الرئيسة والثانوية في منطقة الدراسة بالإعتماد على جدول (١٠) إتضح كثافة الصرف الطولية في الحوض (ابو حضير) فكانت نسبتها (٠,٦٧) كم/كم^٢.

وتعتبر كثافة واطئة جدا نتيجة لقلة الأمطار الساقطة وزيادة تسرب المياه بسبب طبيعة الصخور ذات النفاذية العالية لاسيما التكوينات الكلسية والجبسية والرملية التي تشمل أغلب المنطقة المدروسة.

جدول (١٠) كثافة الصرف الطولية لحوض ابو حضير

الرمز	المساحة (كم ^٢)	الطول (كم)	الكثافة (كم/كم ^٢)	الرمز	المساحة (كم ^٢)	الطول (كم)	الكثافة (كم/كم ^٢)
١	١٢٤٨	٣٤١	٠,٢٧	٢	١٢٤٨	٣٤١	٠,٢٧

المصدر: إعتماًداً على الهيئة العامة للمساحة العراقية، قسم المساحة، خرائط طبوغرافية، ١٩٩٢، مقياس ١: ١٠٠٠٠٠ و ١: ٢٥٠٠٠، بإستخدام برنامج (GIS.9).

٤- كثافة الصرف العددية

تعد واحدة من المقاييس المهمة التي توضح النسبة بين اعداد المجاري ومساحة الحوض، والتي تعكس الخصائص الهيدرولوجية والجيومورفولوجية وشدتها في تقطيع الحوض النهري والتي تزداد مع إزدياد أعداد القنوات المائية في هذه المساحات ويمكن إستخراجها بالطريقة الآتية:

مجموع أعداد الأودية بجميع رتبها

$$\text{كثافة الصرف العددية}^{(٣٣)} = \frac{\text{مساحة الحوض (كم}^2\text{)}}{\text{مجموع أعداد الأودية بجميع رتبها}}$$

مساحة الحوض (كم^٢)

وعند تطبيق هذه المعادلة على حوض ابو حضير ، إتضح إنخفاض الكثافة العددية في هذا الحوض ، إذ سجل الحوض قيمة قدرها (٠,٣١) وادي كم^٢ ، على الرغم من اتساع مساحة الحوض الا انه إمتاز بقلّة أعداد الأودية بسبب جريان تلك الأودية فوق صخور شديدة الصلابة والتي قاومت عمليات التعرية المائية ، جدول (١١) ، ويبقى للمطر الدور الفعال والرئيس في زيادة الكثافة العددية والتي تزداد مع زيادة الإنحدار وطبيعة الصخور في تلك المنطقة ، حيث نلاحظ إن هناك علاقة طردية بين كمية الأمطار والكثافة العددية وكذلك مساحة الحوض .

جدول (١١) كثافة الصرف العددية لحوض ابو حضير

ت	اسم الحوض	المساحة (كم ^٢)	عدد الأودية	الكثافة العددية (كم)
١	حوض ابو حضير	١٢٤٨,٨٨٨	٣٩١	٠,٣١

المصدر: إعتماًداً على الهيئة العامة للمساحة العراقية ، قسم المساحة ، خرائط طبوغرافية ، ١٩٩٢ ، مقياس ١: ١٠٠٠٠٠ و ١: ٢٥٠٠٠ ، بإستخدام برنامج (GIS.9.3).

٥- معدل بقاء المجرى

وهو معدل يوضح متوسط الوحدة المساحية اللازمة لتغذية مرتبة طولية واحدة من مراتب شبكة تصريف أي حوض ، وكلما ازدادت قيمة هذا المعامل كلما إبتعدت المجاري المائية عن بعضها البعض ، ويقاس وفقاً للعلاقة الآتية:

المساحة (كم^٢)

$$\text{معدل بقاء المجرى}^{(٣٤)} = \frac{\text{مجموع أطوال المجاري (كم)}}{\text{المساحة (كم}^2\text{)}}$$

مجموع أطوال المجاري (كم)

وعند تطبيق المعادلة في أعلاه على الحوض وكما مبين في جدول (١٢) حيث سجل حوض ابو حضير قيمة للمعدل بلغت (١.٤٧) كم/٢ كم، وهذا راجع الى العصور المطيرة السابقة التي رسمت شكل الحوض الرئيس والتي عملت على زيادة عمليات الحت في الصخور القابلة للتعرية. مما نتج عنه إتساع مجاري الأحواض وإتساع حوض تغذيتها، في حين نجد العكس من ذلك في حالة صلابة الصخور وقلة كمية الأمطار الساقطة باعد ما بين الأودية مع إرتفاع معدلات بقاء المجرى، وهذه السمة هي الغالبة على كافة الوديان في منطقة الدراسة كونها أودية جافة يحدث فيها الجريان في فصل الشتاء وأثناء سقوط الأمطار فقط وعلى الرغم من تذبذبها وقلتها والتي لا تساعد على نمو وتطور الشبكة المائية في الوقت الحاضر.

جدول (١٢) معدل بقاء المجرى لحوض ابو حضير

ت	اسم الحوض	المساحة (كم ^٢)	مجموع أطوال المجاري (كم)	معدل بقاء المجرى
١	ابو حضير	١٢٤٨,٨٨	٨٤٨,٥٧	١,٤٧

المصدر: إعتمادا على الهيئة العامة للمساحة العراقية، قسم المساحة، خرائط طبوغرافية

١٩٩٢، مقياس ١: ١٠٠٠٠٠ و ١: ٢٥٠٠٠ ، بإستخدام برنامج (GIS.9).

٦- معدل النسيج الحوضي Texture Ratio

معدل النسيج الحوضي يشير الى عدد الأودية ودرجة تقاربها مع بعضها البعض في المحيط، وهو مؤشر لكثافة الصرف فضلا عن أنه يمكن أن يستخدم كمؤشراً لقياس التطور التحاتي للأحواض المائية التي تعكس شدة التقطيع في الحوض هذا ما أوضحه (Strahlar. 1952) ^(٣٥) ويعبر عنها رياضياً .

أعداد أودية الحوض

$$\text{النسيج الحوضي}^{(٣٦)} = \frac{\text{محيط الحوض (كم)}}{\text{ويقسم النسيج الحوضي على ثلاثة فئات رئيسة.}}$$

محيط الحوض (كم)

ويقسم النسيج الحوضي على ثلاثة فئات رئيسة.

- خشن إذا كان معدل النسيج (٤ او اقل) من الأودية.
- متوسط إذا كان معدل النسيج (٤-١٠) وادي.
- ناعم إذا كان أكثر من (١٠) (٣٧).

ومن خلال الجدول (١٣)، يلاحظ، إذ سجل حوض ابو حضير نسبة قدرها (١,٤٠) وهو وبذلك يعد من الأحواض الخشنة حسب التصنيف السابق، وتأتي هذه من أوضاع بقية خصائص الشبكة المائية وفعاليتها الحتية والتعرف على النوعية الطبوغرافية ودرجة التطور التحاتي للأحواض المائية، إن الانخفاض يجعل الطبوغرافية خشنة ووعرة جداً وذلك بسبب طبيعة الصخور وأرتفاع نفاذيتها فضلاً عن الظروف المناخية مما ينعكس على إنخفاض معدلات الحت الذي يحافظ على وعورة سطح الأرض لمدة طويلة ، حيث لوحظ ذلك على منطقة الدراسة.

جدول (١٣) معدل النسيج الحوضي لحوض ابو حضير

ت	اسم الحوض	أعداد أودية الحوض	مخيط الحوض	النسيج الحوضي
١	حوض ابو حضير	٣٩١	٢٧٨,٨٩	١,٤٠

المصدر: اعتماداً على الهيئة العامة للمساحة العراقية، قسم المساحة، خرائط طبوغرافية، ١٩٩٢، مقياس ١: ١٠٠٠٠٠ و ١: ٢٥٠٠٠ ، باستخدام برنامج (GIS.9.3).

٧- نسبة التشعب النهري Bifurcation Ration

تعرف نسبة التشعب النهري بانها أعداد المجاري المائية لمرتبة معينة الى عدد المجاري المائية التابعة الى الرتبة التي تليها مباشرة (٣٨). وهي أحد المقاييس المورفومترية المهمة التي تتحكم في معدل التصريف ، أي كلما كانت نسبة التشعب مرتفعة ، كلما زادت من عمليات التعرية المائية عند المراتب الدنيا ، ورفعت من كفاءة المياه الجارية، ما يساعد على إمكانية نقل حمولة الرواسب فضلاً عن تطوير مجاري الرتب الأولى الى الرتب الثانية والتي تتم من عملية الأسر النهري أو التقاء الرتب الأولى بمجرى واحد إذ يشكلان الرتبة الثانية حسب

نظام (إستريلر) ، ما يهيء الى توسيع وتعميق وتقويض خط تقسيم المياه التي تفصل بين القنوات المائية ويعبر عنها حسابياً بالآتي:

عدد المجاري من رتبة معينة

$$\text{نسبة الشعب}^{(٣٩)} = \frac{\text{عدد المجاري في الرتبة التالية}}{\text{عدد المجاري من رتبة معينة}}$$

عدد المجاري في الرتبة التالية

إن معدل الشعب النهري لحوض ابو حضير ، ظهر بأن ثلاثة أرباع أعداد مجاري الرتبة الأولى تتطور الى الرتبة الثانية من خلال عمليات الأسر النهري ، إذ إن الرتبة الأولى تفوق في عددها وطولها ونسبة تشعبها الرتب الأخرى ، مما يدل على إنعدام التناسب القائم بين أطوال وأعداد مجاري المراتب الدنيا والمجاري الرئيسة ، نتيجة للتغير الكبير الذي تتعرض له تلك المجاري نتيجة للحت المائي. ولا تتوقف هذه العملية عند هذا الحد بل تستمر لتحول مجاري الرتبة الثانية الى ثلاثة وهكذا في متوالية هندسية عبر عنها بنسبة الشعب وفق ما جاء بها قانون (هورتون) لأعداد المجاري المائية ، لكن (إستريلر) أجرى تعديلاً على هذه النسبة إذ وجد نوع من الشذوذ في حالة قسمة مرتبة معينة على المرتبة التي تليها مباشرة والذي يؤدي الى إختلاف في قيمة الشعب من مرتبة الى أخرى في الحوض الواحد ، لذا إستخدم الجمع بين المرتبتين وإيجاد معدل لهما^(٤١) ، وعند تطبيق هذه الأراء والمقترحات على الحوض ، أذ سجل معدل الشعب لحوض (٣,٤) وعلى الرغم من التباينات القليلة إلا أن هناك وجود نوع من التقارب في هذه النسب يدل على تجانس وتشابه الخصائص العامة للصخور في المنطقة ، كما تتأثر تلك الأحواض بالتركيبة الخطية والفوالق ، لاسيما فالق بصرية ، وفي الحوض نفسه ، نلاحظ هناك تبايناً في نسبة الشعب في المراتب النهريّة ، إذ سجلت المرتبة الثالثة اعلى نسبة في الحوض بلغت (٦) ، ويمكن تفسير هذه القيم المتقاربة نسبياً في منطقة الدراسة الى العوامل الطبيعية المتداخلة مع بعضها في تكوين تلك المراتب النهريّة ودرجة تشعبها قياساً الى أعدادها وأطوالها ، الجدول (١٤) .

جدول (١٤) نسبة الشعب ومعدلات الشعب لحوض ابو حضير

ت	اسم الحوض	المرتبة	العدد	نسبة الشعب	معدل الشعب
١	ابو حضير	١	٢٩٤	٣.٩	٣.٤
		٢	٧٥	٤.١	
		٣	١٨	٦	
		٤	٣	٣	
		٥	١	-	


المصدر: إعتماًداً على الهيئة العامة للمساحة العراقية، قسم المساحة، خرائط طبوغرافية ١٩٩٢، مقياس ١: ١٠٠٠٠٠ و ١: ٢٥٠٠٠ ، بإستخدام برنامج (GIS.9.3).

خامساً-المقطع الطولي لحوض ابو حضير

يقصد بالمقطع الطولي الإنحدار التدريجي للمجرى المائي غير المنتظم والمتعرج من المنبع الى المصب ، ويتأثر شكل القطاع الطولي للمجرى النهري بنوع الصخور والحركات التكتونية والتراكيب الخطية ، فضلاً عن مناخ المنطقة والنشاط الجيومورفولوجي للمياه الجارية من نحت وإرساب ، إذ تعمل المياه الجارية على نحت الأجزاء الوعرة وتسويتها وإرسابها في المناطق المنبسطة ورفع مستواها ، أي تقليل الفارق بين أعلى وأدنى منطقة في الحوض مع تشكيل مقطع طولي إنسيابي ذات معدلات إنحدارية بسيطة^(٤١) . وكثيراً ما تعكس لنا المقاطع الطولية طبيعة الخصائص الأنحدارية للحوض والمراحل الجيومورفولوجية المتطورة التي أثرت في تغير أجزاء القناة النهرية من المنبع الى المصب ، والمتمثلة بدورة الشباب ، النضج والشيخوخة ، والتي من خلال هذه المراحل يمكن أن تصف أجزاء المقطع الطولي للمجرى النهري بأي مرحلة جيومورفولوجية ، فالمقاطع الطولية المقعرة الشكل تمثل ودياناً في مرحلة الشباب ، أما المقاطع التي تمتاز بالتقعر البسيط والقريب من التحذب دليل على مرور المقطع بمرحلة النضج ، في حين يصبح السطح مستوي عند المصب فيمثل المرحلة الأخيرة من التطور الجيومورفولوجي وهي مرحلة الشيخوخة يكون مقاطعها مستوية أو مستقيمة.

ومن ملاحظة الشكل (١) للمقطع الطولي لحوض ابو حضير الرئيس، تبين ان معدل الانحدار العام للوادي (٢,١٢) م / كم وهو معدل إنحدار بطيء جداً لاسيما إذا ما عرفنا إن طول الوادي (١٠٨) كم والفاصل الرأسى (الفرق بين أعلى وأدنى إرتفاع) (٢٣٠) م ، ويفسر هذا إنخفاض أوبطىء الإنحدار العام بسبب أن المنطقة ذات إنحدار تدريجي بطيء لأن المنطقة تحتل سطحاً هضيباً شبه مستوي على الرغم من وجود نقاط تجديد في المقطع الطولي لهذا الوادي والتي بلغ عددها (٩)، ويمكن إرجاعها الى إعادة نشاط الوادي في هذه الأجزاء لاسباب تكتونية أو مناخية ، ويدل هذا على كون هذه النقاط تكون فوق تكوينات صخرية لينة نسبياً أكثر من باقي مقاطع إمتداد الوادي، كذلك نلاحظ مقطع التحذب في بداية الوادي على إرتفاع (٢٥٠) متر، ويدل هذا على تعرض منابع الوادي للتعرية المائية، ويستمر بالانحدار حتى يصل الى ارتفاع (٢٠٠) متر، وعلى مسافة (١٩) كم من المنبع يأخذ المقطع بالتقعر لمسافة (٣) كم، بسبب تجديد نشاط هذا الوادي ضمن هذه المقطع نتيجة لوجود تكوينات صخرية لينة نسبياً سريعة التعرية، ومن ثم يأخذ مقطع الوادي بالتحذب نتيجة لوجود صخور صلبة مقاومة لعملية التعرية لمسافة قدرها (٢) كم ، وعلى مسافة (٢٢) كم من المنبع يأخذ المقطع صفة التقعر مرة اخرى على ارتفاع (٢٠٠) متر. وهذا دليل على إعادة تجديد نشاط هذا الوادي ضمن هذه المقاطع ومن ثم ظهور صفة التحذب مرة ثانية نتيجة تعرض هذه المنطقة الى تعرية شديدة جعلت سطح الأرض شبه مستوي ويمكن إرجاع زمن التعرية المائية هذه الى العصور المطيرة (خلال البلايستوسين) فضلاً عن كون صخور هذه المنطقة هي من الصخور الجيرية والدولوميتية القابلة للأذابة والتعرية بسهولة ضمن حواض هذه الودي، واحتواء الصخور على مادة الكلس التي ساعدت في سرعة تعريتها من قبل المياه الجارية لا سيما في تكوينات الزهرة والدبدبة في هذه الأجزاء من منطقة الدراسة.

شكل (١) المقطع الطولي لحوض ابو حضير



المصدر: بالاعتماد على برنامج Global Map per 10.

الاستنتاجات

- يتصف التاريخ الجيولوجي والحركي لحوض ابو حضير بالرصيف المستقر التابع للهضبة الغربية لكن تعرضها الى العديد من الحركات التكتونية القديمة أثرت في تشكيل سطح المنطقة واتجاه الاحواض الرئيسة.
- تتصف الهضبة بقلّة التضرس بصورة عامة كونها تمثل هضبة متدرجة الارتفاع، إذ يبلغ أعلى ارتفاع في المنطقة هو (٢٥٠) م فوق مستوى سطح البحر وأدنى ارتفاع (٢٠) م عند المصب.
- إن للمناخ القديم الدور الكبير في تشكيل الظواهر الأرضية في الحوض.
- الصلابة والضعف في طبيعة البنية الصخرية تتحكم في عمليات الحت فضلا عن الظواهر الخطية الطولية والقصيرة التي تعمل على ضعف صلابة الصخور وتجعلها عرضة لعمليات التجوية والتعرية، أذ يعد الاتجاه الشمال الشرقي / الجنوب الغربي هو الاتجاه السائد في المنطقة الذي يتماشى مع الاتجاه العام لأنحدار السطح.

أوروك للعلوم الإنسانية

المجلد ٦- العدد ٣ - السنة ٢٠١٣

الخصائص المورفومترية لحوض أبو هضير..... (٣٩٧)

- تشير نسبة الاستطالة الى مدى اقتراب الحوض من الشكل المستطيل، حيث بلغ معدل الاستطالة (٠,٣٦٩).
- تشير قيمة الوعورة في الحوض الى إرتفاع نسبة التضرس دالة الى أطوال المجاري المائية
- إنحدار المجاري المائية يكون على أشده في المراتب الأولى مقارنة مع بقية المراتب الأخرى وهذا يشير الى وجود علاقة عكسية ما بين أطول المجاري المائية في الرتب ودرجة الانحدار.

التوصيات

- شق الطرق وتعبيدها من اجل ربط منطقة الدراسة التي تفتقر لها بقية المدن المجاورة.
- إقامة محطات هيدرولوجية على الوديان (الكبيره منها بصورة خاصة على الأقل)
- تحديد حجم التصريف الفصلي لهذه الوديان ومن ثم التخطيط لإستثمار هذه المياه .
- انشاء مصدات لحجز المياه السطحية كما معمول به في دول الجوار ذات المناخ الصحراوي لغرض تغذية المياه الجوفية واستثمار المياه المتجمعة في التنمية.
- الاهتمام بحفر المزيد من الابار وبطرق علمية وحديثة ومدرسة بالاضافة الى الابار الموجودة في المنطقة للحصول على المياه الجوفية
- الاستفادة من الرواسب الطينية والكلسية والرملية من قبل الدولة والقطاع الخاص والتي تصب في الجانب الاقتصادي.
- دراسة فكرة زراعة المناطق الصالحة للزراعة في منطقة الدراسة واستثمارها فيما بعد كمزارع لتوطين السكان.
- تشجيع الباحثين لإكمال مثل هذه الدراسات لتوفير نظم معلومات جغرافية جيدة عن المنطقة ومن ثم توسيع الفرصة أمام الجهات المختصة بإتخاذ القرارات المهمة في جانب تخطيط وتنمية هذه المنطقة.

أوروك للعلوم الإنسانية

المجلد : ٦- العدد : ٣ - السنة : ٢٠١٣

- إمكانية استثمار هذه الأراضي الشاسعة في السياحة الصحراوية كما هو الحال مع دول الخليج العربية لأغراض الصيد أو إقامة السباقات المختلفة مستقبلاً.

Abstract

The study of water basins occupies a great deal of geomorphologies, modern interests. The river basin is an area unit that determines quantitative measurable characteristics and facts. This subject is comparable and analytical. Hence, the current paper focuses on Abokther basin which is located in the northern eastern part of southern western desert of Iraq. It lies between ($^{0}31 - ^{0}30$ 10) southwards and ($^{0}45$ 40- $^{0}45$) eastward. It is bounded by As-Salman region northward and AlAsali Basin southward. As for the eastern part, it is poared through Jalib Khuwayyah depression from the northern side of Rehab reign. As for southern parts, it consists of multiple secondary multiple basins close to the Iraqi Saudi borders. Administratively, it lies within Selman district which follows Samoa province. The basin is dry for most seasons, Water follow though during rainy seasons of the year. Some characteristics and river webs are mapped during the rainy conditions which go back to pilacestocin age

هوامش البحث

- (١) هشام عبد الجبار الهاشمي، رضا محمد عامر، السحنات المجهرية للعصر الجيولوجي الثلاثي في العراق، المديرية العامة للمسح الجيولوجي والتعدين، بغداد، ١٩٨٥، ص ٩.
- (٢) دريد بهجت ديكران، أزهار علي غالي، التقرير الجيولوجي رقعة سوق الشيوخ، المنشأة العامة للمسح الجيولوجي والتعدين، قسم المسح الجيولوجي، بغداد، ١٩٩٧، ص ٣.
- (٣) دريد بهجت ديكران، فائزة توفيق احمد، التقرير الجيولوجي عن رقعتي الرضيمية والكويت، المنشأة العامة للمسح الجيولوجي والتعدين، قسم المسح الجيولوجي، بغداد، ١٩٩٥، ص ٣.
- (٤) عبدالله السياب وآخرون، جيولوجيا العراق، جامعة الموصل، العراق، ١٩٨٢، ص ١٣٧.

- (٥) دريد بهجت ديكران ، أزهار على غالي ، التقرير الجيومورفولوجي لرقعة سوق السيوخ ، المنشأة العامة للمسح الجيولوجي والتعدين ، قسم المسح الجيولوجي ، بغداد ، ١٩٩٥ ، ص ٨.
- (٦) عباس محمد ياسر العيثاوي ، تقويم الحدود البنيوية للجزء الجنوبي لنطاق السلطان من تحليل المعلومات الجيوفيزيائية ، أطروحة دكتوراة (غير منشورة) ، كلية العلوم ، جامعة بغداد ، ٢٠٠٢ ، ص ٣٦.
- (٧) استخرجت المساحة بالاعتماد على الخرائط الطبوغرافية مقياس ١:١٠٠٠٠٠٠ وبرنامج (GIS.9.3)
- (٨) جاسب كاظم عبد الحسين الجوهر ، الأشكال الارضية لأحواض الوديان الجافة في منطقة بصبية ، باستخدام نظم المعلومات الجغرافية ، أطروحة دكتوراة (غير منشورة) ، كلية الآداب ، جامعة البصرة ، ٢٠١١ ، ص ١٣٠.
- (٩) محمد صبري محسوب ، جيومورفولوجية الأشكال الأرضية ، دار الفهد العربي ، القاهرة ، ٢٠٠١ ، ص ٢٠٦.
- (١٠) المصدر ، نفسة ، ص ٢٠٦
- (١١) أحمد عبد الستار جابر العذاري ، هيدروجيومورفولوجية منطقة الوديان غرب الفرات شمالي الهضبة الغربية ، أطروحة دكتوراه (غير منشورة) ، كلية الآداب ، جامعة بغداد ، ٢٠٠٥ ، ص ١٣٧.
- (❖) تم إستخراج المحيط والمساحة بعد تم ربط الخرائط والصور الفضائية بأحداثيات جغرافية ورسم الخارطة الرقمية لمساحة الحوض وباستخدام نوافذ برنامج (GIS.9.3) ثم ربط الحقائق المكانية للحوض بجدول يوضح خصائصها المتعلقة بالمساحة والمحيط.
- (١٢) Gregory and Walling, Drainage Basin form and process Geomorphologic approach, Edward Arnold, London, 1975, p234
- (١٣) جاسب كاظم عبد الحسين الجوهر ، الأشكال الارضية لأحواض الوديان الجافة في منطقة بصبية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية ، مصدر سابق ، ص ١٤١.

(١٤) حسن رمضان سلامة ، أصول الجيومورفولوجيا ، ط١، دار المسيرة ، عمان ، ٢٠٠٤ ، ص١٧٩.

(١٥) حسن رمضان سلامة ، التحليل الجيومورفولوجي للخصائص المورفومترية للأحواض المائية في الأردن ، دراسات العلوم الأنسانية ، مجلد٦ ، العدد٢ ، ١٩٨٠ ، ص١٢٠.

(١٦) محمد فتحي المولى ، دراسة مورفومترية لأختيار موقع في حوض وادي الثرثار شمال مدينة الحضر بأستخدام تقنيات التحسس النائي ، دراسة ماجستير(غير منشورة) ، كلية العلوم ، مركزالتحسس النائي، جامعة بغداد ، ٢٠٠٢ ، ص٣٦.

(١٧) جاسب كاظم عبد الحسين الجوهر، الأشكال الارضية لأحواض الوديان الجافة في منطقة بضية بأستخدام نظم المعلومات الجغرافية، مصدر سابق، ص١٤١.

(١٨) لطفي راشد المومني ، هيدرولوجية وادي الموجب في الأردن دراسة الجغرافيا الطبيعية ، إستشعار عن بعد ، مطبعة وزارة الثقافة ، الأردن ، ١٩٩٧ ، ص١٢٧.

(١٩) محمد صبري محسوب ، جيومورفولوجية الأشكال الأرضية ، مصدر سابق ، ص٢٠٩.

(٢٠) محمد صبري محسوب ، جيومورفولوجية الأشكال الأرضية ، مصدر نفسه ، ص٢٠٩.

(٢١) Gregory and Drainage Basin from and process A .geomorphologic approach,op cit ,p269

(٢٢) حسن رمضان سلامة ، أصول الجيومورفولوجيا ، مصدر سابق ، ص١٨٣.

(٢٣) أحمد عبد الستار جابر العذاري ، هيدروجيومورفولوجية منطقة الوديان غرب الفرات شمال الهضبة الغربية العراقية ، مصدر سابق ، ص١٤٩.

(٢٤) محمد القرالة ، تحليل الجيومورفولوجي للخصائص المورفومترية لحوض وادي الكرك ، حوليات آداب عين الشمس ، المجلد٣٣ ، كلية الآداب ، جامعة عين شمس ، ٢٠٠٥ ، ص١٧٧.

(٢٥) محمد صبري محسوب ، جيومورفولوجية الأشكال الأرضية ، مصدر سابق ، ص٢٠٩.
(٢٦) محمد مجدي تراب ، التحليل الجيومورفولوجي لحوض وادي قصب بالنطاق الشرقي
من جنوب شبه جزيرة سيناء ، المجلة الجغرافية العربية ، العدد ٣٠ ، مصر، ١٩٩٧، ص
٢٧٢.

(٢٧) محمد مجدي تراب ، التحليل الجيومورفولوجي لحوض وادي قصب بالنطاق الشرقي
من جنوب شبه جزيرة سيناء ، مصدر سابق ، ص ٢٧٢.

(٢٨) محمد صبري محسوب ، جيومورفولوجية الأشكال الأرضية ، مصدر سابق ، ص٢٠٤.
(٢٩) ب. و. سياركس ، الجيومورفولوجيا، ترجمة ليلي محمد عثمان، مكتبة الانجلو
المصرية، القاهرة، ١٩٧٨، ص٢١١-٢١٤.

(٣٠) محمد صفى الدين أبو العز، قشرة الأرض دراسة جيومورفولوجية ، دارغريب ،
القاهرة ، ٢٠٠١، ص١٧٧ .

(٣١) Arthur N .Strahlar, Physical Geography, John Wiley & sons, (٣١)
United states of America, 1965, p491.

(٣٢) صلاح الدين بحيري ، أشكال سطح الأرض ، دار الفكر المعاصر، دمشق، ٢٠٠١،
ص١٥٦.

(٣٣) رحيم حميد عبد ثامر العبدان ، الاشكال الارضية لحوض وادي عامج ، أطروحة
دكتوراه (غير منشورة) كلية الآداب ، جامعة بغداد ، ٢٠٠٤ . ص١٨٣
(٣٤) محمد صبري محسوب ، جيومورفولوجية ، الأشكال الأرضية ، مصدر سابق ،
ص٢١٥.

(٣٥) Arthur N.Strahlar, Dimensional analysis applied to fluvial eroded
land forms .op cit. p 283

(٣٦). Arthur N.Strahlar, op,Cit, p283

(٣٧) رحيم حميد عبد ثامر، الاشكال الارضية لحوض وادي عامج، المصدر السابق ، ص١٥٧.

(٣٨) محمد القرالة ، التحليل الجيومورفولوجي للخصائص المورفومترية لحوض وادي الكرك بالأردن ، مصدر سابق، ص١٨٨.

(٣٩) حسن رمضان سلامة ، التحليل الجيومورفولوجي للخصائص المورفومترية للاحواض المائية في الاردن ، مصدر سابق ، ص١٢٥.

(٤٠) رحيم حميد عبد ، الأشكال الأرضية لحوض وادي عامج ، مصدر سابق ، ص١٨٨.

(٤١) صلاح الدين بحيري ، أشكال سطح الأرض ، مصدر سابق ، ص١٢٢.