وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة الموصل

مجلة أبحاث كلية التربية الأساسية

تصدر عن كلية التربية الأساسية

دورية علمية محكمة

المجلد الثالث

عدد خاص بأبحاث المؤتمر العلمي الدولي الثالث

(كامل العلوم نحو تحقيق أهداف التعليم)

١٠ - ١١ نيسان ٢٠١٩

افتتاحية المؤتمر

بسم الله الرحمن الرحيم

((نَوَاقِلُكُمْ وَمَا يَسْطُرُونَ))

ايماناً من اللجنة التحضيرية للمؤتمر العلمي الدولي الثالث/ المشترك الاول في رفق الجامعة واكاديميها، وبكافة التخصصات العلمية بكل ما هو من شأنه الارتقاء بالمستوى العلمي والاكاديمي، فقد أقيم مؤتمراً هذا تحت عنوان "تكمال العلوم نحو تحقيق اهداف التعليم" للفترة من ١٠ - ١١ نيسان ٢٠١٩، فالبحث العلمي الدائم والدؤوب والقائم على اساس صحيحة يلعب دوراً محورياً في نهوض المجتمع الانساني واصلاحه كونه الوسيلة الاساسية الكفيلة بإيجاد حلول فعالة للمشكلات التي تواجهنا في الحياة اليومية من خلال مواكبة التقدم العلمي على جميع الاصعدة، فالبحث العلمي في الوقت الراهن يحتل مكانة بارزة في تقدم النهضة العلمية حيث تعد المؤسسات الأكاديمية هي المراكز الرئيسة لهذا النشاط العلمي الحيوي لما لها من وظيفة اساسية في تشجيع البحث العلمي وتنشيطه وأثارة الحوافز العلمية لدى الباحث والدارس حتى يتمكن من القيام بهذه المهمة النبيلة على أكمل وجه. والمؤتمر العلمي الدولي الثالث حافل بالعديد من الأبحاث في مجال العلوم التربوية والنفسية، واللغة العربية وآدابها، والعلوم الإسلامية وفروعها، والتاريخ بفراته القديمة والإسلامية والحديثة والمعاصرة، وعلوم الرياضة والتربية البدنية، والعلوم الصرفة بأنماطها وأنواعها وتخصصاتها.

نأمل أن تقدم أبحاث هذا المؤتمر الذي يرؤمه الباحثون والاكاديميون وطلبة الدراسات العليا من معرفة نظرية

وميدانية وتجريبية.

الاستاذ الدكتور

محمد توفيق عثمان محمد توفيق آغا

رئيس اللجنة التحضيرية

ضوابط النشر في مجلة أبحاث كلية التربية الأساسية

اخلاقيات النشر

بالإشارة الى اخلاقيات البحث العلمي وبنود لجنة اخلاقيات النشر الموضحة في الفقرة (١٤) من كتاب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/دائرة البحث والتطوير المرقم ٧٩٦١/٤ في ٢٠١٨/١٠/١٥ ، فقد وضعت هيئة تحرير مجلة أبحاث كلية التربية الأساسية اخلاقيات النشر العلمي الخاص بها وعلى النحو الآتي:

رئيس التحرير

يتولى رئيس تحرير مجلة أبحاث كلية التربية الأساسية وبالتعاون مع اعضاء هيئة تحرير المجلة مسؤولية اختيار المحكمين المناسبين بسرية تامة.

اعضاء هيئة تحرير المجلة

يعمل اعضاء هيئة تحرير المجلة على اختيار المحكمين المناسبين للأبحاث المقدمة للمجلة، والحفاظ على سرية عملية التحكيم، ومتابعة وتقييم البحوث تقيماً أولياً، والنظر في مدى صلاحيتها للنشر او الاعتذار عن النشر قبل ارسالها الى المقيمين.

الباحثون

يجب على الباحثين ضمان اصالة ابحاثهم واستيفائها للمعايير الأكاديمية والأخلاقية العالية ويترتب على ذلك الآتي:

١- ان يتمتع البحث المقدم للنشر بمصداقية عالية من حيث اقتباس النصوص أو تقديم البيانات دون تحريف وان يلتزم الباحث بالامانة

العلمية

٢- عدم ادراج اسماء لباحثين غير مشاركين فعلياً في انجاز البحث.

٣- على الباحثين مراجعة أبحاثهم وفقاً لمقترحات المحكمين، وفي حالة اعتراض الباحث على ملاحظات المحكمين فيجب عليه تقديم تبرير منطقي بذلك.

٤- إخضاع جميع البحوث المقدمة للنشر إلى برنامج الاستلال، والتأكد من أن نسبة الاستلال فيها لا تتجاوز الحد المسموح به (٢٠%).

٥- يجب على الباحثين عدم تقديم أبحاث سبق وأن نشرت في مجلات أخرى، وكذلك عدم تقديم البحث إلى أكثر من مجلة في آن واحد، إذ يعد ذلك منافياً لأخلاقيات النشر.

التحكيم والمحكمون

- ١- يتم إخضاع جميع البحوث المقدمة للنشر إلى اثنين من المحكمين.
- ٢- يلتزم المحكمون بكتابة تقرير مفصل حول سلامة البحث وأصالته العلمية وفق نموذج مخصص لذلك.
- ٣- تتعامل إدارة المجلة مع أسماء خبراء التحكيم بسرية تامة.
- ٤- في حالة وجود تقرير سلبي من أحد خبراء التحكيم يرسل البحث إلى خبير ثالث للبت في صلاحيته للنشر.
- ٥- يجب على خبراء التحكيم تحري الموضوعية في الأحكام الصادرة عن عملية التحكيم.
- ٦- يفترض من المحكمين النأي بالنفس عن المصالح الشخصية.
- ٧- يفترض من المحكمين الالتزام بالوقت المخصص لعملية التحكيم.

الانتحال (السرقه العلمية)

- ١- ترى المجلة في الانتحال أو السرقة العلمية سلوكاً غير أخلاقي في مجال البحث والنشر العلمي.
- ٢- يحق للمجلة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بحق أولئك الذين يخالفون أسس وأخلاقيات البحث العلمي وقواعدها.

حقوق النشر

يتم نقل حقوق النشر الى المجلة عند اخطار الباحث بقبول مجته المقدم للنشر في المجلة.

جدول النشر

تلتزم المجلة بجدول النشر حيث تقوم باصدار اربعة اعداد في السنة (اذار-حزيران-ايلول-كانون الاول)

حقوق الملكية

تلتزم المجلة بالحفاظ على حقوق الملكية الفكرية للباحثين.

دليل الباحث

هنالك ضوابط للنشر ينبغي ان يلتزم بها الباحث وعلى النحو الاتي:

١. تقديم طلب خطي لنشر البحث ، مع التعهد بعدم إرساله او نشره في مجلة أخرى.
٢. يجب أن يكون البحث مطبوعاً على الحاسوب على شكل ملف Word .
٣. متن البحث بحجم ١٤ والهوامش بحجم ١٢ ، نوع الخط للمتن والآيات القرآنية Deco Type Naskh، وتباعداً الاسطر والفقرات (١٠٠) للغة العربية، و Time New Roman، وتباعداً الاسطر والفقرات (١٠١٥) للغة الإنكليزية وتخطيط الصفحة يكون بشكل عمودان.
٤. لا يتجاوز عدد صفحات بحوث العلوم الصرفة عن ال (١٥) صفحة والعلوم الإنسانية عن ال (٢٠) صفحة، ويستحصل مبلغ (٢٠٠٠) ديناراً لكل صفحة إضافية.
٥. ينبغي أن يطبع عنوان البحث متبوعاً باسم المؤلف (أو المؤلفين) وعنوانه، ومن ثم ملخص البحث باللغة العربية والإنكليزية على أن لا يتجاوز عدد كلمات الملخص عن (٢٥٠) كلمة، يليها كلمات مفتاحية غير واردة في العنوان ثم يليها متن البحث.

٦. دفع أجور النشر البالغة (١٠٠) ألف دينار للقب الأستاذ، و(٧٥) ألف دينار للقب الأستاذ المساعد، و(٥٠) ألف دينار للقب المدرس فما دون بالنسبة للبحوث العلمية، أما البحوث الإنسانية، فيدفع مبلغ (٧٥) ألف دينار للقب الأستاذ و(٦٠) ألف دينار للقب الأستاذ المساعد و(٤٠) ألف دينار للقب المدرس فما دون، يستحصل القسط الأول عند تسليم البحث للمجلة، ويستحصل القسط الثاني عند استلام القبول بالنشر، كذلك دفع مبلغ (٥) آلاف لنسخة المستل من العدد.
٧. بعد قبول البحث للنشر يقدم الباحث نسخة نهائية للبحث مع قرص مدمج (CD) لغرض تنفيذه وفق سياق المجلة .
٨. إذا كان البحث مستلًا من رسالة ماجستير أو أطروحة دكتوراه توضع علامة (*) في نهاية عنوان البحث ثم يذكر في الهامش تفاصيل المشرف و الباحث و عنوان رسالة الماجستير أو أطروحة الدكتوراه.
٩. تقدم الجداول مطبوعة، والأشكال والمخططات على شكل صورة موحدة.
١٠. لا تعاد البحوث الى أصحابها سواء أقبلت للنشر ام لم تقبل .
١١. أن لا يتجاوز عنوان البحث والملخص باللغة العربية وباللغة الإنكليزية صفحة واحدة فقط.
١٢. تكون المراسلات المتعلقة بالمجلة على العنوان التالي :

(مجلة أبحاث كلية التربية الأساسية / كلية التربية الأساسية /جامعة الموصل)

صيغة النشر

يعتمد في صيغة النشر قالب **Template** وهو قالب موحد لكافة البحوث ونشرها مثبتاً فيه شعار المجلة ويكون معداً بأحدى الصيغتين **Word** او **Latex** .

توثيق المصادر

يجب ان تعتمد المجلة في توثيق المصادر على صيغة **APA** (الجمعية الامريكية لعلم النفس) في توثيق المصادر وتنسيقها وترتيبها .

مجلة أبحاث كلية التربية الأساسية

جامعة الموصل

الرؤية :

أن تكون المجلة رائدة في ميدان نشر الأبحاث الإنسانية، ولها معامل تأثير، ومصنفة ضمن قواعد البيانات العربية والعالمية.

الرسالة :

نشر الأبحاث العلمية، الرصينة والحكمة، والتي تعالج قضايا ومشكلات وموضوعات ذوات الصلة بالعلوم اللغوية، والإسلامية، والاجتماعية، والتربوية والنفسية، والتربية البدنية. فضلاً عن العلوم الرياضية والصفحة.

الأهداف :

- ١- أن تساهم المجلة في نشر أبحاث أعضاء هيئة التدريس والباحثين في عموم المؤسسات الأكاديمية والجامعية، وطنياً وعربياً وعالمياً.
- ٢- أن تصبح المجلة مرجعاً علمياً للباحثين في العلوم الإنسانية والصفحة.
- ٣- أن تلتزم المجلة بنشر الأبحاث ذوات المنهج الوسطي في معالجة قضايا الفكر والدين، مع احترام الحرية الأكاديمية للباحثين.

افتتاحية العدد

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ﴾

بجهود حثيثة من لدن هيئة تحرير المجلة، تواصل المجلة نشر الأبحاث التي حصلت على قبول نشر وفقاً للسياسات العلمية والاجرائية للمجلة، وبفترة قياسية وأعداد كبيرة بغية الانتهاء من النشر الورقي، والتخطيط للتحاق بالنشر الإلكتروني في مواقع عالمية. ونأمل أن يتحقق ذلك مع بداية العام الدراسي القادم إن شاء الله. و المجلة ملتزمة دائماً برسالتها وأهدافها ورؤيتها المستقبلية، فضلاً عن التنوع في الأبحاث الانسانية والعلمية. والعدد الذي بين أيدينا هو العدد الرابع من المجلد الخامس عشر لسنة (٢٠١٩) حافل بالعديد من الأبحاث في مجال العلوم التربوية والنفسية، واللغة العربية وآدابها، والعلوم الإسلامية وفروعها، والتاريخ بفرقاته القديمة والإسلامية والحديثة والمعاصرة، وعلوم الرياضة والتربية البدنية، والعلوم الصرفة بأنماطها وأنواعها وتخصصاتها. وخاتمة أبحاث هذا العدد أبحاث في تخصص اللغة الإنكليزية.

نأمل أن تقدم أبحاث هذا العدد الجديد الذي يرومّه الباحثون والأكاديميون وطلبة الدراسات العليا من معرفة نظرية وميدانية وتجريبية. والمجلة لا زالت مرحبة بأي رأي أو نقد بناء أو تصويب للخطأ. والحمد لله رب العالمين.

الاستاذ الدكتور

فاضل خليل ابراهيم

رئيس تحرير المجلة

((محور دراسات في علوم الفيزياء والكيمياء والاحياء والرياضيات))

رقم الصفحات	العناوين	اسماء الباحثين
١٢٧٣-١٢٦٤	توظيف طيف التداخل الضوئي كمتحسس للاستقطاب وتغيرات القدرة	م. دريد حازم احمد الهلايلي
١٢٨٥-١٢٧٤	تصميم وتنفيذ منظومة تتبع شمسي احادي المحور	م. عمار ياسين برجس/ يسرى مال الله عبدالله
١٢٩٥-١٢٨٦	Study of Optical Properties of XLPE Polyethylene Cross – Bonding by the Effect Annealing	Sahar Abd Alghany Younis
١٣٢٣-١٢٩٦	تحديد بلازميدات المقاومة للمضادات الحيوية واملاح المعادن الثقيلة لبعض الانواع البكتيرية الممرضة للإنسان باستخدام مستخلصات مسحوق حمض الليمون Citric acid powder	نوار طلال حامد عزيز الصفراوي / د. خالد دحام احمد / د. عبدالرزاق خضر محمود
١٣٤٥-١٣٣٢	تحفيز التغيرات الجسمية في مزارع كلس اليانسون <i>Pimpinella anisuml</i> باستخدام الصوديوم ازايد	رغد نواف جرجيس / شمال يونس عبد الهادي
١٣٦٧-١٣٤٦	فعالية مستخلص السيانوبكتريا <i>Westiellopsis prolifica</i> ومركباته الفينولية المعزولة ضد البكتريا والفطريات	أ.م.د. م. اسامة احمد الكاتب / سارة عبدالواحد محمد
١٣٧٧-١٣٦٨	تأثير حذف <i>nifD gene</i> وجزء من <i>nifH gene</i> و <i>nifK gene</i> على انتاج الغشاء الحيوي في بكتريا <i>Klebsiella pneumoniae</i>	فوز عبد السلام الصفار/ عبد الرزاق خضر/ نجوى ابراهيم البرهاوي
١٣٩٤-١٣٧٨	الحساسية المتماثلة للمحسسات لدى مرضى الجاري البولية في محافظة نينوى	م. فرح يونس حسين الخليفة/ أ.د. باسمه احمد عبدالله
١٤١١-١٣٩٥	دور الموت الخلوي المبرمج في خصوبة وعقم الاكياس العدرية في الابقار والاعنام والمعز الخمجة طبيعيا	حنان صديق سعدون/ نبيل عناد صالح/ انتصار رحيم

رقم الصفحات	العناوين	اسماء الباحثين
		الكتاني
١٤٣١-١٤١٢	دراسة بعض الخصائص الفيزيائية والكيميائية والبكتولوجية لعينات مياه نهر دجلة ومياه الاسالة في محافظة نينوى	رنى وعد الله يونس/ ياسين حسين عويد/ كركر محمد ثلج
١٤٥٢-١٤٣٢	تحضير وتشخيص معقدات متعددة النوى و Ni(II), Cu(II), Sb(II) مع مركبات Co(II)، Bi(III) (0-,0) ثنائي ايزوبوتيل او البيوتيل الثالثي ثنائي ثايو فوسفات (IV) الفصدير	إناس حازم محمد ، نبيل هادي بطرس
١٤٦١-١٤٥٣	التأثير الواقي لنبات الجنسنع <i>Panax ginseng</i> في الفئران المعرضة للتسمم بالرصاص	سلوان وعد الله يوسف
١٤٧٠-١٤٦٢	تأثير شراب الكوكاكولا الحاوي على الكافيين في احداث التشوّهات العيانية والآفات النسجية المرضية في دماغ اناث الفئران البيض <i>Mus musculus</i> الحوامل	د. هاني مال الله حمودي/ اروى ادريس احمد
١٤٨٣-١٤٧١	دراسة التغيرات الوراثية لنبات الحنطة الناتج عن التلوث بالمعادن الثقيلة	د. محمد ابراهيم خليل / دلال عبد الله فتحي
١٤٩٥-١٤٨٤	تأثير عدد من المواد في انتاج انزيمي البروتينيز والايلاستيز لجرثومة <i>Pseudomonas aeruginosa</i> *	رسمية عمر سلطان الجبوري/ محسن أيوب عيسى العكيدي
١٥٢١-١٤٩٦	فصل وتشخيص عدد من الاحماض الدهنية وبعض المركبات الفينولية من بذور الكتان ودراسة تأثيرها الحيوي على نوعين من البكتريا الممرضة للنبات	د. فاطمة إبراهيم سلطان الدليمي/ علي أحمد جاسم
١٥٣٣-١٥٢٢	تأثير المستخلص الكحولي لتشور ثمار الرمان على جرثومتي <i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Staphylococcus epidermidis</i>	م.م. اسيل عصام جمال الدين النوري / رنا إبراهيم خليل / جمال محمد حسين
١٥٥٠-١٥٣٤	دراسة تشخيصية ووراثية للبكتريا من جنس المتقلبات المعزولة من نماذج مرضية	م.م سجي ضياء الدين

رقم الصفحات	العناوين	اسماء الباحثين
	للإنسان	مصطفى/ أ.د خالد دحام احمد
١٥٦٦-١٥٥١	الترددات الراديوية وتأثيرها على بعض النواحي الفسلجية للقران المهق	أ.م.د سعيد حسن سعيد التعيمي/ أ.م.د بثينة حاتم السبعوي/ م. روعة ناجي نايف
١٥٧٦-١٥٦٧	دراسة حول تأثير المجال المغناطيسي على بعض أنواع الجراثيم المعزولة من بيئات مختلفة	مي عبد المحافظ عبد القادر العلاف
١٥٨٨-١٥٧٧	Effect of oxygen ratio on the Electrical and optical properties of TiO ₂ films deposited by DC reactive sputtering technique	Laith Rabih, Ghazwan Gh, Ali , Marwan H. Younus, Sudjatmoko, Kuwat Triyana, Pekik Nurwantoro
١٦١١-١٥٨٩	دراسة تأثيرات الحجم الجببي لمادة التديم على كفاءة مقاومة البلى لمادة متراكبة بوليمرية المادة الأساس	أسماء عماد عبد / د. أحمد نوري محمود/ د . إدريس عيدان
١٦٣٥-١٦١٢	دراسة تأثيرات الحجم الجببي وهيئة الاحتواء على السلوكية الميكانيكية لمادة متراكبة بوليمرية المادة الأساس	أحمد نوري محمود/ أسماء عماد عبد
١٦٤٩-١٦٣٦	التقدير الطيفي لهيدروكلوريد الترايفلورازين في الجرعات الصيدلانية باستخدام كاشف ٤,٢- ثنائي كلوروانيلين	اسراء طالب حميدي
١٦٧٦-١٦٥٠	عدد من المعقدات الجديدة لمزيج من الليكندات- للنحاس (II) وتشخيصها وفعاليتها الحيوية وتأثير الليزر	أ. د. د. زهور ف. داؤد/ د . رنا ر. ع. البستاني
١٦٩٦-١٦٧٧	دراسة التحليل الحراري الوزني للمخاليط الفيزيائية لراتنج الأيوكسي مع N-٢	م. ا. ابتهاج زكي سليمان آل

رقم الصفحات	العناوين	اسماء الباحثين
	بروموفينيل حامض المالميك	حليم / ا.أكرم عزيز محمد
١٧٠٦-١٦٩٧	المقارنة بين محاليل التركيز لتشخيص بيوض الديدان الاسطوانية في الضأن	ايناس سعدي حسين، سري سالم أغوان
١٧١٤-١٧٠٧	A Study to determine the validity of groundwater for different uses in Semel - Dohuk governorate	Dr. Yusra Majeed Al-shaker
١٧٢٨-١٧١٥	Histopathological Changes In Some Organs Of Mosquito Fish <i>Gambusia holbrooki</i> Exposed to Cadmium Chloride	Amal abduAllah Yonis, /Ali Ashgar Abed
١٧٤٠-١٧٢٩	Role of Interleukin – 17A in Diabetic Type 2 Patients Infected with <i>Toxoplasma gondii</i>	Sarah Ali Saeed /Israa Kasim Al-Aubaidi
١٧٥٩-١٧٤١	Study of paraoxonase3 enzyme for women with breast cancer (Biochemical and molecular genetics study)	Asst.Prof Dr. Luma abdalmonim Baker, Prof. Dr.Nahida Saieed Hamoodi*,.Prof. Dr. Hazha Jamal Hidayet
١٧٧٥-١٧٦٠	تأثير مستخلصات الكحول الأيثيلي لاجزاء نبات السبج <i>Melia ozedarach L</i> في بعض جوانب الاداء الحيوي لبعوض الكيولكس <i>Culex pipiens molestus</i> Forska	منيف عبد مصطفى/خالدة عبدالله /حميد مهدي رحيل
١٧٩٥-١٧٧٦	تصميم نظام للإجازات ومتابعتها باستخدام أوركل	د. سماء طليح/ علي صالح
١٨٠٥-١٧٩٦	Elementary semigroups of linear transformations and their generating the equations	د. سعد جليل متي

رقم الصفحات	العناوين	اسماء الباحثين
١٨١٦-١٨٠٦	A New Result of Conjugate Gradient Method with Non-monotone Line Search-Part I	Rana Z. Al-Kawaz Abbas Y. Al-Bayati Marwan S. Jameel
١٨٢٨-١٨١٧	A New Nonlinear Conjugate Gradient Coefficient Based on the Scaled Rank-One Update	Dr. Basim A. Hassan Osama M. Taher Hameed M. Sadeq
١٨٣٩-١٨٢٩	حل الحدوديات الضبابية بطريقة دليل العدد الضبابي	د. أسماء زياد محمد الكاتب
١٨٤٦-١٨٤٠	A New Mixed in Sequential Unconstrained Minimization Techniques Cuckoos Search in Constrained Optimization	Saja O. Mohammad T. /Enaam G. AL-taher /Huda Y.Najm
١٨٥٩-١٨٤٧	A QSPR study on melting point of energetic carbocyclic nitroaromatic compounds based on a statistical approach	Maimoonah Khalid Qasim / Zakariya Yahya Algamal

توظيف طيف التداخل الضوئي كمتحسس للاستقطاب وتغيرات القدرة

دريد حازم احمد الهلاي

الملخص

تم محاكاة نمط تداخل مثالي لمقياس التداخل الليفي لمصدر ليزر مستمر تردده 193.1THz وذلك لتوظيفه كمتحسس للاستقطاب الضوئي وتغيرات زوايا السمات والاهليجية واتجاه الدوران عبر ملاحظة معالم التداخل كإزاحة التردد وزاوية الطور.

أظهرت الدراسة إمكانية تحسس الهدب المركزي لنمط التداخل لزوايا الاستقطاب والاهليجية وان أدنى قدرة لخرج المقياس عند الزاويتين -90° , -270° .

Use of Optical Fiber Interferometer as a Sensor of Polarization and Power Changes

Lect. / Duraid Hazim Ahmed / Science Department
College of Basic Education

ABSTRACT

The production and analysis of an optimal interference pattern for the optical interferometer of a 193.1THz continuous laser source was simulated to investigate the effect of optical polarization and changes of azimuth and elliptic angles on the frequency shift, phase angle .

The study showed that the fringe pattern can be sensed the displacement of central fringe at the angles of polarization and elliptical. While the output power of the meter is lowest at the angles -90° , -270° .

عالية ، خفيفة الوزن ، مضغوطة تتحمل ظروف بيئية

١- المقدمة :-

مختلفة ، مرنة ، سلبية التفاعل ، محمية من التداخلات

وظف الليف البصري كمتحسس عبر تقنية الكشف

الكهرومغناطيسية [1].

المقارن التي تعتمد على التداخل الضوئي للتحسس

الهدف من هذه الدراسة هو استخدام مجموعة

بالضغط ، الإجهاد ، درجة الحرارة ، الدوران ،

البرامج البصرية Optisystem كمحاكاة لإنتاج

وقياس سرع الجسيمات فضلا عن التحسس بالمجالات

نموذج تداخل ضوئي مثالي لمقياس التداخل Delay

الكهربائية والمغناطيسية [1,2,3] لما لمتحسسات

Interferometer لمصدر ليزر مستمر ذي تردد

الألياف من مواصفات فريدة فهي ذات حساسية ودقة

الشكل (2) الاستقطاب الاهليجي [4]

طور ($\delta = -\pi/2$) وأنها مستقطبة بوضوايا أو بشكل

اهليجي عند الدوران الغير منتظم للمركبتين

($A_x \neq A_y$) في المستوي xy وهي الحالة الأكثر

عمومية للاستقطاب إذ أن الاستقطابي الخطي

والدائري حالات خاصة للاستقطاب الاهليجي كما

أن الوصف الشامل لهذا الاستقطاب يتضمن ميلان

الاهليج نسبة للمحاور الإحداثية وشكله وإدراك

التفاف المجال الكهربائي $0 > (CCW)$ [4]

($\sin \delta > 0 (CW)$) . الشكل (1) يوضح أشكال

الاستقطاب لفروق طوريه مختلفة .

وتعرف الاهليجية e على أنها $e = \pm b/a$ إذ إن a, b

أطوال محاور الاهليج الأساسية ، لاحظ الشكل

(2)، فعند الالتفاف يمينا تكون الاهليجية موجبة

بينما تصبح سالبة في حالة الالتفاف يسارا وبذلك

193.1THz لتوظيفه كمتحسس لتغيرات زوايا

الاستقطاب الضوئي وتأثيرها في إزاحة نمط الهدب

وفرق الطور والتغيرات الطيفية المصاحبة لوصف

الاستقطاب ك معاملات ستوكس ونوع الاستقطاب

وموقعه واتجاه الدوران وتحسس القدرة الضوئية لخرج

المقياس .

٢- الجزء النظري :-

ان دالة التحويل بين فرق الطور وفرق المسار البصري

هي $\delta = \frac{2\pi}{\lambda} (O PD)$. يتأثر فرق الطور

بتغيرات المسار البصري نتيجة لتغير الطول الفيزيائي ،

معامل الانكسار ، الطول الموجي ومن خلال قياس

إزاحة الطيف يمكن التحسس بالإجهاد ، الحرارة .

ولان مقاييس التداخل تزود معلومات طيفية زمانية

ومكانية عن الإشارات المتداخلة فان الكمية المراد

تحسسها تحسب عبر تغير الطول الموجي ، الطور،

الشدة ، التردد ، عرض الطيف وهذا يعطي مدى

ديناميكي واسع ودقة وحساسية عالية [4] .

يقال للموجة أنها مستقطبة خطيا أو استوائيا في

حال تذبذب المجال الكهربائي باتجاه ثابت داخل

المستوي xy بفرق طور ($\delta = 0, \pi$) وأنها مستقطبة

دائريا عند الدوران المنتظم للمركبتين ($A_x = A_y$) في

المستوي xy باتجاه عقارب الساعة بفرق

طور ($\delta = \pi/2$) وبالعكس عقرب الساعة بفرق

تكون اهليجية الاستقطاب الدائري $e=\pm 1$ فضلا عن زاوية السميت ψ ، الميلان نسبة للمحور X ، وفرق الطور النسبي δ واتجاه الالتفاف لكل حالة .
[4]. الشكل (3) يضع موقع كل حالة من حالات الاستقطاب الاهليجي نسبة للمحاور الأساسية xy

$$\begin{aligned} S0 &= \langle\langle Ax^2 + Ay^2 \rangle\rangle \\ S1 &= \langle\langle Ax^2 - Ay^2 \rangle\rangle \\ S2 &= 2\langle\langle Ax Ay \cos\delta \rangle\rangle \\ S3 &= 2\langle\langle Ax Ay \sin\delta \rangle\rangle \end{aligned}$$

الشكل(3) موقع كل حالة من حالات الاستقطاب الاهليجي نسبة للمحاور الأساسية xy [4]: - (0,0) الاستقطاب الخطي على طول المحور x ، (1,0) الآتية. لاحظ الجدول (1) الذي يدرج أهم حالات الاستقطاب [4] .
الاستقطاب الخطي بزواوية سميت 45° ، (0,1) ، الاستقطاب الدائري CW ، (0,-1) ، الاستقطاب الدائري CCW يعبر أيضا عن استقطاب الموجة المستوية بمصفوفة متجهات جونس الآتية إذ تضم معلومات كاملة عن سعة المركبات وأطوارها [4].
 $J(\psi, \delta) = \begin{vmatrix} \cos\psi & \\ e^{i\delta} & \sin\psi \end{vmatrix}$
استخدمت معاملات ستوكس أو متجهات ستوكس في وصف حالة الاستقطاب وهي أربع معاملات (S0,S1,S2,S3) قابلة للكشف والقياس الضوئي تمثل المعدل الزمني للكميات ، $\cos\delta$ ، Ax ، Ay ، $\sin\delta$ إذ أن:-
 $J = \begin{vmatrix} Ax & e^{i\delta x} \\ Ay & e^{i\delta y} \end{vmatrix}$

ويعبر عن حالة الاستقطاب الاهليجي العام بالمصفوفة فإذا غير المجال ليصبح $S0=1$ فإن التعبير عن الضوء غير المستقطب هو (1,0,0,0) وللمستقطب أفقيا هو (1,1,0,0) وللمستقطب عموديا (1,-1,0,0) وللدائري (CCW, $\delta=-\pi/2$) هو (1,0,0,-1) وللدائري (CW, $\delta= \pi/2$) هو (1,0,0, 1) ، وقد مثلت هذه المتجهات رياضيا بكرة ثلاثية الأبعاد محاورها S1,S2,S3 (على اعتبار أن $S0=1$) تسمى Poincare Sphere ، لاحظ الشكل (4) [4]. إن أي نقطة من نقاط سطح الكرة يمثل حالة من حالات

الاستقطاب فكل النقاط الواقعة على خط استواء الكرة تمثل حالات الاستقطاب الخطي بأنواعه الأفقي وأنواعه الدائري والمائل [4].

الشكل (4) توزيع مواقع مختلفة لأنواع الاستقطاب على سطح

الكرة الافتراضية Poincare Sphere [4]

إن أساس عمل مقياس التداخل الليفي المستخدم في هذه الدراسة يعتمد على الفرق بين ذراعي المقياس وهو يتعلق بالطول الموجي وتحسس الاستقطاب . الشكل (5) يبين البنية الجوهريّة للمقياس إذ أنه يتكون من ذراعين من الليف الضوئي عند دخول الإشارة

الأذرع نحو خرجي المقياس وان فرق الإعاقاة الطوريه بين الذراعين $\Delta\delta$ يتناسب والطول الموجي للإشارة الضوئية وان محاكاة ذلك يتم عبر تطبيق مصفوفة جونس للإشارة الداخلة [5] .

Polarization Ellipse	Jones Vector	(δ, ψ)	(ϕ, θ)	Stokes Parameters
—	$\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$	(0,0)	(0,0)	(1,1,0,0)
	$\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$	(0, $\pi/2$)	($\pi/2$,0)	(1,-1,0,0)
/	$1/\sqrt{2} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$	(0, $\pi/4$)	($\pi/4$,0)	(1,0,1,0)
\	$1/\sqrt{2} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$	(π , $\pi/4$)	(- $\pi/4$,0)	(1,0,-1,0)
○	$1/\sqrt{2} \begin{bmatrix} 1 \\ -i \end{bmatrix}$	(- $\pi/2$, $\pi/4$)	(0, $\pi/4$)	(1,0,0,-1)
○	$1/\sqrt{2} \begin{bmatrix} 1 \\ i \end{bmatrix}$	($\pi/2$, $\pi/4$)	(0,- $\pi/4$)	(1,0,0,1)

جدول (1) يعرض تعابير متنوعة لحالات الاستقطاب [4]
 $\theta = \tan^{-1}e$ الزاوية الاهليجية ، θ الزاوية الاهليجية

الضوئية فإنها
تنشطر باتجاه

الشكل (5) البنية الجوهرية لمقياس التداخل Delay Interferometer [5]

Interferometer إذ تم الاعتماد على الليزر

المستمر ذي التردد 193.1 THz بقدر 0

dBm كمصدر ضوئي وحيد الموجة مثالي لتحقيق

التداخل ، أما ما يخص معالم مقياس التداخل

المستخدم فهي مدرجة في الجدول (2) .

٣- الجزء العملي

الشكل (6) المخطط الكلي لدائرة تكوين التداخل

الضوئي

الشكل (6) يعرض المخطط الكلي لدراسة نموذج

التداخل لمقياس التداخل Delay

Interferometer-1 يعمل على تدوير نظام

المحاور الإحداثية بزاوية مقدارها 90° وتثبيت

Time Delay بمقدار 0.01ns

والمقياسين PDF=10000MHz

التغيرات التي رافقت الهدب

المركزي في المقياسين عند التردد المرجعي

.193.1THz

جدول (2) معالم مقياس التداخل المستخدم

للتقصي عن تحسس طيف الهدب للاستقطاب

الضوئي واثـر تغير زاوية السمـت تم تصميم المخطط

الموضح في الشكل (7) ، بشكل مقارنة ، بعد

إضافة مدور استقطاب للمقياس

الشكل (7) المخطط الكلي لدراسة تأثير تغير زاوية

السمت على طيف هدب التداخل

الشكلان (8,9) يضعان الأطياف بشكل مقارنة بين

نموذج الهدب للخروج المرجعي ونموذج الهدب للخروج

المتغير لمقياسي التداخل . كما أن الجدول (3) يعرض

الشكل (8)

طيفي الخرج

المرجعي

للمقياسين

الخرج المرجعي							
	Stokes Parameters				Polarization State		Bandwidth/THz
	S0	S1	S2	S3	Azimuth	Ellipticity	
Output/1 Interferometer	-1.6dBm	1	0	0	0°	0°	193.05-193.15
Output/1 Interferometer-1	-2.1dBm	-1	0	0	-90°	0°	193.04-193.14
الخرج المتغير							
Output/2 Interferometer	-31.6dBm	1	0	0	0°	0°	193-193.2
Output/2 Interferometer-1	-11.7dBm	-1	0	0	-90°	0°	192.99-193.19

الشكل (9) طيفي الخرج المتغير للمقياسين

جدول (3) نتائج معاملات استقطاب الهدب المركزي بدون تدوير زاوية السميت وبعد تدويرها

نتيجة لدوران زاوية السميت 90° فان طيف الخرج المرجعي ، الشكل (8) ، سينتقل من المحور X إلى المحور Y في محلل الطيف الضوئي وان التغيرات طفيفة وبخاصة حالة عدم الانتظام للهدب المركزي وعدم تناظره حول التردد المرجعي وتقضان قدرته بمقدار 0.5dBm . أما ما يخص طيف الأهداب للخرج المتغير ، الشكل (9) ، فان تأثير زاوية السميت سيحول الطيف إلى المحور Y أيضا وان التغير ملحوظ بشكل كبير على الهدب المركزي إذ نلاحظ تراوح قدرته بين -11.7dBm و -70dBm نتيجة لانشطاره إلى هدين واختلاف طوره . فضلا عن

الإزاحة الجانبية بمقدار 0.01THz لكل الهدب المعروضة في الشكلين السابقين وهو ما يوافق القيمة النظرية التي ثبتناها في مواصفات المقياسين، مع الاحتفاظ بالفاصلة الترددية $\text{FSR}=100\text{ GHz}$ واعتمادها على الإعاقة الزمنية فحسب . أما بيانات خطوط ستوكس فإنها تدل على تغير نوع الاستقطاب من الاستقطاب الخطي الأفقي $\text{HLP}(1,0,0)$ في المقياس الغير مدور إلى الاستقطاب الخطي العمودي $\text{VLP}(1,0,0)$ في المقياس المدور بزواوية دوران 90° عكس عقرب الساعة CCW .

تشير أيضا نتائج محلات الاستقطاب في الشكل (10) أدناه إلى متغيرات زاوية السمات ونوع الاستقطاب بشكله الاهليجي العام والاهليجية لاستقطاب الهدب المركزي بين خرجي مقياس التداخل Interferometer-1 إذ أن الأشكال العليا تشير بان الاستقطاب خطي عمودي وان زاوية السمات 90° للتردد 193.1THz وأنها تنقلب من 90° إلى $+90^\circ$ عند نهاية الهدب المركزي المضيء وبداية الهدب المظلم الأول بينما الأشكال الدنيا خاصة بالخرج المتغير للمقياس إذ نلاحظ أن الاستقطاب أصبح اهليجي بظهور مؤشر لاتجاه الدوران بعكس

الشكل (15) تغير القدرة الضوئية لخرج مقياس التداخل مع زاوية السمات

عقب الساعة نتيجة للإعاقة الزمنية وفرق الطور بين الذراعين مما أدى إلى انقلاب جديد لزاوية السمات وحدث زحف ترددي قدره 0.01THz وهو المسبب في انشطار الهدب المركزي ، نشوء هدب

الشكل (11) نتائج محلات الاستقطاب ومواقع حالات الاستقطاب على Poincare Sphere وليان تحسس نمط التداخل لتغيرات القدرة الضوئية واعتمادها على زاوية السمات تم مسح زاوية التدوير ضمن المدى $0^\circ-360^\circ$. الشكل (12) يبين نتائج المسح إذ لوحظ تفاوت في خسائر القدرة الضوئية بسبب التغير في زاوية الاستقطاب وان أعلى الخسائر

الشكل (10) عرض لمتغيرات استقطاب الهدب المركزي بين خرجي مقياس التداخل 1 جديد . كما أن الشكل (11) يعرض كل النتائج لمعاملات ستوكس وزاوية السمات والزاوية الاهليجية لخرجي المقياسين مع بيان مواقع حالات الاستقطاب على السطح الكروي Poincare Sphere .

تكون عند الزاويتين -270° , -90° ثم الاهليجي عند -135° - عودة إلى الخطي عند 180° باتجاه CCW. وهكذا يتكرر الاستقطاب الأفقي . وقد لوحظ تكرار نوع الاستقطاب عند تدوير زاوية السمات ، بزيادة 45° ، من الخطي عند 0° إلى الاهليجي عند -45° ثم الدائري عند -90°

الشكل (13) تغير استقطاب خرج مقياس التداخل عند زوايا سمات مختلفة

قدرة الهدب ، وفي إحداث إزاحة ترددية وبخاصة الزاويتين $(-270^\circ, -90^\circ)$ المتعامدين مع الاستقطاب الأفقي كونهما تضعان القدرة الضوئية لخرج المقياس في أدنى قيمة وتحدثان فرق طور يمكن

٤- الاستنتاج :-
خلصت الدراسة إلى مجموعة من الاستنتاجات تضم تحسس نمط التداخل لما يلي :-
• لزاوية السمات دور في تغير نوع الاستقطاب ،

- كـتغـيرـات تـرـدـديـة لـنـمـوـذـج التـدـاـخـل .
- طـيـف التـدـاـخـل مـنـظـومـة تـحـسـس دـقـيـقـة لـلـتـغـيـرات
- الـاسـتـقـطـابـيـة و الفـروـق الطـورـيـة و الإـزـاحـات التـرـدـديـة
- فـهـو كـالمـجـس لـلـتـأثـيـرات الخـارـجـيـة أـو الـدـاـخـلـيـة .
-
- التـحـسـس بـه مـن خـلـال انـشـطـار الـهـدب المـركـزي وولـادـة
- هـدب مـظـلم جـديـد .
- اتـجـاه دورـان الـاسـتـقـطـاب الـاهـليـجـي و نـوعـه
- يـحـدـده مـقـدار زـاويـة السـمـت وانه يـظـهـر بـالشـكـل الخـطـي
- أـو الـاهـليـجـي أـو الدائـري .
- تـأثـير الإـعـاقـة الزـمـنيـة لـلمـقـيـاس يـشـاهـد بـوضـوح

المصادر :-

1

- B. Ha Lee, Y. Ho Kim , " Interferometric Fiber Optic Sensors", J. Sensors 2012 .
- 2- S. V. Dhurandhar & W.-T. Ni , " Numerical simulation of time delay interferometry for a LISA-like mission with the simplification of having only one interferometer ", Class. Quantum Grav., 2013.
- 3- U. Sharma & X. Wei , Fiber Optic Interferometric Devices, Springer Science+Business Media New York 2013.
- 4- A.Yariv & P. Yeh , Photonics: Optical Electronics in Modern Communications ,6th ed. ,Oxford University Press ,2007.
- 5- OptiSystem Component Library Optical Communication System Design Software. Version.7,US, Copyright © 2008 Optiwave.

Design and Implementation of one Axis Solar Tracking System

Ammar Yassen Burjes

Yusra Malallah Abdulla

Department of Physics, College of Science, University of Mosul, Mosul,
Iraq

Abstract

In this paper we will design and implement a horizontally moving solar tracking system. The system will follow the sunlight by using one servo motor. The moving motor will rotate (0° - 180°) from East to West. The system will use Lux meter, voltage sensor, current sensor and two light dependent resistors (LDRs) to measure the (lux, Voltage, Current). The measured values will then be processed by an ATMEGA microcontroller, that is embedded in the Arduino Leonardo board, and the servo motor position will change according to the incident light intensity on the small solar panel which senses the light by the two LDRs connected with it. The system is programmed using Arduino IDE.

Keywords: Arduino, One Axis Solar Tracker, ATMEGA microcontroller, LDR, Servo motor.

تصميم وتنفيذ منظومة تتبع شمسي احادي المحور

عمار ياسين برجس يسرى مال الله عبدالله

المخلص

في هذا البحث قمنا بتصميم وتنفيذ منظومة تتبع شمسي تتحرك بصورة افقية، هذه المنظومة سوف تتبع الشمس باستخدام محرك من نوع سيرفو. هذا المحرك يستطيع الدوران (0° - 180°) من الشرق الى الغرب. في هذه المنظومة تم استخدام مقياس شدة الاضاءة، حساس قياس الفولطية، حساس قياس التيار ومقاومتين ضوئيتين لقياس كل من (شدة الاضاءة، الفولطية، التيار). القيم المقاسة سوف يتم معالجتها بواسطة المتحكم الدقيق من نوع ATMEGA الذي يكون مدمج في بورد الاردوينو من نوع ليوناردو، وان حركة محرك السيرفو سوف تغير تبعاً لشدة الضوء الساقط على الخلية الشمسية الصغيرة والتي تحسس الضوء بواسطة المقاومتين الضوئيتين المرتبطتين معها، هذه المنظومة تم برمجتها باستخدام Arduino IDE.

الكلمات المفتاحية: اردوينو، متبع احادي المحور، متحكم دقيق من نوع ATMEGA، محرك سيرفو.

Introduction

There are three top energy sources of electricity in U.S are coal at 37%, nuclear at 19% and natural gas 30% [1]. In future Solar energy will be more popular than other renewable energy resources to take over the scarcity of hydrocarbon[2]. Earth surface received about 600 w/m^2 of solar energy on average [3]. This value depends on several factors such as the atmospheric conditions and the time of the day [1]. Photo voltaic (PV), is one of the exciting new technologies that is already helping towards a solar future. The PV panels are usually mounted at a near open area to face the sun or on the roof of the house[4]. Some people try seasonally to adjust the module's direction manually towards the sun [5,6], to collect as much solar radiations as possible. It is more efficient and convenient to use a sun tracking system [7]. Sun tracking is a device that keeps photo thermal or photovoltaic panel in an optimized position vertical to the solar radiation during day light hours. This can increase the amount of collected energy from the sun by up to 40% [8]. Generally, fixed PV panels can't track the sun

motion, will the single axis tracker follows the sun from East to West [9,10]. In 2012 Abdul-Lateef [9] presented a one-axis sun tracking system using PIC 16F4A Microcontroller. The paper shows how to develop and implement a single axis solar tracking system with minimum cost. In 2013 Armendariz et al [11] presented mono centerline solar tracking system dependent on Microcontroller type (8051), and two LDRs which used to reveal the difference of solar radiation. The module can be tracking the lux of sun manually & automatically. In 2015 Panerjee [12] presented solar tracking system, the system based on 555 Timer, decade counter, two LDRs and stepper motor. This system tracks max. of light intensity when there is a reduce in intensity, the system change its direction automatically to give us a max. light intensity. The aim of paper is the design and implementation of a solar tracking system in one axis by a movement of small solar panel automatically to get a maximum light.

Electronic components of the Experimental

1.Arduino Leonardo Board

Microcontroller type (ATmega32u4) is embedded in Arduino type (Leonardo). The board has twenty digital (output/input) pins, a micro USB connection, a reset button, a (1600000)Hz crystal oscillator, the board simply connect it to a computer with a USB cable or power it with a (Dc-to-Ac) adapter or battery to started

work. The board includes everything needed to support the microcontroller. Leonardo board unlike other boards because the processor has built in usb communication, eliminating needing for another processor. This makes the Leonardo works as keyboard and mouse when connected with computer,[13]. Shown in Fig.(1).

Fig.1 Arduino Leonardo Board

2.Servo Motor

The small motor has an output shaft which can be changed to special angular positions by sending the motor a coded signal. The coded signal is on the input line, the motor will maintain the angular shaft position. The angular position of the shaft change according to the coded signal changes. Servo motor is used for moving by

degrees number to an exact location, when using Arduino board, you can inform the motor what degree you needed it to move and also it will move from its current position. Application servo in radio-controlled airplanes to position control surface as rudders and elevators. In addition to they are used in robots and radio-controlled cars[13].

Fig.2 Servo Motor

3. Voltage Sensor

The sensor Module (0-25)V is dependent on resistance points pressure

principle, it able the input voltage reduced 5 times of original voltage[14].

Fig.3 Voltage Sensor

4.Current Sensor

Current Sensor 5A range module ACS712 is a breakout board for the fully integrated Hall Effect based linear

ACS712ELC-5A current sensor. The sensor gives acurrent measurement for both (Dc and Ac) signals. The module can measure the positive and negative 5A[15].

Fig.4 Current Sensor

5-Light intensity sensor (light Meter)

BH1750FVI is a digital 16bit Serial Output Type Ambient Light Sensor IC for I2 C bus interface. This IC is the

most suitable to get the ambient data for fit LCD and Keypad power of backlight of a Mobile phone. It is suitable to reveal a wide range signal at high resolution[16].

Fig.5 Light intensity sensor

6. Solar Panel

Small solar panels are used in this paper with the Features of good conversion and good efficiency output and very good effect of light. Specification: Output power (1w), working voltage (6V), Working current (0-200)mA and product size (2.5 x 60 x 110)mm. It is used to charge cell of phones for the lighting of home for DIY solar power toys and suitable for solar power system, etc.

The simplest sensor for detecting light is a photoresistor. It's not uncommon to also encounter another name for the exact same sensor: light-dependent resistor (LDR). The component works by changing its resistance based on the amount of light hitting it [17], light dependent resistor is useful in circuits of light sensor because it has a high resistance, sometimes used for measures some physical amount and convert it in to a signal which can be calculated by an instrument or by observer [12].

7. Light Dependent Resistor

Fig.6 Light Dependent Resistor

Experimental work & Setup

The proposed tracking system, tracks the sun light by rotating the small solar panel in one axis. The system is able to track and follow sun light intensity from East to West in order to collect maximum sun light incident on solar cell. The proposed model for one axis tracker is shown in Fig. (7). The tracker model is composed of Arduino board type Leonardo, Servo motor, Voltage sensor Module (0-25 V), Current sensor Module (ACS712), small solar panel, two light dependent resistance (LDRs) sensors, four LEDs and two switch push button. The two LDRs sensors and servo motor are used to track the Sun's East to West (0° – 180°) movement. The servo motor and sensor are interfaced with a microcontroller which embedded in Arduino board which controls the servo motor on the basis of sensor's input. Fig. (8) shown the module of block diagram of the tracking system and flowchart of the control program are given in Fig. (9). The LDR sensor senses the light intensity and sends

signal to the microcontroller. The microcontroller compares the signals received from the LDRs and decide the rotation direction of the servo motor according to the stored program. Now the system is able to follow sun light intensity in order to collect maximum sunlight incident on the cell. When there is reduce in the light intensity, automatically the system will change its direction to give us a max. light intensity, and then sends the signal to the Arduino board which processes the signal by the Microcontroller embedded in an Arduino board. We then start calculating the Lux incident on the solar cell and record the (Lux, V, I, Pin, Pout, Time, Temperature, Efficiency) Parameters by Lux sensor, Voltage sensor and current sensor which are connected to the Arduino board that has been programmed to calculate values listed above, and the time is taken directly for each reading from the computer that was connected to the system and the temperature is taken manually by a thermometer.

Fig.(7) The proposed model for one Axis Tracking System

Fig.(8) Block Diagram of the Tracking System

Fig.(9) Flowchart of the Control Program

Experimental Results

After we prepared the module of tracking system. We have conducted to test the system of solar tracking in mono centerline- from East to West in the city of Mosul /Iraq in 20 February(2018), and the time testing of the experiment was between (9) am to (4) pm, the test was during a sunny day and as shown in the table(1). The data in table (1) includes time of reading, Lux, Temperature, output voltage, output current, output power, input power and efficiency, where we note the measurements in which cell efficiency ranges from (10.29%) as small value to a higher value of (17.75%) as described in table(1). Fig.10 shows that the fluctuation in efficiency values is

due to the fact that measurements were made in winter noted that readings may increase with light intensity or decrease due to the passage of the cloud in front of the sun at the moment of reading, or birds may be pass In front of the sun at the moment of reading , which affects the value of the intensity of the light incident on the solar cell, hence there was somewhat a reading fluctuation. Fig.11 shows that the Lux increases gradually and becomes maximum and semi-stable between (10:45 am – 1:35pm) then decreases gradually with sunset. Fig.12 shows that the output power increases gradually and becomes semi-stable between (10:45am – 3:25pm) with increased temperature, as show in the table (1), within the time period mentioned above.

Time (hh:mm)	Lux	Temp. °C	V. volt	I. Amp.	Pin	Pout	Eff.%
9:00	46319	10	3.2	0.1	2.54	0.32	12.5
9:05	50393	10	3.54	0.1	2.77	0.354	12.77
9:15	54134	12	3.71	0.1	2.97	0.371	12.49
9:25	57452	12	3.89	0.1	3.152	0.389	12.31
9:35	60361	12	4.01	0.1	3.319	0.401	12.08
9:45	65544	12.5	4.2	0.1	3.6	0.42	11.66
9:55	66724	13	4.28	0.1	3.66	0.428	11.69
10:05	75218	13.5	4.62	0.1	4.136	0.462	11.17

10:15	78545	14	4.72	0.1	4.319	0.472	10.92
10:25	82680	15	4.81	0.1	4.547	0.481	10.59
10:35	87829	17	4.94	0.1	4.83	0.494	10.29
10:45	96243	17	5.16	0.15	5.29	0.774	14.03
10:55	102298	17	5.28	0.15	5.62	0.792	14.09
11:05	99540	17.5	5.25	0.15	5.47	0.787	14.39
11:15	104524	17.5	5.35	0.15	5.74	0.802	13.98
11:25	101762	17.5	5.3	0.15	5.59	0.795	14.22
11:35	104377	18.5	5.38	0.15	5.74	0.807	14.05
11:45	105252	19	5.35	0.15	5.78	0.802	13.88
11:55	104209	19	5.28	0.15	5.73	0.792	13.82
12:05	105486	19	5.33	0.15	5.8	0.799	13.7
12:15	107709	19	5.35	0.15	5.92	0.802	13.55
12:25	107369	19	5.35	0.15	5.9	0.802	13.6
12:35	103596	19	5.45	0.15	5.69	0.817	14.36
12:45	104888	20	5.4	0.15	5.76	0.81	14.06
12:55	106340	21	5.35	0.15	5.84	0.802	13.74
1:05	103379	21	5.33	0.15	5.68	0.799	14.06
1:15	98710	21	5.18	0.15	5.42	0.777	14.33
1:25	97436	21	5.18	0.15	5.35	0.777	14.52
1:35	95301	21	5.11	0.15	5.24	0.766	14.61
1:45	87321	21	5.03	0.15	4.8	0.754	15.7
1:55	86306	21.5	4.99	0.15	4.74	0.748	15.79
2:05	84332	22	5.01	0.15	4.63	0.7515	16.23
2:15	86793	21	4.94	0.15	4.77	0.741	15.53
2:25	83660	20	4.89	0.15	4.6	0.7335	15.94
2:35	79100	20	4.72	0.15	4.35	0.705	16.27
2:45	78700	20	4.64	0.15	4.32	0.696	16.11
2:55	79100	20	4.67	0.15	4.35	0.7005	16.1
3:05	75400	20	4.52	0.15	4.147	0.678	16.34
3:15	67800	20	4.3	0.15	3.729	0.645	17.29
3:25	61600	20	4.01	0.15	3.388	0.6015	17.75
3:35	51180	20	3.62	0.1	2.814	0.362	12.86
3:45	49105	20	3.52	0.1	2.7	0.352	13.03
3:55	41982	19	3.13	0.1	2.309	0.313	13.5
4:00	38584	19	2.98	0.1	2.122	0.298	14

Table (1) The Obtained Data from the Experiment

Fig.(10) The variation of efficiency and Time

Fig.(11) The variation of Lux and Time

Conclusions

This paper proposed a solar tracking system based on Arduino Leonardo board

supported by Lux sensor, Voltage sensor, Current sensor, Small Solar cell, Two LDRs, Servo motor, two switch(pushbutton) and four leds. Mono centerline of

solar tracing system design model is successfully implemented with low cost components. This module has the ability to follow lux of light and determine its intensity in order to collect maximum sunlight incident on the solar panel. When there is a reduce in the light intensity, the system is changed automatically its direction to get us max. lux of light as possible, and then sends the signal to the Arduino Leonardo board which processes the signal by a Microcontroller embedded in the

Reference

1.Faq-U.S. energy Information Administration (EIA). (n.d.) U.S. Energy

Information Administration (EIA). Retrieved August 29. (2013).

www.eia.gov/tools/faqs/faq.cfm.

2.Zin, P.E. and Phy. W.E. “ Dual Axis Solar Tracking control system by using Micronroller “, IJSETR, Volume3,issue19, pp.3956-3961.(2014).

3.Kotheri,, D. P. and Nagraath, I.J. Modern Power system Analysis (3rd.ed).

New Delhi. Tata McGraw-Hill, pub. Co.(2003).

Arduino board. We then started to calculate the Lux incident on the solar panel and record the (Lux, V, I, Pin, Pout, Efficiency, Time), by (Lux, Voltage, Current) sensors which were connected with the Arduino board that has been programmed to calculate the values listed above. The time was taken directly with each reading of the computer that was connected to the system, and the temperature was taken manually by a thermometer for each reading.

4.Chiras, D.D.” The Homeowner’s Guide to Renewable Energy”. 1st ed. Canada, New Society puplisher.(2006).

5.Eicker, U.E. “Solar Technologies for Buildings”. 1st ed. Englang, John Wiley & Sons, Ltd.. (2003).

6.Lynn, P, A, “Electricity from Sunlight: An Introduction to Photovoltaics”. 1st. ed. UK, John Wiley & Sons, Ltd. (2002).

7.Huang. Y. J., Kuo. T. C., Chen. C. Y., Chang, C. H., Wu. P. C. and Wu. T. H.

“The Design and Implementation of a Solar Tracking Generation Power System” November (2009).

- 8.Francisco. D., Pedro. D. G. and Luis. G. G.,”Two Axis Solar Tracker Based On Solar Maps controlled by a low power Microcontroller”. Proceeding of the international conference on renewable energies and power quality. Grand (Spain), 23rd to 25th March, (2010).
- 9.Abdul-Lateef.K.I.,“ A Low Cost Single-Axis Sun Tracker System using Pic Microcontroller”.Diyala Journal of Engineering Sciences,Vol.5.No.1.pp.65-78,(2012).
- 10.Sharma. M.,” An Efficient Low Cost Solar Tracker using Microcontroller”. IOSR Journal of Electric and Electronics Engineering.(IOSR, IEEE), V.9. ISSUE4, pp.37-40,(2014).
- 11.Armendariz. J. C., Ortega-Estrada. F. M. , and Cesare. H. E., “Dual Axis Solar Tracing Controller Based on Fuzzy-Rule Emulated Networks and Astronomical Year book Records”, Proceedings of the world congress on Engineering. V.1.,July 3-5, London. U.K.,(2013).
- 12.Banerjee. R. “Solar Tracking System”, International Journal of scientific and Research publications, V.5. ISSUE.3, March(2015).
- 13.www.tutorialspoint.com
- 14.www.electrical4u.com/voltage-sensor.
- 15.www.electrow.com/wiki/index.php?title=ACS712-current-sensor-5A.
16.
www.mousser.com/ds/2/348/bh1750fvi-e-186247.pdf.
- 17.Karvinen. K. & Karvinen. T.” Measure the world with Electronics, Arduino, and Raspberry Pi”. [www.it-books-info](http://www.it-books-info.com).

Study of Optical Properties of XLPE Polyethylene Cross – Bonding by the Effect Annealing

Sahar Abd Alghany Younis

College of Basic Education / Department of Science

Abstract

The research dealt with the effect of annealing on optical properties to the XLPE polyethylene in the degrees of temperature at the range 25 – 100 C° through the study of the absorption coefficient in the visible light area and ultraviolet (100-200 nm) from the transparent waves and absorption, then calculating the absorption coefficient (α) as a function to the falling photon energy and for the different degrees of annealing. One of the results, it is has calculated the " light energy gap E_{pot} " at the annealing temperature degree mentioned above.

The results showed that the transparent value and the light energy gap decreasing at the annealing degree 45 – 65 C° from the degree of room temperature 25 C°, then begins increase when raise of the annealing temperature to the 85 – 100 C°. However, the results have analyzed depended upon " Law of Touc".

نبذة مختصرة

تناول البحث تأثير التلدين على الخواص البصرية لبولي إيثيلين XLPE في درجات حرارة تتراوح بين ٢٥ و ١٠٠ درجة

مئوية من خلال دراسة معامل الامتصاص في منطقة الضوء المرئي والأشعة فوق البنفسجية (١٠٠-٢٠٠ نانومتر) من

الأمواج الشفافة والامتصاص ، ثم حساب معامل الامتصاص (α) كدالة لطاقة الفوتون المتساقطة وبدرجات مختلفة من

الصلب. إحدى النتائج ، تم حساب "فجوة الطاقة الضوئية" E_{pot} في درجة حرارة الصلب المذكورة أعلاه.

أظهرت النتائج أن القيمة الشفافة وفجوة الطاقة الضوئية تتناقص عند درجة التلين ٤٥ - ٦٥ درجة مئوية من درجة

حرارة الغرفة ٢٥ درجة مئوية ، ثم تبدأ الزيادة عند رفع درجة حرارة الصلب إلى ٨٥ - ١٠٠ درجة مئوية. ومع ذلك

، فقد تم تحليل النتائج يعتمد على "قانون توك."

The Preface:

The polyethylene has perfect physical properties qualify it for use as insulation in transport cables of electric power (1)(2). The polyethylene is manufacture by ethylene polymerization which two kinds; the first is the high density polyethylene manufactured at low pressures (1-100 atm), the second one is the low density polyethylene manufactured by "heated polymerization at high pressures" (1000-2000 atm) (3).

In addition, there is a polyethylene of intersect bonds (XLPE) which is manufactured by polyethylene cross bond, so during the operation of intersecting the bonds make the linear molecular structure of polyethylene transforms into a multi-directional molecular structure where molecular chains separate a number of intersecting bonds. This occurs by removing some hydrogen atoms and forming strong bonds of carbon-carbonate (1, 3) as in the following form:

peroxide crosslinking of polyethylene (XLPE)

between (115 – 150 C°)" (4, 5,6), therefore it be determined a highest degree of temperature suitable to it as 70 C°.

Most of the former study are focused on the electric properties of the polyethylene, and for the technological important to this

"The polyethylene has a high electric isolator, high quality resistance, qualified resistant of the weather circumstances and it is from the thermoplastic. Moreover, it deforms under the mechanical tension at about 75 C° and has a degree of softness

research as they form an important section in study to improve its electrical properties.

Scientific Section:

degrees 45 C°, 65 C°, 85 C°, and 100 C°, centesimal in 20 minutes period by using oven type Memmert Schwabach.

The Results and Discussion:

In order to calculate the absorption coefficient to the membranes used in this study, it is used the following equation (7):

$$T = (1-R) e^{-\alpha l}$$

So T represents Transmission equal:

polymer, and in order to make a deep understand for its physical properties, we decide to study its optical properties through our

The samples of the study have got them from the cables of a commercial high power. Then, in order to study the optical properties of the polyethylene as a function to the annealing heat degree, it be cut samples with 1 × 1 cm dimensions, then fixed on the glass slices to measure the "transmission" (T) and absorption (A) as a function of wave length (λ) within the scope of the wave lengths 200 – 1000 nm by using the spectrophotometer type of CECIL 1021. The samples of the study were annealing in the heat

$$T = \frac{I}{I_0}$$

% at the wave length 0.065 Mm, whereas begins to decrease when rising the temperature to 45 C° and 65 C° then increase after that to 80 % and 90% when rising the temperature to 85 C° and 100 C° successively.

It can be interpreting that when rising the temperature, the polymer series movement increase leading to increase the absorption and decreasing the transmission of the polymer material, that in the beginning of rising the temperature at 45 C° the series movement are randomly and when continuity in rising the temperature at 85 C° and 100C°, the series starting regularity and taking forms more static so the interlacements

Also I and I₀ represent the strength of dropped and transmitted light successively, t represents the thickness of membrane, whereas R represents the Reflectance to study the effect of annealing on absorption coefficient, and then on the value of " Optical Energy Gap (E_{opt})", then drawing the transmission as a function to the dropped light wave length to the XLPE samples that annealed at the different heat degrees as illustrated in the fig. (1).

We notice in the figure there is a wide bundle arose at the annealing temperature 45 C° and 65 C°, also we notice that the highest value of transmission at the room temperature (RT) is 65

The value of light energy gap has calculated by "Tauc's law" (8).

$$(\alpha hv)^{1/2} = B (hv - E_{opt})$$

So B is fixed and hv is the falling photon.

Tauc's law has calculated from the practical results to the figure (2) has drawn by the above equation in the figure (3) and for the different annealing degrees. We notice from the figure that the values of energy gap to the samples are not annealing equal 1.7eV proximately, and the value of annealing decreasing to 45 C° and 65 C° then the value of energy gap begins increase to reach to 1.85eV at the annealing degree 100 C°, this affirm the above interpreting that the polymer series static and the distances between the series are increase.

decreasing among them and the distance increasing between the series leading to increase the transmission.

By the way," the degree of transmitting glass (Tg) is about 60 C° – 70 C°", that it transmits from interlacements complex series material to the material has flexible series with easy movement (6). Figure (2) illustrates the relation the absorption coefficient with the energy of falling photon to the polymer XLPE, we can notice in the figure that the absorption coefficient is increased by increasing of the annealing temperature to the degrees at 85 C° and 100 C° to the all the values of falling photon that ascribe to the change happened in the polymer compound.

2- The absorption coefficient of this polymer become high with increasing of the temperature to 65 C°, then begins decreasing gradually at increasing the heat degree of annealing to 85 C° and 100C° to the all values of photon energy.

3- "The gap of optical energy E_{op}^{t} becomes low when the annealing the material at 45 C° and 65 C°, then start increasing.

The Results:

From the results that we have got them, we can conclude the following:

1- The transmission is decreasing to the polymer XLPE in increasing the heat of annealing to 45 C° and 65 C°, then the transmission become high at increasing the temperature of annealing to 85 C° and 100 C°.

Fig. (1) Changing the Transmission with Wave Length of Falling Light to the Polymer XLPE.

Fig. (2) The Relationship Absorption coefficient with Falling Photon Energy to the Polymer XLPE.

Fig. (3) The Relationship between $(\alpha h\nu)^{1/2}$ and Falling Photon Energy to the Polymer XLPE.

References:

- 1- Pirili. (1979). General Booklet, High Voltage Elastomeric Cable Systems.
- 2- Matej Velicky, peter.s. Toth. (2017) from Two-dimensional materials to their heterostructures: An electrochemist's perspective Applied materials to day 8 : 68-103, ELSVIER.
- 3- Tanaka T. & A. Green Wood, (1983) Advanced Power Cable Technology- Basic Concepts and Testing, Vol. 1, CRC. Press.
- 4- A. Delaar, (1989). "Silone Crosslinked Power Cable – An Investigation of Cable Properties," Cigre 21-1, PP 1-7.
- 5- Yahagi K., (1980). Dielectric Properties and Morphology in polyethylene, IEEE. Irans., Vol. EI-15, No. 3, PP 241-149.
- 6- Al-Najar. M. A. (1993). XLPE. Insulant under Functioning of 132 KV. Power Cables. M. Sc. Thesis, Mosul University, Iraq.
- 7- Mekhael Essa Mansur, Muhammed S. Abid & Nawaf Ballo Mallah. The Optical properties of Poly-vinyl chloride (PVC) used as a local substitute for imported polymer in Sharp photocopiers, The Education & Science Magazine, No., (1), Vol. (14), 2002 A. D.
- 8- Al-Hadidi, K.S., (2012). "study the physical properties of silver Doped zine oxide thin films". Thesis M.Sc., Mosul university.

تحييد بلازميدات المقاومة للمضادات الحيوية واملاح المعادن الثقيلة لبعض الانواع البكتيرية الممرضة للإنسان باستخدام

مستخلصات مسحوق حمض الليمون Citric acid powder

د. عبدالرزاق خضر محمود

د. خالد دحام احمد

نوار طلال حامد عزيز الصفاوي

الخلاصة

تم جمع مائه وعشر عينة مرضية من مرضى من داخل وخارج مستشفيات السلام وابن سينا والجمهوري خلال فترة ثلاثة اشهر من سنة ٢٠١٢. اخذت العينات من مرضى يعانون من التهابات الاذن والحروق والجروح والتهابات المجاري البولية والاسهال.

تم عزل البكتريا وتشخيصها باستخدام الصفات المورفولوجية والزرعية والاختبارات البايوكيميائية بالإضافة الى اختبار API20 والاختبار بنظام Vitek2 .

تم الحصول على ٧٦ عزلة بكتيرية تنتمي الى انواع مختلفة تم الحصول عليها لكن ٥٣ منها والتي تعود الى خمس انواع من البكتريا تم اختيارها للدراسة. البكتريا هي الزوائف الزنجارية *pseudomonas aeruginosa* ٢٠ () ٢٥,٦%)، والايشريشيا القولونية *Escherichia coli* بنسبة ١٤ (١٧,٩%). والمكورات العنقودية الذهبية *Staphylococcus aureus* ١٣ (١٦,٧%) و بكتريا المتقلبات الرائحة *Proteus mirabilis* ٥ (٦,٤%). وبكتريا التايفوئيد *Salmonella typhi* ١ (١,٣) .بالاضافة الى عزلتين لبكتريا *Bacillus cereus* والتي تم الحصول عليها من بنك العزلات البكتيرية التابع لقسم علوم الحياة، كلية العلوم، جامعة الموصل.

اختبرت حساسية ومقاومة العزلات البكتيرية قيد الدراسة لـ ١٠ مضادات حيوية وهي *Amoxicillin* و *Ampicillin* و *Chloramphenicol* و *Erythromycin* و *Gentamicin* و *Refampicin* و *Streptomycin* و *Tetracycline* و *Trimethoprim* و *Nalidixic acid* و ٤ املاح للمعادن الثقيلة وهي $HgCl_2$ و $NiCl_2$ و $CoCl_2$ و $CdCl_2$. اظهرت العزلات البكتيرية مقاومة متباينة لاغلب المضادات الحيوية واملاح المعادن الثقيلة. علاوة على ذلك تم اختيار عزلة واحدة من كل نوع من البكتريا والتي اظهرت مقاومة متعددة للمضادات الحيوية والمعادن الثقيلة لاجراء التجارب اللاحقة.

حضرت المستخلصات المائية والايثانولية لمسحوق حمض الليمون Citric acid powder . تم التحري عن التأثير التثبيطي للنمو للمستخلصات المحضرة على انواع البكتريا المختارة وذلك باستخدام طريقة الانتشار بالاكوار Turbidity measurement Agar wells diffiusion method وطريقة قياس العكارة method . المستخلصات المحضرة اظهرت بشكل واضح فعالية مثبتة للنمو تم تقديرها بقياس منطقة التثبيط بلمليمتر للبكتريا المدروسة. ووضحت النتائج التي تم الحصول عليها ان قيمة الفعالية المثبطة للنمو تزداد بزيادة تركيز المستخلصات .

التركيز تحت المشط الادنى (Sub-MIC) Sub minimum inhibition concentration للمستخلصات المحضرة استخدم كعامل محيد لازالة مقاومة المضادات الحيوية والمعادن الثقيلة للانواع البكتيرية قيد الدراسة. تم الحصول على قيم متباينة لنسبة فقدان المقاومة للمضادات الحيوية والمعادن الثقيلة كنتيجة لفعالية المستخلصات لكن لم تظهر بعض التركيزات فعالية محيدة.

دعمت نتائج تجارب التحييد من خلال توصيف الحمض النووي البلازميدي على هلام الاكاروز لل عزلات المحيدة. الهجرة الكهربائية اظهرت اختفاء لحزم الحمض النووي البلازميدي من هلام الاكاروز مقارنة مع العزلات غير المحيدة.

Abstract

A hundred and ten pathogenic samples were collected from in and out patients of Al –Salam and Ibn- Sena hospitals within a time period lasted three months 2013. These patients suffering from otitis, wounds, burns, urinary tract infections and diarrhea.

Bacteria were isolated from these samples and identified using morphological, cultural characters and biochemical tests. In addition, the API 20 and the Vitek 2 compact systems were utilized for this purpose.

Seventy six bacterial isolates belonging to various species were obtained but fifty three of them related to five species were chosen for this study. These are *Pseudmonas aeruginosa* 20(25.6%), *Echerichia coli* 14(17.9 %), *Staphlococcus aureus* 13(16.7%), *Proteus mirabilis* 5(6.4%), and *Salmonella typhi* 1(1.3%) . Moreover, two isolates of *Bacillus cereus* were taken from Bacterial Isolates Bank in Biology Department , College of Science, Mosul University.

The resistance and sensitivity of the isolates under study were tested for 10 antibiotics , Amoxicillin, Ampicillin, Chloramphenicol, Erythromycin, Gentamycin, Rifampicin, Streptomycin, Tetracycline, Trimethoprim and Nalidixic acid and 4 heavy metals salts, HgCl₂, NiCl₂, CoCl₂ and CdCl₂. Variation in resistance appeared by the isolates. Moreover, one isolate from each bacterial species with multiple resistance to antibiotics and heavy metals was chosen for the following experiments.

The aqueous and ethanol extracts were prepared from Citric acid powder. The growth inhibitory action of these extracts was examined on the chosen bacterial species by using agar diffusion and turbidity measurement methods. Most of the prepared extracts appear clear growth inhibitory actions which were estimated in millimeter of the inhibitory zone on the tested bacteria . It is obvious from the results obtained that the inhibitory action values increased as the concentrations of the extracts raised.

The sub-inhibitory concentrations of the prepared extracts were used as curing agent to remove the antibiotics and heavy metals resistance of the bacterial species under study. Various percentage values of losing antibiotics and heavy metals resistance were obtained as the result of most extracts actions but still some of the extracts had no curing action.

The results of the curing experiment were supported by characterizing the plasmid DNA in agarose gel from the cured isolates . Plasmid DNA bands disappear from the gel after electrophoresis as compared with those in uncured isolates.

المقدمة:-

جديدة لمنع او تأخير المقاومة البكتيرية ومنها استخدام المستخلصات النباتية وبعض المواد الكيميائية (المرجاني).

حمض الليمون او حمض الستريك (بالانكليزية Citric acid) او ملح الليمون او سترات الهيدروجين هو حامض عضوي ضعيف يوجد في الموالح. وهو مادة حافظة طبيعية يستخدم لإضافة مذاق حمضي للأطعمة داخل الاتحاد الأوروبي يرمز له بالرمز E330.

الجزئية

يعد ظهور المقاومة للمضادات الحيوية عملية تطورية تعتمد على الكائنات التي عززت القدرة على البقاء على قيد الحياة مع جرعات المضادات الحيوية والتي كانت قاتلة لها قبل ذلك. والمضادات الحيوية التي اعتادت ان تكون علاجات معجزة هي الآن أقل فعالية لأن البكتيريا أصبحت أكثر مقاومة لها وتعمل المضادات الحيوية أنفسها بمثابة ضغط انتقائي يسمح بنمو سلالات بكتيرية مقاومة لطيف واسع من المضادات الحيوية الأمر الذي يتطلب استراتيجيات

مأخوذ عن Frank(2005)

الاغلاق في أماكن جافه وباردة
https://en.wikipedia.org/wiki/citric_acid
 عزل حامض الستريك اول مرة عام ١٧٨٤م
 من قبل كارل ميلهلم شيل الكيميائي الذي استطاع
 بلورته من عصير الليمون (Frank, 2005)
 يستعمل حمض الليمون صيدلانياً كمادة محمضة

الاسم النظامي 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid وهو عبارة عن بلورات عديمة اللون او شفافة او عبارة عن حبيبات بيضاء لمسحوق بلوري ناعم ، شديد الانحلال بالماء، وينحل بسهولة في الكحول، ويمتاز بطعمه الحامضي الشديد. تحفظ المادة في عبوات محكمة

(Arneborg, 2007). إذ يعد مضاداً

للمايكروبات (Antimicrobia Graham

(and Lund,1986). والـ Citrate يمثل

عنصراً حيوياً في العظم حيث يساعد على تنظيم

حجم بلورات الكالسيوم والتي تُعد احد اهم المكونات

المعدنية للعظام والاسنان (HU et al. 2010).

كلية العلوم/ جامعة الموصل. شخصت البكتريا

بالاعتماد على الاختبارات المجهرية والبايوكيميائية

و (Collee et al.,1996). وحسب

Harley and Prescott ,2002;

Morello, et al.,2007)

اختبار مقاومة البكتريا للمضادات الحيوية

واملاح المعادن الثقيلة

حضرت اوساط المضادات الحيوية واملاح المعادن

الثقيلة حسب ماجاء في

(Grant and Pittard.,1974) وبتراكيز

نهائية (مايكروغرام /مل) شملت كل من المضادات

Refampicin, Amoxicillin,

Ampicillin (50 µg/ml),

Gentamicin, Streptomycin (25

µg/ml), Nalidixic acid (30

µg/ml), Erythromycin,

Tetracycline (15 µg/ml),

ومضادة للأكسدة ومنكه حيث يضاف إلى بعض

الأغذية لغرض اضافة الطعم الحامضي، وكذلك يوضع

في الصوص الخاص بالزلطات لتعزيز النكهة كما يضاف

إلى المشروبات وخاصة المشروبات الغازية

(Frank,2005) ويعد عاملاً مؤثراً في تنظيم

مستوى الرقم الهيدروجيني في السلع المعلبة وحفظ

الاغذية لمنع نمو الخمائر والممرضات البكتيرية

(Ananou, et al. 2007; Nielsen and

المواد وطرائق العمل:-

مسحوق مادة حمض الليمون Citric acid تم

الحصول عليه من الاسواق المحلية لمدينة الموصل.

العزلات البكتيرية:-

تم جمع مائه وعشرة عينة مرضية من المرضى

المراجعين لمستشفيات السلام وابن سينا والجمهوري

لمدينة الموصل خلال فترة ثلاثة اشهر (أب وايلول

وتشرين الاول) من سنة ٢٠١٢. أخذت العينات من

مرضى مصابين بالتهابات الأذن، والحروق، والجروح،

والتهابات المجاري البولية، والاسهال. تضمنت كل من

Staphylococcus aureus,

Escherichia coli, *Proteus*

mirabilis, *Pseudomonas*

aeruginosa, *Salmonella typhi* . وتم

Bacillus الحصول على عزلتين لبكتيريا

من بنك البكتريا التابع لقسم علوم الحياة *cereus*

10^8 خلية/مل ثم نشر ٠,١ مل من العالق البكتيري المخفف على وسط الأكار المغذي وبشكل متجانس باستخدام ماسحة قطنية معقمة Cotton swab حُضنت الاطباق مدة ٣٠ دقيقة بدرجة حرارة 37°C لكي يحصل التثريب. أُعتمدت طريقة الحفر Agar Wells Diffusion Method لدراسة تأثير المستخلصات على البكتريا قيد الدراسة إذ تم عمل ثقب في الأكار المغذي باستخدام Stainless steel borer بقطر ٦ ملم ، وضع في كل حفرة مقدار ٠,١ مل من كل تركيز من المستخلصات الكيميائية. حُضنت الاطباق بدرجة 37°C ولمدة ١٨-٢٤ ساعة، قيست بعدها اقطار مناطق التثيب (Inhibition Zones) بالملم حول كل حفرة (Vandepitte $et al.$, 1991). تم تحديد تأثير المستخلصات في نمو البكتريا مقارنة بعينة السيطرة المكونة ٩,٨ مل من المرق المغذي و٠,١ مل من المذيب المستخدم لإذابة المستخلص و٠,١ مل من العالق البكتيري وبتركيز ١٠^٨ خلية / مل (Pessin, $et al.$, 2003).

Chloramphenicol, Trimethoprim HgCl_2 , واملاح المعادن الثقيلة (10 $\mu\text{g/ml}$), NiCl_2 , CoCl_2 , CdCl_2 (25 $\mu\text{g/ml}$).

تحضير المستخلصات المائية والكحولية Preparation of Aqueous and Alcoholic Extracts

حُضرت المستخلصات المائية بالاعتماد على طريقة (Riose $et al.$, 1987). وأتبع طريقة الباحث (Grand $et al.$, 1988) والمحورة عن طريقة الباحث (Verpoorte $et al.$, 1982) في تحضير المستخلصات الكحولية.

أختبار الفعالية التثيبية للمستخلصات

أُختبرت الفعالية التثيبية للمستخلصات المائية والكحولية على نمو البكتريا قيد الدراسة باستخدام طريقة الحساسية (الانتشار في حفر الأكار) حسب طريقة (Perez $et al.$, 1990) إذ تم تلقح وسط المرق المغذي بمستعمرات مفردة من البكتريا وحضنت بدرجة 37°C ولمدة (١٨-٢٤) ساعة، حُفف العالق البكتيري باستخدام المحلول الملحي الفسلجي Normal saline وبالمقارنة مع أنبوبة السيطرة القياسي لمحلول ماكفرلند الذي يعادل

فيمثل ماتحت التركيز المثبط الأدنى الذي تستطيع
البكتريا النمو فيه والذي استخدم في تجارب تحييد
البلازميد Lorian.,1991 و
Shrirama *etal.*,2010).

اختبار تحييد البلازميدات باستخدام
المستخلصات الكيميائية
Curing test by
Using chemical Extractes

أُتبعَت طريقة Deshpandem *et al.* (2001)، حضرت مزرعة من البكتريا المعزولة قيد الدراسة حيث جرى تنميتها بوجود المستخلص وبالتركيز تحت الأدنى Sub-MIC المطلوب لمدة ٢٤ ساعة وبدرجة حرارة ٣٧°م، بعدها حضرت عدة تخافيف عشرية للمزرعة البكتيرية وأخذ ٠,١ مل من التخافيف الثلاثة الأخيرة ونُشرت على أطباق الأكار المغذي وحضنت بدرجة حرارة ٣٧°م ولمدة ٢٤ ساعة. ولتحضير الطبق الرئيسي Master plate تم نقل ١٠٠ مستعمرة من المستعمرات المعاملة بالمادة المحيدة على وسط الأكار المغذي تحضن الاطباق بدرجة حرارة ٣٧°م ولمدة ٢٤ ساعة بعدها نُقلت المستعمرات على أوساط غذائية حاوية على المضادات الحيوية المستخدمة قيد الدراسة كلاً على

تحديد التركيز المثبط الأدنى (MIC) والتركيز
تحت المثبط الأدنى (Sub-MIC) للمستخلصات
الكيميائية

**Determination of Minimum
Inhibitory Concentration
Sub-minimal (MIC) and
inhibitory concentration (SIC)
of chemical extracts**

اتبعت طريقة التراكيز المتضاعفة بالأكار لحساب التركيز المثبط الأدنى (MIC) وماتحت (SIC) للمستخلصات المستخدمة في الدراسة وحسب طريقة (Ongsakul *et al.*,2009) مع اجراء بعض التحويلات. حضرت تراكيز متضاعفة متسلسلة للمستخلصات الكيميائية تراوحت قيمتها ما بين (١٢,٥-٢٠٠) ملغم/مل واضيفت نسب مختلفة من هذه المستخلصات الى وسط مولر-هنتون أكار، وبعد تصلب الأوساط تلقح الأطباق كقطرة واحدة بمعلقات البكتريا وتحضن الأطباق بدرجة حرارة ٣٧°م ولمدة ٢٤ ساعة. يقدر بعدها التركيز المثبط الأدنى بعد ٢٤ ساعة والذي يمثل اقل تركيز من المستخلص الكيميائي لم يلاحظ فيه نمواً بكتيرياً مرئياً، اما (Sub-MIC)

جدول (١) الأعداد والنسب المئوية للانواع البكتيرية المقاومة للمضادات الحيوية

Nal (%)	Tri (%)	TE (%)	Sm (%)	AX (%)	GN (%)	Ery (%)	Cm (%)	Am (%)	AX (%)	No. Species	Antibiotics
											Bacteria
(٧٠)١٤	(١٠٠)٢٠	(٩٠)١٨	(٥٠)١٠	(٧٥)١٥	(٨٠)١٦	(٧٥)١٥	(٩٥)١٩	(٨٥)١٧	(٨٠)١٦	٢٠	<i>Ps.aeruginosa</i>
(٩٣)١٤	(٧٣)١١	(٣٣)٥	(٤٠)٦	(٤٠)٦	(٣٣)٥	(٣٣)٥	(٦٠)٩	(٦٦)١٠	(٥٣)٨	١٥	<i>S.aureus</i>
(٥٧)٨	(٧١)١٠	(٥٧)٨	(٢٨)٤	(٧١)١٠	(٤٢)٦	(٨٥)١٢	(١٤)٢	(٥٧)٨	(٧١)١٠	١٤	<i>E.coli</i>
(٦٠)٣	(١٠٠)٥	(٨٠)٤	(٤٠)٢	(٨٠)٤	(٨٠)٤	(٦٠)٣	(٦٠)٣	(٨٠)٤	(٨٠)٤	٥	<i>Pr.mirabilis</i>
(١٠٠)	(١٠٠)	(١٠٠)	(٥٠)١	(٥٠)١	(٥٠)١	(٥٠)١	(٥٠)١	(١٠٠)	(١٠٠)	٢	<i>B.cereus</i>
	(١٠٠)	(١٠٠)	(١٠٠)	(١٠٠)	(١٠٠)	(١٠٠)	(١٠٠)	(١٠٠)	(١٠٠)	١	<i>S.typhi</i>

CdCl ₂ (%)	CoCl ₂ (%)	NiCl ₂ (%)	HgCl ₂ (%)	No. Species	heavy metal Bacteria
(١٠٠)	(١٠٠)	(١٠٠)	(٢٠)٤	٢٠	<i>Ps.aeruginosa</i>
(٨٠)١٢	(٩٣)١٤	(٨٦)١٣	(٢٦)٤	١٥	<i>S.aureus</i>
(١٠٠)	(١٠٠)	(١٠٠)	(٢٨)٤	١٤	<i>E.coli</i>
(١٠٠)	(١٠٠)	(١٠٠)	(١٠٠)	٥	<i>Pr.mirabilis</i>
(١٠٠)	(١٠٠)	(٥٠)١	(٥٠)١	٢	<i>B.cereus</i>
(١٠٠)	(١٠٠)	(١٠٠)	(١٠٠)	١	<i>S.typhi</i>

جدول (٢) الأعداد والنسب المئوية للانواع البكتيرية المقاومة لأملح المعادن الثقيلة

اعطت مقاومة لثلاثة معادن ثقيلة وبنسبة ١٠٠%.
بكتريا *S.aureus* كانت الاقل مقاومة للمضادات
الحوية ولأملح المعادن الثقيلة.

ربما يعود التباين في مقاومة الانواع البكتيرية
للمضادات الحوية إلى الاختلاف في آلية عمل المضادات
الحوية حيث توجد مضادات تؤثر على تخليق الجدران
الخلوية للبكتريا

Cell wall synthesis وبشكل ادق على
طبقة الببتيدوكلايكان (المرجاني، ٢٠١١) ومضادات
تؤثر على الاغشية الخلوية Cell membrane
synthesis (الخفاجي، ٢٠٠٨) ومضادات مثبطة

من نتائج الجدولين (٢،١) اظهرت العزلات استجابات
مختلفة للمضادات الحوية واملاح المعادن الثقيلة ما بين
مقاومة وحساسية حيث اظهرت بكتريا

S.typhi مقاومة لـ ١٠ مضادات واربعة معادن ثقيلة
وبنسبة 100% بينما قاومت بكتريا *B.cereus*
لخمسة مضادات وبنسبة ١٠٠% ولـ *CoCl2* و
CdCl2 وبنسبة ١٠٠%. بكتريا *Pr.mirabilis*

كانت متباينة في مقاومتها للمضادات الحوية بينما
اعطت مقاومة لأملح المعادن الثقيلة وبنسبة ١٠٠%.
بكتريا *E.coli* وبكتريا *Ps.aeruginosa*
اعطت مقاومة مختلفة تجاه المضادات الحوية بينما

Chukwuani *et al.*, 2002 عزى
 وPereria *et al.*, 2004 اسباب انتشار
 المقاومة المتعددة للمضادات الحيوية إلى الاستعمال
 الخاطيء والعشوائي وغير المنطقي لهذه المضادات من
 قبل المرضى المراجعين للمستشفيات وكذلك للراقدين
 فيها. وقد تحدث المقاومة نتيجة اكتساب بلازميدات
 حاملة للمقاومة عن طريق الاقتران البكتيري أو التحول
 الوراثي أو التوصيل (Martinez-Martinez
et al., 1998).

أما مقاومة النيكل Ni^{+2} تكون من خلال نظام
 الضخ للخارج معتمدا على طاقة ATP إذ يتم طرح
 ايون النيكل من الخلية فيقل تركيزه داخل الخلية. يعد
 الكادميوم والنيكل بين أكثر الملوثات انتشارا في البيئة
 المائية (Nies, 1999). كما تمتلك البكتريا
 نظام اوبرون مقاوم للنيكل والكوبلت يرمز له بـ Cnr
 ويحوي نظام اوبرون CnrcBA المشفر لبروتين
 مرتبط بالغشاء يحفز الضخ للخارج وبهذا تستطيع
 البكتريا النمو بتراكيز واطئة من النيكل (Park *et al.*,
 2004). تعتمد البكتريا السالبة لصبغة كرام
 في مقاومتها للكوبلت Co^{+2} على أساس
 الضخ عبر الاغشية عن طريق مقاومة انقسام الخلية
 وعادة ما ينتج عن مقاومة
 الكوبلت مقاومة لمعادن اخرى مثل المقاومة للنيكل

Inhibition of protein synthesis لعملية تخليق البروتين
 حيث تعمل هذه المضادات على
 تثبيط تصنيع البروتين داخل الخلية البكتيرية حيث
 ترتبط هذه المضادات
 بالوحدات الريبوسومية بطريقة تسبب دخول ساللات
 خاطئة من الاحماض الامينية مما
 ينتج بروتينات غير طبيعية متراكمة داخل الخلية
 البكتيرية وبالتالي توقف نمو البكتريا (Heritage,
 2003) اضعف الى ذلك هناك مضادات تؤثر على
 تخليق وتركيب الحمض النووي Nucleic acid
 synthesis حيث تعمل على تثبيط تخليق الـ
 DNA البكتيري من خلال اعاقا انزيم DNA
 gyrase ومن ثم تثبيط عملية اللف الفائق
 Super coiling لشريطي DNA
 (Hardy *et al.*, 2000).

ومضادات مثبطة لمسارات الايض
 Antimetabolite antibiotics تعمل على
 عرقلة الايض من خلال تثبيط انزيم
 Dihydrofolate reductase (DHFR)
 المهم في صناعة حامض الفوليك Folic acid الذي
 يدخل في صناعة الاحماض الامينية والنيكلوتيدات
 الداخلة في تكوين الحمض النووي (Laurence *et al.*,
 1997).

عملية الاقتران Conjugation أو ان تحدث
المقاومة نتيجة طفرة وراثية (Spain and Alm, 2003).

Nickel والزنك Zince
(Nies et al., 1987; Liesegang et al., 1993; Schmidt and Schlegel, 1994).

اختبار الفعالية التثبيطية للمستخلصات المائية

والكحولية لأملاح حامض الليمون

تم اختبار الفعالية التثبيطية للمستخلصات
المائية والكحولية على نمو البكتريا قيد الدراسة
باستخدام اختبار الحساسية باستخدام طريقة
الانتشار بالحفر وطريقة قياس العكارة

تكهن العديد من الباحثين إلى ان هناك علاقة
ما بين مقاومة البكتريا للمضادات الحيوية والمقاومة
للمعادن الثقيلة بسبب احتمال ان الجينات المقاومة
للمضادات والمعادن قد تكون موجودة معا وبشكل
وثيق على نفس بلازميدات البكتريا ولذلك فهذه
الصفة أكثر عرضة للانتقال معا في البيئة عن طريق

جدول (٣) التأثير التثبيطي لمستخلصات مسحوق حمض الليمون بتركيز مختلفة على الانواع البكتيرية قطر دائرة التثبيط
مقاسا (بالملم)

تركيز السنخلص (ملغم/سم)					نوع السنخلص	البكتريا
٢٠٠	١٠٠	٥٠	٢٥	١٢,٥		
٣٠	٢٩	٢٥	١٤	١٤	السنخلص المائي	<i>S.aureus</i>
٣١	٢٩	٢٠	١٨	١٤	السنخلص الكحولي	
٢٢	٢١	١٥	١٢	٨	السنخلص المائي	<i>B.cereus</i>
٢٠	١٧	١٤	١١	١١	السنخلص الكحولي	
٣٢	٢٧	٢٣	١٥	١٢	السنخلص المائي	<i>E.coli</i>
٢٠	١٨	١٥	١١	٨	السنخلص الكحولي	
٣١	٢٨	٢١	١٩	١٣	السنخلص المائي	<i>Ps.aeruginosa</i>
٢٢	١٨	١٣	١٢	١١	السنخلص الكحولي	
٣٤	٣٠	٢٨	٢٠	١٦	السنخلص المائي	<i>Pr.mirabilis</i>

٢٧	٢٥	٢٥	١٨	١٨	المستخلص الكحولي	
٢٧	٢٥	٢٠	١٤	١٢	المستخلص المائي المستخلص الكحولي	<i>S.typhi</i>

(-) تشير إلى عدم وجود فعالية تثبيطية

للمستخلص الكحولي لحمض الليمون عند التركيز ٢٠٠ ملغم/سم^٣ على النحو التالي: بكتريا *S. aureus* اعلى قطر للتثبيط بلغ ٣١ ملم ثم بكتريا *Pr. mirabilis* ٢٧ ملم، بكتريا *Ps. aeruginosa* ٢٢ ملم بينما كان قطر التثبيط لكل من بكتريا *E. coli*، *S. typhi*، و *B. cereus* (٢٠) ملم شكل (٠).

يبدو من النتائج ان اعلى تأثير للمستخلصات كان عند التركيز ٢٠٠ ملغم/سم^٣ حيث اعطت بكتريا *Pr. mirabilis* اعلى قطر تثبيط للمستخلص المائي بلغ ٣٤ ملم تلتها بكتريا *E. coli* بقطر ٣٢ ملم ثم بكتريا *Ps. aeruginosa* ٣١ ملم تلتها بكتريا *S.aureus* بقطر تثبيط ٣٠ ملم بينما كان قطر التثبيط لبكتريا *S.typhi* ٢٧ ملم و *B. cereus* ٢٢ ملم شكل (4-10). بينما كانت اقطار التثبيط

الشكل (١) صور لتأثير المستخلص المائي لمسحوق حمض الليمون بتركيزات مختلفة على البكتريا النامية على وسط

الأكار المغذي N.agar

A. B. cereus

B. S. aureus

C. Pr. mirabilis

D.Ps. aeruginosa

E. E. coli

F. S. typhi

التركيز ١ (٢٠٠ ملغم/سم^٣)، ٢ (١٠٠ ملغم/سم^٣)، ٣ (٥٠ ملغم/سم^٣)، ٤ (٢٥ ملغم/سم^٣)،

٥ (١٢,٥ ملغم/سم^٣)

على تثبيط نمو بكتريا *S. aureus* ونسبة ٩١% بينما لم يكن له تأثير على نمو بكتريا *E. coli* التي كانت مقاومة لهذا التركيز. ولكن عند ارتباط Citric acid بتركيز ٠,٠٣% مع NaCl ٣% فإنه يستطيع ان يقلل من نمو بكتريا *E. coli* ويشبطها بنسبة ٧٠%.

البكتريا قيد الدراسة وكانت النتائج كما موضح في الجدول (٤).

S. aureus و *B. cereus* مقارنة بالبكتريا السالبة لصبغة كرام مثل *E. coli* و *Salmonella enteritidis*. كذلك جاءت نتائجنا متوافقة ومخالفة لما توصل إليه Abu-Ghazaleh (٢٠١٣) الذي استخدم Citric acid بنسبة ٠,٠٣% ووجد ان هذا التركيز قادر

تحديد التركيز المثبط الادنى Inhibitory Concentration

قدر التركيز المثبط الادنى (MIC)

للمستخلصات النباتية والتي اظهرت تأثيرا تثبيطيا على

الجدول (٤): قيم التراكيز المثبطة الدنيا MIC للمستخلصات النباتية المختلفة في الانواع البكتيرية قيد الدراسة مقمرا

ب (ملغم/سم^٣)

<i>B. cerus</i>	<i>S. typhi</i>	<i>Pr. mirabilis</i>	<i>Ps. aeruginosa</i>	<i>E. coli</i>	<i>S. aureus</i>	نوع المستخلص
٠,١٢٥	٠,١٢٥	٠,١٢٥	٠,١٢٥	٠,١٢٥	٠,٥	المستخلص المائي لأزهار للكجرات
٠,١٢٥	٠,١٢٥	٠,١٢٥	٠,١٢٥	٠,١٢٥	٠,١٢٥	المستخلص الكحولي لأزهار للكجرات
٠,٢٥	٠,٢٥	-	-	٠,٥	٠,١٢٥	المستخلص المائي لبذور للحرمل
٠,١٢٥	٠,١٢٥	٠,١٢٥	٠,١٢٥	٠,١٢٥	٠,١٢٥	المستخلص الكحولي لبذور للحرمل
٠,١٢٥	٠,١٢٥	-	-	-	٠,١٢٥	المستخلص المائي لأوراق فرشاة البطل
٠,١٢٥	٠,١٢٥	٠,١٢٥	٠,١٢٥	٠,١٢٥	٠,١٢٥	المستخلص الكحولي لأوراق فرشاة البطل

٠,١٢٥	٠,١٢٥	٠,١٢٥	٠,١٢٥	٠,١٢٥	٠,١٢٥	المستخلص المائي لمسحوق حمض الليمون
٠,١٢٥	٠,١٢٥	٠,١٢٥	٠,١٢٥	٠,١٢٥	٠,١٢٥	المستخلص الكحولي لمسحوق حمض الليمون

(-) تشير إلى عدم وجود فعالية تثبيطية

البكتيرية الفاقدة لمقاومة المضادات الحيوية والمعادن الثقيلة. بعد ذلك جرى توصيف محتوى DNA البلازميدي وذلك بإجراء الترحيل الكهربائي في هلام الأكاروز قبل وبعد عملية التحييد للأنواع البكتيرية قيد الدراسة والجداول ادناه توضح النتائج.

التحييد باستخدام المستخلص المائي والكحولي

لمسحوق حمض الليمون

Curing by using aqueous and alcohol extracts of citric acid powder

اظهرت النتائج ان قيم MIC للمستخلص

المائي والكحولي لحمض الليمون كان مساويا لـ ٠,١٢٥ ملغم/سم^٢ لجميع الأنواع البكتيرية.

تحييد محتوى الـ DNA البلازميدي في الأنواع

البكتيرية قيد الدراسة باستخدام

مستخلصات املاح حامض الليمون

Curing of plasmid DNA content in bacterial species understudy by using the extracts of Citric acid

اجريت عملية تحييد محتوى الـ DNA

البلازميدي للتحرري عن النسب المئوية للمستعمرات

جدول (٥): قيم النسب المئوية لازالة مقاومة المضادات الحيوية والمعادن الثقيلة من الأنواع البكتيرية بعد المعاملة

بمستخلص حمض الليمون المائي

اوساط المضادات الحيوية والمعادن الثقيلة المضافة بالمليكروغرام/مل														البكتريا
CoCl ₂	CdCl ₂	NiCl ₂	HgCl ₂	RA	Nal	GN	St	Tri	Cm	Ery	TE	Ax	Am	
25	25	25	25	50	30	25	25	10	10	15	15	50	50	
R	R	R	100	100	R	92	R	100	76	100	100	100	R	<i>S. aureus</i>
R	R	100	36	S	S	S	S	R	S	R	S	R	R	<i>E. coli</i>

100	100	100	100	100	R	S	S	R	R	R	R	R	R	<i>Ps.aeruginosa</i>
R	R	R	48	92	24	S	R	R	R	R	R	R	R	<i>Pr. mirabilis</i>
R	R	R	84	72	R	100	100	R	100	82	84	R	R	<i>S. typhi</i>
R	R	R	88	92	R	68	88	R	100	96	96	R	R	<i>B. cereus</i>

(R) مقاومة

(S) حساسة للمضاد

جدول (٦): قيم النسب المئوية لازالة مقاومة المضادات الحيوية والمعادن الثقيلة من الانواع البكتيرية بعد المعاملة

بمستخلص حمض الليمون الكحولي

اوساط المضادات الحيوية والمعادن الثقيلة المضافة بالمايكروغرام/مل														البكتريا
CoCl ₂	CdCl ₂	NiCl ₂	HgCl ₂	RA	NaI	GN	St	Tri	Cm	Ery	TE	Ax	Am	
25	25	25	25	50	30	25	25	10	10	15	15	50	50	
R	R	R	68	24	R	88	84	76	72	24	24	24	36	<i>S. aureus</i>
R	R	72	12	S	S	S	S	100	S	12	S	R	R	<i>E. coli</i>
32	32	24	100	R	56	S	S	R	R	72	R	R	R	<i>Ps.aeruginosa</i>
R	R	R	52	100	36	S	100	R	R	R	R	R	R	<i>Pr. mirabilis</i>
R	R	R	40	24	24	72	40	4	80	56	R	R	R	<i>S. typhi</i>
R	R	R	64	96	84	96	88	R	88	100	76	R	R	<i>B. cereus</i>

(R) مقاومة

(-) حساسة

للمضادات الحيوية هو من نوع R-plasmid حيث يكون على هيئة جزيئين وكل جزيئة تحمل مورثات مسؤولة عن المقاومة.

ويلاحظ من النتائج ان بكتريا *Ps.aeruginosa* عند معامتها بمستخلص حمض الليمون المائي فقدت مقاومتها للمعادن الثقيلة المستخدمة قيد الدراسة ونسبة ١٠٠% ونسب مختلفة عند استخدام مستخلص حمض الليمون الكحولي. بينما كانت نسبة ازالة المقاومة للمضادات الحيوية ضعيفة وهذه النتيجة تتفق مع ما ذكره (Chakrabarty, 1976). بان بلازميد بكتريا *Pseudomonas sp.* يشفر لمقاومة المعادن الثقيلة وانحلال المركبات العضوية. نتائج التحييد اظهرت ان بكتريا *S.aureus* و *B.cereus* و *S.typhi* هم الأكثر تأثرا بعملية التحييد بالمستخلصات المائية والكحولية بينما كانت استجابة كل من بكتريا *Pr.mirabilis* و *Ps.aeruginosa* و *E.coli* ضعيفة ولعل ما تحتويه هذه المستخلصات من مركبات *Phytochemical* مثل القلويدات والفينولات والتانين وغيرها له دور في عملية التحييد.

من نتائج الجداول السابقة يلاحظ ان اغلب الانواع البكتيرية بقيت مقاومة لعدد من المضادات الحيوية والمعادن الثقيلة بعد التحييد ومنها مقاومة (Am) و (Tri) و (Ax) والمعادن الثقيلة ($NiCl_2$ و $CdCl_2$ و $CoCl_2$) ولعل ذلك يدل على ان الجين المسؤول عن مقاومة هذه المضادات والمعادن واقع على الكروموسوم وانه غير متأثر بهذه المعاملة.

كما يلاحظ ان هناك تقارب في النسب المئوية لازالة مقاومة المضادات والمعادن الثقيلة لبعض الانواع البكتيرية فمثلا ان بكتريا *S.typhi* كان كفاءة التحييد فيها ١٠٠% لكل من المضادات TE و Ery و Cm و St و GN و Nal و RA و $HgCl_2$ عند استخدام المستخلص المائي للكجرات كعامل محيد. وكذلك لبكتريا *B. cereus* عند معامتها بمستخلص الحرمل الكحولي حيث لوحظ ان نسب ازالة المقاومة بلغ ١٠٠% لكل من مضاد (ET) و Ery و Cm و St و GN و Nal و RA و $HgCl_2$ وغيرها وهذا ربما يعزى إلى ان الجينات المقاومة لهذه المضادات تقع على جزيئة بلازميد واحدة.

كما ان التباين الواضح بين الانواع البكتيرية بعد التحييد من حيث مقاومتها للمضادات الحيوية والمعادن الثقيلة يكون بسبب ان البلازميد الذي يحمل المقاومة

ونظرا للمقاومة المتعددة للمضادات الحيوية من قبل الكائنات المجهرية والكلف العالية الانتاجية للمركبات الصناعية كان لا بد من البحث عن مواد محيدة تعمل على ازالة بلازميدات المقاومة. رغم ان الخلايا البكتيرية يمكن ان تفقد البلازميدات تلقائيا وبترددات واطئة بعملية تسمى التحييد التلقائي إلا ان البحث عن عوامل محيدة آمنة شديدة التأثير على البكتريا وقليلة السمية هو ما تبحث عنه شركات الادوية (Shriram et al., 2010).

شكل (٣) تأثير المستخلص المائي لحمض الليمون كعامل محيد على بكتريا *S. aureus* النامية على

اوساط المعادن الثقيلة

شكل (٤) تأثير المستخلص المائي لمسحوق حمض الليمون كعامل محيد على بكتريا *S. typhi* النامية على

اوساط المعادن الثقيل

شكل (٥) الترحيل الكهربائي لمحتوى DNA البلازميدي للأنواع البكتيرية قيد الدراسة قبل وبعد التحييد

بمستخلصات مسحوق حمض الليمون Citric acid

<u>العمود</u>	
٥ . بكتريا <i>E.coli</i> بعد التحييد بالمستخلص المائي .	١ . بكتريا <i>S.aureus</i> قبل التحييد بمستخلصات مسحوق حمض الليمون .
٦ . بكتريا <i>E.coli</i> بعد التحييد بالمستخلص الكحولي .	٢ . بكتريا <i>S.aureus</i> بعد التحييد بالمستخلص المائي .
٧ . بكتريا <i>B.cereus</i> قبل التحييد بمستخلصات مسحوق حمض الليمون .	٣ . بكتريا <i>S.aureus</i> بعد التحييد بالمستخلص الكحولي .
٨ . بكتريا <i>B.cereus</i> بعد التحييد بالمستخلص المائي .	٤ . بكتريا <i>E.coli</i> قبل التحييد بمستخلصات مسحوق حمض الليمون .
٩ . بكتريا <i>B.cereus</i> بعد التحييد بالمستخلص الكحولي .	

شكل (6) الترحيل الكهربائي لمحتوى DNA البلازميدي للأنواع البكتيرية قيد الدراسة قبل وبعد التحييد

بمستخلصات مسحوق حمض الليمون Citric acid

		<u>العمود</u>
٣ .	بكتريا <i>Ps.aeruginosa</i> بعد التحييد	
١ .	بكتريا <i>Ps.aeruginosa</i> قبل	
٤ .	بكتريا <i>S.typhi</i> قبل التحييد	التحييد بمستخلصات مسحوق حمض الليمون .
٢ .	بكتريا <i>Ps.aeruginosa</i> بعد التحييد	
٥ .	بكتريا <i>S.typhi</i> بعد التحييد بالمستخلص	بالمستخلص المائي .
	المائي .	

قليلة البلازميدات وفي احيان اخرى فاقدة للبلازميدات وبالتالي تحول البكتريا الفاقدة للبلازميدات من مقاومة للمضادات الحيوية والمعادن الثقيلة الى حساسة (كودانيوف، ١٩٨٥).

كما ان التباين في النتائج ربما يعود الى اسباب تتعلق بالخلية البكتيرية وقابلية اغشيتها الخلوية على تنافذ المستخلصات الى داخل الخلية او قد تعود الاسباب الى عوامل بيئية كدرجة التحضين والرقم الهيدروجيني (Grindley et al., 1970). وقد يكون للمستخلص وتركيزه وعدد نسخ البلازميد وتأثير الأجهاد المسلط على الخلية البكتيرية دور في هذا التباين (الحفاجي، ٢٠٠٨). او ربما ان المستخلص النباتي يؤثر على البكتريا من خلال التقليل من تطوير اي ميكانيكية للمقاومة. كما وان بعض مركبات النباتات الفعالة تعمل كمضادات للمايكروبات حيث بإمكانها القضاء على البكتريا بنجاح (Klanchnik et al., 2012).

تعمل مركبات اخرى على تثبيط او قتل انواع عديدة من البكتريا من خلال عمل خلط وتأزر بين المستخلصات والمضادات الحيوية. او قد تعمل على تثبيط وظيفة النقل عبر الغشاء البلازمي (Coutinho et

٦. بكتريا *S.typhi* بعد التحييد بالمستخلص الكحولي.

٧. بكتريا *Pr.mirabilis* قبل التحييد بمستخلصات مسحوق حامض الليمون.

٨. بكتريا *Pr.mirabilis* بعد التحييد بالمستخلص المائي.

٩. بكتريا *Pr.mirabilis* بعد التحييد بالمستخلص الكحولي.

ومن نتائج جداول التحييد اعلاه نجد بان نسب كفاءة التحييد بالمستخلصات كانت اعلى من نسب التحييد التلقائي التي كانت نتائجه واطئة ولا تتجاوز فيه كفاءة التحييد عن (١-٣)%. كما ان عملية التحييد باستخدام المستخلصات النباتية والكيميائية على البكتريا قيد الدراسة اظهرت تباينا في نسب التحييد وفقدان المقاومة للمضادات الحيوية والمعادن الثقيلة حيث ظهرت لدينا نسب تحييد عالية في الطراز المظهري للبكتريا على اوساط المضادات الحيوية والمعادن الثقيلة ولربما يعود هذا التباين الى حدوث تثبيط او خلل في عملية تضاعف ال DNA البلازميدي للخلية الام وتوزيع هذه البلازميدات خلال عملية انقسام الخلية فيؤدي ذلك الى انتاج خلايا بنوية

بالمواد الفعالة في المستخلصات واصبح غير قادر على ارتباطه بتسلسلات الـ DNA في الاوبرون par. ان هذا التغيير في عمل البروتين الناتج ربما سوف ينعكس على عملية تنظيم انعزال البلازميد إلى الخلايا البنيوية. من الملاحظ ان المستخلصات المستخدمة قيد الدراسة اظهرت فعالية مضادة للبلازميدات وهذا يعني بان هذه المستخلصات بإمكانها تحييد جينات المقاومة للمضادات الحيوية الواقعة على البلازميدات.

(al.,2009). ربما ان المواد الفعالة في المستخلصات النباتية سواء كانت مائية أو كحولية وبعد نفوذها إلى داخل الخلايا البكتيرية قد تعمل على تثبيط فعالية البروتينات المشفرة من قبل Par operon والمسؤولة عن تنظيم عمل الأوبرون par الذي يعد المسؤول عن عملية انتقال البلازميدات من الخلية الأم إلى الخلايا البنيوية اثناء عملية انقسام الخلية. وربما ان البروتين الكاچ Par R المشفر من قبل أحد جينات الاوبرون par قد تغير شكله بعد عملية ارتباطه

- ❖ Nielsen,M.K. and Arneborg,N.(2007). The effect of citric acid and pH on growth and metabolism of anaerobic *Saccharomyces cerevisiae* and *Zygosaccharomyces bailii* cultures. Food Microbilo.,24:101-105. ❖
- ❖ Graham,A.F. and Lund,B.M.(1986). The effect of citric acid on growth of proteolytic strains of clostridium botulinum. J. ❖f Appl. Microbiol. 61:39-49.
- ❖ Hu,Y.Y.; Rawal,A. and Schmidt-Rohr,K.(2010). Strongly bond citrate stabilized the apatite nanocriystals in bone . Proc. Nat. Acad. Sci.,107(52):22425-22429.

References

- المرجاني، محمد فرج (٢٠١١). المضادات الحيوية، المقاومة البكتيرية للمضادات الحيوية، دار دجلة، المملكة الاردنية الهاشمية.
- Frank,H.V.(2005). " citric acid" , Ullmann's encyclopedia of industrial chemistry , Weinheim: Wiley- VCH. Germany
- Ananou,S.; Maqueda,M.; Martinez-Bueno,M. ; Galvez,A. and Valdivia, E. (2007). Bactericidal synergism through enterocin As-48 and chemical preservatives against *Staphylococcus aureus*. Letters in Applied Microbiology 45:19-23.

phytotherapies of tree-savannah
sengal (west –Africa), II-
Antimicrobial activity of 33
species. J.

Ethnopharmacol.,22:25-31.

- ❖ Verpoorte,R.;Tginastoni,A.;Van
doorn,H. and Svendsen,A.B.
(1982). Medicinal plant of
sevinam, l-antimicrobial
❖ activity of some medicinal
plants. J.
Ethnopharmacol.,5:221-226.

- ❖ Perez,C.;Poaul,M. and
Bazerque,P.(1990). An
antibiotic assay by the agar
well diffusion method. Acta
Biol. Med. Exp.,15:113-115.

Vandepitte,J. ; Engback,K. ;
Piot,P. and Heuk,C. (1991).
Basic laboratory procedures in
clinical bacteriology. World
Health Organization,Geneva.
Switzerland.

- ❖ Pessini,G.L.; Dias Filho,B.P.;
Nakamura,C.V. and
Cortez,D.A.G. (2003).
Antibacteria activity of extracts
and neolignans from piper
regneni. Var. pallescens yunck.
Mem. Inst. Oswaldocruz,
Riode, Janeire,98(8):1115-
1120.

- ❖ Ongsakul,M.;Jindarat,A. and
Rojanaworarit,C.(2009).
❖ Antibacterial effect of crude
alcoholic and aqueous extracts
of six medicinal plants against

Collee,J.G.;Fraser,A.G.;Marmi
on,B.P. and Simmons,A.
(1996). Mackie and McCartney
"Practical Medical
Microbiology" 14th .ed.
Chhurchill Livingstone
Inc.New York. U.S.A. pp.245-
260.

Harley,J.P. and Prescott
,L.M.(2002). Laboratory
expercises in microbiology. 5th
ed., McGraw-Hill
Companies,USA.

Morello,J.A. ; Mizer,H.E. and
Granato,P.A. (2007). "
Labortory manual and work
book in microbiology :
Application to patient care" 8th
ed., McGraw-Hill
Companies,INc., New York.
U.S.A.

Grant,A.J. and Pittard,D.J.
(1974). Incompatibility
reactions of R. plasmid isolated
from *Escherichia coli* of animal
origin. J. Bacteriol. ,120:185-
188.

Riose,J.L.;Recio,M.C. and
Villar,A.(1987). Antimicrobial
activity of selected plants
employed in sponish
Mediterranean area.
J.Ethnopharmacol., 21:139-
152.

Grand,A. ; Woudergem,P.A. ;
Verpoorte,R. and Pousset,J.L.
(1988). Anti-infections

- ❖ Stukus, Ph(1997). Investigating Microbiology, A Laboratory Manual for General Microbiology Saunders College Publishing, Fortworth, USA.
- ❖ الخفاجي، زهرة محمود ناصر (٢٠٠٨). التقنيات الحيوية المايكروبية (توجهات جزئية) . وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جامعة بغداد، العراق.
- ❖ Heritage , J. (2003). Antibiotics. University of Leeds.England.
- ❖ Hardy, D., Amsterdam, D., Mandell, L. A., and Rotstein, C. (2000). Comparative in vitro activities of ciprofloxacin, gemifloxacin, grepafloxacin, moxifloxacin, ofloxacin, sparfloxacin, trovafloxacin, and other antimicrobial agents against bloodstream isolates of gram-positive cocci. Antimicrob. Agents Chemother., 44(3), 802-805.
- ❖ Laurence, D. R., and Bennett, P. N. and Brown, M. J. (1997). Clinical pharmacology. 8th ed. Churchill Livingstone. London. U.K.
- ❖ Chukwuani, C. M., Onifade, M., and Sumonu, K. (2002). Survey of drug use practices and antibiotic prescribing pattern at a general hospital in Nigeria. Phar. world and Sci. 24(5), 188-195.
- Staphylococcus aureus* and *Escherichia coli*. J.Health Res. 23(3): 153-156.
- Lorian,V.,(1991).Antibiotics in laboratory medicine,The Williams and Wilkins company,Baltimore. U.S.A. PP.1-51.
- Shrirama, V., Jahagirdarb, S., Lathac, C., Kumard, V., Dhakephalkarb, P., Rojatkare, S., and Shitolea, M. G. (2010). Antibacterial and antiplasmid activities of Helicteres isora L. Indian J. Med Res. 132, 94-99.
- Deshpande,N.M.;Dhakephalkar ,P.K. and Kanckar,P.P. (2001). Plasmid-mediated dimethoate degradation in *Pseudomonas aeruginosa* MCMB-427. Lett.App. Microbiol. 33:275-279.
- Brinboim,H. and Doly,J.(1979).Rapid alkaline extraction procedure for screening recombination plasmid DNA. Nucleic Acid Res.,7:1513-1524.
- Lee,S.Y.;Yim,K.S.:Chang,H.N. and Chang,Y.K.(1994). Construction of plasmids, esitimation of plasmid stability , and use stable plasmids for the production of poly (3-hydroxybutyric acid) by recombinant *Escherichia coli* . J. Biotechnol.,32:203-211.

- ❖ Liesegang, H., Lemke, K., Siddiqui, R. A., and Schlegel, H. G. (1993). Characterization of the inducible nickel and cobalt resistance determinant *cnr* from pMOL28 of *Alcaligenes eutrophus* CH34. *J. of Bacteriol.*, 175(3), 767-778.
- ❖ Schmidt, T., and Schlegel, H. G. (1994). Combined nickel-cobalt-cadmium resistance encoded by the *ncc* locus of *Alcaligenes xylosoxidans* 31A. *J. of Bacteriol.*, 176(22), 7045-7054.
- ❖ Spain, A., and Alm, E. (2003). Implications of microbial heavy metal tolerance in the environment. *Rev. Undergra. Res.*, Vol. 2, 1-6.
- ❖ Panel, E. F. (2015). Scientific Opinion on the safety and efficacy of citric acid when used as a technological additive (acidity regulator) for all animal species. *EFSA J.*, 13(2), 4010.
- ❖ Atlas, R. ; Brown ,A. and Parks,L.(1995). Laboratory manual, Experimental microbiology. Mosby-Year book, INC.USA.
- ❖ del RÍO, E. L. E. N. A., Muriente, R., Prieto, M., Alonso-Calleja, C., and Capita, R. (2007). Effectiveness of trisodium phosphate, acidified
- Pereira, L. M. P., Phillips, M., Ramlal, H., Teemul, K., and Prabhakar, P. (2004). Third generation cephalosporin use in a tertiary hospital in Port of Spain, Trinidad: need for an antibiotic policy. *BMC Infectious Diseases*, 4(1), 59.
- Martínez-Martínez, L., Pascual, A., Hernández-Allés, S., Alvarez-Díaz, D., Suárez, A. I., Tran, J., and Jacoby, G. A. (1998). Roles of β -lactamases and porins in activities of carbapenems and cephalosporins against *Klebsiella pneumoniae*. *Antimicrob. Agents and Chemothe.*, 43(7), 1669-1673.
- Nies, D. H. (1999). Microbial heavy-metal resistance. *Applied Microbiol. Biotech.*, 51(6), 730-750.
- Park, J. E., Schlegel, H. G., Rhie, H. G., and Lee, H. S. (2004). Nucleotide sequence and expression of the *ncr* nickel and cobalt resistance in *Hafnia alvei* 5-5. *Internat. Microbiol.*, 7(1), 27-34.
- Nies, D., Mergeay, M., Friedrich, B., and Schlegel, H. G. (1987). Cloning of plasmid genes encoding resistance to cadmium, zinc, and cobalt in *Alcaligenes eutrophus* CH34. *J. Bacteriol.*, 169(10), 4865-4868.

Campylobacter activities and resistance mechanisms of natural phenolic compounds in Campylobacter. J.L. PloS one, 7(12), e51800.

❖ Coutinho, H. D., Costa, J. G., Lima, E. O., Falcão-Silva, V. S., and Júnior, J. P. S. (2009). Herbal therapy associated with antibiotic therapy: potentiation of the antibiotic activity against methicillin-resistant Staphylococcus aureus by Turnera ulmifolia L. BMC Complement. and Alternat. Medicine, 9-13.

❖

sodium chlorite, citric acid, and peroxyacids against pathogenic bacteria on poultry during refrigerated storage. J. of food Protec., 70(9), 2063-2071.

Abu-Ghazaleh, B. M. (2013). Effects of ascorbic acid, citric acid, lactic acid, NaCl, potassium sorbate and Thymus vulgaris extract on Staphylococcus aureus and Escherichia coli. Afri.J.of Microbiol. Res. 7(1), 7-12.

Chakarvarty, H.L. (1976). Plant wealth of Iraq. Vol.1, ministry of agriculture and agrarian reform, Baghdad, Iraq, p.505.

Shrirama, V., Jahagirdarb, S., Lathac, C., Kumard, V., Dhakephalkarb, P., Rojatkare, S., and Shitolea, M. G. (2010). Antibacterial and antiplasmid activities of Helicteres isora L. Indian J. Med Res. 132, 94-99.

❖ كوداينوف، اورسولا (١٩٨٥). علم الوراثة.

الجزء الثاني، جامعة هارفارد، مترجم.

جامعة الموصل.

❖

Grindley, J.N.; Grindley, N.D. and Anderson, E.S. (1970). Acridine treatment of F⁺ and Hfr strains of *Escherichia coli* K-12 carrying aneomycin-kanamycin resistance determinat. Genet. Res. Camb., 15:327-334.

❖

Klančnik, A., Možina, S. S., and Zhang, Q. (2012). Anti-

تحفيز التغيرات الجسمية في مزارع كالس اليانسون *Pimpinella anisum*l

باستخدام الصوديوم ازايد

شمال يونس عبد الهادي

رغد نواف جرجيس

الخلاصة

اظهرت نتائج الدراسة الحالية ان للمعاملة بالمطفر الكيميائي ازايد الصوديوم تأثير على نسبة الاستحداث للاجزاء النباتية لنباتات اليانسون وبنسبة (١٠٠)% لكالس الجذور و (٨٥)% لكالس الأوراق المعاملة بالتركيز (٣,٠) ملي مولر و (٩٠)% لكالس السيقان تحت الفلقية عند المعاملة بالتركيز (٩,٠) ملي مولر فضلاً عن خفضها المدة اللازمة للاستحداث، كما أظهرت نتائج الدراسة التحفيز الواضح لازيد الصوديوم في احداث التغيرات الجسمية على مزارع الكالس والنباتات الناتجة منه والمتمثلة في زيادة الوزن الطري لكالس السيقان تحت الفلقية والجذور عند التركيز (٣,٠) ملي مولر، وتحفيز الكالس على التمايز وتكوين الافرع الخضرية على اوساط الاستحداث، إذ بلغت اعلى معدل تمايز الافرع الخضرية في كالس الأوراق عند التركيزين (٣,٠، ٦,٠) ملي مولر والتي بلغت (١٢، ١٥) فرع خضري و(٢٨، ٣٠) لكالس السيقان تحت الفلقية على التوالي. فضلاً عن زيادة النسبة المئوية لنسب الزيت الطيار في الاجزاء النباتية للبذور المعاملة والكالس الناتج منها، إذ تراوحت الزيادة في محتوى الزيت الطيار ما بين (٠,٠٢ - ٠,١)% عند التركيزين (٣,٠ - ٦,٠) ملي مولر، كما شملت الزيادة في محتوى البروتين (٥٦)% من مجموع المعاملات في هذه الدراسة، وتم فصل مركب الانيشول من الزيت الطيار لكل من السيقان تحت الفلقية والاوراق والكالس الناتج منها باستخدام تقنية الـ TLC وقيست سرعة الجريان لكل عينة من العينات المفصولة كل على حدى و مقارنتها مع سرعة جريان المركب القياسية والتي بلغت (٠,٣٥).

Induction of Somaclonal Variation on in Vitro Callus Culture***Pimpinella anisum*l by using Sodium Azide****Raghad Nawaf Zarzis****Shemal Younis Abdel Hadi****Abstract**

The results of the current study showed that chemical mutagens treatment sodium azide effect on plant parts development ratio of anise plants (100)% roots callus and (85)% leaves callus by using concentration (3.0) Mm and (90)% hypocotyls callus by using concentration (9.0) mM as well as reduced time required for development , The results of the study also showed a clear stimulus sodium azide in soma clonal vartion

on resulting plants from callus culture are so of mild weight gain hypocotyls by using concentration (3.0)Mm ,results also showed stimulus sodium azide to development community green branches from callus culture,with the highest rate of differentiation of green branches on leaves callus of two concentration (3.0, 6.0) Mm at (12, 15) branches and(28, 30) hypocotyls callus respectively, As well as increase the percentage of oil on plant parts of treatment seed and callus product, The increase in oil content ranged from (0.02-0.1)% when the concentrations (3.0-6.0)mM, It also included an increase in protein content (56)% of total treatment in this study.

Anathol composite were separated from volitile oil t for both hypocotyls, leaves and callus resulting from these using the technique of TLC and measured the rate flow of each sample individually separated and compared with standard composite flow speed (0.35).

على مدى زيادة نسبة الاستحداث وتكوين الأفرع

المقدمة

الخضرية لنباتات البقدونس *Petroselinum*
crispuml.

يعود نبات اليانسون *Pimpinella*

anisuml إلى العائلة الخيمية *Umbelliferae*

وتعد نقانة زراعة الأنسجة من أهم التقانات

وهو من النباتات الصليبية المهمة كونه يحتوي على

الحويبة لتوليد التغيرات الوراثية في النباتات باستخدام

الزيوت الطيارة (Asie & Mehri, 2012)

المطفرات الكيميائية أو الفيزيائية (Humera &

Varroe *et al.*,) والفينولية (

Javed, 2010; Haq, 2007).

(1988) واهتمت العديد من الدراسات ومنها

إذ أثبتت نتائج البحوث التي وظفت المطفرات

الدراسة التي اجراها (النعمي ومحمود، ٢٠٠٥)

الكيميائية في المزارع النسيجية لكثير من النباتات،

لاستحداث الكالس من اجزاء المختلفة، كما تناولت

نجاحات كبيرة في مجال التغيرات الوراثية لتلك المزارع

العديد من الدراسات النباتات العائدة لهذه العائلة،

من خلال التأثير على نسبة الاستحداث والوزن

فقد تمكنت (الزبيدي، ٢٠١٠) من استحداث مزارع

الرطب للكالس ومحتواه من المركبات الفعالة وقدرته

كالس نباتات الكرفس *Apium graveolensl*

على تكوين الاجنة (Kahirzie *et al.*, 2013;

من اجزاء المختلفة باستخدام تداخلات مختلفة من

Keskin & Kunter, 2010; Pavadai

منظمات النمو، في حين تناولت الدراسة التي اجراها

et al., 2009).

(النعمي والزيدي، ٢٠٠٩) تأثير اشعة كما و UV

أولاً: الزراعة النسيجية:

استخدام وسط MS في زراعة بذور اليانسون *Pimpinella anisum* التي مصدرها الاسواق المحلية والمعقمة مختبرياً وكذلك في تنمية البادرات واستحداث وادامة الكالس واعادة تكوين النباتات من الكالس .

استخدام التركيز (١ حجم هايوكولات الصوديوم القاصر التجاري: ٢ حجم ماء مقطر) لمدة (١٥) دقيقة لتعقيم البذور (النعيمي ومحمود، ٢٠٠٥) واستخدمت البادرات السليمة بعمر (١٥) يوماً والنامية في ظروف معقمة كمصدر للاجزاء النباتية بمعدل (١) سم للسيقان تحت الفلقة والجذور و (٠,٥) سم^٢ للاوراق، وضعت قطع الاجزاء في دوارق أو قناني زجاجية حجم (١٠٠-٢٥٠) مل حاوية كل منها على (٢٠-٥٠) مل من وسط MS الحاوي على BA (١,٥) ملغم/لتر و NAA (٠,٥) ملغم/لتر للاوراق و BA (١,٠) ملغم/لتر و NAA (٠,٥) ملغم/لتر للسيقان والجذور (العقراوي، ٢٠٠٦) لاستحداث الكالس وتحفيزه نشوء الافرع الخضرية والذي تمت ادامته دورياً كل (٣-٤) اسابيع تقريباً، علماً ان جميع عينات الدراسة المماثلة لما تقدم وغير المعاملة بالمحاليل الكيميائية اعتمدت كعاملات للمقارنة

وتعد المواد الكيميائية كازايد الصوديوم والكوليسين وثنائي ايثايل الكبريتات من اهم المواد المستخدمة كمطفرات كيميائية (Marcelina, 2010; Ganesan et al., 2005)، ويعتبر Sodium azide من اهم المطفرات الكيميائية واقواها على المستوى الحقلّي أو على مستوى التجارب الزراعية النسيجية (Dhanavel et al., 2008; Al. Qurainy & Khan, 2010).

وتوصلت الدراسة التي اجراها (Turkan et al., 2006) إلى رفع نسبة الانبات وارتفاع البادرات وعدد الأوراق لنباتات البازلاء *Pisum Sativum* باستخدام تراكيز مختلفة من ازايد الصوديوم، بينما أدى استخدام تراكيز عالية منه إلى موت الخلايا وانخفاض نسبة الانبات نتيجة لتغييره وعرقته لسير العمليات الفسلجية للنبات (Al- Qurainy & Khan, 2009; Mostafa, 2011).

بينما تناولت الدراسة التي اجراها (Ahamd et al., 2010) تأثير استخدام تراكيز مختلفة من ازايد الصوديوم على تمايز كالس البطاطا *Solanum tubersuml* وعدد الافرع الناتجة منه.

مواد وطرائق العمل

سادساً: استخلاص وتقدير نسب الزيوت الطيارة:

تمت عملية استخلاص الزيت الطيار لعينات الدراسة (الاجزاء النباتية، الكالس) غير المعاملة والمعاملة بالمطفر الكيميائي باستخدام جهاز التقطير البخاري Steam distillation (هيكل، ١٩٧٧)، وقدرت نسب الزيت الطيار لعينات الدراسة باستخدام القانون التالي:

$$\text{نسبة الزيت} = \frac{\text{حجم الزيت}}{\text{وزن العينة}} \times 100\% \text{ سابعاً: تقدير}$$

كميات البروتين:

استخدمت طريقة Lowry وآخرون (١٩٥١) والمحورة من قبل Schacterle و Polleck (١٩٧٣) في استخلاص وتقدير محتوى البروتين للاجزاء النباتية الناتجة من البذور غير المعاملة والمعاملة بالمطفر الكيميائي والكالس الناتج منها واعتمد البومين مصّل البقر (BSA) كمحلول قياسي في رسم المنحني القياسي الذي اسقطت عليه امتصاصية العينات المذكورة اعلاه عند الطول الموجي ٦٥٠ نانوميتر.

ثامناً: فصل مركب الانثول

فصل المركب الفينولي (الانثول) باستخدام زيت اليانسون وحسب ما أشار إليه (Muthanna, 2009) وذلك باستخدام تقنية ال TLC بابعاد (٢٠×٢٠) وبسّمك (٠,٢٥) ملم، إذ

وحدد الوزن الطري للكالس الناتج بعمر (٤٥) يوماً من زراعة (١) غم لنشوء الافرع الخضريّة.

ثانياً: تحضير المحاليل الكيميائية:

حضرت محاليل ازايد الصوديوم أنياً باربعة تراكيز مختلفة (٣,٠، ٦,٠، ٩,٠، ١٢,٠) ملي مول وضبط الرقم الهيدروجيني لهذه المحاليل عند (٣,٥-٤,٠) باستخدام Orthophosphoric acid (Mostafa, 2011).

ثالثاً: معاملة البذور كيميائياً:

حضرت بذور اليانسون للمعاملة الكيميائية وذلك بتقعها بالماء المقطر ساعة ونصف وبعدها جففت باستخدام أوراق الترشيح المعقمة ثم عوملت البذور بالمحاليل الكيميائية المحضرة وبمختلف تراكيزها الواردة اعلاه ولمدة ساعتين، وبعد ذلك غسلت بالماء المقطر المعقم وجففت باستخدام أوراق الترشيح المعقمة.

رابعاً: زراعة البذور المعاملة:

زرعت البذور المعاملة كيميائياً في نفس يوم معاملتها كما ورد في الفقرة (أولاً) الخاصة بزراعة البذور.

خامساً: انشاء مزارع الكالس:

تم انشاء مزارع الكالس للعينات المعاملة كما ذكر في الفقرة (أولاً) الخاصة بانشاء مزارع الكالس.

وضعت (٥) مايكروليتر من الزيت على خط البداية للوحة TLC ثم وضعت في الجار الحاوي على (هكسان: CH_2Cl_2) بنسبة (١:٥) حجم: حجم، وحددت مواقع البقع المنفصلة وذلك برش لوحة TLC بمحلول (١% من الفانلين في ٢% Sulphuric acid في الايثانول) حجم إلى حجم ثم جففت في فرن حراري بدرجة $100^{\circ}C$ لمدة ١٠ دقائق لتحديد مواقع البقع المنفصلة لمركب الايثول للعينات اعلاه.

النتائج والمناقشة

اظهرت نتائج الجدول (١) ان للمعاملة بالمطفر

الكيميائي ازايد الصوديوم تأثير على نسبة الاستحداث

للأجزاء النباتية إذ بلغت نسبة استحداث الأجزاء النباتية لنبات اليانسون ١٠٠% لكالس الجذور وشملت هذه النسبة جميع المعاملات، كما لوحظ ان نسب الاستحداث زادت في قطع الأوراق والسيقان تحت العقلية وجاءت متفوقة على معاملات المقارنة إذ بلغت اعلى نسبة لاستحداث كالس الأوراق (٨٥%) عند المعاملة بالتركيز (٣,٠) ملي مولر، في حين بلغت اعلى نسبة لاستحداث كالس السيقان تحت الفلقية (٩٠%) عند المعاملة بالتركيز (٩,٠) ملي مولر، من جهة أخرى بينت نتائج الدراسة الحالية تأثير المطفر الكيميائي ازايد الصوديوم على مدة الاستحداث الكالس.

الجدول (١): استحداث الكالس من الأجزاء النباتية الناتجة من بذور اليانسون *Pimpinella anisum*

الاعتيادية والمعاملة بالمطفر الكيميائي ازايد الصوديوم

تراكيز ازايد الصوديوم (ملي مولر)										المقارنة	الأجزاء النباتية
١٢,٠		٩,٠		٦,٠		٣,٠		٠,٠			
المدة	نسبة	المدة	نسبة	المدة	نسبة	المدة	نسبة	المدة	نسبة	الاستحدا	
الزمنية	الاستحدا	الزمنية	الاستحدا	الزمنية	الاستحدا	الزمنية	الاستحدا	الزمنية	الاستحدا		
(يوم)	ث (%)	(يوم)	ث (%)	(يوم)	ث (%)	(يوم)	ث (%)	(يوم)	ث (%)		
٢٠	٧٦	٢٠	٧٥	١٧	٧٩	١٧	٨٥	٢٠	٧٥	الأوراق	
٣٢	٨٦	٣١	٩٠	٢٨	٨٧	٢٩	٨٥	٣٣	٨٥	السيقان تحت العلقة	
١٢	١٠٠	١٢	١٠٠	١٠	١٠٠	١٠	١٠٠	١٢	١٠٠	الجذور	

النسيجية (العقراوي، ٢٠٠٦) ولكن هذه المزايا مكنتها من عبور جسر الاستحداث فقط، فقد لوحظ التأثير السلبي لازيد الصوديوم وبشكل واضح على نمو حيوية الكالس المستحدث وذلك من خلال نقصان في معدل الوزن الرطب لكالس جميع الاجزاء النباتية، حيث سجل كالس الأوراق اقل معدل للوزن الرطب عند التركيز (١٢,٠) ملي مولر وبفارق كبير جداً بلغ (٢,٠) غم ، والتركيزين (٩,٠ ، ١٢,٠) ملي مولر والتي انخفض فيها معدل الوزن الطري بمقدار تتراوح ما بين (٣,٣ - ٢,٤) لكالس السيقان تحت الفلقية، وبفارق (٣,٥ - ٣,٩) لكالس الجذور عند التركيزين اعلاه الجدول(٢) .

ويفسر هذا الانخفاض في معدلات الوزن الطري للضرر الذي يحدثه ازيد الصوديوم من خلال تأثيره على عمليات الاكسدة والفسفرة التأكسدية المجهزة لطاقة الانقسام الخلوي أي هدم لجزيئات الطاقة من ATP اللازمة لعمليات الانقسام الخلوي، وتشبيطه لبعض الانزيمات المتعلقة بتصنيع الهورمونات الداخلية المحفزة للانقسام وتغيير مستوى فعاليتها عند التراكيز العالية من ازيد الصوديوم (Aruna et al., 2010; Gulfishan et al., 2010; Kumar and Ratnam, 2010).

وعلى العكس من ذلك تفسر الزيادة القليلة الحاصلة في الوزن الرطب لكالس السيقان تحت الفلقية

ونلاحظ من خلال الجدول (١) ان التركيز (٣,٠) ملي مولر قلل المدة الزمنية اللازمة لاستحداث كالس الأوراق بمقدار (٣) أيام، وكذلك الحال للتركيزين (٣,٠ ، ٦,٠) بالنسبة لكالس الأوراق، بينما انخفضت المدة الزمنية لاستحداث كالس الجذور ولنفس التراكيز اعلاه بمقدار يومين .

اظهرت نتائج الدراسة نجاح المطفر الكيميائي ازيد الصوديوم في تحفيز التغيرات الوراثية خارج الجسم الحي على مزارع الكالس والنباتات الناتجة من الكالس .

إذ اظهرت النتائج التأثيرات الواضحة لتراكيز ازيد الصوديوم المستخدمة على مزارع الكالس، وجاء اختيار البذور بوصفها الجزء النباتي المعامل، سبباً رئيساً في ظهور هذه التأثيرات، لان نجاح الاستحداث لاحداث التغيرات الوراثية يعتمد بالدرجة الأساس على استخدام الجزء النباتي المناسب والمتمثل بالبذور (Owais et al., 1983; Vagera et al., 2004) .

لم تظهر التراكيز المستخدمة تأثيراً سلبياً على استحداث الكالس للاجزاء النباتية (الأوراق، والسيقان تحت الفلقية والجذور) لنبات اليانسون وقد يعزى ذلك إلى املاك نباتات اليانسون قابلية عالية في استحداث الكالس واستجابتها العالية للمزارع

والجذور عند التركيز (٣,٠) ملي مولر إلى تأثير ازاييد الصوديوم في تصنيع الاوكسينات وبالتالي زيادة النمو عند استخدامه بتراكيز واطئة (North, 1979).

الجدول (٢): معدل الوزن الرطب (غم) لكالس اجزاء نباتات البانسون *Pimpinella anisum* الناتجة من البذور الاعتيادية والبذور المعاملة بالمطفر الكيميائي ازاييد الصوديوم على الاوساط MS القياسية بعمر (٤٥) يوماً

الوزن الرطب (غم)*					مصدر الكالس
تراكيز ازاييد الصوديوم (ملي مولر)				المقارنة	
١٢,٠	٩,٠	٦,٠	٣,٠	٠,٠	
٢,٠	٢,٢	٢,٥	٤,١	٤,٠	الأوراق
٣,١	٢,٧	٣,٨	٦,٢	٥,٤	السيقان تحت العلقة
٣,٢	٣,٦	٤,٧	٦,٨	٦,٥	الجذور

تفرعات المجموع الخضري (لصفته المميزة في احداث

الطفرات الكلوروفيلية) واحداث حالة التزهير المبكر

في بعض النباتات

(Kechagia et al., 1994; Mostafa,)

(2011).

* معدل ٣ مكورات (١) غم كالس عند الزراعة/

جزء نباتي

من جانب آخر اظهرت نتائج الجدول (٣)

التأثير المميز لازاييد الصوديوم على تحفيز الكالس على

التمايز وتكوين الافرع الخضرية على اوساط

الاستحداث، إذ سجل اعلى معدلات تمايز كالس

الأوراق عند التركيزين (٣,٠، ٦,٠) ملي مولر وبلغت

(١٢، ١٥) فرع، في حين سجلت جميع التراكيز على

تمايز كالس السيقان الفلقية وتمييز التركيزين (٣,٠،

٦,٠) ملي مولر في تسجيل اعلاها والتي بلغت (٢٨،

٣٠) فرع، وترجع الزيادة بازاييد الصوديوم إلى التأثير

التحفيزي للاخير لصبغة الزانثوفيل المسؤولة عن زيادة

الجدول (٣): تمايز كالس الاجزاء النباتية لنبات اليانسون *Pimpinella anisum*l الناتجة من البذور المعاملة

بالمطفر الكيميائي ازيد الصوديوم على اوساط MS القياسية

تراكيز ازيد الصوديوم (ملي مولر)								المقارنة		الكالس
١٢,٠		٩,٠		٦,٠		٣,٠		٠,٠		
المدة الزمنية (يوم)	عدد الأفرع	المدة الزمنية (يوم)	عدد الأفرع	المدة الزمنية (يوم)	عدد الأفرع	المدة الزمنية (يوم)	عدد الأفرع	المدة الزمنية (يوم)	عدد الأفرع	
٧	١١	٨	١٠	١٠	١٥	١٠	١٢	٢٤	٥	الأوراق
٤٣	٢٤	٣٧	٢٦	٣٩	٣٠	٤٠	٢٨	٥٦	٢٣	السيقان تحت العقدة
٣٢	٨	٣٥	٧	٣٤	١٠	٣٢	١٢	٣٠	١٨	الجذور

الشكل (١) استحداث وتمايز كالس الاجزاء المختلفة لنبات اليانسون *Pimpinella anisum* الناتجة من البذور

المعاملة وغير المعاملة بالمطفر الكيميائي ازايد الصوديوم

- A- استحداث كالس الأوراق الناتجة من البذور
المعاملة بازايد الصوديوم بتركيز (٣,٠) ملي مولر
من جانب آخر اظهرت نتائج تقدير البروتين
الجدول (٤) في الاجزاء النباتية للبادرات الناتجة من
البذور المعاملة والكالس الناتج منها، إذ اظهرت النتائج
حصول زيادة في محتوى البروتين في (٥٦) % من مجموع
معاملات الاجزاء النباتية والكالس الناتج منها،
ولوحظت ان الزيادة في محتوى البروتين تراوحت ما بين
(٠,٤٨ - ٠,٠٤) % ولوحظ تفوق التركيزين (٣,٠)،
(٦,٠) ملي مولر في رفع محتوى البروتين لمختلف العينات
على بقية التراكيز ولوحظ اعلى معدل لمحتوى البروتين
في الأوراق (٠,٤٨) % عند التركيز (٣,٠) ملي مولر
وكالس السيقان الفلقية (٠,١٩١) عند نفس التركيز
وتطابقت هذه النتائج وفق ما جاء في نتائج الدراسة
التي اجراها (Hussain et al., 2017).
- B- استحداث كالس السيقان تحت الفلقية الناتجة
من البذور المعاملة بازايد الصوديوم بتركيز (٦,٠)
ملي مولر
- C- استحداث كالس الجذور الناتجة من البذور
المعاملة بازايد الصوديوم بتركيز (٩,٠) ملي مولر
- D- تمايز كالس الأوراق الناتجة من البذور المعاملة
بازايد الصوديوم بتركيز (٦,٠) ملي مولر
- E- تمايز كالس السيقان تحت الفلقية الناتجة من
البذور المعاملة بازايد الصوديوم بتركيز (٦,٠)
ملي مولر
- F- تمايز كالس الجذور الناتجة من البذور المعاملة
بازايد الصوديوم بتركيز (٣,٠) ملي مولر

الجدول (٤): المحتوى البروتيني لمزارع كالس نباتات اليانسون *Pimpinella anisum* الناتجة من البذور المعاملة

وغير المعاملة بالمطفر الكيميائي ازايد الصوديوم

تراكيز ازايد الصوديوم (ملي مولر)				المقارنة	العينات
١٢,٠	٩,٠	٦,٠	٣,٠		
١٢,٠	٩,٠	٦,٠	٣,٠	٠,٠	كميات البروتين (ملغم/غم)
١,٠٢	١,٠٩	١,٣٦	١,٥٨	١,١	الأوراق
٠,١٢٩	٠,٣٥	٠,٤٥	٠,٣٠٢	٠,٢٦	كالس الأوراق

٠,٣٦	٠,٣٨	٠,٦٢	٠,٤٧	٠,٣٩	السيقان تحت العلقه
٠,٢٧	٠,٣٠٣	٠,٣٧	٠,٥٠١	٠,٣١	كالس السيقان تحت الفلقية

في السيقان تحت العلقية عند التركيز (٣,٠) ملي مولر وكالسها (٠,٠٨)% عند نفس التركيز وجاءت هذه النتائج مطابقة لما ورد في ارتفاع نسب الزيت لنبات *Brassicam nafus* عند المعاملة بتراكيز مختلفة من ازايد الصوديوم بالمطفر الكيميائي (Rehman et al., 1994; Hajduch et al., 2000).

ويظهر نتائج الجدول (٥) تأثير مختلف التراكيز من ازايد الصوديوم على محتوى الزيت الطيار في اجزاء الكالس الناتج منها، ويظهر واضحاً ان الزيادة في محتوى الزيت الطيار ما بين (٠,١١-٠,٠٢)% ولوحظت فوق التركيزين (٣,٠، ٦,٠) ملي مولر في رفع نسبة الزيت الطيار في الاجزاء النباتية وكالسها على بقية التراكيز ولوحظت اعلى زيادة في نسبة الزيت الطيار

الجدول (٥): نسب الزيت الطيار من مزارع نباتات اليانسون *Pimpinella anisum* الناتجة من البذور المعاملة

وغير المعاملة بالمطفر الكيميائي ازايد الصوديوم

تراكيز ازايد الصوديوم (ملي مولر)				المقارنة	مصدر الكالس
١٢,٠	٩,٠	٦,٠	٣,٠	٠,٠	
٠,١٥	٠,١٦	٠,١٩	٠,٢٦	٠,٢٢	الأوراق
٠,٤٩	٠,٥٤	٠,٦	٠,٦٣	٠,٥٨	كالس الأوراق
٠,١٦	٠,١٧	٠,٢٣	٠,٣١	٠,٢	السيقان تحت العلقه
٠,٤٧	٠,٥١	٠,٥٩	٠,٦١	٠,٥٣	كالس السيقان تحت الفلقية

اشارت اليه الدراسة التي اجراها (Muthanna, 2009) والتي اظهرت ن سرعة جريان مركب الايثول المفصول من زيت البذور بلغت (٠,٣٥).

كما أظهرت النتائج الشكل (٢) ان سرعة جريان البقع المفصولة من الزيت الطيار للسيقان والاوراق والكالس الناتج منها كانت متطابقة مع سرعة جريان RF القياسية لمركب الايثول والتي بلغت (٠,٣٥)، وجاءت هذه النتائج مطابقة لما

الشكل (٢) مركب الانثيول المفصول من الزيت الطيار لنباتات اليانسون

TLC *Pimpinella anisuml* بطريقة

النعمي، عبدالله نجم والزيدي، رغد نواف جرجيس (٢٠٠٩). تأثير التداخل بين تقنيتي الزراعة النسيجية والاشعائية على محتوى البروتين والاحماض النووية لكالس سيقان البقدونس *Petroselinum crispuml* والنباتات الناتجة منه، مجلة تكريت للعلوم الصرفة، المجلد (١٤)، العدد (١).

النعمي، عبدالله نجم ومحمود، سهام أحمد (٢٠٠٥). الزراعة النسيجية لنبات اليانسون *Pimpinella anisuml* خارج الجسم الحي، مجلة التربية والعلم، المجلد (١٧)، العدد (١): ١٣-١٠.

هيكل، محمد السيد وعمر، عبدالله عبد الرزاق (١٩٧٧). النباتات الطبية والعطرية كيميائياً وها- اتاجها- فوائدها، مركز الدلتا للطباعة والنشر.

المصادر الاجنبية

Ahmad, I.; Nasir, I.A.; Haider, M.S.; Javed, M.A.; Latit, Z. and Husnain, T. (2010). In vitro

١- مركب الانثيول المفصول من الزيت الطيار للأوراق. ٢- مركب الانثيول المفصول من الزيت الطيار كالكس الأوراق. ٣- مركب الانثيول المفصول من الزيت الطيار للسيقان تحت الفلقية. ٤- مركب الانثيول المفصول من الزيت الطيار كالكس السيقان تحت الفلقية.

المصادر العربية

الزيدي، رغد نواف جرجيس (٢٠١٠). الزراعة النسيجية لنباتات الكرفس *Apium graveolensl* خارج الجسم الحي، مجلة تكريت للعلوم الصرفة، المجلد (١٥)، عدد (٢).

العقراوي، هاويزن صلاح خليل (٢٠٠٦). تعريض بذور وأعضاء كالكس نبات اليانسون *Pimpinella anisuml* للاشعة فوق البنفسجية وتقدير محتوى الانثيول بواسطة كروموتوكرافيا السائل عالي الاداء، رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة الموصل.

- Thilagarathi, C. (2008). Effectiveness and efficiency of chemical mutagens in cowpea (*Vigna unguiculata* L. walp). Afro, J. Biotechnol., 7 (22): 4116- 4117.
- Ganesan, M.; Bhanumathi, P. and Jay obalan, N. (2005). Mutagenic effect of sodium azide on somatic embryo regeneration and root growth of cotton (*Gossypium hirsutum* L. CV. SVPRZ). J. Agr. Sci. Tech., 1 (2): 365-380.
- Hajduch, M.; Debre, F.; Bohmora, B.; Dolesova, p. and Pretova, A. (2000). Two soybean mutants with increased total and sulphur amino acid content induced by sodium azide. JGen Breed 54: 83-87.
- Haq. N. (2007). In Vitro production of bio active compounds from medical and aromatic plants. Agriculture, 38 (1): 112-119.
- Humera, A. and Javed, I. (2010). In Vitro techniques and mutagenesis for the genetic induction of mutation in potato cultivars, Pak. J. phyto pathol., 22 (1): 51-57.
- Al- Qurainy, F. and Khan, S. (2010). Mutationa approach for enhancement of artemisinin in *Artemisia annua*. J. Med. P. Res., 4 (7): 1714-1726.
- Al- Qurainy, F. and Khang, S. (2009). Mutagenic of sodium azide and its application crop improvement. world App. Sci. J., 6 (12): 1589-1601.
- Arnna, J.; Prakash, M. and Sunil, B. (2010). Study on effect of mutagens in MI. population of brinjal (*Solanum melongena* L.). Res. J. Agriculture Sci., 1 (4): 470- 471.
- Asie, S. and Mehri, A.F. (2012). Review of pharmacological properties and chemical constituents of *pimpinella anisam* international scholarly research network. Vol. 51 (8).
- Dhanarel, D.; Pavadai, P.; Mullainathan, L.; Mohana, D.; Raju, G.; Girija, M. and

- response to ultraviolet- c irradiation. J. Anim. pl. Sic., 20 (3): 197-200.
- Kumar, P.R.R. and Ratnam, S.V. (2010). Mutagenic effectiveness and efficiency in varieties of sunflower (*Helianthus annuus* L.) by separate and combined treatment with gamma- rays and sodium azide. Afr. J. Biotechrol. 99 (39): 6517-6591.
- Lowry, O.H., Roiseb, rough, N.J., Farr, A.L. and Randad, R.J. (1951). Protein measurement with folin reagent. J. Biol. chem. 193: 265-257.
- Marcelina, K.M. (2010). Influence of chmical mutagenes on morphological traits in kalanchoe influence of chemical mutagens on morphological traits in kalanchoe (*Kalancho hybrida*). Agric., Aliment., Pisc z, otech., 279 (15): 11-18.
- Mostafa, G.G. and Alframay, A.M. (2011). RAPD analysis for detection and fingerprinting of sunflower mutants induced by improvement of potato. Pak. J. Bot., 42(3): 1629-1637.
- Hussain, S.; Ali, S.; Akhtar, N.; and Ahmed, S. (2017). Mutagenic effect of sodium azide (NaN_3) on M_2 generation of *Beassicanapus* (variety Dunkled). Pure Appl. Biol., 6(1): 226-236.
- Kahrizi, D.; Chegh amirza, K.; Akbari, L. and Rostami- Ahmad vandi, H. (2013). Effect of magnetic field on cell dedifferentiation and callus induction derived from embryo culture in bread wheat (*Triticum aestivum* L.) genotypes, Mol. Biol., 40: 1651-1654.
- Kechagia, V.; Xanthopoulos, F. and sarropolon, M. (1994). Development of improved cotton cultivars by induced mutations. In: mutation breeding of oil seed crop: IAEA. Vienna: 159-162.
- Keskin, N. and Kunter, B.C. (2010). Production of trans-resveratrol in callus tissue of okuzogzu (*vitis vinifera* L.) in

- mutagens in soybean (*Glycine max* LL. merr.) *J. phytol.*, 6:444-447.
- Rehman, S. M.; Takagi, Y.; Kubota, K.; Miyamoto K and Kawakita, T. (1994). High oleic acid mutant in soyabean induced by x-ray irradiation. *Bio. Sci. Tech Bio chem.* 58: 1070-1071.
- Schacterle, G. R., and Pollack, R.L. (1973). A simplified method for the quantitative assay of small amounts of protein in biological material. *Anal. Biochem.* 51: 654-655.
- Turkan, A. Khawar, K. Ciftci, C. and Ozcan, S. (2006). Effects of mutagenic sodium azide (NaN_3) on in vitro development of four pea (*Pisum sativum* L.) cultivars. *Int. J. Agr. Bio.*, 8 (3): 349-353.
- Vagera, J.; Northny, J. and Ohnoutkova, L. (2004). Induced androgenesis in vitro in mutated populations of barley, *Hordeum vulgare*. *Plant cell Tiss. organ cult.* 77: 55-61.
- sodium azide. *Int. J. Plants Breed. Genet.*, 5 (3): 277-285.
- Mostafa, G.G. and Alfrmawy, A.M. (2011). RAPD analysis for detection and fingerprinting of sunflower mutants induced by sodium azide. *Int. J. Plant Breed. Genet.*, 5 (3): 277- 285.
- Muthanna, J. Mohammed. (2009). Isolation and identification of anethole from *Pimpinella anisum* L. fruit oil. An antimicrobial study. *Research Article*, 2(5): 915-919.
- North, C. (1979). *Plant breeding and genetics in horticulture.* Macmillan Press LTD. London, England.
- Owais, W.M.; Rosichan, J.I.; Ronald, R.C.; Kleinhofs, A. and Nillah, R. A. (1983). A mutagenic metabolite synthesized in the presence of azide is azidoalanine. *Mit. Res.*, 118: 229-239.
- Pavadai, P., Girija, M. and Dhanavel, D. (2009). Effectiveness efficiency and biochemical content of physical and chemical

فعالية مستخلص السيانوبكتريا *Westiellopsis prolifica* ومركباته الفينولية المعزولة ضد البكتريا والفطريات

أ.م.د. مرا اسامة احمد الكاتب

سارة عبدالواحد محمد

الملخص

تم في هذه الدراسة تناول مجال حديث ومهم ضمن البحوث الحديثة التي تركز حاليا على امكانية ايجاد بدائل صديقة للبيئة في مجالات الحياة المختلفة ومنها المضادات الحيوية التي تقل فعاليتها وتزداد مخاطرها بسبب ظهور مقاومة الميكروبات لها وقابلية تطوير دفاعات ضدها من قبل البكتريا والفطريات نظرا للاستخدام المفرط لها. اغلب الاتجاهات ركزت على النباتات والمواد الايضية الناتجة منها ويأتي هنا التركيز على افضل مصدر للمواد الفعالة ضد البكتريا والفطريات وهي الطحالب وتعد السيانوبكتريا (الطحالب الخضراء المزرقة) الافضل والاغنى بالمركبات الفعالة والتي يمكن ان تنتج تجاريا. استخدام المستخلص الايثانولي للطحلب السيانوي *Westiellopsis prolifica* وكذلك المركبات الفينولية المعزولة منه ضد نوعين من البكتريا الموجبة لصبغة كرام *Staphylococcus aureus* و *Bacillus subtilis* ونوعين من البكتريا السالبة لصبغة كرام *Pseudomonas aeruginosa* و *Escherichia coli* كما تم اختبارها ضد انواع من الفطريات *Aspergillus* ، *Fusarium solani* ، *Trichoderma viride* ، *Trichoderma harzianum* و *Penicillium notatum* و *flavus*. كما تم تشخيص نوع المركبات الفينولية المكونة للمستخلص الفينولي للطحلب وذلك بطريقة الفصل بكموماتوكرافيا الفصل السائل ذو الاداء العالي HPLC (شخصت خمسة انواع : Rutin-٥٨,٤ % ، Luteolin-١٩,١ %، Quercetin-٩,٦ % ، Apigenin-٥,٣ % و Kaempferol-٢,٥ %). من النتائج يتبين ظهور فعالية كبيرة للمواد الفينولية المعزولة من الطحلب ضد نوعي البكتريا الموجبة *S. aureus* و *B. subtilis* وبقطر تثبيط ٣٧ و ٣٥ ملم على التوالي وكذلك حساسية البكتريا السالبة لصبغة كرام *P. aeruginosa* و *E. coli* وبقطر تثبيط ٤٠ و ٣٠ ملم على التوالي وهي نتيجة ممتازة لان اغلب الدراسات تسجل الحساسية للبكتريا الموجبة فقط اوالتاثير القليل على البكتريا السالبة. اما المستخلص الايثانولي للطحلب فلم يظهر اي فعالية مع كل انواع البكتريا قيد الدراسة. وبينت النتائج

حساسية الفطريات وبشكل مميز للمكونات الفينولية المعزولة من الطحلب عند مقارنتها بتثبيط المستخلص الايثانولي له ، فقد سجلت فعالية مضادة لجميع الفطريات قيد الدراسة مع المكونات الفينولية واكبر تثبيط ظهر مع نوعي *Fusarium* و *Trichoderma viride* . بقطر تثبيط حوالي ٥٠ ملم مقارنة مع المستخلص الايثانولي الذي تثبط ثلاثة انواع فقط *Aspergillus*، *Fusarium* و *T. viride* وبدرجة اقل جدا من الفينولات .

The Activity of Cyanobacteria *Westiellopsis prolifica* Extract and Its Phenolic Compound as Antibacterial and Antifungal

Abstract

This study focus on new and important field of recently researches that attend to find ecofriendly materials to use in various fields of life, that one of it an antibiotics which activities reduce and it risks increased because of microbes resistance with its bacterial and fungal abilities to develop new defenses against that compounds. The most researches concentrated on plants and its metabolites, thus an algae generally and cyanobacteria with microalgae particularly can consider as best resources of this active compounds. The ethanolic extract of *Westiellopsis prolifica* and its phenolic compounds is used against two types of gram positive bacteria *Staphylococcus aureus* and *Bacillus subtilis*, as well as two gram negative bacteria *Pseudomonas aeruginosa* and *Escherichia coli* .Additionally that extracts is using upon kinds of fungi include *Aspergillus flavus*, *Fusarium solani*, *Trichoderma viride*, *Trichoderma harzianum* and *Penicillium notatum*. In HPLC technique , phenolic compounds type is detected (five types: Rutin-58.4 % , Luteolin-19.1% ,Quercetin-9.6% , Apigenin-5.3% and Kaempferol-2.5%) and show high content of phenols for cyanobacterium extract that cause high antibacterial activity for *S. aureus* and *B. subtilis* (G+) with inhibition zone reach 37 and 35 mm respectively ,as well as sensitivity of (G-) *P. aeruginosa* and *E. coli* at inhibition zone 40 and 30 mm respectively .In constant , the antifungal activity of phenolic extract is very high compared with its ethanolic extract due its inhibition zones with *Fusarium solani* and *Trichoderma viride* that reach approx 50 mm , while ethanolic extract that inhibited just three kinds *Fusarium* ,*Aspergillus* and *T. viride* at less grade than phenols.

المقدمة

عليها بكميات كبيرة من العمليات الكيموحيوية اضافة الى الحدود للكائنات الذي هو احد المعوقات للحصول الكفوء على مثل هذه المركبات من اجل الاستخدام الطبي (Hildebrand *et al.*,2004) ومن اجل التغلب على عائق المصدر للنواتج الطبيعية فان الكائن المختار يجب ان يملك كلفة واطئة بالتنمية له مع كميات عالية لمحتواه من هذه المواد الايضية الثانوية الفعالة حيويًا، وهي بطبيعتها تكون مشبطة للبكتريا والفطريات وتكون ذات اوزان جزيئية منخفضة Ollerstam and Larsson ,2003 ; Sugiyama and Hirota,2009; Harbone,1973). تم عزل الفينولات من الطحلب المدروس ، حيث تعد الفينولات من المركبات الكيميائية العضوية تتألف من ارتباط مجموعة هيدروكسيل وظيفية بشكل مباشر مع هيدروكربوني عطري ، يرجع اسمها الى ايسط هذه المركبات وهو الفينول C_5H_5OH ، وتكون الفينولات بشكل بلورات بيضاء في حالة الصلابة وعديم اللون في حالة السيولة يمتاز برائحة تشبه رائحة المنظفات والمعقمات (Khoddamia *etal.* , 2013). ان الاهمية للطحالب وما تملكه من منتجات اولية وثانوية لها فعالية حيوية Bioactive وهي

تضمنت الدراسة الحالية احد انواع السيانوبكتريا وهو *Westellopsis prolifica* حيث يعود هذا الطحلب الى الطحالب الخضراء المزرقمة بدائية النواة وهي من اقدم الطحالب عمرا حيث يقدر عمرها ٢٥٠٠ مليون سنة منذ العصر البركاني (مولود واخرون ،١٩٩٠)، يمتاز بشكله الخيطي وله تفرعات حقيقية تتألف من عدد من الخلايا يتكاثر خضريا بطريقة التجزئة او الهرموكونيا hormognia يتحمل الظروف البيئية القاسية وهو من الطحالب المثبتة للتروجين له القابلية على النمو في بيئات مختلفة (Dash and Mishrah,١٩٩٩). ان من المجالات الحديثة في بحوث الطحالب هو انتاج مواد ايضية ذات فائدة في مجالات الحياة المختلفة ومنها الفينولات ، حيث ان المركبات الفينولية هي مجموعة فعالة من مركبات الايض الثانوية التي لها استخدامات متعددة وهناك دراسات لفصلها من المصادر النباتية وتعد الطحالب والسيانوبكتريا من افضل هذه المصادر ، اذ ينتجها التحلل الحامضي للمستخلصات النباتية (Teixeira *et al.* ,2013)، كما ان المواد الايضية الفعالة حيويًا المستخلصة من الكائنات تكون محدودة ولا يمكن الحصول

ان للطحالب استخدامات في انتاج العقاقير الطبية وعلاج
العديد من الامراض وكذلك في الابحاث البيولوجية وذلك
لصغر دورة حياتها وسهولة تنميتها مجموعة السيانوبكتريا
هي بكتريا سالبة لصبغة كرام انزلاقية ولها تاريخ عالمي،
ولها تنوع حيوي كبير على الرغم من غياب التكاثر الجنسي
. هذا التنوع الحيوي الكبير ربما منعكس في الطيف الواسع
في مركباتها الايضية الثانوية السيانوبكتيرية هي مصنعة
حيويا بوساطة عدة طرق ، بشكل خاص بوساطة انظمة
تصنيع الببتيد غير الريبوسومي او انظمة تصنيع البولي
كيتايد ، وتظهر مدى واسع لفعاليات حيوية بضمنها
فعاليات مضادة للسرطان anticancer ، ضد البكتريا
antibacterial ، مضاد للفايروسات antivirus ،
وتثبيط البروتيز protease inhibition . هذه
الدرجة العالية للتنوع الكيميائي للمواد الايضية الثانوية
السيانوبكتيرية ربما لذلك تشكل مصدر منتج لكيانات
جديدة تقود الى تطور علاجات (ادوية) جديدة (الحفاجي
، ٢٠٠٨ ؛ السعدي وسليمان ، ٢٠٠٦)، ولاجل الخواص
التي تملكها مستخلصات السيانوبكتريا ازداد عدد البحوث
والتقارير بهذا المجال من اجل تطوير صناعة الادوية
(Kwei ,2012) . كما تعد السيانوبكتريا مصدرا
مهمة في الصناعات الدوائية لان منها مضاد للبكتريا ،
مضاد للفطريات، مضاد للطفيليات ، مضاد لطحالب
اخرى. وتكون المواد المنتجة من الطحالب اما داخل
خلوية Entracellular او خارج خلوية
Extracellular ، وان اهمها الطحالب الخضراء مثل
Chlorella vulgaris والطحالب الخضراء المزرقة التي
لها استخدامات كبيرة كمضاد للسرطان خاصة التي تكون
ضمن عائلة Oscillatoriaceae
(Thummajitsakul *et al.*,2012): الحسيني ،
(٢٠١٦). النواتج الطبيعية المستخلصة من الطحالب
والسيانوبكتريا تبدو مفيدة جدا ولها عدة فعاليات حيوية
منها ضد بكتريا، ضد الفطريات، ضد التجلط anti-
coagulant، ضد تكوين الصفائح anti-platelet
و ضد السل anti-tuberculosis وفعالية ضد
فايروسية anti-viral (Abed *et al.*,2009 ;
Mayer and Humann, 2002) ، فضلا عن
احتواء السيانوبكتريا على عدة مكونات تجعلها ناجحة في
تثبيط فايروس HIV بوساطة تثبيط انزيم وتكون anti-
HIV reverse-transcriptase وذلك بفعالية
مستخلصات الطحالب الدقيقة (Kwei, 2012). كما

الدقيقة، والفينولات التي تملك أكثر من مجموعة هيدروكسيل مرتبطة بحلقة البنزين هي Polyphenols وتتأكسد بواسطة انزيمات الأكسدة مثل انزيمات البيروكسيداز Peroxidase و فينول اوكسيداز Phenoloxidase و لاكيز Laccase (Vincenzo *et al.*, 2006). الفينولات احيانا تسمى مركبات متعددة الفينول Polyphenolic compounds وهي موجودة في انواع نباتات ارضية ومائية ويستفاد منها كمكونات مهمة لكل من غذاء الانسان والحيوان بسبب خواصها المضادة للاكسدة وقد ذكر أكثر من ٨٠٠٠ نوع معروف الان (Bravo, 1998)، حيث تظهر الفينولات المتعددة مدى واسع من التأثيرات الحيوية كتييجة لصفاتها المضادة للاكسدة، وان التركيز العالي نسبيا للمركبات الفينولية في انواع الطحالب البحرية يعطيها خواصها المضادة للاكسدة والتي يمكن ان تفيد في تقليل مخاطر تفاعلات الأكسدة على الصحة ولقد ذكر الخواص الكيميائية والحوية لفينولات الطحالب البحرية كمواد مضادة للاكسدة وطبيعة تأثيراتها الوقائية في الانظمة الحيوية وفعاليتها الكامنة في المنتجات الغذائية -Freile- (Pelegrin and Robledo, 2014).

مهما لهذه المركبات الطبيعية ذات التأثير العلاج والفسولوجي والمنتجة بكميات قليلة كنواتج لعمليات الايض الثانوي (Zorica *et al.*, 2008). ان للطحالب نفس الوظائف الحوية والبيئية التي تملكها النباتات، ورغم انها تنتمي الى فصيلة تطورية مميزة منفردة فان استجاباتها الدفاعية الكيميائية مماثلة للنباتات ومنها تصنيع المواد الايضية الثانوية (Potin (2008).

توجد الفينولات بشكل واسع الانتشار في الاجزاء النباتية المختلفة وتشكل المجموعة الأكبر منها الفلافونويدات وكذلك الفينولات ذات الحلقات البسيطة، والمركبات الفينولية تكون ذائبة في الماء وتزداد قابلية الذوبان لها بزيادة عدد مجاميع الهيدروكسيل وتكون موجودة بشكل مرتبط مع وحدة السكر بشكل كلايكوسيدات في النسيج النباتي (Harborne, 1973;Mahdi *etal.*, 2011). تكون الفينولات الاحادية من Ortho dihydroxy phenols استرات سكرية وكلايكوسيدات واشكال عديدة وبشكل مركبات غير سامة للكائنات لكن يحدث فيها تحلل مائي داخل النبات متحولة الى مركبات فينولية سامة ومضادة للكائنات

المواد وطرق العمل

تمت الدراسة في مختبرات قسم علوم الحياة - كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة الموصل وفيها استخدمت سلالة من الطحالب الخضراء المزرققة وهي *Westiellopsis prolifica* تم الحصول عليها من جامعة بغداد - كلية العلوم - قسم علوم الحياة (Abed, 2013).

تم تخفيف الكتلة الحية للعينة بعد تنميتها في الوسط الزراعي Chu 10. تم تحضير مستخلص الكحول الايثيلي لعينات الطحلب المختارة باخذ ١,٥ غم من الوزن لجاف للطحلب واضيف اليه ١٥ مل من الايثانول (Grand et al., 1988). ثم اخذ المستخلص الايثانولي وضع في حمام مائي ثلجي باستخدام المحرك الكهربائي لمدة ١٠ ساعات وترك لمزيج في الثلاجة للنقع لمدة ٢٤ ساعة ورشح المزيج باستخدام رقة ترشيح Whatmann No.1 واخذ الراشح وتم تبخير الايثانول الموجود فيه باستخدام جهاز المبخر الدوار اذ يعمل هذا الجهاز تحت ضغط مخلل ودرجة حرارة لا تزيد عن ٤٠° م واخذت الطبقة المتكونة من المستخلص الخام وحفظت في قناني زجاجية معقمة ذات غطاء محكم لحين استخدامها.

تم اجراء تحليل حامضي للمستخلص الكحولي باستخدام طريقة (Harborne, 1973) حيث اخذ ٢ مل من المستخلص واضيف له حامض الهيدروكلوريك بتركيز ٢ مولاري وبمجم ٢٠٠ مل من الحامض ثم سخن المزيج في حمام مائي بدرجة (٩٠ - ١٠٠ م) لمدة نصف ساعة مع التحريك ثم برد المزيج واضيف له خلايا الاثيل بمجم ١٠٠ مل ويفصل باستخدام قمع الفصل ، ثم تعاد العملية مرتين ويلاحظ تكون طبقتين ، العليا تمثل خلايا الاثيل وتحتوي على الحوامض الفينولية الحرة تركز بجهاز المبخر الدوار وحفظ في الثلاجة ، اما السفلى تهمل لكونها طبقة مائية.

استخدم الفصل بجهاز HPLC (High Performance Liquid Chromatography) من اجل فصل وتشخيص المركبات الفينولية الموجودة في المستخلص الايثانولي للطحلب وذلك في مختبرات وزارة العلوم والتكنولوجيا / دائرة البيئة والمياه وكان الجهاز من نوع (SYKAM) الالمانى المنشأ وبسرعة جريان ١ مل / دقيقة اما الطور المتحرك (A:B) A =(methanol: D.W.: acetic acid) (85:13:2).

من البكتريا الموجبة لصبغة كرام (*Bacillus subtilis*, *Staphylococcus aureus*) وملاحظة التأثير المضاد لها ، كما ودرست الفعالية المضادة للفطريات لهذه المستخلصات على انواع الفطريات (*Trichoderma harzianum*, *Trichoderma viride*, *Fusarium solani* , *Aspergillus flavus* , *Penicillium notatum*) (Pereze et al., 2004; al., 1990).

النتائج والمناقشة

فحصت عينة طحلب *Westellopsis prolifica* التي نمت في المختبرات ولوحظ تركيب الثالوس الخيطي المتفرع والخلايا الخضرية وكما موضح في الشكل (١):

B=(methanol: D.W.: acetic acid) (25: 70:5).

ان العمود (ODS -18) وبأبعاد (25 4.6 mm) وتم الكشف عن الاستجابات عند طول موجي 360 nm. وسجلت النسبة المئوية للمساحة والتي تشير الى نسبة كل مكون من المركبات في العينة المقاسة وحضرت المركبات القياسية (Kaempferol, Quercetin, Luteolin, Rutin, Apigenin)، ومن ثم عمل تجربة المستخلص الخام للطحلب والمستخلص الفينولي وذلك بطريقة الانتشار في حفر الأكار وحضنت الاطباق بدرجة حرارة ٣٧ وسجل قطر التثبيط لكل نوع على نوعين من البكتريا السالبة لصبغة كرام (*Escherichia coli* , *Pseudomonas aeruginosa*) ونوعين

صورة مجهرية للطحلب

مزرعة الطحلب

الشكل (١) : صورة لمزرعة وطحلب *Westellopsis prolifica*

توجد في الطحلب بكل مركبات الكلاينكوسيدات ، حيث
شخص فيها خمس مركبات فينولية وكما موضح في نتائج
الجدول (١) والشكل (٢) .

تشير نتائج الفصل باستخدام تقنية HPLC والتي تعد
من اهم طرق فصل وتشخيص المركبات الفعالة ومنها
المركبات الفينولية الموجودة في المستخلص الايثانولي

للسيانوبكتيريا وبعد اجراء عملية التلأل الحامضي لها كونها

الجدول (١) : المركبات الفينولية القياسية والمشخصة في عينة السيانوبكتيريا بجهاز HPLC

ت	المركب الفينولي القياسي	زمن الاحتجاز (دقيقة)	زمن الاحتجاز في العينة (دقيقة)	% المساحة (نسبته في العينة)
١	Apigenin	٣,٠٦	٣,٤٠	٥,٣٠
٢	Kaempferol	٣,٧٩	٣,٨٦	٢,٥٠
٣	Rutin	٤,٨٤	٤,٦٩	٥٨,٤٠
٤	Luteolin	٥,١٨	٥,١٥	١٩,١٠
٥	Quercetin	٦,٥٦	٦,٠٥	٩,٦٠

Rutin

Kaempferol

Apigenin

مستخلص السيانونيكتريا

Quercetin

Luteolin

الشكل (٢): قياسات المركبات الفينولية القياسية والموجودة في عينة السيانونيكتريا بتقنية HPLC

Ragan and Glombitza,1989;Targett
(and Arnald,1998) . كما ان الفينول في طحلب
نوستوك *Nostoc* اظهر فعالية ضد اربعة انواع من
البكتريا المرضية (Singh *et al.*,2011) اما
المركب الفينولي Luteolin فان زمن الاحتجاز له عند
٥,١٥ دقيقة في العينة وبنسبة مئوية بلغت (١٩,١ %) في
المرتبة الثانية للمركبات المشخصة، ولقد اشارت دراسة
(Machu *et al.*,2015) الى ان المحتوى الفينولي
في منتجات الطحالب والمشخصة كذلك بجهاز HPLC
قد تم تقدير فعالية المضادة للاكسدة لها وان هذا المحتوى
لطحالب المياه العذبة يعتمد على ظروف الاستخلاص
المختلفة المستخدمة لذلك لايمكن مقارنتها بشكل دقيق
فهي تعتمد على الطريقة المتبعة من حيث المستخلص مائي
، مستخلص الميثانول-كلوروفورم ، مستخلص ايثانولي ،
هكسان ، خلات الاثيل والماء .

كما بينت احدى الدراسات الحديثة (Singh *et al.*,2017)
الى ان المستخلصات الخالية من الخلايا
لعشرين سيانونيكتريا ارضية وباختبار فعاليتها المضادة

لوحظ من نتائج الجدول (١) والشكل (٢) احتواء
السيانونيكتريا قيد الدراسة على المركبات الفينولية
المشخصة الموضحة في اعلاه وكان النسبة الاعلى للمركب
الفينولي روتين Rutin (٥٨,٤ %) ، وهذا المركب شائع
في العديد من النباتات وله وظيفة وقائية من اشعة الشمس
للنبات اضافة الى استخدامات عديدة له منها الفعالية
المضادة للاكسدة والمضادة للاورام والالتهابات وموسع
للاروعية ويعمل كذلك على خفض مستوى السكر في الدم
(Al-Dhabi *et al.*,2015) .

ان التطورات الحديثة المستجدة في المركبات الفينولية
الناجمة من الطحالب اشارت حديثة الى اكتشاف الفينولات
المتعددة في الطحالب البنية وتكون بشكل
Phlorotannins متراكمة وهي اكبر مجموعة مدروسة
للمركبات الفينولية من الطحالب وهي تملك تركيب فريد
غير موجود في النباتات الارضية والتي تولف ربما أكثر من
٢٥% من الوزن الطري للطحالب البنية لذلك يتباين تركيزها
مع الموطن ، زمن الحصاد ، الكثافة الضوئية المعرض
لها ، والمغذيات المتوفرة (

فعالية للمستخلص الايثانولي الخام للسيانوبكتريا وضد اي نوع من البكتريا الموجبة والسالبة لصبغة كرام المستخدمة في الدراسة وكذلك عينة السيطرة ، في حين ظهر تثبيط واضح وحيد للمستخلص الفينولي من الطحلب وفي كل الانواع البكتريا الموجبة والسالبة لصبغة كرام وكان التأثير الاكبر على بكتريا *aeuroginosa* *Pseudomonas* بقطر تثبيط ٤٠ ملم ، وكذلك بكتريا (G+) *Staphylococcus* بقطر تثبيط ٣٧ ملم وبكتريا (G+) *Bacillus* بقطر تثبيط ٣٥ ملم وبكتريا (G-) بقطر ٣٠ ملم ومحسب ما موضح في الجدول (٢) والشكل (٣) واللذان يبينان نتائج الدراسة للفعالية ضد بكتيريا .

للاكسدة كانت حاوية على كميات عالية من الفينول الكلي والفلافونويد الكلي والتي تملك صفات مضادة للاكسدة بارزة وسجلت كميات متفاوتة من فينولات متعددة مثل احماض Gallic ، Chlorogenic ، Caffeic ، Feralic ، Vanillic و الفلافونويدات Rutin ، Quercetin ، Kaempferol في المستخلصات السيانوبكتريا ، والاخيرة قد شخصت في هذه الدراسة في عينة السيانوبكتريا وكانت بنسب مئوية (٥٨,٤ ، ٩,٦ ، ٢,٥) على التوالي .

تم خلال هذه الدراسة اجراء الفعالية المضادة للبكتريا باستخدام المستخلص الايثانولي الخام وكذلك المركبات الفينولية المعزولة منه وعينة السيطرة لكل مذيب مستخدم ودراسة التأثير المضاد لكل منهم ولوحظ عدم وجود اي

الجدول (٢) : تأثير المستخلصات الايثانولية والفينولية على البكتريا المرضية

قطر التثبيط (ملم)/معدل ٣ مكررات			البكتريا المرضية
المستخلص الفينولي	المستخلص الخام	عينة السيطرة	
			بكتريا G+
٣٧	---	---	<i>Staphylococcus aueus</i>
٣٥	---	---	<i>Bacillus subtilus</i>
			بكتريا G-
٤٠	---	---	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>
٣٠	---	---	<i>Escherichia coli</i>

B. subtilis *S. aureus* *E. coli* *P. aeruginosa*

الشكل (٣): صور تبين الفعالية المضادة للمستخلص الفينولي (رقم ٢) على البكتريا المرضية

جاف وسجل *Scenedesmus obliquus* اعلى محتوى كاروتينويدي وتلعب الكتلة الحية فضلا عن نوع السيانوبكتريا دور كبير كمصدر كامن للمواد المضادة للاكسدة وليس بسبب الكاروتينويدات Carotenoids فقط ولكن كذلك بسبب محتوى المركبات الفينولية (Ali et al. , 2014). يتضح مما سبق من النتائج للدراسة

تناولت احدي الدراسات اختبار عشرة اجناس لطحالب دقيقة من حيث الفعالية المضادة للاكسدة وبتقدير المحتوى الفينولي الكلي والكاروتينويدات ، واطهر المستخلص الايثانولي لطحلب *Oscillatoria* sp. اعلى فعالية مضادة للاكسدة (٦٩,١ %) ، في حين سجل طحلب *Chlorella* اعلى محتوى فينولي ٣٩,١ غم / ملغم وزن

الحالية الفعالية الكبيرة نسبيا للمركبات الفينولية المعزولة من
السيانوبكتريا ضد البكتريا المرضية بنوعيتها الموجبة
والسالبة لصبغة كرام وهذه نتيجة ممتازة مقارنة مع بقية
المراجع التي تشير الى مقاومة البكتريا السالبة لاغلب
المستخلصات النباتية حتى الطحلبية في عدة دراسات ، اذ
يشار الى مقاومة البكتريا السالبة وخاصة نوع
Pseudomonas aeruginosa ويعزى ذلك الى
طبيعة جدارها وتطور الياتها للمقاومة في حين انه بدراستنا
الحالية كان اكبر تأثير للمستخلص الفينولي هو على هذه
البكتريا المرضية وبأكبر قطر تثبيط مقارنة مع البكتريا
المرضية الاخرى المستخدمة في الدراسة مما يتوجب اخذه
بنظر الاعتبار للتوصية باستخدام المركب الفينولي لهذا
الطحلب من اجل انتاج علاج ضد هذه البكتريا المرضية.
وقد اعزت الدراسات السابقة فعالية المستخلص الايثانولي
الى تحليله جدران الخلايا البكتيرية مما يثبط نموها من خلال
تعريضها للمؤثرات الخارجية المختلفة مع زوال الجدار الخلوي
واختلاف وتباين حساسية البكتريا لهذه المستخلصات قد
يعود الى تباين كثافة ولزوجة المواد الهلامية التي يفزرها كل
نوع من البكتريا والتي تعد من عوامل المقاومة للبكتريا
المرضية (Ghashemi et al.,2004). كما

اشارت دراسة (حموشي ، ٢٠١٢) الى مقاومة بكتريا
Staphylococcus aureus للمستخلص البروتيني
لسيانوبكتريا *Oscillatoria chlorine* ،
Microcystis rubusta وكانت بحساسية متوسطة
لمستخلص *Anabaena spiroides*. لقد فسرت
اغلب الدراسات اختلاف فعالية المستخلصات تجاه
البكتريا المرضية الى سبب وجود أكثر من مادة فعالة والتي
توزع بحسب المذيب الملائم لها (Ghashemi et al.,2004; Kreitlow et al.,1999) والاكثر
استخداما في الدراسات هو المستخلص الايثانولي وربما
بسبب عزله لمركبات الفينول والتي هي اهم المركبات المثبطة
للبكتريا (Shoko et al.,1999). هناك عوامل تؤثر
على فعالية المستخلص الضد بظظكثيرة منها عوامل بيئية
وفسلفية وطريقة الحفظ وظروف التنمية ونوع المستخلص
وطريقة الاستخلاص (قاسم واخرون ، ٢٠٠٣: Tüney
et al.,2006). توجد دراسات اخرى تضمنت انواع
سيانوبكتيرية وتأثيرها عظمى البكتريا المرضية
(Shareef ,2008) اشار الى ان المستخلص
الميثانولي لـ *Tolypothrix nodosa* له فعالية تثبيطية
عالية ضد عدة انواع بكتيرية وان مركبه الفعال احد

مشتقات مركب بيتيدي Tubercidin، وفي دراسة (المازني، ٢٠٠٧) زادت فعالية المضاد الحيوي بعد تنقيته من مستخلص *Nostoc muscorm* تجاه البكتريا الموجبة والسالبة لصبغة كرام، واشير كذلك الى ان المستخلص الميثانولي لنفس الطحلب المذكور وطحالب اخرى اعطت فعالية مضادة للبكتريا *S. aureus* و *Bacillus subtilis* (Cannell et al., 1988). اشارت دراسة (Thummajitsakul et al., 2012) الى ان مستخلصات الايثانول ٨٠% لطحلي *Microcoleus* و *Phormidium* اظهرت زيادة فعالية ضد بكتريا *Streptococcus enteritidis* (G+) وبكتريا *E. coli* (G-).

ان الفينولات لها قابلية على تحليل الغشاء الخلوي للبكتريا والنفاذ الى الخلية وبالتالي تحطيمها وخروج مكوناتها الى الخارج، ومن الفينولات الشائعة Qurcetin الذي يشبط النمو بتأثيره على الانزيمات المسؤولة عن التفاعلات الايضية الرئيسة (Andrade et al., 2006; Manson and Wasseman, 1987). عند دراسة تأثير الاجهاد غير الحيوي لتحفيز الفينولات والفلافونويدات والخواص المضادة للاكسدة لافراد الطحالب الدقيقة والسيانوبكتريا، تبين ان اجهاد النحاس ادى الى زيادة فينولات *Tetraselmis* sp. و *Nannochloropsis* sp. كما ارتفع المحتوى الفلافونويدي الكلي وزادت فعالية ضد الاكسدة لطحلب *Anabaena* باجهاد الملح (Azim et NaCl) (al., 2018). تم دراسة الفينولات في الطحالب الكبيرة *Macroalgae* لخمسة اجناس من الطحالب الخضراء والحمراء ووجد فيها فينولات بمعدل ١١٠-٥٢٠ مايكروغرام/غم (Sarojini et al., 2016).

تبين عند تشخيص المكونات بتقنية GC-MS ظهور عدة مركبات منها مشتقات الفينول ومشتقات الاحماض الدهنية وهي مسؤولة بصورة رئيسية على السيطرة بتثبيط البكتريا الموجبة لصبغة كرام *P. aeruginosa* وبتثبيط ١٦ ملم للمستخلص الايثانولي الخام لطحلب *Oscillatoria* sp. (Mansor et al., 2013). لقد اشار (Jerez -Martel et al., 2017) الى اختبار مستخلصات ميثانولية ومائية لعدة طحالب دقيقة وسيانوبكتيرية وبينت نتائجها انه رغم ان حقيقة الماء هو المذيب الأكثر كفاءة لاستخلاص أكبر كمية من المواد فقد اظهر الميثانول كفاءة أكبر لاستخلاص

مجموعة مختارة من المركبات تمتلك أعلى فعالية مضادة للاكسدة مع تشخيص مركبات بتقنية HPLC التي أكدت ان منها اربعة مركبات فينولية بسيطة وفلافونويدات وسجلت *Euglena cantabrica* أعلى تركيز للفينولات خاصة Gallic acid و Protocatechuic واعطت مستخلصات الطحلب المذكور أعلى فعالية مضادة للاكسدة ربما تعزى الى المحتوى العالي للفينولات فيه. لاهمية الفينولات في جميع الطحالب كذلك تم دراستها في الطحالب الحمراء ومنها *Gracilaria bursa-pastoris*، اذ ظهر فيه أعلى قيمة للمكون الفينولي، فيتامين E و C ويوصى بانه يستفاد منه كمصدر لجزيئات مضادة للاكسدة طبيعية ويمكن ان تفيد في الصناعات الغذائية (Yildiz et al.,2011)

تبين عند دراسة تأثير المستخلصات السابقة الخام والفينولية للطحلب ضد الفطريات يتضح من نتائج الجدول (٣) والصور في الشكل (٤) بان للمستخلص الخام للطحلب له فعالية مضادة كبيرة للفطر *Fusarium solani* اذ بلغ قطر التثبيط (١٩ ملم) وكذلك ضد فطر *Aspergillus flavus* بقطر تثبيط (١٥ ملم) ولم يظهر المستخلص الخام فعالية ضد الفطريات الاخرى.

اما فيما يخص المستخلص الفينولي فقد تفوق بشكل واضح واطهر فعالية ضد جميع الفطريات المستخدمة وباقطار تثبيط كبيرة وصلت الى ٥٠ و٤٩ ملم مع كل من فطري *Trichoderma* و *Fusarium*.

الجدول (٣): تأثير المستخلصات الايثانولية والفينولية على الفطريات المرضية

فطر التثبيط (ملم) / معدل ٣ مكررات لكل عينة				نوع الفطر
المستخلص الفينولي	المستخلص الخام	السيطرة (خلات الاثيل)	السيطرة (ايتانول)	
٥٠	٢٢	---	---	<i>Fusarium solani</i>
٤٩	١٢	---	---	<i>Trichoderma viride</i>
٢١	---	---	---	<i>Trichoderma harzianum</i>
٢٦	١٥	---	---	<i>Aspergillus flavus</i>
٢٧	---	---	---	<i>Penicillium notatum</i>

Trichoderma harzianum *Trichoderma viride* *Fusarium solani* *Penicillium notatum* *Aspergillus flavus*

الشكل (٤): يوضح الفعالية المضادة لمستخلصات الايثانولية والفينولية على الفطريات المختلفة

(Cano *et al.*, 1990) ذكر انه لمركبات الفينول في السيانوبكتريا الارضي *Nostoc muscorum* فعالية ضد الفطر *Candida albicans*، كما قدرت الفعالية ضد ميكروبية لطحالب خضرمزرقة مختلفة وبمستخلصاتها المائية والعضوية ضد سلالات بكتريا مرضية للانسان ومنها المستخلص الكلوروفورمي اضافة الى فعاليته ضد الفطر

ان عدد كبير من المستخلصات السيانوبكتيرية والطحالب الدقيقة ومنتجاتها الخارج خلوية وجدت لها فعالية ضد بكتيرية و ضد فطرية نواشير الى العديد منها للمستخلصات المائية والعضوية والموضحة في الفحص الحيوي باستخدام كائنات مجهرية للاختبار (Falch *et al.*, 1995). في القرن الاخير تم الاشارة الى الفعالية المضادة للفطريات، ففي دراسة (De

٨٠ مايكروغرام / مل) و ضد بكتيرية متوسطة (١٦-١٦٠ مايكروغرام/ مل) و ضد فطرية (٣٢-٤٠ مايكروغرام/ مل) لكل من المركبين (Volk and Furkert,2006).

المصادر

الحسيني ، احمد عيدان . (٢٠١٨) . الطحالب في العراق بيئتها وتصنيفها . ط١ . بغداد . سلسلة علوم . دار الشؤون الثقافية العامة . وزارة الثقافة العراقية .

حموشي ، رواء محمود داؤود . (٢٠١٢) . تأثير بعض النواتج الحيوية والعلاقة الوراثية للسياونوبكتريا المثبتة للنتروجين الجوي على بعض انواع البكتريا الممرضة . أطروحة دكتوراه . كلية التربية . جامعة تكريت .

الحفاجي ، زهر محمود . (٢٠٠٨) . التقنية الحيوية الماكروبية (توجيهات جزئية) . معهد الهندسة الوراثية التقنية الحيوية للدراسات العليا . جامعة بغداد - العراق .

السعدي ، حسين علي وسليمان ، نضال ادريس . (٢٠٠٦) . علم الطحالب Phycology . الطبعة

Aspergillus terreus في حين ان اي مستخلص من هذه الانواع السيانوبكتيرية اظهر فعالية ضد *Trichoderma viride* وان المستخلص الايثانولي لاربعة انواع منها اظهرت فعالية ضد فطرية لكل من سلالات الخميرة *Candida tropicalis* و *Saccharomyces cerevisiae* و اخيرا مستخلص خلات الاثيل لكل انواع السيانوبكتريا اظهر فعالية ضد *Saccharomyces cerevisiae* (Abo- State et al.,2015). كما شخص مواد فعالة في السيانوبكتريا *Nostoc muscorum* اذ انه يملك مركبات ايضية فعالة حيويًا متعددة وقياس الفعالية المضادة للاكسدة والمضادة للبكتريا والمضادة للفطريات وتبين اكبر تأثير لها على بكتريا *P. aeruginosa* وبتثبيط ٢٠ ملم للمستخلص الميثانولي ومقاومة بكتريا *B. subtilis* واعزيت الفعالية المضادة للاكسدة الى وجود المركبات الفينولية فيه وكانت الفعالية الاقل له مع الفطريات (Rimsha et al.,2014)، ودرس تاثير المحتوى الفينولي كذلك لطحلب *Anabaena* المعزول من حقول الارز في الهند (Pant et al.,2011)، في حين انه عند تقدير المواد الايضية المفترزة للخارج لجنسين من السيانوبكتريا *Nostoc insulare* و *Nodularia haveyana* ولمركبين فيهما حددت فعالية ضدسيانوبكتيرية جيدة (تركيز ٨-

مولود ، بهرام خضير وسليمان، نضال ادريس والبصام ، ابراهيم توفيق. (١٩٩٥) الطحالب والاركيكونات ، مطبعة دار الحكمة . بغداد .

Abed , Ibrahim J.; Jawad , Abdul latif; Abdulhasan, M . J; Al – Hussieny , G.A .; Ahmed Aidan and Moushib , Laith Ibrahim .(2013) . Moluculer Detection of Toxigenic New Record Cyanobacterium , Westiellopsis prolifica In Tigris River . International Journal of Scientific Technology Research . V(2) , Issue 11: 87 – 91 .

Abed ,J.I. (2013).Environmental and Identification Study of Algae in Three Drinking Water Plants in Baghdad and Molecular Detection of Some Toxigenic Cyanobacteria .Ph. D. thesis . Collage of Science .Univercity of Baghdad . Iraq.

Abed, R.M.M.; Dobrestove ,S. Sudesh ,K. (2009). Application of Cyanobactria in Biotechnology ,Journal of Applied Microbiology,V. 106:1-12 .

Abo- State ,M.A.M. ; Shanab, S.M.M. ; Ali , H. E. A. and Abdulla , M. A. (2015) .Screening of antimicrobial activity of selected Egyptian

العربية ، دار اليازوردي العلمية للنشر والتوزيع . عمان – الاردن .

الصالحى ، سهام شكور عبيد. (١٩٩٩) . تأثير بعض المستخلصات المعزولة من السيانوبكتريا على بعض انواع البكتريا والفطريات . رسالة ماجستير. كلية التربية للبنات – جامعة تكريت .

قاسم، نائل ابراهيم؛ الكبيسي ، حارث كامل ويوسف، سامرة يونس(٢٠٠٣). فعالية مستخلص الايثانول للطب العصري المحلي *Nitzschia palea* تجاه البكتريا . مجلة الدراسات للعلوم الزراعية، ٣٠(٢): ٢٤٠ – ٢٤٥

المازني ، منى عبد الامام احمد. (٢٠٠٧) . انتاج المضاد الحيوي ال Cryptophycin من السيانوبكتريا *Nostoc muscorum* المعزولة من تربة عراقية ودراسة فاعلية الضد مايكروبية . رسالة ماجستير. كلية العلوم – جامعة البصرة .

محمد، عبد العظيم كاظم. (١٩٨٥). علم فسلجة النبات. ج٢. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. جامعة الموصل .

in vitro iron – dependent free radical formation . Biochemic . , 88 : 1287 – 1296 .

Azim , N. H. , Subki , A. and Yousf , Z. N. B. (2018). Abiotic Stresses induce total phenolic , total flavonoid and antioxidant properties in Malaysian indigenous microalgae and Cyanobacterium . Malaysian Journal of Microbiology , V. 14(1) : 25 – 33 .

Bravo, I. (1998) .Polyphenoles : chemistry , dietary sources , metabolism and nutritional significance . Nutritional Reviewes , v. 56:317-333.

Cannel, R.J.P. ; Owsianka , A.M. and Wolker ,J.M. (1988) . Results of a large – scale screening programs to detect antibacterial activity from fresh water algae . Br. Phycol. J., 23: 41-44.

Dash ,A.K. and Mishra , P. C. (1999).Response of blue- green alge *westillopsies prolific* in sewage enriched paper mill waste water .Rev. Int. Contam .Ambinet ,v. 15(2) : 79- 83 .

De Cano,M.M.S.;De Mule,M.C.Z.;De Caire,C.Z. and Halperine ,D.R.(1990). Inhibition of *Candida albicans* and *Staphylococcus aureus* by

cyanobacteria species . Journal of Ecology of Health and Environment .v.3 ,no1; 7- 13 .

Al – Dhbi , N. A. , Arasu , M. V. , Park , C. H. and Park , S. U. (2015). An up – to . date review of rutin and its biological and pharmacological activities , Excli J. (Experimental and Clinical Sciences) , 14 : 59 – 63 .

Al- Wathnani ,H.; Ara, I. ; Tahmaza, R.R. ; Al- Dayel , T. h. and Bakri ,M.A. (2012) .Bioactivity of natural compounds isolated from cyanobacteria and green algae againtes human pathogenic bacteria and yeast . Journal of Medical Plants Research , v. 6(18) :3425- 3433.

Ali , H . E . A. , Shanab , S. M. M. , Abo – State , M. A. M , Shadaby , E. A. A. , El Demerdash , U. M. N. and Abdullah , M. Z.(2014). Screening of Microalgae for Antioxidant Activities , Carotenoids and Phenolic Contents . Applied Mechanics and Materials , V. (625) : 156 – 159 .

Andrade , R. G. , Ginani , J. S. , Lopes , G. K. B. Butra , F. ;Alonso , A. and Hermes – lima , M. (2006) . Tannic acid inhibits

- Harborn , J. B. (1973) .
Phytochemical Methods : A guid
to Modern Technique of plant
Analysis 1st ed . Cox and Wyman
. London , P. 52 – 73 .
- Hildebrand , M. , Waggoner , L.
E. , Lim , G. E. , Sharp , K. H. ,
Ridly , C. P. and Haygood , M.
G. (2004). Approaches to
indentify , Clone , and express
symbiont bioactive metalolite
genes . Natural product Reports ,
V. 21 : 122 – 42
- Jeres- Martei , I.; Garcia-Poza,
S.;Rodrigues –Martel; Rico-
Milagros ;Afonso –Olivares,
C.and Gomes –Pinchetti, J.
l.(2017) . Phenolic profile and
anti oxidant activity of crud
extracts from microalgae and
cyanobacteria strains. Journal of
Food Quality , v. 2017 . Hindawi
, [http://doi.
Org 110.1155/ 2017/
2924508](http://doi.org/10.1155/2017/2924508).
- Khoddami; *etal*
(2013).Techniques for analysis
of plant pheolic compounds
molecuies.18(2):2328-75
- Kreitlow , S. M; Mundt , S. and
Lindequist ,U.(1999).
Cyanobacteria a Potential source
of new biologically active
phenolic compounds from the
terresteial cyanobactrium *Nostoc
muscorum* .J.Appl. Phycol. ,v.2:
79- 82 .
- Filch, B.S. ; Konig ,G. M. ;
Wright, A.D. ; Sticher ,O.;
Angerhofer, K. ;Pezzuto , J.M.
Bachmann , H. (1995)
.Biological Activites of
cyanobacteria : evalution of
extractes and pure compounds .
Planta . Med. ,v. 61: 321- 328.
- Freile – pelegrin , Y . and
Roblrdo , D..(2014) . Bioactive
Compounts From Marine Foods :
Plant and Animal Sources , Frist
ed . . 6 Bioactive Phenolic
Compounds . John Wiely & Sons
, ltd. UK .
- Ghasemi , Y. M. , Tababaei , A. ,
Shafiee , A. , Amini , M. ,
Shokravi , Sh. and Zarrini , G .
(2004) . Parasiguine , a novel
antimicrobial substance from
Fischerella ambiua . Pharm .
Biol. , 2 : 318- 322 .
- Grand, A.; Wondergem, P. A.;
Verpoorte, R.; Pousset,
J.L.(1988). Anti-infection
phytotherapies of the tree-
Savannah Of Senegal (West-
Africa)II. Antimicrobial Activity
of 33 species. J. Ethnopharm,
22(1):25-31.

.Biol. Pharm. Bul. ,10 (2) :23-236.

Mansor , R.; Rahman, N.S.;Mohammed,S. F.;Kuppusamy ,P.;Yusoff ,M.M. and Govindan ,N.(2013). Isolation and identification of marine algae (*oscillatoria sp.*)from kuantan costal region Malaysia and studies on their bioactivites and antibacterial proprietes.World Applied Science Journal,28(2) :200- 204 .

Marino , M. , Bersani , C. , and Comi , G. (2001) . Impedance measurements to study the antimicrobial activity of essential oils from Lamiaceae and compound Int. J. Food Microbial , @140 : 1 – 9 .

Mason,T.L.and Wasserman,B.P.(1987).Inactivation of red beta Glucan synthase by native and oxidized phenolic compound.Phytochemistry ,26:2197– 2202 .

Mayer ,A.M.S. and Hamann ,M.T.(2002).Marine pharmacology in 1999: compounds with antibacterial ,anticoaguent, antifungul,anthelminitic, anti-inflammatory antiplatelete, antiprotozoal and antiviral activites affecting the

substances , J. Biotechnol. , 30 (3) : 61 – 3 .

Kulik, M.M. (1995). The potential of using cyanobacteria (blue green algae) and algae in te biological center of plant pathogenic of bactria and fungi . Eur. J. Plant Path . , v. 101 (6) : 585- 599 .

Kwei, C. K. (2012). Elucidation and isolation of specific bioactive compounds in cyanobacteria isolates. Doctor Thesis . The University of Adelaide .Australia

Machu , l. , Misurcova , L. , Ambrozova , J. V. , Orsavova , J. , Mlcek , J. , Sochor , J. and Jurikova , T. , (2015) . Phnncllic Content and Autioxidant Capacity in algal food Products Molecule , 20 , 1118 – 1133 , WWW.mdpi.com/journal/molecules .

Magaldi,S.;Mata-Essayag,C.;DeCapriles,H.;Perez, C.;Collela,M.T.;Olaizola,C. (2004).Well diffusion for antifungal susceptibility testing.Int.J Infect.Dis.,v 8:9-45.

Mahdi,V.;Khanavai,M.;manazadeh, Y.and Hajimedipoor(2011). uantification of gallic acid in fruits of three medicinal Plants

Ragon , M.A and Glombitza,K.W.(1986).Phlorotan nins,brown algal polyphends . In :progress in phycological Research , Biopress Ltd : Bristol , UK : 129 – 241

Rimsha, R; Richa, J.; Sheela, K. ; Shrivastava ,P. N. and Manju, J. (2014) Bioactive substances of cyanobactria(*Nostoc muscorum*) :a review International Journal of Pharma Sciences and Research (IJPSR), v.5, no.7 :320-322.

Sarojini ,Y. ;Sujatha, B. and Santha Rao , P. (2016). The variation in the distribution of total phenols and antioxidant activity in five species marine macro algae . Der Pharmacia Letter , v.8 (1) : 30- 37.

Shareef ,A.A.(2008) . Screening of antibiotics for same of cyanobacteria , green algae and aquatic plant in basrah governorate .a disseratation doctorate collage of education of basrah university .

Shoko , T. , Soich , T. , Megumi , M. M. , Eni , E. , Jun , K. and Michika , W. (1999). Isolation and identification of an antibacterial Compound from grape and its application to foods . Noppon nogekagaku kaishi , 73 : 125 – 128 .

cardiovascular endocrine immune and nerves system and other miscrllaneous mechanisnes of action , compayive biochemistry and physiology c: Toxiology and Pharmacology , v.132: 315- 39

Medina- Jaritez ,N.B. ; Perez-Solis, D.R. ;Ruliboa De leon F. , S.l. and Olivera – Rameriz , R. (2011). Antibacterial activity of aqueous and methanolic extracte from *Arthrospira maxima* , sciences againtes microbial pathogenis community research and technological advances ,A Mendes–Vials (Ed) FORMATEX 2011.

Ollestram ,O. and Larsson ,S. .(2003) . Salicylic acid mediates resistance in the willow salix viminals againtes Gall Midge Dasineura.

Perez, C.; Poaul, M. and Bazaerque ,P., (1990) . An antibiotic assay by the agar well diffusion method . Acta. Boil. Med. Exp. , v. 15 : 113-115.

Potin ,P. (2008) .Oxidative burst and related responses in biotic interaction of algae in: algal chemical ecology (ed. C.D. Amsler) .Springer –Verlage : Berline , Heidelberg ,Germany : 245.

- Vincenzo ,I.;Veronica, M.; Lattanzio,T. and Angila ,C.(2006).Role of phenolics in the resistance mechanisms of plant against fungal pathogen and insects . research sign post 37/66(2), fort p.o. ,Trivandrum - 695023, Kerala , India .
- Volk ,R. –B. and Furket ,F. H. (2006).Antialgal , antibacterial and antifungal activity of two metabolites produced and excreted by cyanobacteria during growth . Microbiological Research , 161: 180- 185.
- Waterman , P. G. and Mole , S. (eds.) (1994). Methods in Ecology = Analysis of phenolic plant Metabolites . Blackwell Scientific publications : Qxford .
- Yildis, G.;Vatan ,O;Celikre ,S.and Dere ,S.(2011).Determination of the phenolic compounds and antioxidative capacity in red algae *Gracilaria bursa –pastries* international journal of food properties .[http://www.tandfonline .com /loi /ljfp20](http://www.tandfonline.com/loi/ljfp20).
- Zorica ,S. ; Dragana ,C. ; Jelica,S.; Maja, K. ;Dejan ,S. (2008). Antibacterial , antifungal and cytotoxic activity of teriterral cyanobacterial strains from Serbia. Sciences in China Series , 51(10) : 941-947.
- Singh , D. P. , Prabha , R. , Verma , S. , Meena , K. K. and Yandigeri , M.. (2017) Antioxidant Properties and polyphenolic Content in terrestrial Cyanobacteria . 3 Biotech , 7 : 134 .
- Singh , R. K. ; Tiwari, S. P. ; Rai , A. K. and Mohapatra , T. M. (2011) . cyanobacteria: an emerging source for drug discovery . The Journal of Antibiotics , 64 : 401 -412.
- Sugiyama ,Y.,and Hirota ,A. (2009) .New potent DPPH radical scavengers from marine – derived actinomycetes strain USFTC 31 .Biosci . Biotechnol .Biochem , v. 37: 2731- 2734.
- Targett , N. M. and Arnold , T. M. , (1998). Predicting on manine hervibores in tropical and temperate Ocean . Journal of Phycology , 34 : 195 – 206 .
- Teixeira, J.; Gasper ,A.; Garrido, E.M. ;Garrido ,J and Borges ,F. (2013) Hydroxy – cinnamic acid antioxidant : an electrochemical overview .BioMed Research International, 11.
- Thummajitsakul ,S.; Silprasit ,K. and Sittipraneed , S. (2012). Antibacterial activity of crude extracts of cyano bacteria phormidium and microcoleus spiecse . African Journal of Microbiology Research , v.6 (10) : 2574- 2579.

تأثير حذف *nifD gene* وجزء من *nifH gene* و *nifK gene* على إنتاج الغشاء الحيوي فيبكتريا *Klebsiella pneumoniae*

فوز عبد السلام الصفار ، عبد الرزاق خضر ، نجوى ابراهيم البرهاوي

الملخص:

اجري هذا البحث بهدف معرفة قابلية البكتريا *Klebsiella pneumoniae* (التي تم الحصول عليها من Prof. Jean-Marc / جامعة Leicester البريطانية) وبنوعها العزلة الطافرة Mutant والعزلة غير الطافرة Wild type على إنتاج الغشاء الحيوي او السكر المتعدد الخارجي (EPS) Exopolysacharides ، وباستخدام وسطي المرق الخالي من النتروجين (NF) Nitrogen-free broth و (LB) Bertani -Luria ، ومن ثم قياس كميته بواسطة جهاز ال Spectrophotometer ، دلت النتائج ان العزلة البكتيرية الطافرة وغير الطافرة تمكنا من إنتاج EPS على وسط LB ولم يلاحظ وجود فروقات معنوية بينهما، في حين تبين عند استخدام الوسط الخالي من النتروجين (NF) ان العزلة البرية وباستثناء العزلة المطفرة كان لها القدرة على إنتاج هذا السكر.

Effect of *nifD* gene deletion and part of *nifH* gene and *nifK* gene on biofilme production in *Klebsiella pneumoniae*

Abstract:

This study was conducted to investigate the susceptibility of the bacteria *Klebsiella pneumoniae* (obtained from Prof. Jean-Marc / Leicester University of Britain), mutant isolates and wild type isolates on the production of exopolysacharides (EPS), using Nitrogen-free (NF) and Luria-Bertani (LB) media, then quantified it by Spectrophotometer. The results showed that mutant and non-mutant bacterial isolates were able to produce EPS on the LB medium, no significant differences were observed, while When using a nitrogen-free medium (NF) the isolated wild type except the isolation mutagens, have the ability to produce this sugar.

المقدمة:

المحتوي على الحديد Fe-protein ويُشفّر من قبل

الجين *nifH*

(Jenkins *et al.*, 2004;

Rosado *et al.*, 1998; Rösch *et al.*,
2002)

يمتاز جنس *Klebsiella* العائد للعائلة المعوية
Enterobacteriaceae وبنوعيه

K. Oxytoca و *K.pneumoniae*

(Brisse *et al.*.,2006) ، بقدرته على تثبيت

النيتروجين الجوي في التربة والمياه وعلى المواد العضوية

المتفسخة و جذور النباتات واوراقها

(Raymond,2004) ، وباحثائه على السكر

المتعدد الخارجي (EPS) Extracellular

Polysaccharides الذي يفرز الى خارج البكتريا

اما بشكل محفظة Capsule تحيط بالخلية او يفرز

للسطح الغذائي الذي تتواجد فيه خلال فترة النمو

(Yuan,2005) ، ويعد هذا المركب واحداً من

أهم عوامل الضراوة في هذه العائلة إذ تكفي الكميات

القليلة منه لمقاومة العوامل المناعية لجسم المضيف)

(Evrard, 2010; Rehm,2009) ،لذلك

اشارت دراسات كثيرة الى دور EPS واهميته في تجميع

ينصب اهتمام الباحثين على عملية تثبيت

النيتروجين الجوي N_2 لما لعنصرالنيتروجين من اهمية

كبرى بوصفه أحد العناصر الأساسية الداخلة في تركيب

المادة الوراثية والبروتينات وتكوين كلوروفيل وهرمونات من

او كسينات وسايوتوكينات في الخلية الحية ، (٢٠٠٦، *et*

Miyawak al.) . والمعروف عن غاز النيتروجين

الجوي N_2 (الجزئي) انه غاز خامل غير فعال و عملية

تثبيته يقصد بها اختزاله وتحويله الى الشكل الفعال بصورة

امونيوم وبمساعدة انزيم Nitrogenase الناتج من

التعبير الجيني لثلاث جينات من اصل *nif genes*

٢٠ من الجينات المثبتة للنيتروجين Nitrogen

fixation (Freiberg *et al.*,2012;

Latysheva, *et al.*,1997) والمتواجدة في

بعض الكائنات الحية الدقيقة والتي يطلق عليها

(Diazotrophs) ذات الاهمية البالغة في الحفاظ

على دورة النيتروجين الكيموحيوية في الطبيعة،علما بان

هذا الانزيم يتكون من نوعين من البروتينات المعدنية النوع

الاول عبارة عن بروتين يحتوي على الموليبدنم والحديد

Mo-Fe-protein ويُشفّر من قبل الجين *nifD* و

الجين *nifK* اما النوع الثاني فهو عبارة عن البروتين

لوب من المزرعة البكتيرية لكل ١٠٠ سم^٣ من الوسط في انابيب اختبار وتم تحضينها ٢٤ ساعة عند درجة حرارة ٣٧ °م في الحاضنة الهزازة بمعدل ٢٠٠٠ دورة /دقيقة ، ثم تم زرعها في اطباق زجاجية حاوية على وسط LB الصلب وحضنت في الحاضنة Growth incubator لمدة ٢٤ ساعة عند درجة ٣٧±١ °م، وحفظت في الثلاجة عند درجة (٤°م) لحين استخدامها في التجارب اللاحقة.

الايوساط الزرعية: Culture Media

وسط المرق المغذي (LB) Medium

: Bertani –Luria

حضرت مكونات وسط المرق المغذي (LB)

كما موضح في الجدول (٣) ثم اكمل الحجم الى ١ لتر بالماء المقطر، ضبط الاس الهيدروجيني على ٧ وعقم الوسط بالمؤصدة تحت ضغط ١ جو ودرجة حرارة ١٢١°م لمدة ١٥ دقيقة ثم صب في اطباق بتري وحفظت في درجة حرارة ٤°م لحين استخدامها (Sambrook,1989).

والتصاق الخلايا وبالتالي تكوين البايوفيلم (Dogsa,2005)

(Wingender and Flemming,2010)، الذي يساعد على ابقاء الخلايا البكتيرية حية في الظروف القاسية (Khan,2011)، كما انه يعمل على تحسين تثبيت النيتروجين التعايشي للبقوليات وله اثار بعيدة المدى ذات انعكاس ايجابي لتحسين خصوبة التربة (Lopez-Garcia et a.,2002b).

تهدف الدراسة الحالية لبيان الاثر التطفيري لثلاثة جينات من نوع nif في بكتيريا *K.pneumoniae* على تكوين الغشاء الحيوي في هذه البكتيريا.

المواد وطرائق العمل:

ظروف تنمية وحفظ البكتريا قيد الدراسة:

Growth Conditions and Maintenance of Bacteria Understudy

زرعت العزلات البكتيرية قيد الدراسة (*Klebsiella pneumoniae*) التي تم الحصول عليها من Prof. Jean-Marc /جامعة Leicester البريطانية وبنوعها العزلة الطافرة Mutant والعزلة غير الطافرة (Wild type) على وسط المرق المغذي LB لغرض تنشيطها باخذ حملة

الجدول (١) مكونات وسط LB .

المكونات	التركيز غرام/لتر
Tryptone	١٠
Yeast Extract	٥
NaCl	١٠
Agar-Agar	٨

وسط المرق الخالي من النيتروجين :-**Nitrogen-free broth (NF)**

حضرت مكونات وسط المرق الخالي من النيتروجين كما في الجدول (2) ثم اكمل الحجم الى ١ لتر من الماء المقطر ، ضبط الاس الهيدروجيني على ٧ وعقم الوسط بالمؤصدة تحت ضغط ١ جو ودرجة

حرارة ٢١ م° لمدة ١٥ دقيقة ثم وزع الوسط على انابيب اختبار بسداد محكم سعة ٣٠ سم^٣ بواقع ١٥ سم^٣ لكل انبوب واستخدمت هذه الانابيب لتنمية البكتريا ومعرفة قدرتها على تثبيت النيتروجين .(Knight and Wilson,1952).

الجدول (٢) مكونات وسط NF

المكونات	التركيز غرام/لتر
Glucose	١٠
K ₂ HPO ₄	٠,٥٢

٠,٤١	KH ₂ PO ₄
٠,٢٠	NaCl
٠,٢٠	CaSO ₄ .2H ₂ O
٠,٠٠٢	Na ₂ MoO ₄ .2H ₂ O
٠,٠٠٥	FeSO ₄ .7H ₂ O
٠,١	MgSO ₄ .7H ₂ O

الكشف عن قابلية بكتيريا *Klebsiella pneumoniae* على تكوين الاغشية الخلوية

(البايوفيلم):

اعتمدت طريقة الباحث Hatkoff وجماعته (٢٠١٢) في الكشف عن قابلية بكتيريا *K. pneumoniae* على انتاج متعدد السكريات الخارجى EPS او مايسمى بالبايوفيلم كما هو موضح ادناه:

• لقع ٥ سم^٢ من وسط LB والوسط الخالي من النيتروجين NF بمقدار ٥ µl من البكتريا الطافرة وغير الطافرة كلا على حدا لمدة ٢٤ ساعة.

•٢ اجري لها نبذ مركزي على سرعة ٨٠٠٠ دورة /دقيقة لمدة ١٥ دقيقة واهمل الراشح وتم الاحتفاظ بالراسب.

•٣ اضيف حوالي ٥ سم^٣ من البفر PBS للراسب ومزجا جيدا بجهاز vortex .

•٤ تم قياس الامتصاصية عند الطول الموجي ٦٠٠ nm مع مراعاة اضافة الدارى لكي نحصل على قراءة تساوي 1.

•٥ حضرت الاوساط الغذائية في ستة انابيب اختبار وعلى النحو الاتي :

• انبوب حاوي على وسط LB (Control) .

• انبوب حاوي على وسط NF (Control) .

• انبوب حاوي على وسط LB ملقح ببكتريا

Klebsiella pneumoniae غير الطافرة

. (Wild type)

• انبوب حاوي على وسط NF ملقح ببكتيريا
Klebsiella pneumoniae غير الطافرة
(Wild type) .

• انبوب حاوي على وسط LB ملقح ببكتيريا
Klebsiella pneumoniae الطافرة
(Mutant) .

• انبوب حاوي على وسط NF ملقح ببكتيريا
Klebsiella pneumoniae الطافرة
(Mutant) .

6 • وضع ٢٠٠ µl من كل عينة (الخطوة ٥) في الحفر
الموجود في طبق بلاستيكي خاص cell
culture cluster مع ملاحظة عمل ثلاث
مكررات لكل عينة، ثم وضع الغطاء على
الطبق .

7 • حضنت العينات لمدة ٢٤ ساعة على درجة ٣٧
°م .

8 • تم التخلص من الاوساط الموجودة في الحفر مع
مراعاة الاحتفاظ بحلقة النمو المتكونة وغسلت هذه
الحفر بجوالي ٢٠٠ µl من البفر PBS مع تحريك
الطبق حركة خفيفة باليد ومن ثم سكب الدارئي
واعيدت عملية الغسل لمرةتين .

9 • وضعت الاطباق في الحاضنة على درجة ٣٠°م
لمدة ٣٠ دقيقة لغرض تجفيفها .

10 • اضيف ٢٠٠ µl من صبغة Crystal Violet
بتركيز ٠,٢ % الى الحفر في الطبق وتركت لمدة ١٥
دقيقة .

11 • غسل الطبق بالبفر ثلاث مرات متتالية للتخلص من
الصبغة، وتركت لتجف لمدة ٣٠ دقيقة تقريبا .

12 • اضيف الاسيتون الممزوج مع ايثانول بنسبة ٢٠:٨٠
الى الحفر .

13 • تم قياس الامتصاصية عند الطول الموجي ٥٩٥
nm .

النتائج والمناقشة:

أظهر طيف الامتصاص كما موضح في الشكل (١)
ان العزلة البكتيرية غير الطافرة والطافرة تمكنتا من انتاج
البيوفيلم على وسط LB ولم يلاحظ وجود فرق معنوي
بينهما، و في الوسط الخالي من النيتروجين (NF)
Nitrogen-free broth (الشكل ٢) تبين فيه ان
العزلة البرية كان لها القدرة على انتاج البيوفيلم في حين
ان العزلة الطافرة لم تتمكن من انتاجه .

يمكن ان يعزى سبب ذلك الى ان استخدام وسط
LB الحاوي على النيتروجين اغنى البكتريا الطافرة

باحثيها النيتروجيني، وجاءت دراسة (Sabra,2008) مدعمة لدراستنا عندما اشارا الى ان اضافة مادة الامونيوم بوصفها المصدر النيتروجيني الافضل زاد من انتاج المادة السكرية (البايوفيلم)، في حين اترعدم توفر المصدر النيتروجيني بالوسط بشكله الميسر كالملاحظ في الوسط الخالي من النيتروجين للبكتريا الطافرة وبشكل سلبي على قدرتها للتشجير لانزيم النيتروجينيز المهم لتثبيت النيتروجين و وبالتالي جعلها غير قادرة على تكوين البايوفيلم.

من الواضح ان هناك حاجة لدراسات طويلة المدى والتي تعد مطلب بالغ الاهمية ينبغي المضي بها قدما على امل التوصل للدور الذي يلعبه السكر المتعدد الخارجي على نمو وتشكل البايوفيلم مثل تاثير الاحماض الامينية والتي أكد عباس واحمد (٢٠١٤) على دورها الكبير في تكوين الغشاء الحيوي لبكتريا *Staphylococcus aureus*.

الشكل (١) مقارنة تكوين الغشاء الحيوي بين العزلة البرية والطاقرة في وسط LB

الشكل (٢) مقارنة تكوين الغشاء الحيوي بين العزلة البرية والطافرة في الوسط الخالي من النيتروجين

Charbonnel, N. , Forestier,C. and Tridon ,A. (2010) . Roles of capsule and lipopolysaccharide O antigen in interactions of human monocyte-derived dendritic cells and *Klebsiella pneumoniae* .J. Infection . Immun., 78(1):210-219.

Flemming, H. C. and Wingender, J.(2010) . The biofilm matrix. J. Nat. Rev. Microbal., 8:623-633.

Freiberg, C.; Fellay, R.; Bairoch, A.; Broughton, W. J.; Rosenthal, A.; and Perret, X. (1997) . Molecular basis of symbiosis between *Rhizobium* and legumes .J. Nature., 387(6631): 394-401.

Hatkoff, W.; . Runco, M. L.; Pujol, C.; Jayatilaka, I.; . Furie, B. M.; Bliska, B. J. and Thanassi, G. D. (2012) . Roles of chaperone usher pathways of *Yersinia pestis* in a murine model of Plague and adhesion to

المصادر:

عباس ، حسين محمود واحمد، محمد فخري (. 2014 تأثير بعض الاحماض الامينية الغشاء

الحيوي (Biofilm) لبكتريا *Staphylococcus aureus*. مجلة ديالى للعلوم

الزراعية6. (2). : 38-27.

Burris, R. H. (1991). Nitrogenases. J. Bio. Chem ., 266: 9339-9342.**Dogsa**, I.; Kriechbaum. M.; Stopar,. D. and Laggne, P. (2005). Structure of bacterial extracellular polymeric substances at different pH values as determined by SAXS. J. Biophys .,89(4): 2711–2720.

Evrard, B.; Balestrino, D.; Dosgilbert, J. L.; Gachancard,J. B.;

transferases and tRNA isopentenyl transferases in cytokinin biosynthesis . J.PNAS ، ١٦٦،٣-١٠٣:١٦٥٩٨

Raymond, J.; Siefert, J . L .; Staples, C.R.; and Blankenship, R.E. (2004) .The natural history of nitrogen fixation . J. Molecular Biology and Envolution., 21 (3): 541-554.

Rehm, B. H. A. (2009). Microbial exopolysacchrides. Varity and Potential Application. In Microbial Production of Biopolymers and Polymer Precursors and Perspectives. Caister. Academic. Norfolk, UK. p. 229-254.

Rosado, A. S.; Duarte, G. F.; Seldin, L.; and Van Elsas, J. D. (1998). Genetic diversity of nifH gene sequences in *Paenibacillus azoto fixans* strains and soil samples analyzed by denaturing gradient gel electrophoresis of PCR amplified gene fragments. J. Appl. Environ. Microbiol., 64(8): 2770-2779.

Rösch, C.; Mergel, A.; and Bothe, H. (2002) . Biodiversity of denitrifying and dinitrogen-fixing bacteria in an acid forest soil. J. Appl. Environ. Microbiol ., 68(8): 3818-3829.

Sabra, W. and Hassan, M.(2008) . exopolysaccharide yield as a kinetic parameter for the statistical optimization of eps production by

host cells. J. Infect. and Immun., 80(10): 3490-35 .

Jenkins, B. D.; Steward, G. F.; Short, S. M.; Ward, B. B.; and Zehr, J. P. (2004). Finger printing diazotroph communities in the chesapeake bay by using a DNA macroarray. J. Appl. Environ.Microbiol., 70: 1767-1776.

Khan, F.; Shukla, I.; Rizvi, M.; Mansoor, T. and Sharma, S. C. (2011) . Detection of biofilm formation in *Staphylococcus aureus* . Does it have a role in treatment of MRSA infection . J. Trends Medical. Res., 6:116-123.

Latysheva, N.; Junter, V.L.; Palmer, W.J.; Codd, G. and Baker, D. (2012). The evolution of nitrogen fixation in cyanobacteria. J. Bioinformatics., 28 (5) 603-606.

Lopez-Garcia, S.L.; Vazquez ,T.E.E; Favelukes, G and Lodeiro, A.R. (2002) .Rhizobial position as a main determinant in the problem of competition for nodulation in soybean. J. Environ . Microbiol ., 4: 216-224.

Miyawak ,K ؛ Tarkowski ،P.؛ Kitano, M.M; Kato, T.; Sato, S ؛ Tarkowska ، D ؛ Tabata, S ؛ Sandberg , G. and Kakimoto ،T. (2006) . Role of *Arabidopsis* ATP/ADP isopentenyl

Klebsiella pneumoniae. J. Biotechnol ., 7 (1): 27-34 .

Sambrook, J.; Fritgah, E. and Maniatis, T. (1989). Molecular Cloning: A laboratory Manual. Cold spring Harbour laboratory, New Yor.

Wilson, P.W. and Knight, S.C. (1952) . Experiments in Bacterial Physiology. Burguess, Minneapolis, USA. 49.

Yuan, Z. C.; Zaheer, R. and Finan, T. M. (2005) . Phosphate limitation induces catalase expression in *Sinorhizobium meliloti*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Agrobacterium tumefaciens*. J. Mol. Microbiol., 58(3):877-94.

الحساسية المتماحلة للمحسسات لدى مرضى المجاري البولية في محافظة نينوى

أ.د. باسمه احمد عبدالله

م. فرح يونس حسين الخليفة^(*)

الخلاصة

تضمنت الدراسة (51) فردا تراوحت اعمارهم (5-71) سنة ممن راجعوا استشارية المجاري البولية ولديهم اعراض الالصابة بالمجاري البولية. جمعت عينات الادرار وخضعت للفحص المجهري وزرعت على الاوساط الغذائية المناسبة لعزل وتشخيص الجراثيم المسببة لالتهاب المجاري البولية Urinary tract infection (UTI). اجري اختبار الحساسية للمحسسات باجراء اختبار الجلد وقدر تركيز IgE بطريقة ELISA.

أظهرت النتائج ان (82.4%) كانوا مصابين بالحساسية والتهاب المجاري البولية و(17.6%) غيرمستجيبين للحساسية والمجاري البولية وكانت النساء أكثر إصابة من الذكور وسكان الريف أكثر إصابة من سكان المدينة وان اعلى نسبة استجابة للمحسسات كانت لنوعي حلم الغبار المنزلي *Dermatophoides Farinae* ، *Dermatophoides Pteronyssinus* وكانت أكثر البكتريا المعزولة من المصابين بالتهاب المجاري البولية والحساسية هي *Staphylococcus aureus* ، *Escherichia coli* ، *Proteus mirbilis* ، *Pseudomonus aerogenossa* ، *pnemoniae Klebsiella* كما واظهرت النتائج ارتفاع نسبة الاجسام المضادة من نوع IgE لدى الاشخاص المصابين بالتهاب المجاري البولية والحساسية؟

الكلمات المفتاحية: التهاب المجاري البولية، الحساسية المتماحلة، المحسسات.

(*) البحث مستل من رسالة الماجستير للباحث الاول.

Atopic Allergy to Allergens, of Patient Urinary Tract Infection in Ninevah Governorate

Farrah Y. H. Z. Al-Khalifa

Prof. Dr. Basima A. A. Ellias

SUMMARY

The study included (51) persons whose ages between 5 and 71 year who has registered the UTI department showing symptoms of UTI. Samples of the urine were subjected to general urine examination. Appropriate media were used to isolate and identify bacteria causing UTIs. Checked the skin test to allergens.

The result apparent that (42%) exhibited allergies and UTI and (17.6%) don't response to allergic and UTI.

The UTIs among allergies was more common in women than in men. The highest allergy response was to two species of mites namely, *Dermatophagoides farinae* and *Dermatophagoides pteronyssinus* and there more bacteria isolated. The result appear that increase total IgE.

وتحدث الاستجابة وهي بذلك مستضدات. وصف

الهستامين (Histamine) من قبل الباحثان Laidlaw و Dale في سنة (1910) حيث

لاحظ انه يسبب تقلص العضلات في الجسم، واصبح واضحاً ان ليس فقط الهستامين هو مادة كيميائية

تتحرر من الخلايا البدنية التي وصفت من قبل الباحث Paul Ehrlich حيث تم التعرف على الصفات

الاساسية للخلايا البدنية (Roitt et al., 2001). كما وصفت ميكانيكية الحساسية من قبل

Praustnitz و Kustner في سنة (1921)

المقدمة

تعد الحساسية من الامراض المنتشرة والاكثر شيوعاً في كافة انحاء العالم، حيث يتعرض الكثير من الاشخاص لامراض الحساسية المتنوعة، وان نسبة الاصابة بها اصبحت في تزايد مستمر (AAAA-I, 2003; Roitt et al., 2001).

ان الحساسية هي رد فعل الجسم تجاه المحسسات حيث يعتبر الباحث Von pirauet في سنة (١٩٠٦) اول من استخدم هذا المصطلح للتعبير عن كون هذه المحسسات هي مواد غريبة تدخل الجسم

(Bethesda, 2002; Bacheller and .Bernstein, 1997)

لقد وجد ان جرثومة *E. coli* مسؤولة عن ٩٠% من حالات الـ UTIs التي تحدث لدى الاشخاص الذين لا يعانون من اختلال في المجاري البولية من ناحية التركيب والوظيفة، تليها *Staph. saprophyticus* حيث كانت نسبتها (١٠-٢٠%) من هذه الاصابات كذلك *Staph. aureus*، اما في التهابات المجاري البولية المعقدة الناتجة عن وجود اختلال في التركيب والوظيفة للمجاري البولية فان المسببات الشائعة هي *E. coli* و *K. pneumoniae* و *P. mirabilis* والتي تسبب الحصوات البولية و *Strept. Pseudo.* و *Candida aeruginosa* كذلك تسبب خمائر *Candida albicans* التهاب المجاري البولية عند مرضى السكري، ويعتبر كل من *K. pneumoniae* و *Pseudo. aeruginosa* مسؤول عن UTI الناتجة من عدوى المستشفيات (Bethesda, 2002).

تعتبر حساسية المجاري البولية (Urinary tract allergy) نوعاً من انواع الحساسية، وهي حالة نادرة تصيب المجاري البولية وتوصف بحدوث تكرار في الادرار والم في التبول والزحير المثاني الذي

فقد اوضح Praustnitz ان الحساسية يمكن ان تنتقل من شخص الى اخر عبر المصل، وان المسؤول عن هذه الظاهرة هو عامل موجود في المصل ولم يعرف هذا العامل إلا في سنة (1967) في امريكا والسويد، ولقد عرف بانه IgE في سنة (١٩٧٠) من قبل الباحث (Miller et al., Ishizaka 1991).

تعتبر الحساسية من الامراض الحيرة والمربكة لكل العلاجات والادوية كما يظهر بعض الأشخاص استجابة لها وبعضهم لا يظهروا ذلك، بالإضافة الى تداخل امراض الحساسية مع غيرها من الامراض وارتباط تطورها بالعوامل الوراثية والبيئية (Prescott, 1996; Dey, 2001).

تمثل UTIs مشكلة صحية عامة للمجتمع حيث تصيب الملايين كل سنة فضلاً عن التكاليف المادية الباهظة المطلوبة للشخص والعلاج التي بلغت ٩ بليون دولار سنوياً في أمريكا، وتعتبر أحد أكثر الامراض شيوعاً في المجال الطبي وتأتي بالدرجة الثانية بعد التهابات المجاري التنفسية العليا، حيث تصل الاصابة بـ UTIs إلى أكثر من (٨,٣) مليون اصابة، وان نسبة الوفيات عالية حيث تشير البحوث الى ان ما يقارب ٧ مليون مريض يقعون ضحية UTIs

ولقد أدى انتشار الحساسية بشكل واسع في شتى أنحاء العالم إلى التوجه لدراسة الحساسية ولاغرو في ذلك ان هدفت الدراسة ولأول مرة في العراق إلى التحري عن الاصابة بالحساسية لدى المصابين بال UTI، عزل وتشخيص الانواع الجرثومية المسببة لل UTI، ومعرفة امراض الحساسية ذات العلاقة بال UTI.

المواد وطرائق العمل

تم اختيار (٥١) شخصاً من الذين راجعوا الاستشارية البولية لنفس المستشفى، ويعانون من التهاب المجاري البولية (Urinary tract infection) واجري لهم اختبار الجلد للتأكد من إصابتهم أو عدم إصابتهم بالحساسية. أخذت عينات الادرار والدم من كلا الجنسين وباعمار مختلفة تراوحت بين (٥-٧١) سنة، ودونت المعلومات عنهم.

عزل الاحياء المجهرية من عينات الادرار

جمعت عينات الادرار في الصباح لانه افضل وقت جمع لاجراء التحليل الروتيني عليه، حيث يكون الادرار في اعلى تركيز بمكوناته من أي وقت اخر. تم اخبار المريض على ضرورة جمع الادرار الوسطي (Clean-catch Midstream urine) الذي يعد اقل تلوثاً كذلك غسل اليدين والمنطقة واعطي للمريض حاويات نظيفة

يعني بانه احساس ملح بضرورة التبول ولكن من غير القدرة على ذلك، الأم متعددة ومستمرة على المثانة وبشكل خاص البييلة المخاطية والوذمة المتحسسة انواع من الالام المزعجة التي تجعل المريض يرقد في المنام لمدة اشهر (Frazier, 1978). ان الوظيفة الاساسية للجهاز البولي هو التخلص من أية مواد غير مرغوب فيها اذ ما وجدت تسبب مشاكل عديدة للجسم وان الاعراض العامة لاصابة المثانة والاحليل هو الاحاح هو تكرار التبول للتخلص من البول وهذه اعراض شائعة لحساسية الغــــذاء (Health and Age, 2003; Alpha ENF, 2003)

أوضحت دراسات عديدة اسباب وتأثير العلاقة ما بين سلس البول او تدفقه لا اراديا و UTI وكذلك الحساسية وسلس البول وان المثانة تصبح هدفاً للمحسسات بانواعها المستنشقة والمهضومة وتسبب تشنج وانقباض وتقلص وقلة وظائف المثانة واستيعابها فضلاً عن ان الانقباض والتقلص للعضلات يؤدي إلى ارخاء او تراخي الاحليل الاقرب Proximal urethra ويؤدي ذلك الى حدوث سيل البول واصابات المجاري البولية (Frazier, 1978; Siegel et al., 2001).

شركة Biomereix الفرنسية والمخففة بنسبة (1:1000.000) في الفينول، اذ حقنت كمية (٠,٠٥) سم^٣ من كل مستضد باستخدام حقن طبية (Tuberclean) حجم (١) سم^٣ وقياس (٠,٥) × (٢٦) انج بعد تعقيم منطقة الحقن بالكحول الايثيلي (٧٠%) وتجنيفها جيداً .

استخدم في الاختبار محسسات تضم الانواع الشائعة والقياسية المستخدمة في اختبار حساسية الجلد في الاستشارية الطبية الحساسية وحسب توصيات منظمة الصحة العالمية (WHO, 2000)، كما اجريت طريقة Prick باستخدام المحسسات الغذائية المتوفرة، حيث وضعت نفس كمية المستضد (٠,٠٥) على الجلد وباستخدام المحقنة تم ادخال المستضد .

المواد او المحسسات المستخدمة في اختبار الجلد
Allergens

يوضح الجدول (١) انواع المحسسات

المستخدمة قيد الدراسة .

معقمة ومحكمة الغطاء، لحفظ عينة الادرار بداخلها مع تنبيه المريض بضرورة احكام غطاء الحاوية بعد جمع العينة للحفاظ عليها من التلوث (Collee et al., 1996; Vandepitte et al., 1991). نقلت عينات الإدرار بعد جمعها مباشرة الى المختبر، وخلال فترة اقل من ساعتين عملت مسحات وصبغت بصبغة كرام لملاحظة وجود الجراثيم، زرعت على وسط اكار الدم (Blood agar) وعلى وسط الماكونكي (MacConkey agar)، وحضنت في درجة حرارة (٣٧) م^٥ ولمدة (٢٤-٤٨) ساعة، وبعدها تم حساب عدد المستعمرات على الوسط، (Cruickshanke et al., 1975) ثم زرعت على موائيل الأكار المغذي واکار الدم، وحضنت في درجة حرارة (٣٧) م^٥ ولمدة (١٨-٤٨) ساعة، وحفظت في الثلاجة لحين اجراء الفحوصات التشخيصية (Vandepitte et al., 1991).

اختبار حساسية الجلد Skin Test

اجري اختبار حساسية الجلد بطريقة الحقن

تحت الجلد، باستخدام المستضدات القياسية من انتاج

الجدول (١) انواع المحسسات المستخدمة في الدراسة الحالية .

المحسس	الاسم الشائع	الاسم العلمي
- غبار المنزل	House dust (HD)	Holister Stire

الاسم العلمي	الاسم الشائع	المحسس
<i>Dermatophagoides pteronyssinus</i>	House dust mites (HDM) (DP) &	- حلم الغبار المنزلي ويحوي نوعين
<i>Dermatophagoides farinae</i>	(Df)	
<i>Cynodon dactylon</i>	Bermuda grass	- حشائش Bermuda
	Grass mixture (5 grasses)	- أعشاب Grasses
<i>Anthexanthum odoratum</i>	Sweet vernal grass	
<i>Dactylis glomerata</i>	Orchard grass	
<i>Lolium perenne</i>	Rye grass	
<i>Phleum pratense</i>	Timothygrass	
<i>Poa pratensis</i>	Meadow grass	
<i>Artemisia vulgaris</i>	Mug wort	الشيج Mugwort
<i>Plantago lanceolata</i>	Plantain	لسان الحمل Plantain
<i>Chenopodium album</i>	Fathen or lambsquarters	رجل الازرق Chenopodium
	Feather	الريش Feather
	Wool	الصوف Wool
		أربع مجاميع من الفطريات
<i>Penicillium mixture</i> <i>Aspergillus mixture</i> <i>Cladosporium</i> <i>Alternaria</i>		M1 فطريات النوع الاول المجموعة الاولى
<i>Botrytis</i> <i>Mucor</i> <i>Rhizopus</i> <i>Stemphylium</i>		M2 فطريات النوع الثاني المجموعة الثانية
<i>Furasium</i>		M3 فطريات النوع الثالث

المحسس	الاسم الشائع	الاسم العلمي
المجموعة الثالثة		<i>Chaetomium</i> <i>Neurospora</i> <i>Pullularia</i>
فطريات النوع الرابع M4		<i>Helminthosporium</i>
المجموعة الرابعة		<i>Epicoccum</i> <i>Trichothecinm</i>
أشجار النوع الاول	Beech خشب الزان	<i>Fugus sylratica</i>
	Chestnut خشب الكستناء	<i>Castaneq vulgaris</i>
	Oak اشجار البلوط	<i>Ouercus robur</i>
اشجار النوع الثاني T2	Mediterranean	
	Or Oleaceae	
	Cypress خشب السرج	<i>Cupressus sempervirens</i>
	Muberry	<i>Morus alba</i>
	Olive شجرة الزيتون	<i>Olea europaea</i>
	Privel	<i>Ligustrum vulgare</i>
اشجار النوع الثالث T3	Betulaceae	
	Alder شجر جار الماء	<i>Alnus glutinosa</i>
	Birch خشب التبولة	<i>Betula alba</i>
	Hazel شجر البندق	<i>Corylus avellana</i>
	Hornbean قرن الفاصوليا	<i>Carpinus betulus</i>
المحسسات الغذائية:	قهوة، سبانخ، بصل، سمك، مكسرات، تفاح، برتقال، دجاج، فول سوداني، باقلاء فرنسية، باذنجان، حبوب، بيض، بطاطا، كاكاو، موز، شعير والجوكليت	

تحديد تركيز الكلوبولين المناعي IgE الكلي في الدم بطريقة اليزا (غير المباشرة)

(Indirect immuno sorbent assay)

- جمعت عينات دم من جميع الأفراد وذلك عن طريق سحب الدم باستخدام محقنة طبية سعة (٥) سم^٢ من الوريد الرأسي (Cephalic vein) او الوريد الملكي (Basilic vein)،
- اجري العمل بها بالاعتماد على ادمصاص المستضد على سطح حفرة البولي ستيرين وبعد التحضين غسل الفائض من المستضد غير المدمص ثم أضيف مصل الاختبار إلى الحفر لكي تتحد الاضداد مع المستضدات المتخصصة لها، ثم أزيل الفائض من مصل الاختبار ثم الكشف عن الاضداد باضافة مضاد الكلوپولين المعلم بالانزيم وباستخدام مولد الصبغ (Chromagene) وعند التفاعل يكون ناتجاً ملوناً تناسب شدة لونه طردياً مع كمية الانزيم المرتبط بمضاد الكلوپولين والذي بدوره يناسب طردياً مع كمية الاضداد المستخدمة مع المستضدات، قيس اللون المرئي بوساطة جهاز الطيف الضوئي الدقيق Micro spectrophotometer وقد استخدمت في البحث عدة عمل جاهزة من قبل شركة Biomagrab الفرنسية.
- طريقة العمل :**
- أضيف (١٠٠) مايكروليتر من الدارئ المعير إلى كل حفرة من حفر طبق البولي ستيرين.
- أضيف (٢٠) مايكروليتر من المحلول القياسي، محلول السيطرة، وعينات المصل الى الحفر وكما يأتي:
- أضيف إلى الحفر A₁ و A₂ (٢٠) مايكروليتر من المحلول القياسي بتركيز (٠)، ثم أضيفت بقية الحاليل القياسية الى الحفر B₁ و C₁ إلى H₁ على التوالي حسب تركيز الحاليل من (٥-٥٠٠).
- غطي طبق البولي ستيرين بغطاء بلاستيكي، واجري له طرد مركزي بسرعة (٣٠٠٠) دورة/دقيقة (هزاز افقي) وحضن في حاضنة لمدة (٩٠) دقيقة بدرجة حرارة (٣٧)م^٠.
- سحب السائل غير الملتصق من كل حفرة، وأضيف (٣٠٠) سم^٢ من محلول الغسل، وكررت العملية ثلاث مرات، وترك الطبق ليستقر لمدة دقيقة واحدة.
- أضيف (١٠٠) مايكروليتر من سائل الاقتران (Conjugate).
- غطي الطبق بغطاء بلاستيكي، وحضن لمدة (٩٠) دقيقة في درجة حرارة (٣٧)م^٠.
- حضر محلول مولد الصبغة في وعاء زجاجي نظيف وذلك باذابة حبيبة واحدة pNPP في

الجدول (٢) يوضح نتائج الاختبارات الكيمياءحياتية المستخدمة في تشخيص الجراثيم المعزولة.

TSI		اختبار التجلط	اختبار اليوريز	اختبار الحركة	IMVIC				اختبار الاوكتيديز	اختبار الكاتاليز	الاختبارات الكيمياءحياتية الانواع الجرثومية
B/S	H ₂ S				السترات	فوكس بروس كدر	المثيل الاحمر	الاندول			
A/A	-	/	-	+	-	-	+	+	-	+	E. coli
/	/	+	/	/	/	/	/	/	-	+	Staph. aureus
/	/	-	+	/	/	/	/	/	-	+	Staph. Saprophyticus
/	/	-	/	/	/	/	/	/	-	+	<i>Staph. epidermidis</i>
A/k	-	/	+	-	+	+	-	-	-	+	K. pneumoniae
/	/	/	/	/	/	/	/	/	-	-	<i>Strept. faecalis</i>
A/k	+	/	+	+	+	-	+	-	-	+	<i>P. mirabilis</i>
A/k	+	/	+	+	+	-	+	+	-	+	<i>P. vulgaris</i>
A/k	-	/	+	-	-	-	+	+	-	+	<i>M. organii</i>
k/k	-	/	+		+	-	-	-	+	+	<i>Pseudo. aeruginosa</i>

+ موجب (A) Triple Sugar Iron Agar (TSI) Acid

- سالب (B) Alkaline (K) Butt

/ لم يجر الاختبار (S) Different (D) Slant

احتمالية ($p < 0.05$)، ويعزى السبب الى كون الاناث أكثر عرضة للاصابة بالحساسية نتيجة التعرض المستمر داخل المنزل للمحسسات المختلفة الناتجة من العمل المنزلي والتعرض للغبار وحبوب الطلع في حديقة المنزل والمحسسات الفطرية المتواجدة داخل الغرف ومع الاغذية وفي المناطق الباردة والرطوبة من المنزل مثل السرايب.

يبين الجدول (٣) النسب المئوية للمستجيبين وغير المستجيبين من الذكور والاناث المصابين بـ UTIs ، حيث بلغت نسبة المستجيبات للحساسية (٧٨,٦%) والمستجيبين (٢١,٤%) بينما لدى غير المستجيبين للحساسية فان نسبة الاناث (٤٤,٤%) والذكور (٥٥,٦%)، حيث ان استجابة الاناث أكثر من الذكور في حالة وجود الحساسية مع UTIs، حيث ظهر فرق معنوي بين الذكور والاناث عند مستوى

الجدول (٣) العلاقة بين الاستجابة للمحسسات مع الجنس والسكن والمهنة لافراد السيطرة الموجبة.

المهنة		السكن				الجنس*		الافراد المصابين بـ UTIs				
		مدينة		ريف		انثى						ذكر
غير موظف	موظف	عدد	%	عدد	%	عدد	%	عدد	%	عدد	%	
٥٢,٤	٢٢	٤٧,٦	٢٠	٨٥,٧	٣٦	١٤,٣	٦	٧٨,٦	٣٣	٢١,٤	٩	المستجيبين للحساسية (n=42)
٣٣,٣	٣	٦٦,٧	٦	٤٤,٤	٤	٥٥,٦	٥	٤٤,٤	٤	٥٥,٦	٥١	غير المستجيبين للحساسية (n=9)
٤٩,٠	٢٥	٥١,٠	٢٦	٧٨,٤	٤٠	٢١,٦	١١	٣٨,١	٣٧	٦١,٩	٦٠	المجموع الكلي (n=51)

المدينة (٨٥,٦%) بينما الريف (١٤,٤%) اما في حالة الاشخاص غير المصابين بالحساسية فان نسبة استجابة سكان المدينة (٤٤,٤%) والريف (٥٥,٦%) ان ارتفاع نسبة استجابة سكان الريف لدى غير المستجيبين للحساسية والمصابين بالـ UTIs ويعود

ويبين الجدول (٣) ايضا علاقة السكن مع الاصابة بـ UTIs والحساسية حيث ظهر فرق معنوي عند مستوى احتمالية ($p = 0.001$) في حالة الاستجابة للحساسية فان استجابة سكان المدينة أكثر من سكان الريف اذ بلغت نسبة استجابة سكان

كذلك يبين الجدول (٣) النسب المئوية للمستجيبين للحساسية وغير المستجيبين من الموظفين وغير الموظفين حيث ظهر ان نسبة غير الموظفين من المستجيبين للحساسية (٥٢,٤%) بينما لدى الموظفين (٤٧,٦%) وفي المستجيبين للحساسية كانت نسبة الموظفين (٦٦,٧%) اما غير الموظفين (٣٣,٣%) ولم يظهر فرق معنوي بين المستجيبين وغير المستجيبين للحساسية على الرغم من انه في حالة غير المستجيبين والمصابين بـ UTIs فقد كانت نسبة الموظفين أكثر من غير الموظفين ويعود السبب الى طبيعة العمل الذي يقوم به الشخص فقد يكون الشخص يعمل في مختبرات معرض للاصابة بالجراثيم كذلك الاجهاد في العمل والضغط على المئات نتيجة الجلوس ساعات طويلة وعدم تفريغ المثانة المنتظم.

يبين الشكل (١) الفئات العمرية للمستجيبين للحساسية وغير للمستجيبين من افراد السيطرة الموجبة وظهر ان الفئة (٢١-٤٥) سنة كانت اعلى في المصابين بـ UTIs مع الحساسية إذ بلغت النسبة (٨٧,٥%) اما غير المصابين بالحساسية فقد كانت (١٢,٥%) تليها الفئة العمرية الثانية إذ بلغت نسبة الاشخاص المصابين بـ UTIs مع الحساسية (٨٥,٧%) وفي غير المستجيبين للحساسية (١٤,٣%) اما الفئة العمرية الاولى فان المستجيبين للحساسية

ذلك إلى انعدام الوعي الصحي لدى سكان الريف مقارنة بالمدينة وقلة الاهتمام بالنظافة مما يؤدي الى اصابات المجاري البولية بشكل كبير بالإضافة الى اختلاف طبيعة التغذية والعادات وغير ذلك. يعود هذا الاختلاف في الاستجابة للمحسسات بين سكان الريف والمدينة الى طبيعة معيشة اهل الريف وتكيفهم للتعرض للمحسسات منذ الصغر وابتعاد اهل المدينة عن هذه المحسسات ولكن زيادة التلوث في المدينة نتيجة كثرة المصانع والمعامل ربما ادى الى حدوث هذا الاختلاف، ولقد اشار الباحث العاني في سنة (٢٠٠٢) في دراسة اجراها على افراد من سكة مدينة الموصل حيث ظهر لديه اختلاف وفرقا معنويا في نسبة الاستجابة بين سكان الريف والمدينة اذ كانت نسبة الاستجابة في سكان المدينة (٦٢,٩%) بينما في الريف (٣٧,١%)، كما اشار الباحث Riedle واخرون في سنة (٢٠٠٠) الى ان الاصابة بمجمي الكلا والتهاب الاغشية الانفية والربو قليلة في سكان الريف مقارنة مع سكان المدينة وبذلك فان طبيعة وزيادة التعرض للمحسسات يزيد من التحسس ومن دخول المحسسات الى جسم الشخص وبالتالي الاصابة بامراض الحساسية المختلفة التي تؤدي عند الكثير من الاشخاص إلى الاصابة بـ UTIs.

كانت نسبتهم (٢٥%) في حين ان غير المستجيبين للحساسية كانت النسبة (٧٥%).

الشكل (١) النسبة المئوية للمستجيب للحساسية وغير المستجيبين ضمن الفئات العمرية للأفراد المصابين بال UTIs

بين الشكل (٢) نسبة الاستجابة للمحسسات من المصابين ب UTIs و المستجيبين للحساسية حيث يظهر من الشكل ان اعلى نسبة استجابة لحسس حلم الغبار المنزلي وخاصة النوع Derp بلغت (٣٥,٧%) ثم Derf والریش (٢١,٤%) والاعشاب (١٩,٠%) وM4 والغبار المنزلي (١٤,٣%) و M3 (١١,٩%) و T2 (٩٥,٥%) وإن كلامن حشائش البرمودا ونبات لسان الحمل ونبات الشيح و T3 و T1 و M1 بنسبة (٧,١%) ثم M2 ونبات رجل الاوز (٤,٨%) والصوف (٢,٤%) حيث كانت هذه النسبة مشابهة لما ظهر .

اظهر الباحث العاني في سنة (٢٠٠٢) ان اعلى نسبة استجابة كانت في الفئة العمرية (٢١-٤٠) سنة بلغت (٤١,٢%) كذلك الباحث Al-Taie في سنة (٢٠٠٢) اوضح ان اصابات الحساسية بالرئوب كانت في الفئة العمرية (٢٠-٣٤) سنة وبنسبة استجابة بلغت (٥٧,٩%).

اظهر الباحث Barbee واخرون في سنة (١٩٨٧) ان اعلى نسبة استجابة للمحسسات كانت في الفئة العمرية (٢٥-٣٤) سنة بينما قلت بعد سن ال ٥٥ وهذا ما توصلت اليه الدراسة الحالية ايضا .

بالبكتريا والفطريات التي ربما تكون عاملا اضافيا لحدوث الاصابة عند انتقالها مع المحسس نفسه إلى الجسم وقد تكون المحسسات الاخرى كالريش والصوف وحبوب الطلع والاعشاب والاشجار والبذور نفسها ملوثة بالبكتريا والفطريات قد دخل الجسم معها وتحدث الاصابة بالم UTIs (منظمة الصحة العالمية، ١٩٨٧; Sties, 1994).

تجسد العلاقة بين المحسسات والم UTIs في نواحي عديدة منها ارتفاع نسبة الاستجابة لحلم الغبار المنزلي المسبب الرئيس للربو وارتشاء الانف ربما يصاحبه حدوث اصابة بالم UTIs نتيجة لاحتواء براز حشرة حلم الغبار المنزلي على كثير من البكتريا والفطريات التي قد تدخل الجسم مع المحسس وتحدث الاصابة. كما ان الغذاء الرئيس للحشرة هو الفطريات الجلدية، وكذلك تعرض الحشرة نفسها للاصابة

الشكل (٢) نسبة ظهور المحسسات لدى الاشخاص المصابين بالم UTI والمستجيبين للمحسسات.

نسبة الاصابة بارتشاح الانف (٤٥,٢%) والربو فكانت (٥٢,٤%) والاكزيما (١٦,٧%) والشري (١١,٩%)

يبين الشكل (٣) نسبة ظهور امراض الحساسية لدى المصابين بالم UTIs والمستجيبين للحساسية في أفراد السيطرة الموجبة، حيث ظهرت

هذه الادوية حيث ان بعضها اذا ما وجدت مع مادة غذائية تسبب تكوين معقدات تحدث الحساسية (بيسيرت، ١٩٩٠)، وان قلة الاصابة بالشري وخاصة غير المتعلقة بالحساسية فقد يكون نتيجة الحرارة او البرودة كما اشار الباحث Abingdon في سنة (2003) إلى ان الشري هو اصابة فيسيولوجية مسببة لحساسية العيون نتيجة ارتباط المحسس مع غشاء العين Eyelide membrane محدثاً احمرارا وحكة فيها وتعتبر اقل شيوعاً من الربو وارتشاح الانف والتهاب الجلد المتماحل .

وحساسية العيون (٢,٤%) وحساسية الغذاء (٨١,٠%) وحساسية الادوية (٣٥,٧%) .

يعد ارتشاح الانف من أكثر امراض الحساسية انتشاراً وشيوعاً حيث يصاب (٣٥) مليون امريكي به وربما يعود ذلك حالياً إلى زيادة تلوث البيئة وكثرة المعامل والمصانع وما تنتجه من الحجرة ومواد بالاضافة إلى زيادة تعرض ربات البيوت لحلم الغبار المنزلي بينما التهاب الجلد المتماحل اقل شيوعاً (AAAAI, 2003; Rogers, 2003; Roitte, 2001). اما حساسية الغذاء فانها منتشرة بكثرة ولكن يصعب تشخيصها ومعالجتها . كذلك ازدياد حساسية الادوية نتيجة سوء استخدام

الشكل (٣) نسبة ظهور امراض الحساسية لدى الاشخاص المصابين بال UTI والمستجيبين للحساسية .

الأدرار والمسا أثناء التبول ويؤدي إلى الـ UTIs (Frazier, 1978). اشار الباحث Jenner في سنة (٢٠٠٣) إلى ان المصابين بالربو أو حساسية الجلد أو ارتشاح الأنف لديهم حساسية للغذاء مثل الرز والحنطة والبطاطا كما اشار الباحث Reddy في سنة (٢٠٠٠) إلى ان حساسية الجلد المتماحل تحدث لوحدها ولكن يبدو ان بعض المشاكل من حساسية الجلد تتطور لدى الاطفال مجدوث اصابات الربو وحساسية الجهاز التنفسي .

Abdullah, A. and Chani, M. (1986). Estimation of total serum IgE. in normal Iraqi subjects J. Fac. Med. , 2, 3.

Alpha ENF Alpha Nutrition Information (2000). Chronic and Interstitial cystitis, www.healthworks.com.

Bacheller, C.D. and Bernstein, J.M. (1997). Urinary tract infection. Med. Clin. North. Am. 81(3): 719-730.

Bethesda, A. (2002). Urinary tract infection in adults. NIH Publication No. 02-2097.

Collee, J; Fraser, A.; Marmion, B. and Simmons, A. (1996). Practical Medical Microbiology. 14th, ed. Churchill Livingston Inc., New York, pp. 84-90, 361-381.

Cruickshank, R.; Duguid, J.; Marmion, B. and Swan, R.

ان امراض الحساسية ذات علاقة مع اصابات الـ UTIs ومع بعضها البعض حيث ظهرت علاقة معنوية بين الحساسية بارتشاح الانف مع الربو وقيمة $r = 0.395 - P > 0.0001$ وظهر علاقة معنوية بين حساسية الجلد والربو حيث $r = 0.144$ والربو مع ارتشاح الانف $r = 0.187$. اشار الباحث Oggero في سنة (١٩٩٤) إلى ان اصابات حساسية الجلد المتماحلة تعتبر اكثر العوامل خطورة لحصول التهابات المجاري البولية كما ان الربو وارتشاح الانف يسبب تكرار

المصادر

العاني، يزن مهلب (٢٠٠٢) . الحساسية المتماحلة لبعض الحساسات والعفنيات وغيرها السائدة في محافظة نينوى وعلاقتها بمستوى الضد E وبعض المتغيرات الأخرى، رسالة ماجستير، كلية العلوم، جامعة بغداد .

نشرة منظمة الصحة العالمية (١٩٨٧) . مستأرجات سوس الغبار ومرض الربو . مشكلة ذات انتشار عالمي . المكتب الاقليمي لشرق البحر المتوسط .
الجلد الاول، الصفحات ١-٣٣٢ .

AAAA-I American Academy of Allergy Asthma & Immunology (2003). Indoor Allergens. <http://www.Aaaa.org>.

- disease, and environmental control. *J. Immunol.*, 2: 100-150.
- Prescott, L.M.; Harley, J.P.; and Klein, D.A. (1996). *Microbiology*, 3rd ed., W.M.C. Brown Publishers London, pp. 656-669.
- Rogers, R. (2003). Colloidal silver for rhinitis. <http://www.atopiasilver.com>.
- Roitt, I.; Brostoff, J. and Mal, D.(2001). *Immunology*. 6th ed., Harcourt Publishers Limited, 6th edition, pp. 323, 324, 325, 326, 329, 333, 334, 335.
- Roitt, I; Brostoff, J and Mal, D. (1998). *Immunology*. 5th ed., Mosby International Limited, London, pp. 301-314.
- Siegel, S.; Riwitt. L.; Sokoloff , B. and Isigel, B. (2001). Relationship of allergy. Enuresis and urinary infection in children 4 to 7 year of age. *Peditrics* 57(4): 552-553.
- Stites, D.P; Terr, A.I. and Parslow, T.G. (1994). *Basic and Clinical Immunology*. Appleton and Lange, pp. 314-346, 339-342, 370.
- Vandepittle, J.; Engbaek, K.; Piot, P. and Heuck, C.C. (1991). *Basic laboratory procedures in clinical bacteriology*. World Health Organization, Geneva, pp. 31-33, 92.
- (1975). *Medical Microbiology*. 2nd ed., *Practice of Medical Microbiology*. 12th ed., Churchill Livingstone, Edinburg, pp. 184, 403, 429-438.
- Dey, L.P. (2001). How allergies affect the body? <http://www.ep.pen.com>.
- Frazier, C.A. (1978). *Current Therapy of Allergy*. 2nd ed., Henry Kimpton Publishing, pp. 403-404, 446.
- Health & Age (2003). Allergic rhinitis (Hay fever and Rose fever) and chronic nasal congestion, <http://www.novatisfoundationforgerontology.com>.
- Koneman, E; Allen, S; Jana, W.; Schreckenberger, P. and Winn, W. (1997). *Color Atlas and Textbook of Diagnostic Microbiology*, 5th ed., Lippincott Raven Publishers, pp. 136-142.
- MacFaddin, J.F. (1980). *Biochemical Tests for Identification of Medical Bacteria*. Williams and Wilkins, London, 2nd ed., pp. 346-464.
- Miller, L.E.; Ludke, H.R.; Peacock, J.E. and Tomar, R.H. (1991). *Manual of Laboratory Immunology*. Lea & Febiger, Philadelphia, London, pp. 313-324.
- Norrby, S. (1994). Useful agents in the management of urinary tract infection. *Inter. J. of Antimi. Agents*, 4(2): 129.
- Plats-Mills, T.A.E. and Chapman, M.D. (1989). House dust mites: Immunology, allergy

دور الموت الخلوي المبرمج في خصوبة وعقم الأكياس العدرية في الإبقار والاعنم والمعز الخمجة طبيعيا

حنان صديق سعدون^١، نبيل عناد صالح^١ وانتصار رحيم الكناني^٢

الخلاصة

اجريت هذه الدراسة لمعرفة دور الموت الخلوي المبرمج في عقم وخصوبة الأكياس العدرية من اصل ابقار واعنم ومعز الخمجة طبيعيا بالمشوكات الحبيبية عن طريق عزل الحامض النووي منقوص الاوكسجين من الطبقة المولدة للأكياس العدرية الخصبية والعقيمة باستخدام العدة الجاهزة DNeasy tissue kit المقدمة من شركة QIA GEN واستخدام تقانة الترحيل الكهربائي في هلام الأكاروز ، اذ تم ملاحظة عملية تجزئة الحامض النووي منقوص الاوكسجين بشكل واضح في الأكياس العدرية العقيمة بينما كانت غائبة في الأكياس الخصبية ، كما تم استخدام اختبار التعليم الانزيمي لتل تحديد النسبة المئوية للانوية التي تعاني من الموت الخلوي المبرمج ، فقد ظهرت انوية الطبقة المولدة للأكياس العدرية العقيمة (الإبقار) نسبة اعلى مما هو عليه في الأكياس الخصبية (الاعنم والمعز) ، واستخدم في هذه الدراسة بعض الملونات الخاصة مثل ملون فولجين لتحديد الضرر الحاصل في الحامض النووي منقوص الاوكسجين للأكياس العدرية الخصبية والعقيمة .

The role of programmed cell death in the fertility and infertility of Hydatid cysts in cow, sheep and goats naturally infected

¹H.S.Saadoon, N.E.Salih¹ and E.R.AL-Kennany²

¹Department of Bioblogy ,College of Education for Pure Sciences,²
Department of Pathology and Puoultry Disease , College of Veterinary
Medicicine, Mosul,Iraq

Abstract

This study was carried out to investigate the role of programmed cell death in the infertility and fertility of naturally-occurring hepatic hydatidosis in cow ,sheep and goats by isolating DNA from the fertile and sterile germinal layer using the DNeasy tissue kit prepared by QIA GEN and using the agarose gel electrophoresis technique. The process of fragmentation of the DNA was clearly observed in the sterile cysts while absent in the fertile cysts. The tunel enzymatic test was also used to determine the percentage of the nucleus undergo to programmed cell

death, in the sterile cysts (cow) was higher than in the fertile cyst (sheep and goats). In this study, certain special colors, such as volgyn, were used to determine the damage of oxygen-deficient DNA to fertile and sterile cysts.

ابتلاع بيوض المشوكات الحبيبية التي تنقسم الى جنين سداسي الاشواك اذ يستقر في اعضاء الجسم المختلفة متحولاً الى كيس عدري ، ويبدأ المرض من دون اعراض ويستمر بدون اعراض الى عدة اعوام ، وتعتمد الاعراض والعلامات السريرية على موقع الكيس وحجمه ، ويبدأ المرض عادة في الكبد ولكن يمكن ان ينتشر الى اجزاء اخرى من الجسم مثل الرئتين والدماغ واعضاء اخرى من الجسم (WHO ، ٢٠١٤) ، ويعود السبب في انتشار المرض في العراق الى انتشار الكلاب السائبة ، وذبح الحيوانات خارج المجازر ورمي فضلات ما بعد الذبح دون اتلافها بالحرق خارج المجزرة مما يؤدي الى اكمال دورة الحياة بتغذية الكلاب السائبة عليها (Mahmoud ، ١٩٨٠) . وتختلف نسبة تطور الكيس باختلاف المضيف الوسطي ونوع الطفيل ، ويعتمد تطور الرؤيسات الاولية على تكاثر محافظ الحضنة brood capsules من الطبقة الجرثومية germinal layer في تجويف الكيس اذ لوحظ لاسباب مجهولة ان قسماً من الاكياس تكون عقيمة infertile ولا تنتج رؤيسات اولية وبذلك ينهي الطفيل دورة الحياة

المقدمة

داء الاكياس العدرية Hydatid cystic disease او داء المشوكات الكيسي Cystic echinococosis من الامراض الطفيلية المشتركة بين الانسان والحيوان التي تحدث الكثير من المشكلات الصحية والاقتصادية الخطيرة على مستوى الانسان والحيوان (McManus) واخرون ، 2003 ؛ Samad Mosaddeghi واخرون ، ٢٠١٤) وهو من الامراض المتوطنة في العراق وينتشر بشكل واسع بين الاعمار جميعها وفي الجنسين كليهما (الكفاني واخرون ، ٢٠١١) . ويتسبب داء الاكياس العدرية عن الاصابة بالطور اليرقي للمشوكة الحبيبية *Echinococcus granulosus* ، المضيف النهائي لهذا الطفيل هو آكلات اللحوم التي تعود للعائلة الكلبية، تتواجد الديدان البالغة لطفيل المشوكات في الامعاء الدقيقة للكلاب ، اما المضائف الوسطية فهي آكلات الاعشاب (مثل الاغنام و الابقار و الماعز.....الخ) ويعد الانسان مضيفاً وسطياً يصاب عن طريق الصدفة نتيجة لتناول الطعام والشراب الملوث ببيوض الطفيل . يحدث المرض بعد

عينة لكل نوع) مصابة طبيعياً ببدء المشوكات بعد ذبحها في مجزرة الموصل، واستخدمت الأكياس من أكباد الاغنام والابقار المصابة اذ وضعت في حاوية مبردة من الفلين ونقلت الى المختبر في كلية التربية ، غسلت الاعضاء المصابة من الخارج بالماء الجاري لغرض ازالة الدم والمواد العالقة بها اثناء الذبح .

التثبيت Fixation و تحضير المقاطع النسيجية Preperation of Microscopic Slides .

اخذت قطع صغيرة من العضو المصاب مع الكيس العدري ووضعت في قناني صغيرة حاوية على المحلول المثبت المستخدم وهو فورمالين الدارئ المتعادل (Luna) Buffered neutral formalin ، وحضرت المقاطع النسيجية كما جاءت به (1968) الكنانى ، ٢٠١٣ .

تقانة ملون تئل Tunel stain :technique

استعملت تقانة ملون تئل (Terminal TUNEL) deoxy uridine phosphate nick end labiling) للكشف عن عملية الموت الخلوي

، وعلى الرغم من اصابة الابقار بسهولة الا انها عموماً تنتج اكياساً عدرية عقيمة بينما في الاغنام اغلبية الاكياس تكون خصبه (McManus واخرون ، 2003) . والاليات التي تقوم عليها العمليات التي تؤدي الى عقم الاكياس العدرية او خصوبتها غير معروفة (Paredes واخرون ، ٢٠٠٧) . وكذلك الاليات على المستوى الجزيئي المسؤولة عن خصوبة الاكياس العدرية وعقمها غير معروفة (Gonzalo واخرون ، ٢٠٠٨) . الموت الخلوي المبرمج هو شكل من اشكال موت الخلية الذي يمكن التعرف اليه بالعديد من الصفات الشكلية والتغيرات الكيموحيوية التي تؤدي الى حدوث سلسلة من الخطوات المنظمة التي تؤدي في النهاية الى تدمير ذاتي Self destruction وتعد عملية الموت الخلوي المبرمج من اهم عمليات التنظيم الفسلجي والاتزان النسيجي Tissue homeostasis لبقاء الجسم في حالة سوية (Arends و Wylli ، ٢٠١٤) .

المواد وطرائق العمل Material and methods

جمع الاكياس Collection of hydatid cyst

تم الحصول على 75 عينة أكباد خبيجة بالأكياس العدرية من اصل اغنام ، معز وابقار (25

الخلوي الكلي بدون استخلاص للمادة العضوية او ترسب للكحول . تم قياس نقاوة وتركيز عينات الحامض النووي منقوص الاوكسجين المعزول من الطبقة الجرثومية من اصل اغنام ومعز وابقار باستخدام جهاز Nanodrop وذلك عن طريق اضافة قطرة من (DNA Rehydration solution) لتصفير الجهاز ثم اضافة قطرة من DNA فيقوم الجهاز بقياس تركيز ونقاوة الDNA وكانت درجة نقاوة ال DNA للعينات تتراوح بين (٠,٧ - ١,٢ نانوميتر) .

الترحيل الكهربائي في هلام الاكاروز Agarose Gel electrophoresis :

استعملت تقانة الترحيل الكهربائي لعزل الجزيئات بحسب معدل حركتها تحت تأثير المجال الكهربائي واستعملت هذه التقانة لتحديد التجزاء او التهتك الذي يحدث في الحامض النووي منقوص الاوكسجين للخلايا المولدة المكونة للاكياس العدرية لكل من الاغنام والمعز والابقار على هلام الاكاروز.

تقانة ملون فولجين (F) Feulgen stain :

تم استخدام ملون فولجين للكشف عن الحامض النووي منقوص الاوكسجين وذلك لملاحظة التغيرات

المبرمج وتحديد النسبة المئوية للخلايا التي تعاني من الموت الخلوي المبرمج. واستعملت في هذه الدراسة عدة الاختبار الجاهزة للمقاطع النسجية المطمورة بشمع البارافين وهي من المنتجات التي قدمتها شركة GenScript (USA) ، Cat. No. L00297 وهو يكشف عن الحامض النووي منقوص الاوكسجين المتجزى في النواة في عملية الموت الخلوي المبرمج عن طريق تعليم Labeled النيوكليوتيدات biotinylated nucleotide في نهاية الحامض النووي OH-3 منقوص الاوكسجين . وباستعمال هذا الاختبار تظهر الانوية التي فيها موت خلوي مبرمج بلون بني داكن .

عزل الحامض النووي المنقوص الاوكسجين من الطبقة المولدة للاكياس العدرية للاغنام والمعز والابقار

عزل الحامض النووي منقوص الاوكسجين من الطبقة المولدة للاكياس العدرية من اصل اغنام والمعز والابقار بالعدة الجاهزة DNeasy tissue kit ، التي

صنعتها شركة QIAGEN وهذه العدة تستعمل تقانة غشاء هلام السيليكا المتقدمة للتنقية السريعة والكفاءة لعزل الحامض النووي منقوص الاوكسجين

الأكياس العدرية العقيمة 3. 43. % ، اما بالنسبة
للأكياس العدرية الخصبة فقد كان 2.3 % و 3.2%
لكل من الاغنام والمعز على التوالي (جدول ١) .

وقد اظهرت هذه الدراسة ان عملية الموت الخلوي المبرمج
في الطبقة المولدة للأكياس العدرية العقيمة تحدث على شكل
رقع (patches) فقد لوحظ وجود منطقتين في نفس
العينة التي خضعت لتفاعل تنل الانزيمي فهناك منطقة تظهر
نسبة عالية من الموت الخلوي المبرمج 3% 43.
(الشكل ٢) ومنطقة اخرى تظهر نسبة واطئة من الموت
الخلوي المبرمج ٢.٠٣ % (الشكل ١) .

ملحوظة: المناطق الموضحة في الاشكال ١ و ٢ تظهر
نسبة عالية وواطئة من الموت الخلوي المبرمج للطبقة المولدة
نفسها .

الحاصلة في الحامض النووي منقوص الاوكسجن
وحضرت الشرائح النسجية ولونت وفقا لطريقة (
Culling واخرون ، 1985) .

النتائج

تفاعل تنل الانزيمي :

اظهرت المقاطع النسجية لأكباد الإبصار الخنجة بالأكياس
العدرية العقيمة والاعنم والمعز الخنجة بالأكياس العدرية
الخصبة والخاضعة لاختبار التعليم الانزيمي تنل TUNEL
تفاعل ايجابي لمون تنل والذي تم مشاهدته في كل من
الأكياس العدرية الخصبة والعقيمة ، فقد اظهرت انوية
الطبقة المولدة للأكياس العدرية العقيمة (الإبصار) نسبة
اعلى لعملية الموت الخلوي المبرمج (الشكلان ١ و ٢) من
الأكياس العدرية الخصبة (الاغنم ، المعز) (الشكلان ٣
و ٤) ، فقد كانت النسبة المئوية للموت الخلوي المبرمج في

الشكل ١ و ٢ مقطع نسجي لكبد الابقار المخمجة طبيعيا بالاكياس العدرية يوضح الموت الخلوي المبرمج في الاكياس العدرية العقيمة في الطبقة المولدة (G) للكيس العدري (السهم) حيث يظهر الشكلان رقع الانوية التي تعاني من الموت الخلوي المبرمج والموجبة لصبغة تنل (ملون تنل قوة تكبير ٤٠٠X).

الشكل ٣ مقطع نسجي لكبد معز مخمجة طبيعيا بالاكياس العدرية يوضح الموت الخلوي المبرمج (السهم) في الطبقة المولدة (G)، L الطبقة الصفائحية (ملون تنل قوة تكبير ٤٠٠ X).

الشكل ٤ مقطع نسجي لكبد الاغنام مخمجة طبيعيا بالاكياس العدرية يوضح الموت الخلوي المبرمج في الطبقة المولدة للكيس (G) (ملون تنل قوة تكبير 400x)

المؤبة للموت الخلوي المبرمج في الاكياس العدرية الخصبية
فقد كانت النسبة $2.3 \pm 3.2\%$ و $5.5 \pm$

6.3% في المعز والاعنام، على التوالي (جدول ١

.)

النسبة المؤبة لعدد خلايا الموت الخلوي المبرمج في
الاكياس العدرية العقيمة والخصبة :

اوضحت النتائج ان النسبة المؤبة للموت

الخلوي المبرمج في الاكياس العقيمة (الابقار) باستعمال

اختبار التعليم الانزيمي تنل TUNEL في الطبقة

المولدة اعلى مما في الاكياس العدرية الخصبية (الاعنام و

المعز) فقد كانت النسبة المؤبة للموت الخلوي المبرمج

في الاكياس العدرية العقيمة عند مستوى احتمالية

$P < 0.05$ % 16.1 ± 43.3 اما النسبة

الجدول ١ النسبة المئوية لعدد خلايا الموت المبرمج للخلايا الطبيعية % والتي حددت بواسطة اختبار التعليم الانزيمي تنل TUNEL في الطبقة المولدة للكيس العدري لكل من الاغنام والمعز والابقار.

الابقار %	المعز %	الاعنم %	النسبة لعدد الخلايا التي تعاني من الموت الخلوي المبرمج في الطبقة المولدة للكيس العدري
43.3 ± 16.1 c ab	٣,٢ ± 2.3b	٦,٣±5.5a	

الحروف المختلفة تعني وجود فرق معنوي عند مستوى احتمالية $P < 0,05$

الاقواقسجين عند مواقع internucleosomal sites، لذلك ينتج وباتظام اجزاء من الحامض النووي منقوص الاوكسجين والتي يمكن ملاحظتها بشكل واضح بالترحيل الكهربائي للحامض النووي منقوص الاوكسجين على هلام الاكار، وعند استخلاص الحامض النووي منقوص الاوكسجين من الطبقة المولدة للاكياس العدريه العقيمة والخصبة شوهده عملية تجزئة الحامض النووي منقوص الاوكسجين في الاكياس العدريه العقيمة التي كانت غائبة في الاكياس العدريه الخصبة (شكل ٥).

ab = وجود فرق معنوي في الابقار عن الاعنم والمعز تجزئة الحامض النووي منقوص الاوكسجين في خلايا الطبقة المولدة للاكياس العدريه الخصبة والعقيمة: من الطرق الاخرى المستعملة لاثبات حدوث الموت الخلوي المبرج في الطبقة المولدة للكيس العدري هي تقدير تجزئة الحامض النووي المنقوص الاوكسجين DNA fragmentation الناتجة عن فعالية انزيمات endonucleases، وتعمل هذه الانزيمات على قطع شريط الحامض النووي منقوص

منقوص الاوكسجين المستخلص من الطبقة المولدة للاكياس العدرية الخصبية (المعز).

ملون فولجين:

الاغنام:

اظهرت المقاطع النسجية لكبد الاغنام الخمجة بالاكياس العدرية طبيعيا لطيفيل المشوكة الحبيبية تفاعلا موجبا ملون فولجين مع الحامض النووي منقوص الاوكسجين لخلايا الكبد فضلا عن التفاعل الموجب للملون فولجين مع الطبقة المولدة للكيس العدري (الاشكال ٦، ٧).

يوضح الشكل ٥ عملية الترحيل الكهربائي لحامض الحامض النووي منقوص الاوكسجين المستخلص من الطبقة المولدة للاكياس العدرية العقيمة والخصبية M الدليل الحجمي القياسي المتكون من الحامض النووي منقوص الاوكسجين، 1 الحامض النووي منقوص الاوكسجين المستخلص من الطبقة المولدة للاكياس العدرية العقيمة (الابقار)، 2 و3 الحامض النووي منقوص الاوكسجين المستخلص من الطبقة المولدة للاكياس العدرية الخصبية (الاغنام)، 4 الحامض النووي

الشكل ٦ مقطع نسجي في كبد اغنام خمجة بالمشوكة الحبيبية يوضح التفاعل الموجب للملون فولجين مع الحامض النووي

منقوص الاوكسجين لخلايا الكبد (السهم) (ملون فولجين تكبير X٤٠٠).

الشكل ٧ مقطع نسجي في كبد اغنام خمجة بالمشوكة الحبيبية يوضح التفاعل الموجب للملون فولجين مع الطبقة المولدة

للكيس العدري (السهم) فضلا عن خلايا الكبد (ملون فولجين تكبير X١٠٠).

المعز:

واظهرت المقاطع النسجية لأكباد المعز التفاعل الموجب الشديد لملون فولجين مع الخلايا الالتهابية المرتشحة حول الكيس العدري والحامض النووي منقوص الاوكسجين لخلايا الكبد (الشكلان ٨،٩

اظهرت المقاطع النسجية لكبد المعز الخمجة طبيعيا بالاكياس العدرية لطفيل المشوكة الحبيبية وجود تفاعل موجب ضعيف لملون فولجين مع مكونات الكيس العدري ومن ضمنها الطبقة المولدة والرويسات الاولية،

الشكل ٨ مقطع نسجي لكبد معز خمجة طبيعيا بالمشوكة الحبيبية يوضح التفاعل الموجب الضعيف لملون فولجين مع مكونات الكيس العدري بما فيه الطبقة المولدة والرويسات الاولية (ملون فولجين تكبير 100x)

الشكل ٩ مقطع نسجي لكبد معز خمجة طبيعيا بالمشوكة الحبيبية يوضح التفاعل الموجب الشديد لملون فولجين مع مكونات الكيس العدري والخلايا الالتهابية المرتشحة حول الكيس العدري (ملون فولجين تكبير 100x)

وكذلك مع الخلايا الالتهابية في الطبقة البرانية للكيس العدري واظهرت المقاطع النسجية لأكباد الابقار التفاعل الضعيف لملون فولجين مع الحامض النووي منقوص الاوكسجين للخلايا الكبدية (الاشكال ١٠،

الابقار :

اظهرت المقاطع النسجية لكبد الابقار الخمجة بالاكياس العدرية لطفيل المشوكة الحبيبية هناك تفاعلا موجبا ضعيف لملون فولجين مع الحامض النووي منقوص الاوكسجين للخلايا المكونة للطبقة المولدة

(١١، ١٢) .

الشكل ١٠ مقطع نسجي لكبد ابقار خمجة طبيعيا بالمشوكة الحبيبية يوضح التفاعل الموجب الضعيف لملون فولجين مع الحامض النووي منقوص الاوكسجين في الخلايا المكونة للطبقة المولدة (السهم) (ملون فولجين تكبير 400x)

الشكل ١١ مقطع نسجي لكبد ابقار خمجة طبيعيا بالمشوكة الحبيبية يوضح التفاعل الموجب الضعيف لملون فولجين مع الحامض النووي منقوص الاوكسجين في الخلايا الالتهابية في الطبقة البرانية للكيس العدري (السهم) (ملون فولجين تكبير 400x).

الشكل ١٢ مقطع نسجي لكبد ابقار خمجة طبيعيا بالمشوكة الحبيبية يوضح التفاعل الموجب المعتدل لملون فولجين مع الحامض النووي منقوص الاوكسجين في الخلايا الكبدية (ملون فولجين تكبير 40x)

النسب المؤية اتضح ان اعلى نسبة لعملية الموت الخلوي

المناقشة:

المبرمج كانت في الطبقة المولدة للاكياس العدرية العقيمة

تحديد الاستماتة بواسطة اختبار التعليم الانزيمي تتل

في الخمج الطبيعي واكدته اختبارات الترحيل الكهربائي

TUNEL Detection Kit

على هلام الاكاروز وتجزئة الحامض النووي منقوص

اختبار التعليم الانزيمي تتل من تقانات كيمياء

الاوكسجين وضحت هذه الدراسة الانحراف العالي

النسج المناعية التي تحدد الاستماتة اذ ظهرت الانوية

high deviation لمعامل الموت الخلوي المبرمج

التي فيها الحامض النووي منقوص الاوكسجين مجزأ

للطبقة المولدة الماخوذة من الاكياس العدرية العقيمة)

وتعاني من موت خلوي مبرمج بلون بني داكن ، ومن

الابقار مقارنة لمعامل الموت الخلوي المبرمج للطبقة

عد الخلايا التي حدثت فيها الاستماتة واحسب

المولدة الماخوذة من الاكياس العدرية الحصبية (٣,١,٥ تجزئة الحامض النووي منقوص الاوكسجين : الاغنام والمعز) .

ان عملية الاستماتة في الشريطيات مثل المشوكات الحبيبية هي عملية متوقعة الحدوث ، وعلى ما يبدو تحدث هذه العملية بشكل طبيعي في الديدان المسطحة لتجديد الانسجة كما تلعب دورا رئيس في تنظيم عدد الخلايا والقضاء على الخلايا والانسجة غير المرغوب فيها وفي اعادة بناء الانسجة القديمة في الجسم (Paredes واخرون ، ٢٠٠٧ ؛ Wylli ، ٢٠٠٧) .

و من الطرق المستعملة لاثبات حدوث الموت الخلوي المبرح في الطبقة المولدة للكيس العدري هي تقدير تجزئة fragmentation الحامض النووي المنقوص الاوكسجين والنتائج عن فعالية انزيمات endonucleases ، وتعمل هذه الانزيمات على قطع شريط الحامض النووي منقوص الاوكسجين عند مواقع internucleosomal sites ، لذلك ينتج وبانتظام اجزاء من الحامض النووي منقوص الاوكسجين التي يمكن ملاحظتها بشكل واضح بالترحيل الكهربائي للحامض النووي منقوص الاوكسجين على هلام الاكاروز (Hunhua واخرون

تحدث الاستماتة بسبب العديد من العوامل منها الاجهاد التاكسدي والتعرض للعوامل المرضية عبر تراكم الجذور الحرة التي تؤدي الى تلف الحامض النووي منقوص الاوكسجين (Ozawa ، ١٩٩٧) .

وقدمت هذه الدراسة الادلة الكيموجيوية والشكلية على حدوث عملية الاستماتة في الطور اليرقي (الكيس العدري) للمشوكات الحبيبية

E.granulosus ، ولم يلحظ وجود عملية تغاظ النواة pyknotic nuclei واجسام الاستماتة في الطبقة المولدة للكيس العدري ، ولكن عملية تجزئة الحامض النووي منقوص الاوكسجين شوهد بشكل واضحاً من خلال اختبار تنل الانزيمي ومن خلال عملية الترحيل الكهربائي على هلام الاكاروز ، ومن المثير للاهتمام ان النسبة المئوية لعملية الموت الخلوي في الطبقة المولدة للاكياس العدرية العقيمة التي قيست باستعمال تنل الانزيمي اعلى مما هي عليه في الطبقة المولدة للاكياس العدرية الحصبية وهذه النتيجة تتفق مع ما توصل اليه Paredes واخرون (٢٠٠٧) .

، (٢٠١١) ، قدمت هذه الدراسة وصفا لعملية الاستماتة في الأكياس العدرية العقيمة والخضبة فعند استخلاص الحامض النووي منقوص الأوكسجين من الطبقة المولدة للأكياس العدرية العقيمة والخضبة شوهدت عملية تجزئة الحامض النووي منقوص الأوكسجين في الأكياس العدرية العقيمة والتي كانت غائبة في الأكياس العدرية الخضبة و تتفق هذه الملحوظة مع النسبة العالية من عملية الاستماتة التي لوحظت في الطبقة المولدة للأكياس العدرية العقيمة عن طريق تفاعل تنل الانزيمي ، وكذلك مع النسبة الواطئة من عملية الاستماتة للانوية في الطبقة المولدة للأكياس العدرية الخضبة، وثبتت هذه النتيجة حدوث عملية الاستماتة بشكل فعال في الأكياس العدرية العقيمة ويعود ذلك الى فعل المؤكسدات (الجذور الحرة) التي أكدتها هذه الدراسة ان نسبتها في الأكياس العقيمة أكثر من الخضبة.

النوي منقوص الأوكسجين في الخلايا الى شظايا صغيرة من قبل انزيم اندونكلياز ، الذي يعمل على تجزئة المادة الكروماتينية الى nucleosomal units ، التي هي مضاعفات الاوليغمرات حوالي 180 bp، تظهر عند مقارنتها بسلم الحامض النووي القياسي المنقوص الأوكسجين DNA ladder على هلام الأكاروز ، واستعملت هذه الطريقة لتحديد نوع الخلايا التي تعاني الاستماتة (Matassov وآخرون ، ٢٠٠٤) ولم يوصف موت الخلية المبرمج في المشوكات الحبيبية في دراسات سابقة ، وظهرت الدراسات ذات الصلة على الشريطيات الطفيلية التي تعود الى جنس *T.solium* ان 0.3Gy من الاشعاع قادر على حث عملية الاستماتة التي اثبتت باستعمال كل من الترحيل الكهربائي على هلام الأكاروز والتفاعل الموجب مع صبغة تنل. ووصف Merchant

آخرون (١٩٩٧) توقف نمو الطفيل عند منطقة العنق في المنطقة المولدة عند تعرضه للاشعاع ولذلك اقترح المنطقة المولدة المتواجدة في منطقة العنق هي كانت هدفاً للاشعاع ، وهذا الاكتشاف كان مؤشراً كون ان الاشعاع يعمل على تثبيط النمو الطبيعي للطفيل

موت الخلايا المبرمج يمكن تشخيصه من عدد من الصفات الشكلية والكميوكيوية التي تميزه عن غيره من أشكال موت الخلية ، وواحدة من هذه الميزات، وهي السمة المميزة لموت الخلايا المبرمج ، هي تجزئة الحامض

من الطور اليرقي الى الطور البالغ عن طريق تحفيز الاستماتة (Carneiro-Santos و اخرون ، ٢٠٠٠ ؛ Flores-Perez و اخرون ، ٢٠٠٣) .
 من الطور اليرقي الى الطور البالغ عن طريق تحفيز الاستماتة (Carneiro-Santos و اخرون ، ٢٠٠٣) ،
 الية الاستماتة أثرت فقط في بقع نوى المتكاثره وبالتالي
 ادت الى توقف عملية التبرعم ومن ثم تكوين الاكياس
 العدريه العقيمة . اخيرا الية الاستماتة من الممكن ان
 يكون لها صلة في الاستجابة الفعالة للمضيف ضد
 الطفيل

أظهرت الدراسة التي اجراها Spotin

واخرون (٢٠١٢) المستوى المعنوي لتعبير TRAIL وفاس-L ان التعبير أعلى في الطبقة المولد للكيس العقيم مما في الطبقة المولدة للكيس العدري والأنسجة الطبيعية للمضيف واستنج Spotin وجماعته ان انسجة المضيف تعمل على تحفيز عملية الاستماتة في الطبقة المولدة للاكياس الخصبة هي على الأرجح احدى الليات المسؤولة عن عقم الكيس في الاشخاص المصابين بداء الاكياس العدريه .

تفاعل فولجين Feulgen reaction :

تفاعل فولجين من ملونات كيمياء النسيج التي تستعمل في تشخيص العديد من الامراض ويعمل على

ووصف Hwang و اخرون (٢٠٠٤) حدوث عملية الاستماتة في اثناء عملية التجدد في البلاناريا فضلا عن وجود ثلاثة جينات مماثلة لجينات انزيمات الكاسبيسس تدعى ب Djc1g ، ان عملية الاستماتة تؤدي دوراً مهماً في المشوكات الحبيبية ، وبصورة رئيسة في تنظيم انتاج الرويسات الاولى في الطبقة المولدة للاكياس العدريه ، لذلك يعد هذا النوع من الاستماتة الآلية الخلوية المسؤولة عن عقم الاكياس العدريه ، التي تلحظ في عدد من اكلات الاعشاب في الانسان كذلك ففي دراسات سابقة اثبت كل من الباحثون (Zhang و اخرون ، ٢٠٠٣ ؛ Yildiz و Gurcan ، ٢٠٠٣ ؛ Tato و اخرون ، ٢٠٠٤) ان قطاعات معينة للطبقة المولدة تظهر زيادة اولية في تكاثر الخلايا التي تتطور فيما بعد الى براعم متطاولة و ثم الى رويسات اولية ، وتكون هذه القطاعات من الخلايا المتكاثره على شكل

صنع الحامض النووي منقوص الاوكسجين بالاعتماد على ردود فعل كاشف شيف مع مجموعة الاديهايد المتولدة في جزئية الحامض النووي منقوص الاوكسجين بواسطة التحلل المائي للحامض النووي منقوص الاوكسجين بوجود حامض الهيدروكلوريك HCL عند درجة حرارة ٦٠ م° و تناسب كثافة الاصطباغ مع كثافة تركيز الحامض النووي منقوص الاوكسجين (Chieco و Derenzini ، ١٩٩٩) و استعمل تفاعل فولجين في هذه الدراسة لاثبات الآفات المرضية في خلايا الكبد الخمجة بطفيل المشوكة الحبيبية في كل من الاغنام والمعز والابقار وذلك لشرح التغيرات التي تحدث في الحامض النووي منقوص الاوكسجين في حالة الخمج بالطفيل ، واطهرت المقاطع النسيجية لكبد الاغنام الخمجة بالاكياس العدرية لطفيل المشوكة الحبيبية تفاعلا موجبا ملون فولجين مع الحامض النووي منقوص الاوكسجين لخلايا الكبد ، فضلا عن التفاعل الموجب ملون فولجين مع الطبقة المولدة للكيس العدري وكشفت نتائج الفحص النسيجي لكبد الاغنام ان هناك تفاعلا موجبا شديدا بين ملون فولجين و الحامض النووي منقوص الاوكسجين للخلايا الظهارية المبطنة للقنوات الصفراوية فضلا عن التفاعل الموجب ملون فولجين الموجب الشديد مع مكونات الكيس العدري ومن ضمنها الطبقة المولدة والرويسات الاولية ، واطهرت المقاطع النسيجية لأكباد المعز التفاعل الموجب الشديد ملون فولجين مع الخلايا الالتهابية المرتشحة حول الكيس العدري والحامض النووي منقوص الاوكسجين لخلايا الكبد . وفي الابقار اظهرت المقاطع النسيجية لكبد الابقار الخمجة بالاكياس العدرية لطفيل المشوكة الحبيبية تفاعلا موجبا ضعيفا ملون فولجين مع الحامض النووي منقوص الاوكسجين للخلايا المكونة للطبقة المولدة وكذلك مع الخلايا الالتهابية في الطبقة البرانية للكيس العدري . يشير تفاعل فولجين الضعيف مع الحامض النووي منقوص الاوكسجين المتواجد في خلايا الطبقة المولدة للكيس العدري والخلايا الكبدية للابقار الخمجة بداء المشوكات الحبيبية الى الانخفاض الشديد في كمية الحامض النووي والتي يمكن تفسيرها بتأثير سموم الطفيل الذي يؤثر في تخليق البروتين في الخلايا المضيفة ، ويفسر هذا الانخفاض من محتويات الحامض النووي منقوص الاوكسجين في هذه الدراسة إلى تدهور المحتويات

النوية فضلا عن الضرر في نوى الخلايا المضيفة الخمجة بالطفيل وهذا يتفق مع ماتوصل الية Sarhan واخرون (٢٠١٣) الذين اشاروا الى تفاعل فولجين الضعيف في اكباد الفران المصابة بداء المقوسات كان بسبب الانخفاض في كمية الحامض النووي منقوص الاوكسجين في خلايا المضيف الناتج عن المواد السامة التي ينتجها الطفيل .

واشارت دراسات سابقة الى أن الانخفاض في الحامض النووي يمكن أن يعزا إلى اختلال اغشية الاجسام الحالة تحت تأثير المواد السامة المختلفة مما يؤدي

المصادر

الكناني، انتصار رحيم عبيد (2013) .
تقنيات في علم الامراض النسجي، كلية
الطب-البيطري، جامعة الموصل ، العلا
للطباعة والنشر ، الطبعة الاولى : 105-
110.

الكناني ، انتصار رحيم ؛ علي ، فواز
فاضل ؛ عبدالله ، دنيا عبد الرزاق (٢٠١١).
دراسة وبائية لداء الاكياس العدرية
المشخصة في محافظة نينوى ، مجلة
البحوث الصحية والطبية ، بغداد : ٤٩-
٥٥ .

Schistosomiasis mansoni.
Parasite Immunol. ; 22:267-277.

Chieco, P. and Derenzini, M.(
1999) .The Feulgen reaction 75
year. Son Cell Biol. ,11(5):345-
58.

Carneiro-Santos, P.; Martins-
Filho, O.; ves-Oliveira, L.F.;
Silveira, A.M.; Cura-Filho, P.
;Vana, I.R.; Wilson, R.A. and
Correa-Oliveira, R. (2000).
Apoptosis mechanism of
immunoregulation during human

- Hwang, J.S. ; Kobayashi, C., Agata, K.; Ikeo, K. and Gojobori; T. (2004). Detection of apoptosis during planarian regeneration by the expression of apoptosis –related genes and TUNEL assay .Gene, 333:15-25.
- Mahmoud, R.; Sharif, M.; Abdullah, R. and Mhommad, R. (2008). Comparison of some electrolytes in hydatid cyst fluid and serum of liver hydatidosis of sheep . Jundish. J. Microbiol.; 1(1): 10-14.
- Matassov, D. ; Kagan, T.; Leblanc, J.; Sikorska, M. and Zakeri, Z.(2004). Measurement of apoptosis by DNA fragmentation. Methods Mol. Biol. ;282:1-17.
- McManus ,D.P.; Zhang, W.;Li ,J. and Bartley, P.B.(2003). Echinococcosis. Lancet, 362:1295–1304.
- McManus ,D.P.; Zhang, W.;Li ,J. and Bartley, P.B.(2003). Echinococcosis. Lancet, 362:1295–1304.
- Ozawa , T. (1997) . Oxidative Damage and Fragmentation of Mitochondrial DNA in Cellular Apoptosis . Biosci.. Rep., (17) 237-250.
- Paredes, R.; Jimenez, V. ; Cabrera, G. ; Iraguen, D. and Galanti, N.(2007). Apoptosis as Culling, C. F. A. ; Allisocn, R. T. and Barr, W. T. (1985) . Cellular pathology technique. 4th end . Mid – Country Press , London.
- Flores-Perez , I. ; Fragoso, G.G. and Sciutto, E. (2003). Apoptosis induced by gamma irradiation of *Taenia solium* metacestodes. Parasitol. Res. , 90-203-208.
- Galindo, M. ;Paredes, R. ; Marchant, C.; Mine, V. and Galanti , N. (2003). Regionalization of DNA and protein synthesis in developing stages of parasitic platyhelminth *Echinococcus granulosus* , J. Cell. Biochem., 90:294-303.
- Gonzalo, C.;Mari A. C.;Alessandra L. M.;Carolina C. N.;Juana, O. ; Hellman, Ulf.; Arnaldo Z. and Norbel G. (2008). DNA Damage, RAD9 and Fertility/Infertility of *Echinococcus granulosus* Hydatid Cysts.J. Cell. Physiol.216 (2) :498-506.
- Hunhua, H.; Jinfeng, K., Rong, C.,Wulamu, M.,Guizhen W. and Wumei Y. (2011). Drug induced apoptosis of *Echinococcus granulosus protoscoleces*. Parasitol Res. 109(2): 453-9.

- solium* metacestodes induced apoptosis in human CD4+ T-cells . Parasitol .Res., 92:197-204.
- World Health Organization.(2014) . Echinococcosis Fact sheet N°377 Retrieved From Internet 19 March 2014.
- Wylli ,A.H (2007). Agency for science , Tochnology and research . Lecture Abstract .Archived from the original on 2007 – 11-13.
- Wylli ,A.H and Arends,M.J. (2014) . Apoptosis in health and diease . Oxford Textbook of Medicine , 5th.ed.,Oxford.
- Yildiz ,K. and Gurcan, S.(2003) . Prevalence of hydatidosis and fertility of hydatid cyst in sheep in Kirikkale ,Turkey. Acta Vet. Hung., 52:181-187.
- Zhang, W. ; Li, J. and McManus, D.P. (2003) .Concepts in immunology and diagnosis of hydatid disease. Clin. Microb., 16(1):18-36.
- Possible Mechanism of Infertility in *Echinococcus granulosus* Hydatid cysts. J. Cell. Biochem., 100:1200-1209
- Saber, A.S; Hany, A.A and Maha, E.S.(2004) . Exploring Hepatotoxicity of Benomyl: Histological and Histochemical Study on Albino Rats. J Med. Sci.,4(1) 77-83.
- Samad Mosaddeghi, K.; Hengameh, K.; Amorllah - Bayat,H. and Zahra, M. K.(2014). Capsulorrhaphy in the management of liver hydatid cyst . Ann.. Hepatol. ; 13 (3) : 378-383.
- Sarhan' O.M.; Osman , A.M.A. and Abdel-Aziz, A. M. (2013). hepatic histochemical alteration induced by ultraviolet-exposed *Toxoplasma gondii* in murine model. Egypt.J.Zool,53:263-282.
- Spotin, A.; Mokhtari A.M.; Sankian, M.; Varasteh, A. and Vahedi, F. S. (2012). Expresstion of apoptosis inducing-ligands,TRAIL-in hydatid cyst germinal layer and normal tissue. Ardabil University of Medical Sciences, (43) ;7-16.
- Tato, P.;Fernandez, A.M.; Solano, S.; Borgonio, V.;Garridio, E., Sepulveda, J. and Molinari, J.L. (2004) . A cysteine protease from *Taenia*

دراسة بيئية وبكتريولوجية للبكتريا المكونة للاغشية الحيوية في بعض محطات الاسالة

م.م . رنى وعد الله يونس

أ.د. ياسين حسين عويد

أ.د. كركر محمد ثلج

الخلاصة:

تمت دراسة الصفات الفيزيائية والكيميائية لمياه نهر دجلة في مناطق تمثلت في مجرى النهر قرب محطات التصفية في الموصل والقيارة وكذلك ماء المحطات نفسها، وبعد التصفية في البيوت، فضلا عن عزل وتشخيص الاحياء المجهرية الملوثة، تبين من النتائج أن درجة الحرارة للمياه في النهر ومحطات التصفية وفي البيوت كانت متشابهة في اماكن اخذ العينات جميعها وكان أكثرها في فصل الصيف ماعدا مدينة الموصل وفي فصل الصيف إذ كان انخفاضها أكثر من بقية فصول السنة. اما التوصيلية فكانت أقلها في فصل الصيف وتدرجت لتكون أكثرها ارتفاعا في فصل الربيع إذ تراوحت بين ٤١٠-٧٠٠ التوصيلية $\mu\text{S/cm}$. وكانت قيم العكورة أقلها في فصل الصيف في عينات المياه وأكثرها في فصل الشتاء إذ كانت في مدينتي الموصل والقيارة ١٣,٣ و ١٠,٧ N.T.U على التوالي. ولم تختلف المواد الصلبة الكلية اعتمادا على المناطق ولكنها كانت أقل ما يكون في فصل الصيف وارتفعت في الفصول الاخرى ولا سيما في فصلي الربيع والشتاء، ولوحظ ان الدالة الحامضية لم تتغير في جميع حالات الدراسة، وتراوحت قيم الأوكسجين المذاب بين (٣,٥-٧,٣١) mg/L حيث أظهرت ارتفاعاً في فصل الشتاء وانخفاضاً في فصل الصيف.

كما كشف عن ستة عشر نوع بكتيري من الأحياء الدقيقة المتضمنة الجراثيم السالبة والموجبة لصبغة جرام وتم تحديد خمسة أنواع مهيمنة من كلا النوعين وتبين أن النوع السائد هو *Bacillus cereus* والأقل سيادة هو *Salmonella paratyphi*، وتضمنت الأنواع البكتيرية المعزولة البكتريا المعوية والمكورات العنقودية والمكونة للسبورات وكانت أعدادها الكلية هي الأكثر في عينات الماء المأخوذة في فصلي الشتاء والربيع وفي مدينة القيارة وصلت الى ١٩٣٧ (وت م / مل) من البكتريا المعوية في فصل الشتاء

abstract

The physical and chemical characteristics of the Tigris River water were studied in the areas of the riverbed near the filtering stations in Mosul and Qayyarah as well as the water of the plants themselves, and after the filtering in the houses, as well as the isolation and diagnosis of contaminated microorganisms, the results show that the temperature of the water in the river and the filtering stations. The houses were similar in all sampling places and most of them were in summer except Mosul city and in summer it was more than the rest of the year. Conductivity was the lowest in the summer and progressed to be the highest in the spring, ranging from 410-700 $\mu\text{s} / \text{cm}$. Turbidity values were lowest in summer in water samples and most in winter, in Mosul and Qayyarah 13.3 and 10.7NTU respectively. Total solids did not differ depending on regions but were lower in summer and rose in other seasons, especially in the two seasons. The values of dissolved oxygen ranged between (3.5-7.31) mg / L where it showed an increase in winter and a decrease in summer.

Sixteen dominant species of both species were identified, *Bacillus cereus* and less dominant is *Salmonella paratyphi*. Is the most in the water samples taken in the winter and spring and in the city of Qayyarah reached 1937 (and mt / ml) of intestinal bacteria in the winter

أن الأمراض المتعلقة بمياه الشرب تبقى سبباً

رئيساً في وفيات الكثير من السكان في مناطق العالم

وبشكل خاص الأطفال

(Fawell and Nieuwenhuijsen,

2003) إذ أن مياه الشرب غير الآمنة تسبب ١,٧

مليون حالة وفاة في كل عام أي ما يعادل ٣,١% من مجموع

الوفيات حول العالم

(Ashbolt, 2004). إن الماء المستخدم للاستهلاك

البشري يجب أن يكون خالياً من الأنواع البكتيرية ذات

المخاطر الصحية ووجود الأعشبية الحيوية في أنظمة توزيع

المقدمة:

يغطي الماء ٧٠% من مساحة الكرة الأرضية

ويحتل بما يقدر 1.38×10^9 كيلومتر مكعب، معظم

الماء يكون على شكل محيطات والتي تقدر بـ ٩٧% من

المياه العالمية ويشكل الباقي ٣% مياه عذبة (Sigeo,

2005)، ويعد الماء من الحاجات الأساسية للإنسان،

وإن استهلاك المياه من أجل الفعاليات المختلفة يعتمد

على الخصائص الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية

(Tomar, 1999). ويعد التزود الكافي من مياه

الشرب الآمنة أحد المتطلبات الأساسية لحياة صحية، إذ

أوراق ترشيح خاصة بالجهاز بقطر $0.22 \mu m$ ، بعد أن تم تعقيم الجهاز بالمؤصدة بعد تغطية الجهاز كاملاً بالسيلوفين نقلت أوراق الترشيح إلى الأوساط الزرعوية الملائمة لكل نوع بكتيري باستخدام الملقط المعقم بالتهيب الكحولي، ثم حضنت عند الدرجات الحرارية الملائمة لكل منها وكما في (Benson, 2002).

العزل والتشخيص:

الاختبارات الشكلية والفحص المجهرى:

لوحظت المستعمرات على الأوساط المستخدمة للعزل وسجلت أشكالها وأقطارها وألوانها، حضرت مسحات من البكتريا المعزولة وصبغت بصبغة جرام وفحصت مجهرياً باستخدام العدسة الزيتية لملاحظة شكل الخلايا وطبيعة الأصباغ.

الصفات الزرعوية:

درست صفات العزلات على الأوساط الزرعوية المستعملة ولوحظت قابليتها على النمو عند درجات حرارية مختلفة ومستوى من الأس الهيدروجيني المختلف، واجريت لها الاختبارات الكيموحيوية.

النتائج والمناقشة:

مياه الشرب تلعب دوراً في وجود امراضية كامنّة في تزويد مياه الشرب، فضلاً عن أنها تعد أساس الكتل في شبكة توزيع المياه (September et al., 2007)، فالمياه غير المعاملة تحتوي العديد من البكتريا والابتدائيات والفطريات والفيروسات، بعض منها تدخل إلى مياه الشرب وتكون ثابتة في الأغشية الحيوية التي تتكون على السطوح الداخلية في أنظمة توزيع مياه الشرب. (Juhna et al., 2007) ومن الأمور الناجمة عنها هي الأمراض المعوية مثل الكوليرا، الحمى التيفوئيدية وعصيات الدينترى التي غالباً ما تصبح أوبئة. (Benson, 2002).

جمع العينات:

بعد أن جمعت العينات المائية في قناني زجاجية حجم ٢٥٠ مل ذات غطاء محكم ومعقمة بجهاز المؤصدة، تم استخدام جهاز Millipore filter وهذه الطريقة تعطي عد مباشر لاشباه القولونيات الكلية واشباه القولونيات المتطرفة للحرارة في الماء وتميز بانها دقيقة وتعطي نتيجة في وقت قليل وترشح أحجام كبيرة من العينات (Tomar, 1999).

تم عزل الأنواع البكتيرية الملوثة لعينات الماء بعد صب كمية ٢٠ مل من كل عينة، واستخدم معه

١- درجة الحرارة:

كان انخفاضها أكثر من بقية فصول السنة. إن درجة حرارة المياه هي من أكثر عوامل السيطرة وتنظيم النمو الميكروبي سواء كانت بصورة مباشرة أو غير مباشرة (Lechevallier, 1989)، إذ أنها تؤثر في نوع النباتات الموجودة ونسبة النمو الميكروبي الذي ينخفض مع زيادة درجة الحرارة عن المثلى منها نتيجة تحطيم الإنزيمات، كذلك تؤثر على كفاءة عمل المعقمات أو المطهرات سواء في ارتفاعها أو انخفاضها (ولكسون، ١٩٧٥؛ EPA, 1989). إذ أن الجراثيم الانتهازية تتمكن من البقاء فترة أطول في الماء البارد، لأن العمليات الأيضية تكون أبطأ (Atlas and Bartha, 1993) وتؤثر على قدرة الماء في حمل الغازات المذابة خاصة الأوكسجين، حيث تقل نسبته مع زيادة درجة الحرارة في الماء (Kumar, 2012). وان هناك فعالية ميكروبية متميزة في درجة حرارة ١٥°م (WHO, 2003)، إذ أن وجود أشباه القولونيات يكون مميزاً عند هذه الدرجة وهذا يتطابق مع ما تم عزله في هذه الدراسة خلال فصل الشتاء، حيث تم عزل اجناس من أشباه القولونيات وهي *Citrobacter* و *Proteus* و *Providencia* و *E. Coli*.

تبين من نتائج الجدول (١) ان معدلات درجة الحرارة للمياه في النهر وفي محطات الإسالة وفي البيوت قد تشابهت في مناطق الدراسة في كل من مدن الموصل والقيارة وتراوح معدلها في فصل الصيف بين ٢٢,٩- ٢٣,٩ م ماعدا درجة حرارة المياه في البيوت في مدينة الموصل التي كانت عند معدل ٢٢م التي يمكن ان تعود إلى نوعية شبكات المياه في المدينة وعمق الأنابيب في الأرض. أما في فصل الخريف فقد انخفضت الحرارة لتكون عند معدل بين ٢١-٢٢,٨ م في جميع المناطق قيد الدراسة وكان اشد انخفاض لها في مناطق الدراسة لتكون بين ١٣-١٣,٢، ١٤,٢-١٤,٩، ١٤,٦-١٣,٢ و ١٣-١٥,٢ م على التوالي في فصل الشتاء في كل من الموصل، القيارة تبعها الارتفاع في درجة الحرارة ليتراوح بين ١٨,٥-٢٠,٥ م في فصل الربيع، تبين من النتائج تدرج الانخفاض في درجة الحرارة مع التغير في فصول السنة من الصيف إلى الربيع والتي تعد حالة طبيعية ومتوافقة مع الدراسات في هذا المجال (السنجري ٢٠٠١؛ السامرائي، ٢٠٠٩)، كذلك لوحظ عدم الاختلاف الواضح في درجات الحرارة بين المدن المنتخبة للدراسة، الا في حالة مدينة الموصل وفي فصل الصيف إذ

جدول (١) قيم درجات الحرارة لعينات الماء المأخوذة من مواقع محطات تصفية مختلفة على نهر دجلة

قيم درجات الحرارة عند فصول السنة المختلفة (°م)				فترة سحب العينات		المواقع
الربيع	الشتاء	الخريف	الصيف			
١٩	١٣	٢١	٢٣,٧	١	موصل	
١٩	١٣,٥	٢١	٢٣,٧	٢		
١٨,٥	١٤,٢	٢١	٢٢	٣		
٢٠	١٤,٢	٢٢	٢٣,٥	١	قيارة	
٢٠	١٣,٢	٢٢	٢٣,٥	٢		
٢٠	١٤,٩	٢٢	٢٢,٩	٣		

١= عينة ماء النهر=٢ عينة ماء محطة التصفية=٣ عينة ماء البيوت.

2- التوصيلية:

كل من مدن الموصل والقيارة التي تراوحت عند معدلات ٣٢٠-٣٥٣/μs ازدادت قيم التوصيلية في فصل الخريف وكانت اقلها في مدينة الموصل عند ٣٥٠-٣٦٢ μs/cm . تزداد كمية الأملاح في الشتاء، بسبب السيول الواردة نتيجة تساقط الأمطار حيث أن السيول تذيب الأملاح وفي حالة عدم وجود الأمطار فإن مياه البزل والارتشاح تذيب هذه الأملاح وهذا يوضح سبب ازدياد قيم التوصيلية في المواقع قيد الدراسة وهذا

تعرف بانها عبارة عن قياس قابلية الماء لتوصيل التيار الكهربائي (Sige, 2005)، وتعتمد هذه القيمة على تركيز وتكافؤ الأيونات الذائبة الموجودة في الماء وعلى درجة حرارة الماء، يوضح الجدول (٢) قيم التوصيلية الكهربائية حسب فصول السنة لمناطق الدراسة المختارة التي لوحظ ان هذه القيم كانت اقلها في فصل الصيف وتقاربت في عينات الماء المأخوذة من

يتطابق مع الدراسة التي قام بها (السنجري، ٢٠٠١؛ البدري، ٢٠١٢).

جدول (٢): قيم التوصيلية $\mu\text{S}/\text{cm}$ لعينات الماء المأخوذة من مواقع محطات تصفية مختلفة على نهر دجلة

قيم التوصيلية $\mu\text{S}/\text{cm}$ لعينات الماء من محطات تصفية وفصول مختلفة				فترة سحب العينات	
الربيع	الشتاء	الخريف	الصيف	المواقع	
700	425	362	353	١	موصل
450	412	٣٥١	٣٤٨	٢	
٥٤٠	415	٣٥٠	٣٤٠	٣	
٥٤٠	497	٤٠٤	٣٥٣	١	قيارة
٤٣٢	٤٦٠	٤٢٥	٣٤٥	٢	
٤١٠	٤٠٠	٤٠٠	٣٥٠	٣	

١= عينة ماء النهر=٢ عينة ماء محطة التصفية=٣ عينة ماء البيوت

3المكارة:

دائمة إلى جعلها بمسوّ منخفّض من خلال إزالة الجزيئات

العالقة ومعها العوام

المرضية، إن مستوى العكارة يجب أن يكون عند

1.0NTU أو أقل، إذ إن هذه المواد العالقة سوف

تحمي الكائنات الدقيقة مثل البكتريا والفيروسات

تنتج العكارة عن وجود مواد صلبة عالقة في الماء وهي

إحدى الدلالات على حالة الماء وإمكانية استخدامه

للشرب من قبل الإنسان إذ أن قيمتها تزداد مع زيادة

حمولة الماء من المواد العضوية الملوثة، وهناك حاجة

ان قيم العكورة قد ازدادت في فصلي الشتاء والربيع في مدينتي الموصل والقيارة إلى قيم ١٣,٣ و ١٠,٧ على التوالي والتي يمكن ان تكون بسبب موسم الأمطار في تلك المدينتين في هذا الفصل الذي يسبب في زيادة حمولة الماء من الغرين، وبالتالي ارتفاع قيمة العكارة عينات الماء المأخوذة

والابتدائيات من تأثير المعقمات (Smethrst, WHO, (1984; 1988). تبين من النتائج في الجدول (٣) ان قيم العكورة كانت اقلها في فصل الصيف في عينات المياه التي جمعت من جميع مناطق الدراسة وكانت كفاءة محطات التصفية واضحة في تقليلها إلى الحدود الدنيا لها التي تجعل من الماء ممكنا للاستخدام.

جدول (٣): قيم العكارة لعينات الماء المأخوذة من مواقع محطات تصفية مختلفة على نهر دجلة

قيم العكورة بوحدة NTU لعينات الماء حسب الفصول				فترة سحب العينات	
الربيع	الشتاء	الخريف	الصيف	المواقع	
٩,٠	١٣,٣	٥,٨	٥	١	موصل
٢,٨	٦,٢	٥,٢	٢,٣	٢	
٢,٧	٦,٢	٢,٢	٢,٣	٣	
١٠	١٠,٧	٤	٥,٥	١	القيارة
٤,٥	٨,٥	٣,٢	٤,٨	٢	
٤	٨	٢	٤,٦	٣	

١ = عينة ماء النهر = ٢ عينة ماء محطة التصفية = ٣ عينة ماء البيوت

٤ - المواد الصلبة الذائبة T.D.S:

وهي الكالسيوم، المغنيسيوم، الصوديوم، الكاربون

الحوي، الكلور والكبريت (Thirumalini and

Joseph, 2009).

تؤدي المواد الصلبة الذائبة إلى تأثيرات سلبية

على التفاعلات الوظيفية للمستهلك وقد حددت نسبة

المواد الصلبة الذائبة التي توصف لمياه الشرب بـ ٥٠٠

mg/L والماء الذي تكون فيه المواد الصلبة الذائبة

قليلة يكون خالياً من الطعم، كذلك فإن القيمة العالية من

المواد الصلبة الذائبة تكون مترافقة مع التآكل في الأنابيب

وتم تقسيم الماء اعتماداً على تركيز المادة الصلبة الذائبة

فيه (Bruvold and Daniels, 1990).

تعد قيم المواد الصلبة الذائبة متوافقة مع قيم

العكورة والتي يكون وجودها سبباً في زيادة العكورة في

الماء. وقد بينت النتائج الحالية هذا التوافق من خلال

كونها في اقل ما يكون في فصل الصيف وارتفاعها في

الشتاء والربيع والخريف، الذي يمكن ان يكون بسبب

سقوط الأمطار وكذلك حصول الفيضانات التي يمكن ان

تجرف المواد الذائبة معها مسببة زيادتها في عينات الماء

المأخوذة جدول(٤). إن المواد الموجودة بالماء في

شكلها الذائب مكونة من مواد عضوية وأملاح لاعضوية

وهي تتمثل في المواد الصلبة الكلية، إن المواد الصلبة

اللاعضوية تسهم فيها بشكل سائد ستة أيونات رئيسة

الجدول(٤): قيم المواد الصلبة T.D.S الذائبة لعينات الماء المأخوذة من مواقع محطات تصفية مختلفة على نهر دجلة

قيم المواد الصلبة الذائبة بوحدة mg/L حسب الفصول				فترة سحب العينات	
الربيع	الشتاء	الخريف	الصيف	المواقع	
٢٧٦	٢٦٨	٢٣٢	٢٢٠	١	موصل
٢٧٠	٢٥٨	٢٤٦	٢١٨	٢	

٢٥٠	٢٠٠	٢١٥	٢١٠	٣	
٣٢٨	٢٣٥	٢٩٨	٢٢٢	١	قيارة
٣١٨	٢٠٥	٢٧٠	٢٢٠	٢	
٣٢٨	٢٠٠	٢٢٠	٢٠٥		

١ = عينة ماء النهر ٢ = عينة ماء محطة التصفية ٣ = عينة ماء البيوت

٥

سلبيا على صحة المستهلكين من البشر، فعندما يكون pH للماء أقل من ٤ فإنه سوف يسبب الاحمرار والحساسية للعين، كذلك يكون الرقم الهيدروجيني مرتبطاً بكفاءة عمل المعقمات، إذ إن الدالة الحامضية يجب أن تكون أقل من ٨ من أجل كفاءة التعقيم بالكور وإذا كان الرقم الهيدروجيني منخفضاً دون الحد الأدنى فإنه سوف يؤدي إلى تآكل الأنابيب (WHO, 2003; WHO, 2008). وتقوم البكتيريا بتحليل المادة العضوية لتنتج غاز كبريتيد الهيدروجين الذي يتحلل هوائياً الذي يؤدي الى خفض الدالة الحامضية (مصطفى ومعاذ، ٢٠٠٧).

- الدالة الحامضية :

إن الرقم الهيدروجيني هو قياس الحامضية أو القاعدية الطبيعية في المحلول، (Kumar and Puri, 2012). تعد قيم الدالة الحامضية ذات علاقة وثيقة مع نوعية المايكروبات التي يمكن ان تستوطن في المادة الموجودة فيها، ومن النتائج في الجدول (٥) تبين ان الدالة الحامضية لعينات الماء في مناطق الدراسة كانت عند (٧,٢-٨,٢٨) وفي جميع فصول السنة مما يشير إلى ملاءمة الماء في جميع حالاته لنمو معظم أنواع البكتيريا (Prescott, 2010) ، إن انخفاض قيمة الـ pH يؤدي إلى رفع مستوى التآكل للمعادن (Stone, 1987)، وكذلك يكون تأثيره

الجدول (٥): قيم الدالة الحامضية لعينات الماء المأخوذة من مواقع محطات تصفية مختلفة على نهر دجلة

قيم الدالة الحامضية حسب الفصول				فترة سحب العينات	
الربيع	الشتاء	الخريف	الصيف	المواقع	
٨,٠٦	٧,٨٦	٧,٩٨	٨	١	موصل
٧,٨٥	٧,٧٤	٧,٨٧	٧,٨٤	٢	
٧,٨٥	٧,٤	٧,٨٧	٧,٨٤	٣	
٨,١٦	٧,٦٦	٨,٢٨	٨,٢	١	قيارة
٨,٢	٧,٠٢	٧,٨٧	٨,٠	٢	
٨,٢	٧,١٢	٧,٨٠	٨,٢	٣	

١ = عينة ماء النهر = ٢ عينة ماء محطة التصفية = ٣ عينة ماء البيوت

٦- قيم الكلور:

هي ٠,٠٢ (White, 1978) mg/liter. وفي الماء

يتفاعل الكلور حتى يكون Hypochlorous acid و

Hypochlorites ، هذه الأنواع الثلاثة تخرج

متوازنة فيما بينها، وهذه الكميات المتنوعة مترابطة مع

الدالة الحامضية ففي المحاليل عند الدالة الحامضية حوالي

٤,٠ تكون كمية جزيئات الكلور قليلة في المحلول. إن

تركيز حامض Hypochlorous وأيون

الهايپوكلورايت Hypochlorites هو تقريباً متساو

في pH الذي يساوي ٧,٥ في درجة ٢٥°م (WHO,

تعد قيم الكلور من الأهمية أكثر من جميع

المعايير في عينات الماء، إذ أن الكلور يضاف لغرض قتل

الميكروبات الملوثة للماء، أن فاعليته تكون من خلال

التأثير على الجدار الخلوي للأحياء المجهرية، وإن زيادة

تركيزه في الماء يؤدي إلى حصول تأثيرات سلبية على

الإنسان. إن الكلور يوجد في مياه الشرب المعقمة بتركيز

٢,٠-١ mg/liter إن أعلى قيمة للكلور الكلي هي

٥ mg/liter وأقل قيمة لتركيز الكلور

mg/L

(1982). أن الكلور الحر المتبقي يؤثر وسيطر على

أشباه القولونيات عندما يكون تركيزه أكثر من ١٠٠ .

الجدول (٦): قيم الكلور لعينات الماء المأخوذة من مواقع محطات تصفية مختلفة على نهر دجلة

قيم الكلورايد لعينات الماء المأخوذة mg/L				فترة سحب العينات	
الربيع	الشتاء	الخريف	الصيف	المواقع	
١٩	١٦,٨	١٦	١٦	١	موصل
٢١	١٩,٧	٢٠	١٨	٢	
٢١	٢٣,٢	١٦	٢٠	٣	
٢١,٤٥	٢٠,٤٧	٢٠	٢٠	١	قيارة
١٩,٥	١٩,٥	٢٠	٢٢	٢	
٢٣,٤	١٩,٥	٢٠	٢٢	٣	

١= عينة ماء النهر=٢ عينة ماء محطة التصفية=٣ عينة ماء البيوت

٧- الأوكسجين المذاب

إن شبكة توزيع المياه تكون ذات تهوية جيدة، وهذا

سوف يضعف خطر الأحياء الدقيقة ويحث حدوث

التآكل، وإنتاج الكبريت على أية حال (WHO,

2004).

يتغير الأوكسجين موسمياً وكذلك يتغير خلال

فترة ٢٤ ساعة وهذا يعود إلى أن تحلل المواد العضوية عن

طريق الأحياء أو إنتاج الأوكسجين من قبل النباتات

إن تركيز الأوكسجين المذاب يؤثر في عملية الالتصاق

الأولي للخلايا وإنتاج السكريات المتعددة الخارجية

(Skolimowki,2010). إذ وجد في احدي

الدراسات أن مدى قابلية التصاق

Pseudomonas aeruginosa على المادة

الأساس يتغير مع الانحدار في تركيز الأوكسجين المذاب.

والطحالب في الماء ، وقد لوحظ أن الماء البارد يجوي على مستوى عالٍ من الأوكسجين مقارنة بالماء الدافئ (APHA 1992) وهذا يظهر بشكل واضح في الجدول (٧) أن قيم الأوكسجين كانت مرتفعة في فصلي الشتاء والربيع إذ تراوحت بين (٤,٧٥-٧,٣١) . مقارنة مع الصيف والخريف حيث تراوحت بين (٤,٦٥-٣,٥)

الجدول (٧) قيم الأوكسجين المذاب المأخوذة من مواقع محطات تصفية مختلفة على نهر دجلة

قيم الأوكسجين المذاب لعينات الماء المأخوذة mg/L				فترة سحب العينات	
الربيع	الشتاء	الخريف	الصيف	المواقع	
5.71	٥,٩٨	3.20	3.39	1	الموصل
4.81	٦,٣٦	3.16	3.27	2	
5.35	٥,٨٠	3.5	3.12	3	
4.22	٧,١١	3.40	3.53	1	قيارة
4.73	٧,٣١	3.36	3.45	2	
4.33	٧,١٢	3.17	3.10	3	

1= عينة ماء النهر ٢= عينة ماء محطة التصفية ٣= عينة ماء البيوت

8 - عزل وتشخيص الأنواع المايكروبية:

مناسبة لأغلب أنواع البكتيريا في نموها ولذلك فإن الأنواع التي ظهرت تعد من الأنواع الهوائية من البكتيريا ، وان تقدير العدد الكلي للبكتيريا في المياه يعد مهما في معرفة مدى التلوث (الشواني، ٢٠٠٩) .

تم استخدام وسط الاغار المغذي للكشف عن الأنواع المايكروبية الكلية الهوائية من البكتيريا كونه من الأوساط العامة للنمو البكتيري لاسيما عندما يكون النمو عند ٣٧ °م وفي ظروف هوائية التي تعد

لتشخيص الأنواع المايكروبية من المكورات العنقودية فإن عزلها كان من خلال تنميتها على وسط Mannitol Salt Agar إذ تم اختبار قابلية العزلات على تخمير سكر المانيتول، وبعد التأكد من أنها موجبة لصبغة جرام فقد اجري اختبار قابليتها على إنتاج إنزيم الكاتاليز والاكسيديز الجدول وقابليتها على الحركة وإنتاج اليوريز وإنتاج كبريتيد الهيدروجين والقابلية التخمرية لبعض أنواع السكريات. وبعد المقارنة لنواتج التنمية على الأوساط والاختبارات المشار إليها فان الأنواع التي تم تشخيصها تضمنت الأنواع من البكتريا التالية *Staph. aureus* ، *Staph.epidermidis* ، *Staph.saprophyticus* ، *Str.mutans* ، *Str.pyogenes*، *B.ceres* و *Pse.aeruginosa* ان الانواع المشار إليها تظهر غالبيتها في إنها مكونة للغشاء الحيوي عند تنميتها على الأوساط الملائمة لنموها .

اما الاختبارات المثبتة في الجدول (8) فانها تعد من أهم الاختبارات التي يتم من خلالها الى تشخيص أنواع البكتريا المعوية بعد تنميتها على وسط MacConkey agar وملاحظتها على الوسط الزرعي من ناحية الشكل والفطر، وكذلك شكلها تحت المجهر وقابليتها على الاصطبغ بصبغة جرام. فضلاً عن اختبارات IMViC واختبار الكاتاليز والاكسيديز وقابليتها على الحركة وكذلك قابليتها على إنتاج انزيم اليوريز وإنتاج كبريتيد الهيدروجين إضافة إلى قابليتها على تخمير بعض أنواع السكريات. ان الفحوصات المشار إليها تعد كافية للوصول إلى مستوى النوع من البكتريا المعوية وإكمال التشخيص. وبعد المقارنة من خلال الاختبارات المشار إليها لغرض التشخيص فقد تبين بان *S.paratyphi* ، *E.coli* ، *Pro.Mirabilis* ، *pseudotuberculosis* ، *Cit. freundii* ، *Y. enterocolitica* ، *Y. Pro.alcalifaciens* و *Cit. diversus* .

الجدول (٨): نتائج الاختبارات الكيموحيوية لتشخيص عزلات العائلة المعوية المعزولة من مواقع مختلفة من نهر دجلة

تخمير السكريات						H ₂ S	TSI	اليوريز	الحركة	الأكسيديز	الكاتاليز	IMVC	الأنواع الجرثومية
كلوكوز	لاكتوز	سكروز	سوربيتول	ارابينوز	زايلوز								

+	+	+	v	+	+	-	A/A	-	+	-	+	++ --	<i>E. coli</i>
-	+	+	-	-	+	+	AIK/A	-	+	-	+	- + - -	<i>S. paratyphi</i>
-	-	-	v	-	+	+	AIK/A	+	+	-	+	- + vv	<i>Pro. Mirabilis</i>
+	+	-	-	-	-	-		+	+	-	+	- + - -	<i>Y. pseudotuberculosis</i>
v	+	+	+	-	-	-		V	+	-	+	v + - -	<i>Y. enterocolitica</i>
+	+	+	v	v	+	+	A/A	V	+	-	+	- + - +	<i>Cit. freundii</i>
+	+	+	v	v	+	v	A/A	V	+	-	+	++ - +	<i>Cit. diversus</i>
-	-	-	+	-	v	-	AKV/A	-	+	-	+	++ - +	<i>Pro. alcalifaciens</i>

v متغايرة

- نتيجة سالبة

+ نتيجة موجبة

الجدول (٩): نتائج الاختبارات الكيموحيوية لتشخيص البكتيرية العنقودية والسبحية والمكونة للصبورات والزوائف المعزولة من

مواقع مختلفة من نهر دجلة

تحلل السكريات						H ₂ S	TSI	Bactracin	النوريز	الحركة	الأكسيداز	الكاتالاز	الأنواع الجرثومية
زالموز	ارابيتوز	سوريبتول	سكروز	لاكتوز	كلوكوز								
-	-	+	+	+	+	-	-	+	v	-	-	+	<i>Staph.aureus</i>
-	-		+	v	+	-	+	-	+	-	-	+	<i>Staph.epidermidis</i>
-	-	-	+	+	+	-	+	-	+	+	-	+	<i>Staph.Saprophyticus</i>
-		+	-	-	-	-		-	-	+	-	+	<i>B. cereus</i>

		-		+	+			-.					<i>Str.Pyogenes</i>
		+	+	+	+					-			<i>Str.Mutans</i>
		-	-	+	-	AIK/AK	-	V	+	+	+		<i>Pse.aeruginosa</i>

نتيجة سالب - + نتيجة موجبة لم يجرى لها اختبار

الجدول (١٠) أعداد أنواع البكتريا الملوثة لعينات المياه المأخوذة من مواقع مختلفة في مدينة الموصل

العدد الكلي لأنواع البكتريا (وت م / مل)				الأنواع البكتيرية فترة أخذ العينات	
المكونة للسبورات	المكورات العنقودية والسبحية	المعوية	العدد الكلي Total) (count		
٥١٢	١٦٠	١٤٤٠	336	١	الصيف
Zero	Zero	٤	٢٣٨	٢	
Zero	Zero	٣	٣	٣	
٧٠٠	٥٠	٢٨٨	٣٥٢	١	الخريف
١٨	Zero	Zero	٣	٢	
١٠	Zero	Zero	٣	٣	
١٢٤٤	١٥٢	١٢٠٠	٧٤٢	١	الشتاء

٢	Zero	٢	٣	٢	
Zero	Zero	٢	٢	٣	
٩٩٠	١٩	١٣٢٠	٨٢٥	١	
٤٧	٨	٤	٢٢	٢	الربيع
١١	١٢	٣	١٤	٣	

١ = عينة ماء النهر ٢ = عينة ماء محطة التنقية ٣ = عينة ماء البيوت

الجدول (١١): أعداد أنواع البكتريا الملوثة لعينات المياه المأخوذة من مواقع مختلفة لنهر دجلة في منطقة القيارة

العدد الكلي لأنواع البكتريا (وت م / مل)				الأنواع البكتيرية	
المكونة للسبورات	المكورات العنقودية والسبحية	المعوية	العدد الكلي Total) (count	فترة أخذ العينات	
752	١٧٦	٢٥٦	٣٨٤	١	الصيف
192	Zero	١٤٤٠	١٢٨	٢	
2	٢	3	٤	٣	
٧٢٠	٣٥٢	٢٢٤	١٠٨٨	١	الخريف
٤٧٢	١١٣٦	١٢٨	٣٨٤	٢	
١٢	٦	٨	٥	٣	

859	٩٦	١٩٣٧	1289	١	الشتاء
١٠٤٠	٦٦١	597	٦٣١	٢	
827	39	٧٩	٤٦٤	٣	
١٣٢٥	٣١	٦٦٠	١١٣٢	١	الربيع
١٨١٥	٢٠	١١٣٩	١٤٨٥	٢	
١٤٤٠	٢٤	٨٢٥	١١٣٢	٣	

١= عينة ماء النهر=٢ عينة ماء محطة التصفية=٣عينة ماء البيوت

الأنواع المايكروبية الملوثة لعينات الماء:

تبين من النتائج في الجدول (١٠) و(١١) وجود تلوث عالٍ من أنواع الأحياء المجهرية في مياه نهر دجلة وفي جميع مواقع الدراسة، وتبين أن أكثرها هي من أنواع البكتريا المعوية لاسيما في فصول السنة من الصيف والشتاء والربيع التي كانت أعدادها عند ١٤٤٠، ١٢٠٠ و ١٣٢٠ (وت م/ مل) على التوالي، وأقلها في موسم الخريف إذا كانت أعدادها عند ٢٨٨ (وت م/ مل) ويعود سبب ازديادها في الشتاء والربيع الى زيادة تساقط الامطار وبالتالي زيادة الجريان السطحي وغسل الميكروبات ونقلها الى النهر اما في الصيف فيعود شحة تساقط الامطار وازدياد تركيز الملوثات وهذا يوافق ما

ذكره طليع (١٩٨٣) أن الحمل العضوي لمياه نهر دجلة قد تجاوز الحدود القياسية الدولية المعتمدة في تصنيف مياه الشرب وهذا لم يتوافق مع دراسة الجبوري ٢٠٠٥ الذي وجد انها انخفضت في فصل الشتاء عدا شهر شباط واتفقت مع دراسة البدري ٢٠١٢ الذي اظهر ارتفاعها في فصل الشتاء والربيع. واتفقت مع دراسة العكيدي ٢٠٠٩ لمياه الشرب في محافظة نينوى في أن معظم الجراثيم المعزولة تعود الى العائلة المعوية ولم تتوافق مع دراسة السامرائي ٢٠٠٩ التي سجلت انخفاضاً في اعداد بكتيريا القولون في فصل الصيف في محطة اسالة بيجي وظهرت دراسة (النعمي والراوي، ٢٠٠٤) ارتفاع اعداد البكتريا الهوائية والمعوية في مركز مدينة الموصل

- وسيادة النوع *E.coli* تلتها في الأعداد الأنواع من البكتريا المكونة للصبورات وفي جميع فصول السنة إذ كانت عند ٥١٢، ٧٠٠، ١٢٤٤ و ٩٩٠ (وت م/ مل) على التوالي تلتها في الأعداد البكتيرية من الأنواع البكتيرية الهوائية والأنواع من المكوّرات العنقودية. أما في حالة عينات الماء المأخوذة من محطات التصفية فقد لوحظ أيضاً تلوثها بأنواع من الأحياء المجهرية ولاسيما في فصل الصيف ومن البكتريا الهوائية التي كانت بأعداد ٢٣٨ (وت م/ مل)، وتواجدت كذلك ولكن بأعداد قليلة في بقية فصول السنة، كما تواجدت الأنواع الأخرى من البكتريا المعوية والمكونة للصبورات في عينات الماء المأخوذة من محطة التصفية. ولم تحل عينات الماء المأخوذة من البيوت في مدينة الموصل من أنواع البكتريا الملوثة لها، حيث احتوت على أنواع المايكروبات الملوثة من المجاميع الهوائية والمعوية والمكوّرات العنقودية والبكتريا المكونة للصبورات وفي جميع فصول السنة، ولكن أكثرها التي كانت ملوثة للعينات المأخوذة في فصل الربيع التي كانت بأعداد من المجاميع المذكورة عند ٣، ١٤، ١٢ و ١١ (وت م/ مل) وعلى التوالي
- المصادر:
- اوغلو، شفق طارق برهان (٢٠١٠). دراسة فيزيائية وكيميائية ومايكروبيولوجية للاغشية الحيوية المكونة في محطة اسالة مياه الشرب في جامعة تكريت. رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة تكريت.
- البدري، افراح طعمة خلف (٢٠١٢). دراسة تأثير مياه مجاري سامراء على نوعية المياه في نهر دجلة. رسالة ماجستير، كلية التربية للبنات، جامعة تكريت.
- الراوي، اميرة محمود والنعمي، اسامة محمد سعيد (٢٠٠٤). دراسة على خط التلوث المار في مركز مدينة الموصل، مجلة علوم الرافدين ١٥(٥): ١١٨-١٢٦.
- الجبوري، محييد مدالله (١٩٩٠). علم البكتريا الطبية. دار الكتب للطباعة والنشر- جامعة الموصل. الراوي، اميرة محمود والنعمي، اسامة محمد سعيد (٢٠٠٤). دراسة على خط التلوث المار في مركز مدينة الموصل، مجلة علوم الرافدين ١٥(٥): ١١٨-١٢٦.
- السامرائي، بيداء عبد القادر (٢٠٠٩). دراسة بيئية مايكروبيولوجية لمياه الإسالة في محافظة صلاح الدين. رسالة ماجستير.
- السنجري، مازن نزار (٢٠٠١). دراسة بيئية لنهر دجلة ضمن مدينة الموصل. رسالة ماجستير، كلية العلوم، جامعة الموصل

water and wastewater. 18th ed.
Washington, D.S.

Atlas, R. N. and Barth, R. (1993).
Microbial Ecology Fundamental
and application. U.S.A

Benson, H. J. (2002).
Microbiological Applications:
Laboratory Manual in General
Microbiology. 8th ed. McGraw Hill
Companies. USA.

Bruvold, W.H. &
Daniels, J.I. (1990). Standards for
mineral content in drinking
water. Journal of the American
water works association, 82:59-65.

Kumar, M. and Puri, A. (2012). A
review of permissible limits of
drinking water. Jordan J. Occup.
Environ. Med. 16: 4-40.

Prescott, L. M.; Harely, T. P. and
Klein, D. A. (2010).
"Microbiology" 8th ed. McGraw-
Hill Companies, Inc., USA.

Sigee, D. C. (2005). Fresh water
Microbiology. John Wiley and
Sons.

Skolimowski, M.; Nielsen, M. W.;
Emneus, J.; Molin, S.; Taboryski,
R.; Stevberg, C.; Dufva, M. and
Geschke, O. (2010). Microfluidic
dissolved oxygen gradient
generator biochip as a useful tool
in bacterial biofilm studies labchip.
10:2162-2169.

Smethurst, G. (1988). Basic water
treatment for Application World-

الشواني، طاووس محمد كامل (٢٠٠٩). الدلائل
الجرثومية للتلوث الاحيائي وعلاقتها ببعض العوامل
الفيزيائية والكيميائية المؤثرة عليها لبعض الانظمة البيئية
المائية في محافظة كركوك، اطروحة دكتوراه، كلية التربية،
جامعة تكريت.

طليح، عبد العزيز يونس (١٩٨٣). دراسة التأثيرات
الموسمية للفضلات المائية المطروحة من مدينة الموصل
على نوعية مياه نهر دجلة ومدى صلاحيتها للري
والشرب والصناعة، رسالة ماجستير، كلية التربية
،جامعة الموصل.

العكيدي، أنغام جبار (٢٠٠٩). التلوث الجرثومي لمياه
E.Coli الشرب في محافظة نينوى والتحري عن السلالة
0157: H7 وعلاقتها بمجالات إسهال الأطفال دون
سن الخامسة، رسالة ماجستير، كلية العلوم .جامعة
الموصل.

مصطفى، معاذ حامد ومنى حسين
جانكيز (٢٠٠٧). التباين النوعي لموقعين على نهر دجلة
ضمن مدينة الموصل، مجلة علوم الرافدين ١٨ (١): ١٣٣-
١٢٥.

APHA (American Public Health
Association) (1992). Standard
methods for the examination of

WHO (World Health Organization) (2003). pH in drinking water: Background document for development of who guidelines for drinking water quality.

WHO (World Health Organization) (2004). Guidelines for drinking water quality, 3rd ed. Geneva.

WHO (World Health Organization) (2008). Guidelines for drinking-water quality (electronic resource): incorporating 1st and 2nd, Vol.1,- 3rd .

World Health Organization (2003). Heterotrophic Plate Counts and Drinking-water SafetyA. Glasmacher. Published by IWA Publishing, London, UK

Wide. 2nd ed. Redwood-Great Britain

Stone, A. (1987). The effects of short term changes in water quality on Copper and Zinc corrosion rates. Journal of the American Water Works Association (AWWA). 79(2): 75-82.

Thirumalini, S. and Joseph, K. (2009). Correlation between Electrical Conductivity and total dissolved solids in natural water. Malaysian Journal of Science. 28(1): 55-61.

Tomar, M. (1999). Quality Assessment of Water and Wastewater. CRC press of Congress.

WHO (World Health Organization) (1984). Guide lines for drinking water quality. Vol.2- Geneva.

Perparation and Characterization of multi nuclear complexes of,Co(II)
Ni(II), Cu(II), Sb(II) , Bi(III) with(di Iso . ter. Butyl di thiophosphate)
Tin (IV) .

Enas . Hazim Mohammed , Nabeel Hadi Buttrus

ABSTRACT

My Reserch include preparation of the ligand bis (dithiophosphoryl disulfide) fom the oxidative addition reaction then react this ligand with tin metal to prepare (o,o di iso or ter. butyl dithiophosphate)tin(IV) and prepare 18 complexes in molar ratio (2:1) , (4:1) , (M:L) with general formula : $[M_2Sn\{S_2P(OBu^{i-t})_2\}_4Cl_4]$, $[M_4Sn\{S_2P(OBu^{i-t})_2\}_4Cl_8]$ M= Ni, Co, Cu And preparation complexes with formula $[SnSb_2\{S_2P(OBu^{i-t})_2\}_4Cl_6]$, $[SnBi_2\{S_2P(OBu^{i-t})_2\}_4(NO_3)_6]$ with meatel Salts: $NiCl_2 \cdot 6H_2O$, $CuCl_2 \cdot 4H_2O$, $SbCl_3$, $Bi(NO_3)_3 \cdot 5 H_2O$.

The prepared compounds adducts and complexes were characterized by spectral measurements (I.R, U.V), atomic absorption, magnetic and conductivity measurement.

تحضير وتشخيص معقدات متعددة النوى Co(II)، Ni(II), Cu(II), Sb(II) , Bi(III) مع مركبات

(0⁻,0) ثنائي ايزوبوتيل او البيوتيل الثالثي ثنائي ثايو فوسفات (القصدير(IV)

نبيل هادي بطرس

إناس حازم محمد

تضمن البحث تحضير الليكاندات بس(ثنائي ثايو فوسفورايل ثنائي الكبريتيد) من خلال تفاعل الاضافة المؤكسدة ومن ثم مفاعلة فلز القصدير مع الليكاندات اعلاه لتحضير المركب (O⁻O ثنائي ايزوبوتيل او البيوتيل الثالثي ثنائي ثايو فوسفات (القصدير(IV) وكذلك تحضير المعقدات ذو الصيغة التالية $[M_2Sn\{S_2P(Bu^tO)_2\}_4Cl_4]$ ، ونسبة مولية ٢:١ ليكاند - فلز من خلال التفاعل المباشر مع $MCl_2 \cdot 6H_2O$ حيث ان $M=Co(II), Ni(II)$ وكذلك تحضير المعقدات من النوع $[M_4Sn\{S_2P(Bu^tO)_2\}_4Cl_8]$ وكذلك المعقدات بالصيغة $[M_4Sn\{S_2P(Bu^tO)_2\}_4Cl_8]$ ونسبة مولية ٤:١ ليكاند - فلز وتحضير المعقدات بالصيغة $[M_2Sn\{S_2P(Bu^tO)_2\}_4X_6]$ اذ ان (Cl=X و Sb=M) ، ونسبة مولية ٤:١ ليكاند - فلز وتفاعل المعقدات بالصيغة $[Sn\{S_2P(Bu^tO)_2\}_4]$ مع $SbCl_3$ و $(NO_3=X, Bi=M)$ من خلال تفاعل المعقدات بالصيغة

$\text{Bi}(\text{NO}_3)_3$ وتم تشخيص المعقدات المحضرة بواسطة الطيف الذري وطيف الاشعة تحت الحمراء وفوق البنفسجية وقياسات التوصيلية والقياسات المغناطيسية

تخليق ليكاندات ذوات الصيغة

المقدمة

١. الأكسدة باليود⁽⁸⁾:

تعد هذه الطريقة من الطرق السائدة وتضمن هذه الطريقة أكسدة حوامض ثنائي ثايوفوسفوريك او احد املاحه في محاليل مائية تحوي على اليود وبوجود ١٠% من KI وتكون نسبة الناتج المستحصلة (٧٣-٨٨%)، وكما هو موضح في المعادلات الاتية:

bis(thiophosphoryl) disulfide

bis(thiophosphinyl) disulfide

R = Me, Et, Pr, Bu, ^tBu

تحضير الليكاند

فانها تعد مبحثا لايجاد العلاقة في الية عمل مانع

الأكسدة لمركبات ثنائي ثايوفوسفات في زيوت

التشحيم.

ان الليكاندات الحاوية على الكبريت لها اهمية واستخدامات كبيرة جدا. اذ تم استعمال هذه المواد بوصفها مثبتات لاجزاء البوليمر(1,2)، ومعجلات لعملية فلكنة المطاط(3,4) كما استخدمت مضادات للتآكل والأكسدة اذ تعمل على تكوين طبقة قوية على السطوح الفلزية لان لديها معامل احتكاك واطى(5)، وتستخدم مضافات في الصناعات النفطية لتحسين نوعية الوقود وزيت التشحيم(6,7) ويوجد طرق

ويمكن استعمال اليود في محاليل تحوي على

CH_2Cl_2 في حالة استبعاد الماء من التفاعل.

٢. الأكسدة باستعمال بيروكسيد

الهيدروجين⁽⁹⁾: تعد طريقة جيدة لأكسدة حامض

ثنائي ثايوفوسفوريك فضلا عن انها تعتبر طريقة

تحتزل الى حالات تأكسدية اوطاً باستعمال ايونات

ثنائي ثايوفوسفينايت والتي بدورها تعود

لتأكسد الى مركبات

bis(thiophosphinyl)disulfide وكما

موضح في المعادلات الالية^(١١):

(RO)₂P(S)SSP(S)(OR)₂ تكون معقدات

مع الاملاح الفلزية بعدم كسر اصرة S-S مثل تحضير

المعقدين TiCl₄L و VOCl₂L الناتجين من تفاعل

TiCl₄ و VOCl₃ مع الليكاند اذ ان (L =

(RO)₂P(S)SSP(S)(OR)₂ ، Pr = R ،

Et) اذ يسلك هنا الليكاند سلوك ثنائي السن ويكون

مركبات حلقيه حول ايون الفلز المركزي وقد اثبتت

دراسة الاشعة تحت الحمراء والاطياف الالكترونية

وبعض الخواص الفيزيائية ان المركب (I) يمتلك شكل

ثنائي السطوح حول ايون الفلز المركزي والمركب (II)

ياخذ شكل هرم مربع القاعدة.

٣. الاكسدة باستعمال ثنائي مثيل سلفوكسيد

⁽¹⁰⁾DMSO لحامض ثنائي ثايوفوسفوريك

(RO)₂P(S)SH اذ تعد طريقة ممتازة لتحضير

الليكاندات (RO)₂(S)PSSP(S)(OR)₂

٤. استعمال بعض العناصر الفلزية ذات التأكسد

العالي مثل Cu(II) و Au(III) و Tl(III) التي

وتعد فعالية الفلزات تجاه الثايورام ثنائي

الكبريتيد طريقة مشابهة لتحضير دايثايوكارباميت

الفلزات اذ ان الثايورام ثنائي الكبريتيد وبس

(ثايوفوسفورايل) ثنائي الكبريتيد

(RO)₂(S)PSSP(S)(OR)₂ تحتوي على

المجموعة الفعالة S-S والتي توحد الفعالية الكيمياءوية

للعناصر الانتقالية اذ من الممكن ان تتفاعل هذه

الليكاندات بكسر او بعدم كسر الاصرة S-S.

وعلى غرار ما ذكر، فقد اثبت

كادرايدو Cuadrado وموران Moran⁽¹²⁾ ان

ليكاندات ثنائية الكبريت ذوات الصيغة

(I)

(II)

I : المعقد [TiCl₄{(RO)₂P(S)SSP(S)(OR)₂}**II : المعقد [VOCl₂{(RO)₂P(S)SSP(S)(OR)₂}**

كما يمكن لليكاندات بس (ثايوفوسفورايل) ثنائي الكبريتيد ذوات الصيغة (RO)₂P(S)SSP(S)(OR)₂ ان تكون معقدات مع الاملاح الفلزية من خلال كسر حراري متجانس لاصرة S-S وحدوث تفاعل الاضافة المؤكسدة (Oxidative-addition)

reaction) مع بعض العناصر الفلزية سواء الرئيسية او الانتقالية، اذ تزداد حالة التاكسد في التفاعلات بمقدار وحدتين او أكثر وبهذه العملية يزداد العدد التناسقي وذلك بتأصر اجزاء مكونات الجزيئة المؤكسدة⁽¹³⁻¹⁵⁾ كما هو مبين في المعادلة الاتية:

في ضوء ما ذكر فقد حضر العالم كزمان Kuzmin وجماعته⁽¹⁶⁾ معقدات من النوع [Co{S₂P(OR)₂}₃] من خلال اكسدة المعقد [Co{S₂P(OR)₂}₂] واختزال الليكاند وكذلك . (RO)₂P(S)SSP(S)(OR)₂ اثبتت الدراسة ان وجود اليود يسرع من عملية الاكسدة وتكوين الناتج كما هو موضح في المعادلة الاتية:

ثانيا: الجزء العملي

1-2- تحضير الليكاند

يمزج (٠,٠٢ مول، ٥,٢٨ غم) من ليكاند ثنائي اثيل ثنائي ثايوفوسفات الصوديوم والمذابة في ٢٠ ملتر من الماء المقطر مع (٠,٠١ مول، ٢,٥٤ غم) من اليود المذاب في (١٠ ملتر) من الايثانول ثم يصعد

المزيج لمدة ساعة في دورق زجاجي سعة (٢٥٠ مل) . بعد ذلك يتم اضافة محلول (١٠%) من يوديد البوتاسيوم الى مزيج التفاعل . يستمر تصعيد المحلول الناتج لمدة ساعتين مع التحريك المستمر وبعد ذلك يترك المحلول ليبرد في درجة حرارة الغرفة لمدة ٢٤ ساعة ليتم الترسيب . بعد ذلك يتم ترشيح الراسب المتكون ويتم غسله بالايثر لعدة مرات ويجفف تحت الضغط المخفّف، اذ يتم الحصول على راسب اصفر .

البيوتيل الثالثي ثنائي ثايوفوسفات الصوديوم والمذاب بـ
٢٠ مللتر من (ميثانول-ماء) بنسبة (١:١ / V:V)
والحصول على راسب برتقالي محمر . والمعادلة العامة
للتحضير مبينة كما في ادناه:

٢-٢ تحضير الليكاند

يحضر هذا الليكاند بالطريقة السابقة نفسها باستثناء استخدام (٠,٠٢ مول، ٥,٢٨ غم) من ثنائي

اذ ان (R = ايزوبيوتيل، بيوتيل الثالثي)

الجدول (١): بعض الخواص الفيزيائية لليكاندات المحضرة

الليكاندات	الصيغة الوضعية $(RO)_2PSSP(OR)_2$	اللون	النسبة المئوية (%)	درجة التفتك (م°)	التوصيلية المولارية Λ_M سم ^٢ . اوم ^{-١} . مول ^{-١}
L ₁	R = ايزوبيوتيل	اصفر	٧٢	١٩٨-٢٠٠	٢٥
L ₂	R = البيوتيل الثالثي	برتقالي محمر	٧٦	١٢٤-١٢٦	١١

يتم تقطيع فلز التصدير الحر الى قطع صغيرة جدا ثم يؤخذ (٠,٠١ مول، ١,١٩ غم) ويمزج مع (٠,٠٢ مول، 9.64 غم) من الليكاند (L₁) في دورق

٣-٢ تحضير المركبات من النوع

اذ ان $(Ni(II) , Co(II) = M)$ ،

$(Cu(II))$

يتم تحضير هذا النوع من المعقدات باضافة

$(0,001$ مول، $1,08$ غم) من المركب

$[Sn\{S_2P(OR)_2\}_4]$] عندما $(R =$

ايزوبوتيل والبيوتيل الثالثي والمذاب في $(20$ مل من

الايثانول الى $(0,002$ مول، $0,26$ غم) من (MCl_2)

اذ ان $(Ni , Co = M)$ المذاب في $(10$ مل من

الميثانول او $(0,002$ مول، $0,43$ غم) من كلوريد

النحاس المذاب في $(10$ مل من الماء المقطر في دورق

زجاجي سعة $(100$ مل)، يتم تصعيد المزيج مع

التحريك المستمر. بعد اكمال التصعيد لمدة ساعتين

يتم تسخين المحلول للتخلص من المذيب اذ يتكون

راسب يغسل عدة مرات بالميثانول ومن ثم بالايثر وبعد

ذلك يتم تجفيفه تحت الضغط المخلخل لمدة 3

ساعات.

٦-٢ تحضير معقدات من النوع

$[M_4Sn\{S_2P(OR)_2\}_4Cl_8]$

اذ ان $[M = Co(II), Ni(II),$

$Cu(II)]$

يتم تحضير هذا النوع من المعقدات بمزج

$(0,001$ مول، $1,08$ غم) من المركب

زجاجي دائري سعة $(100$ مل) وباستخدام $(40$ مل)

من التولوين الجاف بوصفه مذيبا. بعد ذلك تجرى

عملية تصعيد حراري شديد لمزيج التفاعل مع

التحريك المستمر لمدة (12) ساعة. بعد ذلك يتم

تبريد المحلول عند درجة حرارة الغرفة ويتم التخلص

من الفلز المتبقي عن طريق الترشيح البسيط. ثم يركز

المحلول الى $(1/3)$ حجمه ويرشح الراسب المتكون

ويتم غسله عدة مرات بالايثر ويحفظ تحت الضغط

المخلخل.

٤-٢ تحضير المركبات من النوع

$[M_2Sn\{S_2P(OR)_2\}_4X_6]$:

يتم تحضير هذا النوع من المركبات بمزج $(0,001$ مول،

$1,08$ غم) من المركب $[Sn\{S_2P(OR)_2\}_4]$

عندما $(R =$ ايزوبوتيل ، البيوتيل الثالثي) والمذاب في

$(20$ مل من الايثانول مع $(0,002$ مول، $0,46$ غم)

من كلوريد الاتمون $(SbCl_3)$ و $(0,002$ مول،

$0,97$ غم) من نترات البزموث

$Bi(NO_3)_3 \cdot 5H_2O$. والمذاب في (10)

مل من الماء المقطر في دورق زجاجي دائري سعة

$(100$ مل) ويصعد المزيج مع التحريك المستمر لمدة

ساعتين .

٥-٢ تحضير معقدات من النوع

$[M_2Sn\{S_2P(OR)_2\}_4Cl_4]$:

زجاجي دائري سعة (١٠٠ مل) ويصعد المزيج مع
التحريك المستمر لمدة (٤) ساعات. يبرد مزيج
التفاعل ويرشح الراسب المتكون ويغسل عدة مرات
بالإيثانول ومن ثم بالإيثير وبعد ذلك يتم تجفيفه تحت
الضغط المخلخل لمدة ثلاث ساعات.

عندما $[Sn\{S_2P(OR)_2\}_4]$ = R) ايزوبوتيل
وبيوتيل الثالثي،
والمذاب في (٢٠) مل من الإيثانول مع (٠,٠٠٤) مول
(غم) من كلوريد النحاس ($CuCl_2 \cdot 2H_2O$)
والمذاب في (٢٠) مل من الماء المقطر في دورق

جدول (٢): الصبغ الوضعية وقيم التحليل الدقيق للعناصر والنسب المئوية للنواتج مع بعض الخواص الفيزيائية

للمعقدات المحضرة

رقم المعقد	الصيغة الوضعية	اللون	النسبة المئوية %	درجة التفكك م°	النسبة المئوية (القيمة العملية)/القيمة النظرية	
					Sn	M
1	$[Sn\{(isobutyl)_2dtp\}_4]$	اصفر قهوائي	76	162- 164	(11.17) 10.98	
2	$[Co_2Sn\{(isobutyl)_2dtp\}_4Cl_4]$	اخضر فاتح	82	155- 158	(8.59) 8.86	(8.38) 8.78
3	$[Ni_2Sn\{(isobutyl)_2dtp\}_4Cl_4]$	اخضر فاتح	65	209- 211	(9.15) 8.86	(8.29) 8.74
4	$[Cu_2Sn\{(isobutyl)_2dtp\}_4Cl_4]$	قهوائي غامق	76	169- 171	(8.35) 8.79	(9.09) 9.39
5	$[Co_4Sn\{(isobutyl)_2dtp\}_4Cl_8]$	خاكي غامق	66	158- 160	(7.79) 7.42	(14.67) 14.65
6	$[Ni_4Sn\{(isobutyl)_2dtp\}_4Cl_8]$	اصفر مخضر	71	219- 221	(7.21) 7.42	(14.25) 14.65
7	$[Cu_4Sn\{(isobutyl)_2dtp\}_4Cl_8]$	بني غامق	85	183- 185	(7.80) 7.33	(15.72) 15.42
8	$[Bi_2Sn\{(isobutyl)_2dtp\}_4(NO_3)_6]$	برتقالي محمر	74	212- 214	(16.13) 16.34	
9	$[Sb_2Sn\{(isobutyl)_2dtp\}_4Cl_6]$	برتقالي	83	113- 115	(7.47) 7.70	
10	$[Sn\{(tert-butyl)_2dtp\}_4]$	اصفر	78	223- 225	(11.26) 10.98	
11	$[Co_2Sn\{(tert-butyl)_2dtp\}_4Cl_4]$	برتقالي غامق	77	170- 172	(9.08) 8.86	(8.98) 8.78
12	$[Ni_2Sn\{(tert-butyl)_2dtp\}_4Cl_4]$	اصفر فاتح	73	212- 214	(8.41) 8.86	(8.37) 8.74

13	[Cu ₂ Sn{(tert-butyl) ₂ dtp} ₄ Cl ₄]	خاكي	64	196-198	(8.49) 8.79	(9.64) 9.39
14	[Co ₄ Sn{(tert-butyl) ₂ dtp} ₄ Cl ₈]	خردلي غامق	78	152-154	(7.63) 7.42	(14.80) 14.65
15	[Ni ₄ Sn{(tert-butyl) ₂ dtp} ₄ Cl ₈]	اخضر فاتح	83	156-158	(7.79) 7.42	(14.40) 14.65
16	[Cu ₄ Sn{(tert-butyl) ₂ dtp} ₄ Cl ₈]	شذري	76	240-242	(7.82) 7.33	(16.00) 15.42
17	[Bi ₂ Sn{(tert-butyl) ₂ dtp} ₄ (NO ₃) ₆]	حليبي	72	> 400	(6.64) 6.34	
18	[Sb ₂ Sn{(tert-butyl) ₂ dtp} ₄ Cl ₆]	ابيض مسمر	65	> 400	(7.39) 7.70	

dtp = ثنائي ثايوفوسفات

M= Co(II), Ni(II), Cu(II)

وقد تبين من نتائج قياسات التوصيلية

الكهربائية انها تتفق مع الصيغ التركيبية للمعقدات المحضرة، اذ وجد ان ليكاندات بس (ثايوفوسفورايل) ثنائي الكبريتيد وجميع المعقدات المحضرة تقع ضمن مدى صنف المعقدات ذات السلوك المتعادل غير الالكتروليتية او ضعيفة التوصيلية وقيم التوصيلية للمعقدات تتراوح بين (٨-٢٣ سم^٢ . اوم^{-١} . مول^{-١})^(١)، وكما موضح في الجدول (3).

٣- النتائج والمناقشة:

١-٣ الامتصاص الذري: **Atomic**

Absorption

تم تقدير كل من القصدير والكوبلت والنيكل والنحاس لقسم من المعقدات ومقارنة النسب المئوية لهذه العناصر على اساس الصيغ التركيبية المقترحة، وكانت النتائج العملية مطابقة لتحليل هذه العناصر كما موضح في الجدول (٣).

٢-٣ التوصيلية الكهربائية المولارية: **Molar**

Conductivity

الجدول (٣): قيم التوصيلية الكهربائية المولارية (سم^٢ . اوم^{-١} . مول^{-١}) للمعقدات المحضرة في درجة حرارة (٢٥ م°)

وتركيز (10⁻³ M) في مذيب (DMSO)

رقم المعقد	التوصيلية الكهربائية
1	11
2	20

3	19
4	9
5	19
6	12
7	9
8	9
9	10
10	16
11	18
12	16
13	14
14	20
15	23
16	17
17	8
18	13

⁽²⁵⁾ وعليه فهي تسلك سلوك معقدات النيكل ذوات شكل المربع المستوي.

واخيرا فقد اظهرت معقدات النحاس (II) المحضرة (4,13) عزوما مغناطيسية مساوية لـ (B.M, 2.30, 2.02) على التوالي، وهذه القيم تتفق مع معقدات النحاس (II) ثمانية السطوح^(26,27). في حين ان معقدات النحاس (II) المحضرة (7,16) اعطت عزوما مغناطيسية مساوية لـ (B.M, 1.91, 1.81) على التوالي وهذه القيم تتفق مع معقدات النحاس (II) رباعية السطوح^(28,29).

٣- القياسات المغناطيسية: **Magnetic**

Measurements اظهرت معقدات الكوبلت

(II) المحضرة (2,5, 11, 14) عزوما مغناطيسية مساوية لـ (2.35, 2.58, 2.12, 2.10) (B.M) على التوالي كما في الجدول (٤). وهذه القيم تتفق مع معقدات الكوبلت (II) ذات شكل المربع المستوي^(19, 20)، اما معقدات النيكل (II) المحضرة (3, 12) فقد اظهرت عزوما مغناطيسية مساوية لـ (B.M ٢,٩٢، ٣,٢٠) على التوالي. وهذه القيم تتفق على نحو عام مع معقدات النيكل ثمانية السطوح عالية البرم^(21,22). في حين اظهرت معقدات النيكل (II) المحضرة (6, 15) خواص ديامغناطيسية⁽²³⁾.

الجدول (٤): نتائج القياسات المغناطيسية للمعقدات المحضرة بدرجة حرارة الغرفة

رقم المعقد	الحساسية الغرامية $\chi_g \times 10^{-6}$ (c.g.s.u)	معامل التصحيح الدايامغناطيسي $D \times 10^{-6}$ (c.g.s.u)	الحساسية الذرية $\chi_A \times 10^{-6}$ (c.g.s.u)	العزم المغناطيسي الفعال μ_{eff} (B.M)
2	5.709	771.04	8451.819	2.10
3	10.13	771.04	14396.45	2.92
4	5.9923	771.04	8885.065	2.30
5	4.1917	877.04	7596.3351	2.12
6	-	-	-	دايامغناطيسي
7	3.2587	877.04	6165.993	1.91
11	1.5018	877.04	2801.231	2.58
12	3.1469	877.04	4313.339	3.20
13	4.4288	877.04	6869.262	2.02
14	5.348	877.04	9261.6732	2.35
15	-	-	-	دايامغناطيسي
16	2.8506	877.04	5503.610	1.81

٣-٤ الاطياف الالكترونية: Electronic Spectra

الجدول (٥): قيم طيف الاشعة فوق البنفسجية/المرئية لليكاندات الحرة

اليكاندات	Band (1)		Band (2)		Band (3)	
	λ_{max} (nm)	ν (cm ⁻¹)	λ_{max} (nm)	ν (cm ⁻¹)	λ_{max} (nm)	ν (cm ⁻¹)
L _v	227	44052	269	37174	339	29498
L _v	263	38022	320	31250	355	28169

والامتون والبزموت. اذ وجد ظهور حزم جديدة للمركبات المحضرة عند المواقع (٣٥٧-٤٠٥ نانوميتر) كما في الجدول (٦) وهي تعزى الى طيف نقل الشحنة Charge transfer transition (C.T) من اوربيٲال الليكاند الممتلئ الى اوربيٲال الفلز الفارغ،

وعند قياس طيف الاشعة فوق البنفسجية للمركبات المحضرة في هذا البحث لوحظ اختلاف في مواقع هذه الحزم عن تلك العائدة لليكاندات الحرة مما يؤكد حدوث التناسق بين ليكاندات بس (ثايوفوسفورائل) ثنائي الكبريتيد مع كل من التصدير

وتكون شديدة الامتصاص وتقع عادة في المنطقة فوق البنفسجية ولكن نهايتها تقع في المنطقة المرئية غالبا وهذا يتفق مع ما نشر من بحوث في هذا المجال⁽³⁰⁾

وفيما يأتي جدولاً بقيم طيف الأشعة فوق البنفسجية/المرئية للمركبات المحضرة.

(32)

الجدول (٦): الطيف الإلكتروني (سم⁻¹) لمركبات بعض العناصر الرئيسية في مذيب DMSO

رقم المركب	Band (1)		Band (2)		Band (3)	
	$\lambda_{\max}$ (nm)	ν (cm ⁻¹)	$\lambda_{\max}$ (nm)	ν (cm ⁻¹)	$\lambda_{\max}$ (nm)	ν (cm ⁻¹)
1	258	38759	302	33112	390	25641
8	232	43103	325	30769	363	27548
9	269	37174	343	29194	-	-
10	235	42553	-	-	371	26954
17	254	39370	329	30395	372	26881
18	228	43859	354	28248	405	24691

أظهرت معقدات الكوبلت (II) المحضرة (2، 5، 11، 14) حزمة امتصاص واسعة وقوية عند (١٣٧١٧-١٨١١٥ سم⁻¹)، الجدول (٩)، وهي تعزى إلى الانتقال الإلكتروني ($^2A_{1g} \rightarrow ^2E_g$) مما يدل على اتخاذ هذه المعقدات شكل المربع المستوي، أما الحزم الأخرى فلم تظهر لأنها تقع خارج مدى الجهاز المستخدم.^(34,33)

الجدول (٧): الطيف الإلكتروني (سم⁻¹) لمعقدات الكوبلت (II) رباعية التناسق باستخدام مذيب (DMSO)

رقم المعقد	$^2A_{1g} \rightarrow ^2E_g$	$^4A_2 (F) \rightarrow ^4T_1 (P)$	حزم انتقال الشحنة (C.T)
2	14367, 15243		24813
5	14705, 16286		23809
11	15748, 16077		25641, 33898
14	13717, 15060, 18115		23201, 28060

ولقد تم قياس الطيف الالكتروني لمعقدات النيكل، اذ اظهرت معقدات النيكل (II) المحضرة (12,3) حزم امتصاص محدود (٢٢٠٧٥-٢٥٥١٠ سم^{-١}) وتعزى الى الانتقال الالكتروني $^3A_2g (F) \rightarrow ^3T_1g (P)$ ، وحزم امتصاص اخرى محدود (١٤١٨٤-١٩٢٣٠ سم^{-١}) وتعزى الى الانتقال الالكتروني $^3A_2g (F) \rightarrow ^3T_1g (F)$ ،

وحزم امتصاص اخرى محدود (١١٠٤-١٢٤٥٣ سم^{-١}) وتعزى الى الانتقال الالكتروني $^3A_2g (F) \rightarrow ^3T_2g (F)$ ، وان هذه القيم تتفق مع ترتيب النيكل (II) ثنائي السطوح⁽³⁵⁻³⁷⁾.

الجدول (٨): الطيف الالكتروني (سم^{-١}) لمعقدات النيكل (II) سداسية التناسق باستخدام مذيب (DMSO)

رقم المعقد	$^3A_2g (F) \rightarrow ^3T_2g (F)$	$^3A_2g (F) \rightarrow ^3T_1g (F)$	$^3A_2g (F) \rightarrow ^3T_1g (P)$
3	11049	19230, 17108	22075, 25510
12	12453	14184, 16155	24813

اما معقدات النيكل (II) المحضرة (6, 15) فقد اظهرت حزم امتصاص عند (١٥٣٢٦-١٨٢٤٨ سم^{-١}) وهي تعود للانتقال الالكتروني $^1A_1g \rightarrow ^1A_2g$ وحزمة امتصاص اخرى عند (١١٠٤-١٢٤٥٣ سم^{-١}) وتعود للانتقال الالكتروني $^1A_1g \rightarrow ^1B_1g$ ، وان مواقع هذه الحزم تتفق مع ترتيب النيكل (II) شكل المربع المستوي^(38,39).

الجدول (9): الطيف الالكتروني (سم^{-١}) لمعقدات النيكل (II) رباعية التناسق باستخدام مذيب (DMSO)

رقم المعقد	$^1A_1g \rightarrow ^1A_2g$	$^1A_1g \rightarrow ^1B_1g$	$^3T_1 (F) \rightarrow ^3T_1 (P)$
6	16752	24312, 26205	
15	15326, 18248	25188	

وقد تم قياس الطيف الالكتروني لجميع معقدات النحاس (II) ، اذ اظهرت معقدات النحاس (II) المحضرة (4, 13) حزم امتصاص محدود (١٦٢٠٧-١٩٨٤١ سم^{-١}) تابعة الى $\square_1$ و $\square_2$ وحزم

امتصاص اخرى مجدود (٢٤٨١٣-٢٩٩٢٣ سم^{-١}) وان هذه الحزم تتفق على نحو عام مع معقدات النحاس
تعزى الى حزم انتقال الشحنة كما في الجدول (١٢)، (II) ثمانية السطوح^(41,40).

الجدول (١٠): الطيف الالكتروني (سم^{-١}) لمعقدات النحاس (II) سداسية التناسق باستخدام مذيب
(DMSO)

رقم المعقد	${}^2B_{1g} \rightarrow {}^2A_{1g}$	حزم انتقال الشحنة (C.T)
4	16583, 19841	24813, 28602
13	16207	27624, 29923

اما معقدات النحاس (II) المحضرة (16,7) موضحة في الجدول (١٣)، وان هذه الحزم تتفق على
نحو عام مع معقدات النحاس (II) رباعية التناسق بترتيب رباعي السطوح⁽⁴²⁾.
فقد اظهرت حزم امتصاص في المنطقة (١٠٨٩٣-١١٦٢٧ سم^{-١}) والتي تعزى الى الانتقال الالكتروني
 ${}^2E \rightarrow {}^2T_2$ ، وحزم اخرى مجدود (٢٦٤٠١-٢٩٣٢١ سم^{-١}) تمثل حزم انتقال الشحنة كما هو

الجدول (١١): الطيف الالكتروني (سم^{-١}) لمعقدات النحاس (II) رباعية التناسق باستخدام مذيب (DMSO)

رقم المعقد	${}^2T_2 \rightarrow {}^2E$	حزم انتقال الشحنة (C.T)
7	10893	26401, 29321
16	11627	27300, 28615

٣-٥ طيف الاشعة تحت الحمراء (IR) : التوالي وهي تعود الى مط الاصرة (S-S)⁽⁴³⁾، كما
موضح في الجدول (١٤).

٢. اهتزازات مط المجموعة (P=S) ν :

اعطت الليكاندات المحضرة (L_1 و L_2) حزم امتصاص قوية ومتوسطة في المواقع (٦٥٠ و ٦٥٥ سم^{-١}) والتي تعود الى مط المجموعة (P=S)⁽⁴³⁾. ويلاحظ ان مواقع هذه الحزم في طيف الاشعة تحت الحمراء

٣-٥ طيف الاشعة تحت الحمراء (IR) :

Infrared Spectra

. اهتزازات مط المجموعة (S-S) ν :

اعطت الليكاندات المحضرة (L_1 و L_2) في طيف الاشعة تحت الحمراء حزمة امتصاص ضعيفة ومتوسطة في المواقع (٤٥٠ و ٤٧٥ سم^{-١}) وعلى

٤ . اهتزازات مط المجموعة (P-O-C) : v

اظهرت قياسات الاشعة تحت الحمراء لليكاندات المحضرة (L_1 و L_2) حزم امتصاص ضعيفة ومتوسطة او قوية احيانا في المواقع (٩٨٤-١٠٣٦ سم⁻¹) التي تعود الى مط المجموعة (P-O-C) $\square$ (47)، كما هو موضح في الجدول (١٤)، اما في المعقدات المحضرة فلم تتغير مواقع هذه الامتصاصات.

٥ . اهتزازات مط المجموعة (Sn-S) : v

عند قياس طيف الاشعة تحت الحمراء للمركبات المحضرة في هذا البحث ظهرت حزمة امتصاص المجموعة (Sn-S) $\square$ في المنطقة المحصورة ما بين (٣٢١-٣٦٦ سم⁻¹) (48) على شكل حزم متوسطة وضعيفة وقوية احيانا (كما مبين في الجدول (١٥)، كما ان اختفاء حزمة الامتصاص (S-S) في طيف هذه المعقدات يدل على حدوث كسر الاصرة وتناسق الكبريت مع فلز القصدير (16)

٦ . اهتزازات مط المجموعة (M-S) : v

اعطت المعقدات المحضرة حزم امتصاص ضعيفة او متوسطة او قوية احيانا في المواقع (٣٤٧-٤٠٠ سم⁻¹)، كما مبين في الجدول (١٥)، مما يدل على تناسق الفلزات مع الكبريت الطرفية. وهذه النتائج تتفق مع ما نشر من مجوثر في هذا المجال (49).

للمعقدات المحضرة (1، 10) لم تعطى تغيرات ملحوظة، اما بالنسبة لبقية المعقدات المحضرة فقد ظهرت في المواقع المحصورة (٦٠٢-٦٤٥ سم⁻¹) بشكل حزم متوسطة او قوية وفي بعض الاحيان ضعيفة كما موضح في الجدول (١٥)، ويلاحظ ان هناك تقصا في قيم الترددات في المعقدات المحضرة عن تلك في الليكاندات مما يؤكد حدوث التناسق بين الليكاند والفلزات، وهذا ما اكدته الدراسات والبحوث المنشورة (127، 128).

٣ . اهتزازات مط المجموعة (P-S) : v

من قياسات اطيف الاشعة تحت الحمراء لليكاندات والمعقدات المحضرة لوحظ ظهور نوعين من الحزم للاصرة (P-S) $\square$ المتناظرة (Symmetry stretching) وغير المتناظرة (Asymmetric stretching)، اذ كانت ترددات الحزم المتناظرة لليكاندات (L_1 و L_2) المحضرة عند المواقع (٥٦١-٥٨٠ سم⁻¹). اما الحزم غير المتناظرة فظهرت في المواقع (٦١٦-٦٢٥ سم⁻¹) (43). بينما كانت ترددات الحزم المتناظرة للمعقدات المحضرة في المنطقة المحصورة (٥١٧-٥٦٣ سم⁻¹)، وغير المتناظرة في المنطقة المحصورة بين (٥٧٩-٦٢٥ سم⁻¹)، كما مبين في الجدول (١٢)، اذ لوحظ انخفاض في ترددات المعقدات عن ترددات الليكاندات، مما يدل على ان الليكاندات قد ارتبطت مع الفلزات عن طريق ذرة الكبريت (46).

الجدول (١٢): قيم الترددات للحزم المهمة في طيف الاشعة تحت الحمراء لليكاندات الحرة

الليكاندات	v (P=S)	v (P-S)		v (P-O-C)	v (S-S)
		Sym.	Asym.		
L ₁	655 (m)	561 (w)	616 (w)	984 (s)	450 (w)
L ₂	650 (s)	580 (m)	625 (m)	1035 (s)	475 (m)

الجدول (13): قيم الترددات للحزم المهمة في طيف الاشعة تحت الحمراء للمعقدات المحضرة

رقم المعقد	v (P=S)	v (P-S)		v (Sn-S)	v (M-S)	v (M-Cl)
		Sym.	Asym.			
1	653 (s)	529 (m)	609 (vw)	329 (w)	-	-
2	616 (s)	519 (m)	595 (w)	366 (m)	380 (vw)	253 (s)
3	639 (m)	538 (vw)	586 (s)	344 (w)	360 (m)	315 (m)
4	619 (s)	517 (w)	602 (m)	323 (m)	375 (w)	239 (m)
5	627 (m)	524 (w)	585 (vw)	321 (w)	389 (m)	279 (s)
6	602 (s)	522 (w)	579 (vw)	362 (w)	392 (w)	230 (s)
7	616 (w)	540 (vw)	600 (m)	352 (m)	366 (m)	282 (s)
8	645 (s)	535 (m)	605 (s)	364 (w)	400 (m)	-
9	605 (vw)	542 (s)	600 (m)	325 (vw)	347 (w)	258 (s)
10	650 (m)	555 (w)	585 (s)	355 (w)	-	-
11	622 (m)	537 (s)	615 (vw)	338 (m)	388 (m)	302 (w)
12	627 (w)	546 (w)	587 (m)	345 (vw)	372 (m)	269 (s)
13	618 (w)	561 (w)	616 (vw)	323 (m)	379 (w)	293 (vw)
14	613 (m)	559 (vw)	602 (m)	335 (w)	383 (w)	238 (s)
15	632 (s)	552 (w)	593 (m)	342 (vw)	371 (m)	239 (s)
16	620 (s)	563 (m)	590 (s)	352 (s)	368 (w)	289 (m)
17	610 (w)	539 (vw)	589 (m)	345 (w)	379 (m)	-
18	602 (s)	548 (m)	613 (m)	354 (s)	392 (m)	245 (w)

حزم امتصاص ضعيفة ومتوسطة وقوية احيانا كما

موضح في الجدول (١٣) وهذا يتفق مع ما نشر من

بحوث في هذا المجال⁽⁵¹⁾.

٨. اهتزازات مط المجموعة (Bi-NO₃) v :

وقد اظهرت النتائج التي تم الحصول عليها ان حزم مط

المجموعة (Bi-NO₃) للمعقدات المحضرة (٣، ١٦،

s : حزمة قوية، w : حزمة ضعيفة، vw : حزمة

ضعيفة جدا، m : حزمة متوسطة.

٧. اهتزازات مط المجموعة (M-Cl) v :

عند قياس طيف الاشعة تحت الحمراء

للمعقدات المحضرة ظهر امتصاص اصرة (M-Cl)

الطرفية ضمن المدى (٢٣٠-٣١٥ سم⁻¹)⁽⁵⁰⁾ بشكل

(٢٦) اخذت المواقع الاتية $\square_1$ (١٠٥٠-١١٦٠ سم^{-١}) في حال الفرق بين اعلى ترددتين (Bi-O-NO_2) $\square_2$ (١٣١٠-١٣٦٨ سم^{-١}) : $\square_3$ (١٤٢٢-١٤٨٢ سم^{-١}) وهذا يتفق مع ما نشر من بحوث في $\geq$ (١١٥ سم^{-١}) وهذا المجال (53,52).

وكما هو مبين في الجدول (١٤). اذ تتناسق مجموعة (NO_3) مع البزموت بشكل احادي السن عن طريق احدى ذرات الاوكسجين

الجدول (١٤): اهتزازات مط المجموعة (Bi-NO_3) ν للمعقدات المحضرة

رقم المعقد	$\nu_1 (\text{Bi-NO}_3)$	$\nu_2 (\text{Bi-NO}_3)$	$\nu_3 (\text{Bi-NO}_3)$	$\Delta\nu$
16	1105 (m)	1368 (s)	1482 (m)	114
26	1160 (m)	1310 (s)	1422 (s)	112

s : حزمة قوية، w : حزمة ضعيفة، vw : حزمة ضعيفة جدا، m : حزمة متوسطة.

الاستنتاجات: الكبريتيد وبنسبة مولية (٢:١) وهي ذات تاصر رباعي بترتيب رباعي السطوح ولها الصيغة العامة الاتية

في ضوء ما ورد من نتائج يمكن استنتاج اشكال المركبات المحضرة الناتجة من تفاعل فلز القصدير مع ليكاندات بس (ثايوفوسفورايل) ثنائي :

$\text{Bi}(\text{NO}_3)_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ بنسبة مولية (٢:١) فكانت

غير موصلة وتتناسق من خلال ذرات الكبريت الطرفية اذ ان مركبات القصدير لها شكل رباعي السطوح، اما مركبات الالتيمون والبزموت فلها شكل ثنائي الهرم المثلي

الشكل (١): مركبات القصدير (10,1)

مركبات البزموت (8, 17) والالتيمون (9, 18)

الناتجة من تفاعل مركبات القصدير اعلاه مع املاح

SbCl_3 ، $\text{SnCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$

الشكل (2): المعقدات (8، 9، 17، 18)

١. معقدات رباعية التناسق: فتتخذ شكل المربع المستوي وكما موضح في الاشكال

وتتضمن المعقدات (٧، ١٦) التي تتخذ شكل الالية:

رباعي السطوح، اما المعقدات (٥، ٦، ١٤، ١٥)

الشكل (٣): المعقدات (٢، ١١)

الشكل (٤): المعقدات (٥، ٦، ١٤، ١٥)

٢. معقدات سداسية التناسق:

وتتضمن المعقدات (٣، ٤، ١٢، ١٣) التي تتخذ شكل ثماني السطوح وتمتلك الصيغة العامة الالية:

الشكل (٥): المعقدت (٣، ٤، ١٢، ١٣)

(R= isobutyl, tert-butyl) : اذ ان

- Chem. Abstr., 131, 7588, (1999).
7. V. Dinoiu, D. Florescu and C. Stanescu, Rev. Chem. (Bucharest) 47, 725, (1996); Chem. Abstr., 125, 280341, (1996).
8. B.A. Khashin, Usp. Khim, 53, 1325, (1984); Russ. Chem. Rev. (Engl. Transl.) 53, 768, (1984).
9. J. Kalil, Ger. Offen. DE 2 223 000, (1972); Chem. Abstr., 78, 42851, (1973).
10. M. Mikolajczyk and M. Para, Bull. Acad. Pol. Sci. Ser. Sci. Chim., 16, 295, (1968).
11. H. Keck, W. Kuchen, J. Mathow, B. Meyer, D. Mootz and H. Wunderlich, Angew. Chem., 93, 1019, (1981).
- References
1. A.F. Kopacki and J. Horodecky, U.S. Patent, 3, 549, 588, (1970); Chem. Abstr., 74, 64973, (1971).
2. A.F. Kopacki and J. Horodecky, U.S. Patent, 3, 424, 715, (1969); Chem. Abstr., 70, 69059, (1969).
3. B.T. Ashworth and D. Haper, Ger. Offen DE 1906765, (1969); Chem. Abstr. 71, 125745, (1969).
4. T. Biswas, N. Naskar and D.K. Basu, J. Appl. Polym. Sci., 58, 981, (1995).
5. J.A. McCleverty, S. Gill, R.S.J. Kowalski and N.A. Bailey, J. Chem. Soc. Dalton Trans. 493, (1982).
6. R. Wang and K. Li, Runhua yu Mifeng, 22, (1999);

20. F.A. Cotton and G. Wilkinson, "Advance, Inorganic Chemistry", 5th Ed., Interscience, New York, (1988).
21. R.N. Murly, R.N. Dash and D.V. Raman, J. Indian. Chem. Soc., 61, 943, (1984).
22. R.L. Lintvedt, J.W. Guthrie and M.D. Glick, Inorg. Chem., 19, 2949, (1980).
23. N. Singh, N.K. Singh and C. Kaw, Bull. Chem. Soc., (Jpn), 62, 3328, (1989).
24. R.C. Aggarwal, B. Singh and S. Singh, Indian, J. Chem., 21A, 268, (1982).
25. R.C. Aggarwal, B. Singh and S. Singh, Indian, J. Chem., 21A, 161, (1983).
26. N. Saha and N.C. Gayen, J. Indian. Chem. Soc., 60, 317, (1983).
27. A.C. Massey, B.F.G. Johnson "The Chemistry of Copper, Silver and Gold", Pergamon Press, Oxford, 41, (1975).
12. I. Cuadrado and M. Moran, Trans. Met. Chem., 9, 96, (1984).
13. A.W. Gal, J.W. Gosselink and F.A. Vollenbroek, Inorg. Chim. Acta., 32, 235, (1979).
14. I. Haiduc, D.B. Sowerby and S.F. Lu, Polyhedron, 14, 3389, (1995).
15. I. Haiduc and D.B. Sowerby, Polyhedron, 15, 2469, (1996).
16. V.I. Kuzmin, T.A. Klimkina and O.A. Logutenko, Zh. Neorg. Khim, 43, 877, (1998).
17. M.N. Hyghes and K.J. Rutt, J. Chem. Soc. Dalton. Trans., 1311, (1972).
18. J.V. Quagliano, J. Fujita, G. Franz, D.J. Philips, J.A. Walmsley and S.Y. Tyree, J. Amer. Chem. Soc., 81, 3770, (1961).
19. R.C. Aggarwal, N.S. Singh and S. Singh, Polyhedron, 4, 343, (1985).

36. N.R. Gandhi and K.N. Mushi, *J. Indian Chem. Soc.*, LIX, 1290, (1982).
37. I.J. Sallomi and A.J. Shaheen, *Polyhedron*, 17, 142, (1998).
38. D. Nicholls "The Chemistry of Iron, Cobalt and Nickel" Pergamon Press, Oxford, 1st Ed., 1090, (1973).
39. K.B. Pandeya, T.S. Warich, R.C. Gaur and R.P. Singh, *J. Inorg. Nucl. Chem.*, 43, 3159, (1981).
40. P.L. Maurya, C.P. Dube and B.V. Agarwala, *J. Indian Chem. Soc.*, LIX, 1400, (1982).
41. M.A. Ali and S.G. Teoh, *J. Inorg. Nucl. Chem.*, 40, 451, (1978).
42. R.K. Verma, B.K. Mishar and K.C. Satplathy, *Asian J. Chem.*, 2, 365, (1997).
43. C.N.R. Rao, "Chemical Application of Infrared Spectroscopy", New York, (1963).
28. D.K. Dwived, R.K. Shukla and B.K. Shukla, *Asian, J. Chem.*, 2, 286, (1990).
29. P.K. Bhattacharya, *J. Indian Chem. Soc.*, LIX, 505, (1982).
30. M.M. Al-Neemi, M. Sc. Thesis, University of Mosul, (1994).
31. I.A. Mustafa and A.A. Taka, *Synth. React. Inorg. Metal Org. Chem.*, 31(4), 517, (2001).
32. F. Ando, T. Hayashi, K. Ohashi and J. Koketsu, *J. Inorg. Nucl. Chem.*, 37, 2011, (1975).
33. Y. Nishida and S. Kida, *Inorg. Nucl. Chem. Lett.*, 7, 325, (1971).
34. H. Nishikawa and S. Ymada, *Bull. Chem. Soc., Jpn.*, 37, 8, (1964).
35. H.S. Verma, R.C. Saxena and J.L. Vats, *J. Indian. Chem. Soc.* LIX, 1184, (1982).

50. K. Nakamoto, "Infrared Spectra of Inorganic and Coordination Compounds", Translated by I.J. Sallomi, (1982).
51. L.J. Bellamy, "Infrared Spectra of Complex Molecular", John Wiley and Sons, Inc., New York, 356, 427, (1956).
52. G. Xinmin, T. Ning, W. Xin, Z. Yin and T. Minyu, Polyhedron, 8, 933, (1989).
53. M. Vidali, Coord. Chem. Rev., 35, 184, (1981).
44. J. Haiduc, Rev. Inorg. Chem., 3, 353, (1981).
45. W.E. Slinkard and D.E. Meek, J. Chem. Soc. Dalton Trans., 1024, (1973).
46. S.E. Livingston and A.E. Mihkelson, Inorg. Chem., 9, 2545, (1978).
47. L.J. Bellamy and L. Beecher, J. Chem. Soc., 475, (1952).
48. D. Dekternieks, B.F. Hoskins, E.R.T. Tickink and G. Winter, Inorg. Chim. Acta., 85, 215, (1984).
49. A.C. Villa, C. Guastin, P. Porta and A.A.G. Tomlinson, J. Chem. Soc., Dalton Trans., 956, (1978).

التأثير الواقي لنبات الجنسنغ *Panax ginseng* في الفئران المعرضة للتسمم بالرصاص

سلوان وعدالله يوسف

الخلاصة

أجريت الدراسة الحالية لمعرفة التأثير الواقي لزيت نبات الجنسنغ بتركيز (200 ملغم/ كغم) من العلف على بعض المتغيرات الفسيولوجية مثل مكونات الدم والتي شملت تركيز الهيموكلوبين Hb وعدد خلايا الدم الحمر والبيض RBC و WBC ، وبعض المتغيرات الكيموحيوية والتي شملت قياس انزيمات الكبد AST و ALT وانزيمات الأكسدة مثل الكلوتاثيون GSH و المالوندايالدهيد MDA لذكور الفئران البيض السويسرية المعرضة للتسمم بالرصاص من خلال ماء الشرب بتركيز (50 ملغم/ لتر) لمدة (4 اسابيع) حيث قسمت الحيوانات الى (4 مجاميع) وبواقع (5 فئران) لكل مجموعة. أظهرت النتائج ان زيت نبات الجنسنغ تأثير واقي ضد التسمم بالرصاص، فقد ادى الى تحسن في مكونات الدم حيث رفع من تركيز الهيموكلوبين Hb وزيادة عدد خلايا الدم الحمر RBC والى انخفاض في عدد خلايا الدم البيض WBC مقارنة مع المجاميع المعاملة بالرصاص والسيطرة. أظهرت النتائج وجود فروقات معنوية عند مستوى احتمال ($P \leq 0.05$)، كذلك ادت المعاملة بزيت نبات الجنسنغ الى حدوث انخفاض في فعالية انزيمات الكبد AST و ALT وارتفاع مستوى الكلوتاثيون GSH وانخفاض في مستوى انزيم المالوندايالدهيد MDA في المجاميع المعاملة بالنبات مقارنة مع المجاميع المعاملة بالرصاص والسيطرة وعند مستوى احتمال ($P \leq 0.05$).

Protective effect of *Panax ginseng* in mice exposure to lead toxicity.

Salwan Wadalla Yousif

Abstract

The present study was conducted to determine the protective effect of ginseng oil with concentration of (200 mg/kg) of feed on some physiological parameters such as blood components, which included

hemoglobin concentration Hb and the number of red and white blood cells, and some biochemical variables which included measuring liver enzymes ATS and ALT, oxidative enzymes like glutathion GSH and malondialdehyde MDA for albino swiss mice exposed to lead poisoning through drinking water with concentration (50 mg/l) for (4 weeks) where the animals were divided to (4 groups), (4 animal in each group). The results showed that ginseng oil had a protective effect against lead poisoning, This led to an improvement in the blood components, Which increased the concentration of hemoglobin Hb and increased the number of red blood cells RBC and decreased the number of white blood cells WBC compared to the groups treated with lead and control. The results showed significant differences at the level of probability ($P \leq 0.05$), and the treatment of ginseng oil resulted in a decrease in the effectiveness of liver enzymes ATS and ALT, a rise in the level of glutathion GSH and a decrease in the level of malondialdehyde MDA in ginseng treated groups compared to the groups treated with lead and control at the level of probability ($P \leq 0.05$).

تلعب النباتات دورا في تعزيز جهاز المناعة من خلال

ازالة الجذور الحرة في الجسم وازالة الضرر التاكسدي

oxidative damages للخلايا والانسجه

المعرضه للتلوث والتسمم والكرب التاكسدي

(Aronson, 2008).

ومن هذه النباتات نبات الجنسغ (GINSENG)

وهو نبات معمر ينتمي الى الفصيلة الارالية

Araliaceae ويمتلك جذور حنطية اللون مدببة

الشكل ويتراوح طولها بين 5-35 سم وتستخدم

للاغراض الطبية ويتوفر هذا النبات في شمال امريكا

المقدمة

تلعب الاطعمة والاعشاب دور مهم في الوقايه من

العديد من الامراض والاضرار الناتجه من التلوث البيئي

والتعرض للتسمم بالملوثات المختلفه وخاصه المعادن

الثقيله (Fabricant and Fransworth,

2001)

وقد اثبتت الابحاث العلميه الحديثه الفاعليه الدوائيه

لكثير من النباتات الطبيه والاعشاب المنتشره بكل

انحاء العالم ومعالجه العديد من الامراض مثل السرطان

cancer والسكري diabetes والزهايمر

alzheimer وامراض القلب الوعائيه وكذلك

الجسم ويعتبر الدماغ أكثر الاعضاء حساسيه للرصاص وقد تشمل اعراض التسمم الام البطن والصداع ومشاكل الذاكرة والعقم وفقر الدم الحاد وخاصة عند الاطفال وقد يتعرض الشخص للرصاص عن طريق الهواء والماء الملوث او الطعام والمنتجات الاستهلاكية ولعب الاطفال (Francis, 2004) (Kim, 2012). من هنا جاء الهدف من الدراسة وهو ايجاد او معرفة التأثير الواقي لنبات الجنسنغ ضد التلوث والتسمم بمعدن الرصاص في الفئران البيض السويسرية من خلال ملاحظة تأثير زيت نبات الجنسنغ بتركيز 200 ملغم/كغم من العلف ودراسة تأثيره على مكونات الدم وبعض انزيمات الكبد وانزيمات الاكسده .

المواد وطرق العمل

نبات الجنسنغ : تم الحصول على كبسولات نبات الجنسنغ الامريكى من الاسواق المحليه والتي تحتوي على ماده الغعاليه الجنسينوسيد بتركيز (200 ملغم) .
حيوانات التجربة : اجريت الدراسة على ذكور الفئران البيض من سلالة Balb/c التي تم الحصول عليها

وفي مناطق شرق اسيا مثل كوريا وبوتان وشرق سيبيريا (Attele, et.al., 1999).

يوفر الجنسنغ العديد من الفوائد الصحية لجسم الانسان ونذكر منها تعزيز الطاقة في الجسم من خلال زيادة النشاط العقلي والحركي عند الاشخاص الذين يعانون من التعب والارهاق ويمتلك النبات العديد من الخصائص المضادة للالتهابات حيث يحتوي الجنسنغ على مركبات تسمى الجنسينوسيدات Ginsenosides التي تمتلك خصائص مضادة للالتهابات وذلك لانها تؤثر في الجهاز المناعي بطريقه تقلل من الالتهابات كما له فوائد في تقليل مستويات السكر بالدم ويعد الجنسنغ من اغلى الاعشاب بالعالم (Choi, et.al. 1995).

كما يعد الجنسنغ من النباتات المضاده للاكسده لاحوائه على العديد من المركبات والمواد والزيوت التي تتمتع بالعديد من الخصائص التي تقاوم التلوث وازالة الجذور الحره والمواد السامة في الجسم وخاصة التلوث بالمعادن ومن هذه المعادن الرصاص الذي يعد من احد الملوثات البيئية والتسمم بالرصاص هو نوع من انواع التسمم المعدني الناجم عن تراكم الرصاص في

من كلية طب الاسنان / جامعة الموصل بعد التأكد
من خلوها من الامراض وضعت في اقفاص
بلاستيكية بواقع (5 فئران) لكل قفص تراوحت
اوزانها ما بين (30-35 غم) اعمارها (4-5) اشهر
وقد وفرت لها الظروف المختبرية المناسبة من درجة
الحرارة والرطوبة

تصميم التجارب

الفحوصات الكيموحيوية

١- تقدير فعالية ناقل الامين الالنين (ALT) Alanin amino transferase

تم تقدير فعالية انزيم ناقل الامين الالنين (ALT) باستخدام عدة التحليل الجاهزه من شركة Randox الانكليزيه اعتمادا على الطريقه اللونيه المتبعه من قبل (Reitman and frankel, 1957) وحددت فعالية الانزيم مقدره بالوحده العالميه / لتر بالاعتماد على المنحنى الخاص بعدة التحليل الجاهزه المستخدمه لقياس فعالية انزيم (ALT) .

٢- تقدير فعالية ناقل الامين الاسبارتيت (AST) Aspartate amino transferase

١- مجموعة السيطرة: اعطيت عليه قياسيه وماء اعتيادي .

٢- المجموعة الثانية : اعطيت عليه قياسيه مضافا لها زيت نبات الجنسنغ بتركيز 200 ملغم/كغم وماء اعتيادي.

٣- المجموعة الثالثة : اعطيت عليه قياسيه مضاف لها زيت نبات الجنسنغ بتركيز 200 ملغم/كغم وماء مضاف اليه خلات الرصاص بتركيز 50 ملغم/ لتر.

٤- المجموعة الرابعة : اعطيت عليه قياسيه وماء مضاف اليه خلات الرصاص بتركيز 50 ملغم/ لتر فقط.

الفحوصات الدموية

أظهرت نتائج البحث فعالية نبات الجنسنغ ودوره في خفض التأثير السام لمعدن الرصاص حيث يبين الشكل (١) تأثير زيت نبات الجنسنغ على بعض مكونات الدم فقد حدث انخفاض معنوي ($P \leq 0.05$) في عدد خلايا الدم الحمر RBC وتركيز الهيموكلوبين Hb وارتفاع في عدد خلايا الدم البيض WBC عند تعريض الحيوانات للرصاص بتركيز 50 ملغم/ لتر في ماء الشرب مقارنة بمجموعه السيطرة في حين حدث تحسن في نفس مكونات الدم في الجامع التي عوملت بزيت الجنسنغ بعد خلطه مع العلف بتركيز 200 ملغم/ كغم حيث ارتفع عدد خلايا الدم الحمر وتركيز الهيموكلوبين وانخفض عدد خلايا الدم البيض مقارنة مع مجموعة السيطرة هذه النتائج جاءت متفقه مع ما قام به (Ali and Levent, 2008) حيث استخدم نبات الجنسنغ وتأثيره على مكونات الدم في الفئران المعرضه للتسمم بمعدن الفلور نستنتج من هذا ان لنبات الجنسنغ القدره على ازالة جزء من الضرر الذي احده الرصاص وحالة فقر الدم التي ظهرت نتيجة معاملة الحيوانات بالرصاص حيث ان لنبات الجنسنغ القدرة على تنشيط دوره الدمويه ورفع معدل نشاط

تم تقدير فعالية انزيم ناقل الامين الاسبارتيت باستخدام عدة التحليل الجاهزه من شركة Randox الانكليزيه اعتمادا على الطريقه اللونيه المتبعه من قبل (Reitman and frankel, 1957) وحددت فعالية الانزيم مقدره بالوحده العالميه /لتر بالاعتماد على المنحنى القياسي الخاص بعدة التحليل الجاهزه المستخدمه لقياس فعالية الانزيم (AST) .

٣- تقدير مستوى الكولتاينون في انسجة الكبد بطريقة المان المحوره (James, et.al.,1982) قدر ايضا مستوى المالوندايالايدهايد في انسجة الكبد مقدره بالنانومول/غم باستخدام الطريقه المتبعه من قبل الباحثين (Volken, et.al., 2001) .

التحليل الأحصائي :

تم تحليل البيانات عن طريق تحليل التباين باتجاه واحد (one way Anova) من ثم وضحت النتائج على شكل اعمدة بيانية باستخدام برنامج (Excell 2010) (Daniel, 2010).

النتائج والمناقشة

Steroid Glycoside ومواد صابونية وزيت

الجسم وهو يعتبر مقوي عام ويرجع تأثيره العلاجي الى

طياره تعمل على تقوية جهاز المناعة ومعالجة فقر الدم

احتوائه على مادة والجنسينوسايدز

(Stavro, et.al., 2006).

Ginsinosides وكوكسيدات ستيرويديه

شكل (1) تأثير زيت الجنسنغ بتركيز

200ملغم/كغم من العليقه على بعض مكونات الدم

في الفئران

الانخفاض في فعالية الانزيمين نتيجة المعاملة بزيت نبات

الجنسنغ الى احتوائه على المواد الفعالة التي ذكرت

سابقا والتي تعمل كمواد مضاده للاكسده والتي لها دور

كبير في كبح الجذور الحرة وحماية خلايا الكبد من

التلف نتيجة الاجهاد الناتج من تفاعلات الجذور الحرة

ومن ثم تحسين وظيفة الكبد وزيادة نشاط الانزيمات

المضاده للاكسده والتي تمنع تكون الجذور الحرة وبالتالي

تحافظ على المستوى الطبيعي للانزيمات الكبدية في

مصل الدم (Mi, (Tapsell, et.al., 2006)

.et.al., 2017)

كذلك اظهر الشكل (٢) الى حدوث ارتفاع معنوي

في فعالية انزيم ناقل الامين AST ($P \leq 0.05$)

وانزيم ناقل الالانين ALT في نسيج كبد الفئران

المعرضه للرصاص مقارنة مع مجموعة السيطرة في حين

انخفضت فعالية الانزيمين في المجموعة المعاملة بالنبات

فقط ومجموعة النبات مع الرصاص انخفضا معنويا

مقارنة مع مجموعة الرصاص لوحده ويعزى هذا