

طرائق مختلفة لتقدير أداء الهجن الزوجية في زهرة الشمس (*Helianthus annuus* L)

خالد محمد داود الزبيدي عبد الستار احمد محمد راضي مهدي صالح السفاح ياسر حسن صالح العاتي
جامعة الموصل - كلية الزراعة والغابات وزارة الزراعة - شركة ما بين النهرين العامة للبذور

الخلاصة

تم استنباط 15 هجين فردي و60 هجين ثلاثي و45 هجين زوجي بين ستة سلالات نقية من زهرة الشمس (EMB و EUR و L3 و L6 و L10 و PERE12)، زرعت بذور السلالات النقية وجميع الهجن الفردية والثلاثية والزوجية في العاشر من تموز 2013 في حقل بقضاء الحويجة الواقع غرب محافظة كركوك باستخدام تصميم القطاعات العشوائية الكاملة بثلاث مكررات. استخدمت قيم الهجن الفردية والثلاثية في اختبار خمسة طرائق للتنبؤ بسلوك الهجن الزوجية لصفات مساحة القرص وعدد البذور بالقرص ووزن 100 بذرة وحاصل البذور بالنبات ونسبة الزيت ومقارنتها بالقيم الحقيقية المشاهدة لصفات هذه الهجن الزوجية. أظهرت النتائج وجود فروقات عالية المعنوية بين متوسطات الهجن الزوجية (محسوبة كمتوسط للقيم الحقيقية والقيم المتوقعة من طرائق التنبؤ الخمسة). وكذلك بين طرائق التنبؤ المختلفة ولجميع الصفات التي شملتها الدراسة. اتضح من خلال المقارنة بين متوسطات القيم المشاهدة للهجن الزوجية والقيم المتوقعة من طرائق التنبؤ الخمسة المعتمدة في الدراسة، ان الطريقة الاولى التي تعتمد على الهجن الفردية كانت الافضل من بين الطرائق المستخدمة للصفات جميعها وتلتها في الاهمية الطرائق التي تعتمد على الهجن الثلاثية وهي الثانية لصفتي عدد البذور بالقرص ونسبة الزيت والثالثة لصفة وزن 100 بذرة والطريقتين الثانية والثالثة لمساحة القرص، وتأكدت هذه النتائج من خلال معاملات الارتباط البسيط بين القيم المشاهدة والقيم المتوقعة من طرائق التنبؤ جميعها وكذلك من خلال الاختبار بطريقة الانحدار المتدرج.

DIFFERENT METHODS OF ESTIMATING THE PERFORMANCE OF DOUBLE CROSSES IN SUNFLOWER (*Helianthus annuus* L)

K. M. D. Al-Zubaidy* A. S. A. Mohammed* R. M. S. Al-Safah** Y. H. S. AL-Aaty**

*Mosul University, College of Agriculture and Forestry

**Ministry of Agriculture, Mesopotamia State Company for Seeds

ABSTRACT

Fifteen single crosses, 60 three-way crosses and 45 double crosses were produced from six inbred lines of sunflower (EMB, EUR, L₃, L₆, L₁₀ and PERE₁₂). All these genotypes planted through 10th of July 2013 at a field in Al-Hawija, west of Kirkuk Governorate using randomized complete block design with three replications. The single and three-way crosses values were used to test five methods of double cross hybrids performance prediction for characters head area, number of seeds per head, 100 seeds weight, seeds yield per plant and oil percent, as compared with actual observed values of these double crosses characters. The results showed highly significant differences among double crosses means (expressed as mean of observed and predicted values from the five methods of prediction) and among the different predicting methods for all studied characters. In general, it was shown through comparison between the means of observed values of double crosses and the predicted one from the five prediction methods used in this study, that the first methods of prediction which depend on single crosses was found to be the most consistent method for predicting all characters, followed in importance by the methods that depends on three-way crosses, the second for number of seeds per head and oil percent, the third for 100 seeds weight and both second and third for head area. These results were supported through simple correlation coefficients among observed and all predicted values, as well as through stepwise regression test.

المقدمة

المائي ويمكن أن يزرع مرتين في السنة. وهذا المحصول ينتج تجارياً في جميع أنحاء العالم. وتعد روسيا أكبر منتج تقليدي له، إضافة الى تميز عدد من الدول الاخرى بانتاجها الكبير من زهرة الشمس من ضمنها الأرجنتين والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والصين والهند وتركيا وجنوب أفريقيا. وفي الولايات المتحدة الأمريكية تعد ولايات داكوتا الشمالية وداكوتا الجنوبية ومينيسوتا وكنتاس وكولورادو ونبراسكا وتكساس وكاليفورنيا الاكثر انتاجاً (12).

يعد محصول زهرة الشمس (*Helianthus annuus* L.) جزء مهم في العائلة المركبة Compositae. ويوجد بشكل بري في جميع أنحاء العالم، الا ان الأشكال المزروعة منه تعد مصدر غني جداً بالزيت. ووفقاً للباحثين (16) و (15)، فان بذور زهرة الشمس تحتوي على حوالي 40-50% من الزيت الغني بالأحماض الدهنية غير المشبعة العالية و20% بروتين. ومحصول زهرة الشمس يمتاز بتكيفه الجيد لظروف الإجهاد

المشاهدة باستخدام ستة سلالات نقية وجميع الهجن الفردية والثلاثية والزوجية الممكنة بينها.

مواد وطرائق البحث

استخدمت في الدراسة ستة سلالات نقية من زهرة الشمس هي: (1) EMB و(2) EUR و(3) L3 و(4) L6 و(5) L10 و(6) PERE12 و 15 هجين تبادلي بينها انتجت حسب طريقة Griffing الثانية (19) (مصدر بذورها الشركة العامة للمحاصيل الصناعية بوزارة الزراعة). زرعت السلالات وهجنها في صواني دايات بموعدين خلال الأسبوعين الأول والثاني من شباط 2013 (لضمان الحصول على حبوب اللقاح في الوقت المطلوب)، ونقلت الشتلات إلى حقل بقضاء الحويجة الواقع غرب محافظة كركوك بتاريخ 25 شباط 2013 وذلك بزراعة 12 مرز من كل تركيب وراثي (سلالات وهجن)، طول المرز 5م والمسافة بينها 0.75م وبين النباتات 0.25م. وعند وصول النباتات مرحلة تكوين الاقراص بقطر 1.5 سم تم رش اقراص نباتات بعض المروز بحامض الجبريلين GA3 بتركيز 100 جزء بالمليون ولمرتين بينهما 48 ساعة (1) ووضعت علامات على هذه النباتات التي أصبحت عقيمة، وعند بداية ظهور الاوراق التوجيهية غلفت اقراص التراكيب الوراثية العقيمة مع تلك الخصبة باستعمال اكياس عزل مصنوعة من قماش المللم مفتوحة الطرفين وتم تحريكها يومياً لنثر حبوب اللقاح على الاقراص العقيمة، وتم اجراء جميع التهجينات الثلاثية الممكنة بين السلالات النقية والهجن التبادلية والتهجينات الزوجية بين الهجن الفردية حسب (23 و 24) على التوالي، وتم الحصول على 60 هجين ثلاثي و45 هجين زوجي، فضلاً عن اعادة اجراء التهجين التبادلي والتلقيح الذاتي للسلالات النقية للحصول على بذور اضافية.

وفي نهاية الموسم تم حصاد اقراص الهجن بانواعها والاقراص الملقة ذاتياً للسلالات بصورة منفصلة ثم فرطت بذورها وجففت لزراعتها في الموسم التالي. وفي العاشر من تموز 2013 زرعت بذور السلالات النقية وجميع الهجن الفردية والثلاثية والزوجية في الحقل ذاته باستخدام تصميم القطاعات العشوائية الكاملة بثلاثة مكررات بعد ان تم اعداد الارض بحراثتين متعامدتين والتسوية والتنعيم وازدادة سماد الداب بمعدل 240 كغم للهكتار عند اعداد الارض وسماد اليوريا (46% N) بمعدل 280 كغم للهكتار على دفعتين، الاولى بعد 15 يوم من الري الاولى والثانية عند بداية تكوين البراعم الزهرية (5). احتوت الوحدة التجريبية على مرزين بنفس الابعاد والمسافات المشار اليها انفاً. وعند النضج سجلت بيانات على اساس النبات الفردي (خمس نباتات اختيرت عشوائياً من كل وحدة تجريبية) لصفات مساحة القرص، سم (6) وعدد البذور بالقرص ووزن 100 بذرة (غم) وحاصل البذور بالنبات (غم) ونسبة الزيت (بجهاز Soxhlet وحسب ما ورد في 9)، وحللت بيانات الصفات جميعها حسب طريقة التصميم التجريبي المستخدم لاختبار فرضية العدم التي تنص على عدم وجود اختلافات معنوية بين كل من التراكيب الوراثية جميعها والسلالات الابوية والهجن بانواعها (كل على حده). واعتمدت خمسة طرائق للتنبؤ بمواصفات الهجن

ان بذور الهجن الفردية لزهرة الشمس تعد مهمة للزراعة المحلية في حقول المزارعين. والهجين الفردي يعد كثير التكلفة ويتطلب انتاجه سنوياً، بسبب حصول نقص في الانتاج بنسبة 50% في الجيل التالي. ولهذا يتطلب استيراد بذور زهرة الشمس سنوياً، مما يزيد من تكلفة الإنتاج. والاكثير من ذلك معظم المزارعين لا يمكنهم شراء البذور الهجينة سنوياً بسبب الدخل المتدني. ونظراً لأهمية انتاج بذور زهرة الشمس الهجين فقد بدأ التفكير بإمكانية انتاج الهجن الزوجية كمصدر لانتاج البذور الهجينة الأقل تكلفة (10). والهجن الزوجي يمكن اعتباره أول صنف هجين تجاري لمحصول الذرة الصفراء تم تجهيزه لمزارعي الدول المنتجة للمحصول. وهذه الحقيقة أصبحت ممكنة بسبب العمل الذي قام بتطويره Jones في وقت مبكر من القرن العشرين (Troyer, 2009). وفي البرازيل، تشير الدراسات الحالية إلى أن ما يقرب من 20% من سوق بذور الذرة الصفراء تشمل أصناف هجينة زوجية (14)، وان شركات البذور المختلفة تعمل على المحافظة على هذا النوع من الاصناف من أجل استغلال قوة الهجين الموجودة بين أزواج من الهجن الفردية، ولا سيما تلك التي تتميز بقوة هجين منخفضة في حد ذاتها (20).

ان توليف الهجن الثلاثية او الزوجية يعتمد على عدد من الهجن الفردية التي تدخل في تكوينها، ويمكن أن تصبح غير مجدية بسبب الزيادة في عدد الهجن الفردية اللازمة لاستخدامها كمولدات لها. فعلى سبيل المثال، عند استخدام عشرة سلالات نقية لابد للمربي ان يحصل على $(9 \times 10 \times 8) = 720$ هجين ثلاثي و $(8 \times 7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1) = 40320$ هجين زوجي، وان تقييمها جميعها يكون غير عملي. اذ ان التكلفة تزداد كثيراً عندما يكون هناك حاجة لمزيد من الهجن الثلاثية او الزوجية. والفعالية الاكثر تكون في تقييم بعض التراكيب الوراثية فقط ومن ثم التنبؤ بالأخرى، اذ ان القدرة على التنبؤ لحاصل الهجن الزوجية بطرق مختلفة يتيح فرصة تطوير الواعدة منها والتي تمثل الحالات التي تضمن الحصول على اقصى ما يمكن من اداء مرغوب للهجن وهذا يوفر المال والجهد والوقت (8). ومن أجل التنبؤ بحاصل الهجن الزوجية اقترح (19)، أربعة طرائق تنبؤية مختلفة اطلق عليها طرائق Jenkins, A و B و C و D. ويمكن استخدامها للتنبؤ بآداء الهجن الزوجية على اساس اعتماد آداء الهجن الفردية غير الابوية في تقييم الهجن الزوجية ذوات الاداء العالي فقط، وقد حصل على معاملات ارتباط عالية في احدى طرائقه بين القيم الحقيقية للهجن الزوجية والقيم المتنبأ بها. واقترح (13) معادلة عامة للتنبؤ بسلوك الهجن الزوجية عن طريق اعتماد توافقات خطية لمتوسطات الهجن الفردية التي ليست لها علاقة بالهجين الزوجي، وكانت كفاءتها مساوية لطريقتي (19) الاولى والثانية. وفي دراسات متعددة عن محصول الذرة الصفراء والتي اعتمدت على انتاج هجن فردية وثلاثية وزوجية حصل العديد من الباحثين على مواصفات ايجابية عن بعض الهجن والتي تميزت بانتاجيتها العالية ومنها تلك التي قام بها (18) و(22) و(25) و(20) و(20) و(26) و(11).

ان الهدف من الدراسة الحالية مقارنة كفاءة خمسة طرائق للتنبؤ بمواصفات الهجن الزوجية في محصول زهرة الشمس (من خلال الهجن الفردية والثلاثية) بالمقارنة مع قيمها الحقيقية

كل على حده، وفيه يلاحظ ان متوسط مربعات التراكيب الوراثية جميعها والآباء والهجن بانواعها كل على حده فضلاً عن المقارنات المستقلة بينها (الآباء ضد كل من انواع الهجن والهجن الفردية ضد كل من الثلاثية والزوجية والثلاثية ضد الزوجية) كان معنوياً عالياً للصفات الخمسة قيد الدراسة باستثناء مقارنة الهجن الفردية ضد الهجن الزوجية لصفة حاصل البذور بالنبات، اذ كان متوسط مربعاتها غير معنوياً. وتدل معنوية متوسط مربعات التراكيب الوراثية وكل من انواع الهجن العالية المعنوية على الاختلافات الكبيرة بين السلالات المستخدمة في الدراسة نتيجة تبايدها الوراثي، وان هذه الاختلافات انتقلت الى جميع انواع الهجن المستنبطة. وتظهر في الجدول (2) المتوسطات العامة لكل من السلالات النقية وجميع انواع الهجن، ويلاحظ لجميع الصفات ان المتوسط العام لجميع انواع الهجن كان اعلى معنوياً من متوسط عام السلالات، وهذا دليل على ان هناك قوة هجين مرغوبة ظهرت في العديد من الهجن الفردية والثلاثية والزوجية، اما المقارنة بين المتوسطات العامة لجميع انواع الهجن تدل على ان متوسط عام الهجن الفردية كان اعلى معنوياً من كل من الهجن الثلاثية والزوجية لصفتي مساحة القرص ونسبة الزيت، وكان متوسط عام الهجن الثلاثية هو الاعلى لصفتي وزن 100 بذرة وحاصل البذور بالنبات، اما لصفة عدد البذور بالقرص فيلاحظ ان متوسط عام الهجن الزوجية هو الاعلى بفارق معنوي عن كل من الهجن الفردية والثلاثية. وتظهر في الجدول (3).

الزوجية من بيانات الهجن التبادلية والثلاثية باعتبار وجود التأثيرات الاضافية والسيادية فقط، وذلك باستخدام المعادلات التي اقترحها (17) ولكل هجين زوجي في كل مكرر وهذه الطرائق الخمسة المستخدمة هي الاولى: $Ds_{ij}.kl = \frac{1}{4} (S_{ik} + S_{il} + S_{jk} + S_{jl})$ (Sik: هي الاولى: $Dt_{ij}.kl = \frac{1}{2} (T_{ij}.k + T_{ij}.l)$ والثانية: $Dtkl_{ij}.kl = \frac{1}{2} (T_{kl}.i + T_{kl}.j)$ والثالثة: $Dt_{ij}.kl = \frac{1}{2} (Dt_{ijij}.kl + Dtklij.kl)$ والرابعة: والخامسة: $Dt-s_{ij}.kl = 2 Dt_{ij}.kl - Ds_{ij}.kl$ علماً ان S_{ij} يعبر عن الهجين الفردي (سلالة i x سلالة j) و $T_{ij}.k$ يعبر عن الهجين الثلاثي (سلالة k x سلالة j) و $Dij.kl$ يعبر عن الهجين الزوجي ($S_{ij} \times S_{kl}$). وبعد تقدير قيم الهجن الزوجية من معادلات التنبؤ السابقة في كل مكرر حلت احصائياً حسب طريقة تصميم القطاعات العشوائية الكاملة لتقييم طرائق التنبؤ بالاضافة الى القيم الحقيقية للهجن الزوجية ولـ 45 هجين زوجي، ثم قورنت الفروقات بين متوسطات طرائق الحصول على بيانات الهجن الزوجية كمعدل للهجن ومتوسطات الهجن كمعدل للطرائق المختلفة باستخدام اختبار دنكن المتعدد المدى، وقدرت معاملات الارتباط الخطي البسيط بين القيم المشاهدة للهجن الزوجية والقيم المتوقعة من الطرائق الخمسة (7)، وكذلك تم اعتماد الاختبار بطريقة الانحدار المتدرج للتعرف على افضل معادلة انحدارية للتنبؤ بالهجن الزوجية (4)

النتائج والمناقشة

تظهر في جدول (1) نتائج تحليل التباين لسلالات زهرة الشمس وجميع انواع الهجن بينها (الفردية والثلاثية والزوجية)

جدول (1): نتائج تحليل التباين للتراكيب الوراثية بجميع انواعها لبعض صفات زهرة الشمس

الصفات					درجات الحرية	مصادر الاختلاف
نسبة الزيت	حاصل البذور بالنبات	وزن 100 بذرة	عدد البذور بالقرص	مساحة القرص		
26.297	34.841	4.745	6141.35	914.199	2	للتراكيب جميعها
0.200	1.315	0.181	81.193	22.113	2	للآباء
3.055	3.461	0.657	620.673	532.314	2	للهجن الفردية
18.849	13.105	2.346	8153.9	258.126	2	للهجن الثلاثية
8.657	18.169	1.657	399.275	408.979	2	للهجن الزوجية
**32.444	**894.35	**3.223	**193016.2	**20187.5	125	التراكيب الوراثية
**33.018	**67.658	**1.081	**174796.2	**4129.1	5	الآباء
**32.771	**1276.11	**1.673	**306145.8	**21370.3	14	الهجن الفردية
**32.177	**833.083	**2.373	**192655.9	**17582.1	59	الهجن الثلاثية
**31.686	**573.059	**2.646	**127758.4	**22130.1	44	الهجن الزوجية
**85.365	**13518.4	**81.37	**1233949.3	**173572.3	1	الآباء ضد الفردية
**19.515	**19050.8	**117.01	**1796880.3	**152573.1	1	الآباء ضد الثلاثية
**54.317	**16626.9	**90.03	**1926672.7	**171701.1	1	الآباء ضد الزوجية
**79.352	**103.41	**0.904	*16762.7	**13871.3	1	الفردية ضد الثلاثية
**17.858	0.167	**0.613	**50020.7	**5035.5	1	الفردية ضد الزوجية
**44.237	**240.353	**6.634	**22083.7	**4241.1	1	الثلاثية ضد الزوجية
1.318	0.612	0.037	2831.08	53.117	500	للتراكيب جميعها
0.032	0.151	0.011	15.281	3.029	10	للآباء
1.304	0.208	0.019	1041.29	193.103	28	للهجن الفردية
2.161	0.827	0.051	8677.07	4.398	118	للهجن الثلاثية
0.328	0.520	0.026	26.575	76.232	88	للهجن الزوجية

(**) معنوية عند مستوى احتمال 1%.

جدول (2): المتوسطات العامة للتراكيب الوراثية لجميعها والسلالات وكل من انواع الهجن لصفات زهرة الشمس.

متوسطاتها للصفات					انواع التراكيب
نسبة الزيت	حاصل البذور بالنبات	وزن 100 بذرة	عدد البذور بالقرص	مساحة القرص	التراكيب الوراثية
26.527	53.697	5.539	1047.559	248.363	الآباء
25.039	22.033	3.116	755.490	151.416	الهجن الفردية
27.616	54.459	5.632	1065.286	267.605	الهجن الثلاثية
26.131	56.154	5.790	1086.865	247.976	الهجن الزوجية
26.889	54.389	5.497	1103.784	255.391	

جدول (3): نتائج تحليل التباين لبيانات الهجن الزوجية المستنبطة بالطرائق المختلفة و لصفات زهرة الشمس..

الصفات					درجات الحرية	مصادر الاختلاف
نسبة الزيت	حاصل البذور بالنبات	وزن 100 بذرة	عدد البذور بالقرص	مساحة القرص		
77.861	65.739	10.404	26655.7	1343.41	2	القطاعات
**140.42	**304.171	**4.450	**41921.9	**20820.3	5	الهجن الزوجية
**47.549	**663.463	**2.454	**173283.4	**23058.4	44	طرق استنباط البيانات
**18.206	**358.617	**1.413	**85879.9	**9133.75	220	الهجن x الطرق
1.113	0.378	0.026	2178.41	31.025	538	الخطأ التجريبي

(**) معنوية عند مستوى احتمال 1%.

و 28.276 و 28.932% في الهجن الثلاث (5x3)x(2x1) و (5x3)x(3x1) و (6x5)x(3x1) و (5x3)x(6x1) و (5x3)x(11) في الذرة الصفراء و (10) في زهرة الشمس على هجن زوجية في متفوقة في صفات الحاصل ومكوناته من الصفات الاخرى، والتي يمكن الاستفادة منها في برامج التربية.. ومن متوسطات طرائق الحصول على بيانات الهجن الزوجية كمعدل للهجن جميعها والموضحة في جدول (5)، يلاحظ أن متوسط القيم المشاهدة للهجن الزوجية اختلف معنوياً عن المتوسطات المتوقعة من جميع طرائق التنبؤ لصفات مساحة القرص ووزن 100 بذرة ونسبة الزيت، وعن معظم الطرائق لصفتي عدد البذور بالقرص (لم يختلف معنوياً عن متوسط الطريقتين الثانية والخامسة) وحاصل البذور بالنبات (لم يختلف معنوياً عن متوسط الطريقة الاولى)، وعند مقارنة متوسطات القيم المشاهدة مع متوسطات قيم طرائق التنبؤ المستخدمة، يتضح أن أفضل الطرائق للتنبؤ بالهجن الزوجية لصفات مساحة القرص وحاصل البذور بالنبات ونسبة الزيت هي الاولى، إذ كانت متوسطاتها هي الأقرب إلى القيمة الحقيقية لهذه الصفات، وبلغت 266.825سم² و 54.254غم و 27.135% على التوالي، بينما بلغت المتوسطات الحقيقية 255.391سم² و 54.389غم و 26.889% لهذه الصفات على التوالي. وكان متوسط طريقة التنبؤ الخامسة هو الأقرب للقيمة الحقيقية لصفة عدد البذور بالقرص تلاه متوسط الطريقة الثانية، إذ بلغ متوسطي الطريقتين على التوالي 1111.556 و 1093.75 بذرة على التوالي)، في حين بلغ المتوسط الحقيقي لها 1103.784 بذرة. وكانت أقرب وأفضل الطرائق للتنبؤ بوزن 100 بذرة في الهجن الزوجية الطريقتين الاولى والثانية، حيث حققت متوسط وزن 100 بذرة بلغ 5.627 و 5.643غم على التوالي والاقترب الى المتوسط الحقيقي لهذه الصفة (5.497غم) رغم معنويته.

نتائج تحليل التباين للهجن الزوجية المشاهدة والمتوقعة من طرائق التنبؤ المختلفة المعتمدة وللصفات الخمسة التي شملتها الدراسة، وفيه يلاحظ أن متوسط مربعات كل من الهجن الزوجية (كمعدل للطرائق الستة في الحصول على بياناتها) وطرائق الحصول على بيانات الهجن الزوجية (كمعدل للهجن) والتداخل بين الهجن الزوجية وطرائق الحصول على بياناتها، كان معنوياً عالياً للصفات جميعها، ومن دراسات سابقة تعلق بالمقارنة بين هجن زوجية انتجت من سلالات لمحاصيل مختلفة وبين طرائق تنبؤية بمواصفات هذه الهجن، توصل (20) و (3) و (8) على محصول الذرة الصفراء و (27) على محصول البنجر السكري الى اختلافات عالية المعنوية بين الهجن وطرائق التنبؤ، فضلاً على التداخل العالي المعنوية بينهما، وان بعض طرائق التنبؤ اعطت قيم لمواصفات الهجن الزوجية قريبة من قيمها المشاهدة.

تظهر في جدول (4) متوسطات الهجن الزوجية (كمعدل لطرائق استنباطها المختلفة) وللصفات قيد الدراسة، وفيه يلاحظ ثمة فروقات معنوية بينها للصفات جميعها حسب الاختبار بطريقة دنكن المتعدد المدى، ويتضح لصفة مساحة القرص تفوق الهجينان (5x4)x(2x1) و (6x4)x(5x2) على بقية الهجن بأعلى مساحة بلغت 307.99 و 307.520سم² على التوالي. وتفوق الهجين (5x4)x(6x1) في عدد البذور بالقرص، إذ اعطى متوسط 1307.52 بذرة بفارق معنوي عن جميع الهجن الاخرى. واعطت الهجن (6x2)x(4x1) و (5x3)x(4x2) و (6x4)x(5x3) اعلى المتوسطات لوزن 100 بذرة من بين الهجن الزوجية بلغت 6.346 و 6.315 و 6.358غم على التوالي. كما وتفوق الهجين (6x4)x(5x2) على باقي الهجن الزوجية في صفة حاصل البذور بالنبات بأعلى متوسط بلغ 70.147غم وبفارق معنوي عن جميع الهجن الزوجية الاخرى، واخيراً بلغت اعلى نسبة زيت 28.955

جدول (4): متوسطات الهجن الزوجية كمعدل لطرائق الحصول عليها لصفات زهرة الشمس.

متوسطاتها للصفات					الهجن الزوجية
مساحة القرص	عدد البذور بالقرص	وزن 100 بذرة	حاصل البذور 2ر بالنبات	نسبة الزيت	
247.47 ل م	1003.9 س ع ف	5.565 م-ع	49.574 غ	27.431 ج-و	(4x3)(2x1)
271.47 ز	1075.45 ل م	5.544 م-ع	48.730 غ	28.955 أ	(5x3)(2x1)
278.55 هـ و	884.35 ت	5.581 م ن س	44.232 ب'	25.645 ط-م	(6x3)(2x1)
307.99 أ	1228.86 ب	5.405 س ق	55.306 ع	27.642 ب-هـ	(5x4)(2x1)
280.55 د هـ و	1226.45 ب	5.806 ي ك	60.951 ز	26.394 ز ح ط	(6x4)(2x1)
277.66 و	1078.45 ك ل م	5.454 ع ف ص	52.155 ر	23.654 ق	(6x5)(2x1)
249.88 ت	1190.14 ج د هـ	4.935 غ	60.499 ح	22.419 ر	(4x2)(3x1)
280.13 د هـ و	1158.47 هـ و ز	6.045 د هـ و	61.743 و	27.239 د هـ و	(5x2)(3x1)
288.52 ج	1132.52 ز-ي	6.116 ج د	62.404 هـ	27.418 ج-و	(6x2)(3x1)
175.13 ظ	926.38 ش	5.339 ق ر	50.187 ظ	28.035 ب جد	(5x4)(3x1)
277.39 س ع	1007.6 س ع ف	5.159 ت ظ	52.492 ق ر	27.624 ب-هـ	(6x4)(3x1)
163.99 غ	1001.7 س ع ف	5.434 ف ص ق	49.674 غ	28.276 أب	(6x5)(3x1)
230.51 س	1113.52 ح ط ي	5.647 ل م ن	56.544 ن	26.956 هـ و ز	(3x2)(4x1)
231.22 س	1126.49 ز-ي	5.963 هـ ح	56.489 ن	23.965 ف ص	(5x2)(4x1)
259.09 ك	998.19 س ع ف	6.346 أ	52.765 ق	25.908 ط ل	(6x2)(4x1)
241.497 ن	1024.48 س ع	6.195 ب ج	59.514 ط	27.676 ب-هـ	(5x3)(4x1)
227.94 س ع	1033.41 ن س	6.283 أب	55.172 ع ف	26.387 ز ح ط	(6x3)(4x1)
263.95 ط ي	1104.60 ي ك ل	5.918 ز-ي	60.136 ح	25.035 م-ع	(6x5)(4x1)
219.731 ص	1147.03 و ز ح	5.680 ل م	58.573 ك	25.160 ل-س	(3x2)(5x1)
240.826 ن	1195.46 ب ج د	5.714 ك ل	61.167 ز	25.555 ي-ن	(4x2)(5x1)
219.450 ص	1061.14 م ن	5.937 ز-ي	57.973 ل	25.495 ك-ن	(6x2)(5x1)
209.321 ق	1179.34 د هـ و	5.840 ط ي	59.041 ي	24.675 س ع ف	(4x3)(5x1)
225.22 ع ف	961.01 ص ق	6.088 د هـ و	52.058 ر	24.81 ن س ع	(6x3)(5x1)
196.671 ر	1157.19 هـ و ز	5.576 م ن س	58.878 ي ك	27.335 د هـ و	(6x4)(5x1)
230.302 س	1009.7 س ع ف	5.070 ظ	42.240 ج'	25.182 ل-س	(3x2)(6x1)
268.660 ز ح	1213.98 ب ج	5.191 ر ش	51.574 ش	24.675 س ع ف	(4x2)(6x1)
279.64 د هـ و	1111.04 ط ي ك	5.605 ل-س	56.246 ن س	27.286 د هـ و	(5x2)(6x1)
268.063 ز ح	1192.52 ج د	6.076 د هـ	61.872 و	25.167 ل-س	(4x3)(6x1)
259.141 ك	1151.15 و ز	6.026 د-ز	63.859 ج	28.932 أ	(5x3)(6x1)
290.326 ج	1307.52 أ	5.819 ط ي ك	68.863 ب	25.704 ي-م	(5x4)(6x1)
198.366 ر	985.14 ف ص	4.956 غ	49.667 غ	27.668 ب-هـ	(5x4)(3x2)
282.094 د هـ	1108.95 ي ك	5.594 ل-س	59.294 م	25.895 ط ل	(6x4)(3x2)
189.938 ش	1069.25 م	5.276 ر ش	47.800 أ'	21.670 ت	(6x5)(3x2)
261.45 ي ك	1155.22 و ز	6.315 أ	64.185 ج	26.741 و ز ح	(5x3)(4x2)
266.911 ز ح	1145.63 و-ط	5.624 ل م ن	59.622 ط	25.144 ل-س	(6x3)(4x2)
279.828 د هـ و	1176.47 د هـ و	6.125 ج د	62.944 د	24.357 ع ف ص	(6x5)(4x2)
270.542 ز ح	1153.95 و ز	5.490 س-ص	56.021 س	25.930 ط ل	(4x3)(5x2)
300.077 ب	1014.9 س ع ف	6.066 د هـ	55.322 ع	27.841 ب ج د	(6x3)(5x2)
307.520 أ	1227.10 ب	5.992 هـ و ز	70.147 أ	26.057 ح-ك	(6x4)(5x2)
222.67 ف ص	936.09 ش ت	5.971 هـ ح	48.361 غ	25.875 ط ل	(4x3)(6x2)
259.245 ك	1018.8 س ع ف	6.007 د-ز	50.988 ت	27.550 ب-هـ	(5x3)(6x2)
259.213 ك	929.91 ش ت	5.856 ح ط ي	49.086 ظ	27.899 ب ج د	(5x4)(6x2)
179.230 ت	1132.93 ز-ي	5.655 ل م ن	54.816 ع	26.340 ز-ي	(6x5)(4x3)
283.563 د	995.94 ع ف	6.358 أ	54.275 ص	28.187 ب ج	(6x4)(5x3)
244.480 م ن	983.41 ف ص	5.718 ك ل	52.276 ر	27.804 ب ج د	(5x4)(6x3)

- قيم متوسطات كل صفة المتبوعة بالحرف نفسه لا تختلف عن بعضها معنوياً حسب الاختبار بطريقة دنكن المتعدد المدى.

- (1) EMB و (2) EUR و (3) L3 و (4) L6 و (5) L10 و (6) PERE12

جدول (5): متوسطات الهجن الزوجية المشاهدة والمتوقعة من خمسة طرائق مختلفة لصفات زهرة الشمس..

الطرائق	متوسطاتها للصفات				
	مساحة القرص	عدد البذور بالقرص	وزن 100 بذرة	حاصل البذور بالنبات	نسبة الزيت
القيم الحقيقية	255.391 ب	1103.784 أب	5.497 د	54.389 هـ	26.889 ب
الطريقة الاولى	266.825 أ	1062.174 هـ	5.627 ج	54.254 هـ	27.135 أ
الطريقة الثانية	250.688 ج	1093.75 ب ج	5.643 ج	55.303 د	25.994 د
الطريقة الثالثة	245.264 هـ	1079.980 ج	5.937 أ	57.005 ب	26.268 ج
الطريقة الرابعة	247.976 د	1086.865 د	5.790 ب	56.154 ج	26.131 ج د
الطريقة الخامسة	229.127 و	1111.556 أ	5.954 أ	58.054 أ	24.601 هـ

قيم متوسطات كل صفة المتوقعة بالحرف نفسه لا تختلف عن بعضها معنوياً حسب الاختبار بطريقة دنكن المتعدد المدى. وتبين الجداول (6 و 7 و 8 و 9 و 10) المقارنة بين المتوسطات المشاهدة وتلك المتوقعة من الطرائق الخمس

لصفات مساحة القرص وعدد البذور بالقرص ووزن 100 بذرة وحاصل البذور بالنبات ونسبة الزيت على التوالي. ويتضح من الجدول (6) أن الطرائق الخمسة للتنبؤ بمساحة القرص أعطت قيماً أعلى من القيم الحقيقية في (24 و 21 و 20 و 22 و 16) هجين زوجي على التوالي، وكانت الطرائق الاولى والثانية والثالثة هي الأقرب الى الواقع في معدلاتها لهذه الصفة إذ اعطت متوسطات اقرب الى القيم الحقيقية في 19 و 10 و 10 هجين على التوالي، ولصفة عدد البذور بالقرص (الجدول 7) حققت طرائق التنبؤ الخمس قيماً أعلى من القيم الحقيقية في (18 و 19 و 20 و 23 و 22) هجين زوجي على التوالي، وكانت القيم المتوقعة من الطريقتين الاولى والثانية الاقرب من القيم الحقيقية في 15 هجين لكل منهما. اظهرت طرائق التنبؤ الخمسة على التوالي قيماً أعلى من متوسطات الهجن الزوجية الحقيقية في (25 و 24 و 27 و 28) هجين لصفة وزن 100 بذرة (الجدول 8)، وبرزت الطريقة الاولى كافضل طريقة تنبؤ للصفة، إذ اعطت متوسطات اقرب الى القيم الحقيقية في 23 هجين لتلتها الطريقة الثالثة. ولحاصل البذور بالنبات (الجدول 9) اعطت طرائق التنبؤ على التوالي قيماً أعلى من متوسطات الهجن المشاهدة في (21 و 25 و 22 و 24 و 24) هجين، وكانت طريقة التنبؤ الاولى قد اعطت قيماً متوقعة اقرب الى القيم المشاهدة في 20 هجين دلالة على انها الافضل في التنبؤ للصفة. واخيراً فإن لصفة نسبة الزيت (الجدول 10) ظهرت من طرائق التنبؤ قيماً متوقعة أعلى من القيم المشاهدة في (25 و 19 و 20 و 18 و 16) هجين، وتميزت الطريقة التنبؤية الاولى للصفة باعطائها قيماً متوقعة قريبة من القيم المشاهدة في 23 هجين زوجي، تلتها الطريقة الثانية التي اعطت متوسطات اقرب الى القيم المشاهدة في عشرة هجن. ويفسر ظهور القيم المتوقعة للهجن الزوجية من طرائق التنبؤ أعلى من القيم المشاهدة بان هناك مقدرة عامة عالية على الاتحاد للسلالات النقية الداخلة في تلك الهجن الزوجية، ولا سيما السلالات التي تكون غير متفوقة بمواصفاتها (27). ويلاحظ بشكل عام ان الطريقة الاولى تعد هي الافضل من بين الطرائق المستخدمة في التنبؤ بالهجن الزوجية للصفات جميعها تليها في الاهمية الطريقة الثانية لصفتي عدد البذور بالقرص ونسبة الزيت والطريقة الثالثة لصفة وزن 100 بذرة والطريقتين الثانية والثالثة لمساحة القرص، ومن دراسات سابقة على محصول الذرة الصفراء توصل عدد من الباحثين إلى طرائق تنبؤ مناسبة

ليعض الصفات في الهجن الزوجية ومنهم (20) و (3) و (21).
يتضح مما تقدم أن قيم الهجن الزوجية الناتجة من طرائق التنبؤ في هذه الدراسة وللصفات جميعها، لا تتماشى بشكل متجانس مع القيم المشاهدة لتلك الهجن، ونتيجة لذلك فقد تم حساب معامل الارتباط البسيط بين القيم المشاهدة للهجن الزوجية والقيم المتوقعة من طرائق التنبؤ بصفات تلك الهجن والمبينة نتائجها في جدول (11)، وفيه يلاحظ أن القيم المشاهدة لصفة مساحة القرص قد أظهرت ارتباطات غير معنوية سالبة مع القيم المتوقعة من طريقة التنبؤ الاولى وموجبة مع تلك من الطرائق الاخرى، أما لصفتي عدد البذور بالقرص وحاصل البذور بالنبات فقد كان الارتباط موجب معنوياً عند مستوى احتمال 5% مع القيم المتوقعة من الطريقة التنبؤية الاولى، وغير معنوي موجب او سالب مع تلك من الطرائق الاخرى. ولصفة وزن 100 بذرة ونسبة الزيت ارتبطت القيم الحقيقية للهجن الزوجية ارتباطاً موجباً عالي المعنوية مع القيم المشاهدة من الطريقة الاولى فقط، في حين كانت الارتباطات غير مهمة مع تلك من باقي طرائق التنبؤ، وفي هذه النتائج هناك تأكيد على ان الطريقة الاولى للتنبؤ كانت هي الافضل للصفات جميعها ما عدا مساحة القرص والتي لم تتضح فيها اي من الطرائق على انها مناسبة. وقد حصل باحثون آخرون من اعمالهم على محصول الذرة الصفراء على قيم موجبة وقيم سالبة للارتباط بين القيم المشاهدة للهجن الزوجية والقيم المتوقعة ومنهم: (28) و (3) و (21). ولتوقع تنبؤ أفضل بقيم الهجن الزوجية يمكن اعتمادها كدليل على ادائها فقد اعتمدت طريقة الانحدار المتدرج Stepwise regression method لتبيان العلاقة بين القيم المشاهدة للهجن الزوجية (المتغير y) وقيمتها المتوقعة من الطرائق الخمسة (المتغيرات M_1 و M_2 و M_3 و M_4 و M_5 التي تمثل القيم المتوقعة من الطرائق الخمس على التوالي) وذلك للتعرف على افضل معادلة انحدارية يمكن منها التنبؤ بقيم الهجن الزوجية. ويلاحظ من ما يظهر في الجدول (12) ان افضل معادلة انحدارية للتنبؤ بمساحة القرص هي تلك التي تعتمد القيم التنبؤية من الطريقة الاولى رغم ان F المحسوبة لها والتي بلغت قيمتها 2.09 لم تصل الى الحد المعنوي، وبرزت معادلتين مفضلتين للتنبؤ بعدد البذور بالقرص في الهجن الزوجية، احدها تضم القيم المتوقعة من الطريقة الثالثة والاخرى تضم القيم من الطريقتين الاولى والثالثة، وظهر من تحليل التباين لكلا المعادلتين انهما معنويتان عند مستوى احتمال 1% (F المحسوبة لهما

11.33 و 7.81 على التوالي). وكذلك لصفة وزن 100 بذرة ظهرت معادلتين مفضلتين للتنبؤ بقيمها للهجن الزوجية وبمعنوية عالية، تعتمد احدى المعادلتين على القيم المتوقعة من الطريقة الاولى (F المحسوبة = 24.21)، بينما تعتمد الاخرى على القيم المتوقعة من الطريقتين الاولى والثانية (F المحسوبة = 19.94). واخيرا لصفتي حاصل البذور بالنبات ونسبة الزيت ظهر ان معادلة الانحدار التي تعتمد على القيم المقارنة بين القيم المشاهدة للهجن الزوجية وقيمها المتوقعة من خمسة طرائق ولصفة مساحة القرص لزهرة الشمس. جدول (6):

متوسطاتها للصفات						الهجن الزوجية
الطريقة الاولى	الطريقة الثانية	الطريقة الثالثة	الطريقة الرابعة	الطريقة الخامسة	الحقيقية	
310.259	315.713	208.987	262.350	310.259	173.073	(4x3)(2x1)
244.848	302.240	206.565	254.403	244.848	356.827	(5x3)(2x1)
300.052	224.748	331.325	278.037	300.052	281.140	(6x3)(2x1)
374.594	405.433	228.052	316.743	374.594	264.213	(5x4)(2x1)
336.504	327.942	259.518	293.730	336.504	214.663	(6x4)(2x1)
279.500	314.468	265.503	289.986	279.500	216.040	(6x5)(2x1)
242.078	248.972	209.412	229.192	242.078	353.323	(4x2)(3x1)
227.455	235.275	263.518	249.397	227.455	433.797	(5x2)(3x1)
272.372	265.393	287.692	276.543	272.372	348.420	(6x2)(3x1)
81.684	139.850	190.200	165.025	81.684	225.657	(5x4)(3x1)
177.704	169.968	265.477	217.723	177.704	275.697	(6x4)(3x1)
22.163	156.262	178.665	167.468	22.163	146.623	(6x5)(3x1)
202.285	185.103	262.843	223.976	202.285	263.187	(3x2)(4x1)
181.884	255.160	245.308	250.234	181.884	136.140	(5x2)(4x1)
237.115	267.805	302.028	284.917	237.115	129.983	(6x2)(4x1)
153.842	215.755	238.765	227.260	153.842	312.683	(5x3)(4x1)
130.582	228.400	216.993	222.697	130.582	254.157	(6x3)(4x1)
133.978	298.452	223.257	260.854	133.978	279.430	(6x5)(4x1)
173.085	142.625	246.812	194.718	173.085	344.797	(3x2)(5x1)
258.216	210.565	181.888	246.227	258.216	213.823	(4x2)(5x1)
210.353	175.252	303.693	239.473	210.353	119.337	(6x2)(5x1)
197.019	184.513	234.353	209.433	197.019	208.760	(4x3)(5x1)
177.797	149.200	284.798	216.999	177.797	266.290	(6x3)(5x1)
136.279	217.140	193.227	205.183	136.279	154.107	(6x4)(5x1)
212.780	230.013	226.353	228.183	212.780	240.897	(3x2)(6x1)
217.069	277.063	206.237	241.650	217.069	403.710	(4x2)(6x1)
254.040	229.800	210.692	270.246	254.040	326.607	(5x2)(6x1)
219.481	261.540	229.092	245.316	219.481	381.800	(4x3)(6x1)
236.810	314.277	213.805	264.091	236.810	234.393	(5x3)(6x1)
280.774	361.327	233.463	297.395	280.774	254.980	(5x4)(6x1)
186.997	221.228	184.028	202.628	186.997	177.053	(5x4)(3x2)
325.540	200.770	370.265	285.518	325.540	264.977	(6x4)(3x2)
169.217	184.738	200.658	192.698	169.217	176.133	(6x5)(3x2)
376.041	300.370	281.783	291.077	376.041	113.327	(5x3)(4x2)
257.438	224.718	305.625	265.322	257.438	274.860	(6x3)(4x2)
251.308	297.195	245.250	271.223	251.308	317.463	(6x5)(4x2)
264.118	311.933	198.913	255.423	264.118	346.133	(4x3)(5x2)
436.452	277.317	373.730	325.523	436.452	172.847	(6x3)(5x2)
295.280	259.107	298.015	278.561	295.280	452.313	(6x4)(5x2)
166.987	269.367	193.652	231.509	166.987	178.483	(4x3)(6x2)
296.050	271.032	256.923	263.978	296.050	235.583	(5x3)(6x2)
228.750	285.368	227.292	256.330	228.750	273.627	(5x4)(6x2)
73.992	219.018	158.412	188.715	73.992	131.807	(6x5)(4x3)
324.470	289.123	303.973	296.548	324.470	218.633	(6x4)(5x3)
175.453	259.398	189.440	224.419	175.453	344.783	(5x4)(6x3)

- (1) EMB و (2) EUR و (3) L3 و (4) L6 و (5) L10 و (6) PERE12

جدول (7): مقارنة بين القيم المشاهدة للهجن الزوجية وقيمها المتوقعة من خمسة طرائق ولصفة عدد البذور بالقرص لزهرة الشمس.

متوسطاتها للصفات						الهجن الزوجية
الطريقة الخامسة	الطريقة الرابعة	الطريقة الثالثة	الطريقة الثانية	الطريقة الاولى	الحقيقية	
1211.616	1054.029	1003.800	1104.258	896.443	753.613	(4x3)(2x1)
865.593	1001.549	1006.097	997.002	1137.506	1444.983	(5x3)(2x1)
646.383	914.582	1115.298	713.865	1182.781	733.207	(6x3)(2x1)
1515.925	1249.876	1033.265	1466.487	983.827	1123.810	(5x4)(2x1)
1538.047	1283.574	1383.798	1183.350	1029.102	940.823	(6x4)(2x1)
887.238	1078.702	1081.310	1076.093	1270.165	1077.207	(6x5)(2x1)
1477.943	1195.471	1162.772	1228.170	912.998	1163.487	(4x2)(3x1)
1149.942	1114.803	1047.903	1181.702	1079.663	1376.783	(5x2)(3x1)
1261.268	1154.950	929.565	1380.335	1048.632	1020.377	(6x2)(3x1)
752.802	880.981	1025.680	736.282	1009.160	1153.350	(5x4)(3x1)
950.015	964.072	993.228	934.915	978.128	1225.200	(6x4)(3x1)
744.057	944.425	1000.403	888.447	1144.793	1287.753	(6x5)(3x1)
1365.348	1226.298	1198.852	1053.745	887.249	1049.647	(3x2)(4x1)
1033.060	1081.540	1216.543	946.537	1130.020	1351.243	(5x2)(4x1)
701.130	955.612	865.190	1046.033	1210.093	1211.110	(6x2)(4x1)
868.228	1040.712	1061.278	1020.145	1213.196	943.343	(5x3)(4x1)
726.696	1009.983	900.323	1119.642	1293.269	1150.557	(6x3)(4x1)
565.707	1050.873	1089.313	1012.433	1536.050	1373.210	(6x5)(4x1)
1347.934	1142.398	1044.077	1140.720	936.863	1170.187	(3x2)(5x1)
1556.155	1284.562	1332.055	1237.068	1012.968	749.970	(4x2)(5x1)
1088.980	1086.208	1101.920	1070.497	1083.437	935.783	(6x2)(5x1)
1393.558	1207.652	1132.552	1282.752	1021.746	1037.770	(4x3)(5x1)
711.628	901.921	687.662	1116.180	1092.214	1256.430	(6x3)(5x1)
1258.543	1213.432	1214.335	1212.528	1168.320	875.990	(6x4)(5x1)
1112.601	1005.248	1227.540	882.955	897.894	1031.997	(3x2)(6x1)
1158.327	1121.716	991.955	1251.477	1085.105	1675.280	(4x2)(6x1)
1139.055	1107.278	1006.813	1207.742	1075.500	1129.850	(5x2)(6x1)
1294.844	1156.210	1047.828	1264.592	1017.576	1374.057	(4x3)(6x1)
1388.893	1198.432	1176.007	1220.857	1007.971	914.750	(5x3)(6x1)
1513.657	1354.419	1119.460	1589.378	1195.182	1073.020	(5x4)(6x1)
1101.495	988.660	905.638	1071.682	875.825	967.540	(5x4)(3x2)
1401.628	1119.243	1183.340	1055.145	836.857	1057.517	(6x4)(3x2)
1173.767	1030.118	1059.867	1000.370	886.470	1264.930	(6x5)(3x2)
1359.709	1162.624	930.282	1394.967	965.539	1118.183	(5x3)(4x2)
1237.768	1207.758	1360.648	1054.867	1177.747	834.973	(6x3)(4x2)
1095.210	1186.463	1148.777	1224.150	1277.717	1226.483	(6x5)(4x2)
1197.453	1114.333	1114.012	1114.653	1031.212	1352.027	(4x3)(5x2)
1076.218	4026.455	1147.987	904.923	976.692	957.583	(6x3)(5x2)
1450.962	1239.005	1404.447	1073.563	1027.048	1167.593	(6x4)(5x2)
721.545	874.293	1029.288	719.298	1027.042	1245.053	(4x3)(6x2)
1100.653	1000.519	1045.010	956.028	900.385	1110.180	(5x3)(6x2)
829.225	945.536	999.418	891.653	1061.847	851.773	(5x4)(6x2)
1073.565	1112.955	1067.870	1158.040	1152.345	1232.817	(6x5)(4x3)
1137.993	1057.034	1013.877	1100.192	976.075	690.490	(6x4)(5x3)
837.665	962.423	991.833	933.012	1087.180	1088.370	(5x4)(6x3)

- (1) EMB و (2) EUR و (3) L3 و (4) L6 و (5) L10 و (6) PERE12

جدول (8): مقارنة بين القيم المشاهدة للهجن الزوجية وقيمها امتوقعة من خمسة طرائق ولصفة وزن 100 بذرة لزهرة الشمس.

متوسطاتها للصفات						الهجن الزوجية
الطريقة الخامسة	الطريقة الرابعة	الطريقة الثالثة	الطريقة الثانية	الطريقة الاولى	الحقيقية	
6.002	5.765	6.127	5.403	5.528	4.567	(4x3)(2x1)
4.827	5.410	5.867	4.953	5.993	6.217	(5x3)(2x1)
5.761	5.626	6.807	4.445	5.491	5.357	(6x3)(2x1)
4.817	5.415	5.817	5.013	6.013	5.353	(5x4)(2x1)
5.811	5.661	6.817	4.505	5.511	6.533	(6x4)(2x1)
4.443	5.209	6.363	4.055	5.976	6.680	(6x5)(2x1)
4.548	4.983	4.412	5.553	5.417	4.697	(4x2)(3x1)
5.604	5.790	5.703	5.877	5.976	7.320	(5x2)(3x1)
7.038	6.240	6.477	6.003	5.442	5.493	(6x2)(3x1)
4.754	5.122	5.347	4.897	5.489	6.423	(5x4)(3x1)
6.135	5.545	6.067	5.023	4.955	3.230	(6x4)(3x1)
5.636	5.575	5.803	5.347	5.514	4.727	(6x5)(3x1)
6.567	6.039	5.582	6.497	5.512	3.683	(3x2)(4x1)
5.403	5.828	5.742	5.915	6.254	6.637	(5x2)(4x1)
7.066	6.532	6.585	6.478	5.998	5.417	(6x2)(4x1)
6.631	6.189	6.350	6.028	5.748	6.223	(5x3)(4x1)
7.801	6.646	6.700	6.592	5.491	4.467	(6x3)(4x1)
6.188	6.211	6.412	6.010	6.233	4.457	(6x5)(4x1)
5.466	5.722	5.015	6.428	5.978	5.477	(3x2)(5x1)
5.331	5.746	5.430	6.062	6.161	5.557	(4x2)(5x1)
6.511	6.063	6.487	5.638	5.614	5.307	(6x2)(5x1)
5.627	5.688	5.512	5.863	5.748	6.600	(4x3)(5x1)
6.882	6.042	6.643	5.440	5.202	6.317	(6x3)(5x1)
5.763	5.574	6.075	5.073	5.385	5.583	(6x4)(5x1)
4.918	5.222	4.982	5.462	5.526	4.313	(3x2)(6x1)
3.813	4.900	4.455	5.345	5.987	6.643	(4x2)(6x1)
5.445	5.571	5.768	5.373	5.697	5.777	(5x2)(6x1)
6.859	6.201	5.955	6.447	5.543	5.450	(4x3)(6x1)
7.134	6.193	5.912	6.475	5.253	5.190	(5x3)(6x1)
6.490	6.102	5.845	6.358	5.713	4.407	(5x4)(6x1)
4.139	4.848	4.943	4.753	5.558	5.497	(5x4)(3x2)
6.061	5.583	6.447	4.720	5.106	5.650	(6x4)(3x2)
4.505	5.038	5.923	4.153	5.572	6.467	(6x5)(3x2)
6.982	6.241	6.973	5.508	5.500	6.687	(5x3)(4x2)
5.797	5.672	6.810	4.533	5.547	5.387	(6x3)(4x2)
5.793	6.042	6.532	5.552	6.291	6.540	(6x5)(4x2)
5.275	5.545	5.105	5.985	5.815	5.217	(4x3)(5x2)
7.508	6.383	6.753	6.012	5.258	4.483	(6x3)(5x2)
6.969	6.253	6.455	6.050	5.536	4.687	(6x4)(5x2)
6.478	6.043	5.649	6.538	5.609	5.607	(4x3)(6x2)
7.749	6.488	6.535	6.440	5.226	3.607	(5x3)(6x2)
6.208	5.995	5.442	6.548	5.782	5.163	(5x4)(6x2)
5.076	5.453	5.972	4.933	5.829	6.670	(6x5)(4x3)
7.743	6.362	5.705	7.018	4.980	6.340	(6x4)(5x3)
6.361	5.809	4.972	6.647	5.258	5.263	(5x4)(6x3)

- (1) EMB و (2) EUR و (3) L3 و (4) L6 و (5) L10 و (6) PERE12

جدول (9): مقارنة بين القيم المشاهدة للهجن الزوجية وقيمها متوقعة من خمسة طرائق ولصفة حاصل البذور بالنبات لزهرة الشمس.

متوسطاتها للصفات						الهجن الزوجية
الطريقة الخامسة	الطريقة الرابعة	الطريقة الثالثة	الطريقة الثانية	الطريقة الاولى	الحقيقية	
53.638	50.089	52.418	47.760	46.540	46.837	(4x3)(2x1)
36.589	48.066	55.395	40.737	59.543	52.050	(5x3)(2x1)
35.120	46.163	63.807	28.520	57.207	34.577	(6x3)(2x1)
53.789	55.526	55.102	55.95	57.263	54.207	(5x4)(2x1)
70.662	62.794	81.855	43.733	54.927	51.733	(6x4)(2x1)
30.498	49.213	61.717	36.710	67.929	66.863	(6x5)(2x1)
80.477	61.838	53.462	70.215	43.200	53.803	(4x2)(3x1)
56.763	56.486	50.268	62.703	56.208	88.030	(5x2)(3x1)
76.708	63.548	52.130	74.965	50.388	56.683	(6x2)(3x1)
40.382	47.284	53.133	41.435	54.187	64.703	(5x4)(3x1)
63.508	55.937	58.177	53.697	48.366	35.270	(6x4)(3x1)
37.253	49.313	52.442	46.185	61.374	51.480	(6x5)(3x1)
80.305	60.060	65.797	54.323	39.815	38.963	(3x2)(4x1)
45.251	53.928	62.493	45.363	62.606	69.290	(5x2)(4x1)
39.351	51.025	49.360	52.690	62.699	61.467	(6x2)(4x1)
56.999	59.932	62.337	57.527	62.864	57.427	(5x3)(4x1)
52.659	57.808	50.763	64.853	62.958	41.990	(6x3)(4x1)
37.858	61.803	67.713	55.893	85.748	51.800	(6x5)(4x1)
72.306	58.867	54.730	63.003	45.428	57.107	(3x2)(5x1)
76.848	66.029	66.095	65.963	55.210	36.853	(4x2)(5x1)
65.362	58.987	63.692	54.282	52.612	52.907	(6x2)(5x1)
60.089	57.782	51.100	64.463	55.474	65.337	(4x3)(5x1)
42.173	47.524	42.267	52.782	52.876	74.727	(6x3)(5x1)
60.080	61.369	66.997	55.742	62.658	46.420	(6x4)(5x1)
44.533	42.214	45.913	38.515	39.896	42.367	(3x2)(6x1)
47.271	51.432	39.593	63.270	55.593	52.287	(4x2)(6x1)
60.668	56.784	51.400	62.168	52.901	53.557	(5x2)(6x1)
71.015	61.693	55.398	67.988	52.372	62.767	(4x3)(6x1)
83.533	66.607	66.327	66.887	49.680	50.120	(5x3)(6x1)
86.522	75.949	60.257	91.642	65.377	33.430	(5x4)(6x1)
54.644	49.416	41.895	56.937	44.188	50.920	(5x4)(3x2)
76.803	57.729	67.338	48.120	38.656	55.120	(6x4)(3x2)
40.823	42.546	48.038	37.053	44.268	74.073	(6x5)(3x2)
81.752	64.386	53.165	75.607	47.020	63.183	(5x3)(4x2)
70.909	63.771	78.437	49.105	56.633	38.877	(6x3)(4x2)
56.406	62.524	63.310	61.738	68.643	65.043	(6x5)(4x2)
48.061	52.158	45.392	58.925	56.256	75.333	(4x3)(5x2)
71.221	58.886	69.940	47.832	46.551	37.503	(6x3)(5x2)
83.267	68.108	76.158	60.057	52.948	80.347	(6x4)(5x2)
35.877	44.515	49.690	39.340	53.153	67.593	(4x3)(6x2)
67.761	55.413	57.155	53.672	43.066	28.860	(5x3)(6x2)
44.543	49.960	49.018	50.902	55.378	44.713	(5x4)(6x2)
40.319	51.203	54.035	48.372	62.088	72.880	(6x5)(4x3)
70.189	58.288	52.480	64.097	46.388	34.210	(6x4)(5x3)
51.645	51.973	47.050	56.897	52.302	53.790	(5x4)(6x3)

- (1) EMB و (2) EUR و (3) L3 و (4) L6 و (5) L10 و (6) PERE12

جدول (10): مقارنة بين القيم المشاهدة للهجن الزوجية وقيمها اتموقعة من خمسة طرائق ولصفة نسبة الزيت لزهرة الشمس.

متوسطاتها للصفات						الهجن الزوجية
الطريقة الاولى	الطريقة الثانية	الطريقة الثالثة	الطريقة الرابعة	الطريقة الخامسة	الحقيقية	
26.305	27.572	26.095	26.833	27.362	30.420	(4x3)(2x1)
26.971	27.828	29.750	28.789	30.608	29.787	(5x3)(2x1)
29.305	24.897	25.893	25.395	21.485	26.893	(6x3)(2x1)
26.711	28.287	28.017	28.152	29.593	25.093	(5x4)(2x1)
29.045	25.355	28.403	26.879	24.713	23.967	(6x4)(2x1)
29.711	25.612	19.412	22.512	15.313	29.363	(6x5)(2x1)
27.218	25.267	19.920	22.593	17.969	21.550	(4x2)(3x1)
27.670	26.912	26.108	26.510	25.350	30.887	(5x2)(3x1)
27.012	28.867	26.270	27.568	28.125	26.667	(6x2)(3x1)
29.450	26.248	29.208	27.728	26.0006	29.567	(5x4)(3x1)
28.793	28.203	29.882	29.043	29.293	20.533	(6x4)(3x1)
29.245	29.848	24.817	27.333	25.420	32.993	(6x5)(3x1)
26.093	24.592	28.495	26.543	26.994	29.017	(3x2)(4x1)
24.913	23.637	23.947	23.792	22.670	24.833	(5x2)(4x1)
26.951	24.480	26.697	25.588	24.226	27.507	(6x2)(4x1)
26.954	25.755	31.098	28.427	29.899	23.920	(5x3)(4x1)
28.992	26.598	24.787	25.693	22.393	29.857	(6x3)(4x1)
27.813	25.643	24.202	24.923	22.033	25.600	(6x5)(4x1)
27.649	24.065	23.987	24.026	20.403	30.833	(3x2)(5x1)
26.018	27.980	22.402	25.191	24.364	27.377	(4x2)(5x1)
28.415	25.630	26.17	25.900	23.385	23.470	(6x2)(5x1)
27.845	24.628	26.653	25.641	23.437	19.843	(4x3)(5x1)
30.243	22.278	24.492	23.385	16.528	31.920	(6x3)(5x1)
28.611	26.193	28.310	27.252	25.893	27.753	(6x4)(5x1)
28.212	26.213	25.020	25.617	23.022	23.007	(3x2)(6x1)
29.276	23.127	24.110	23.618	17.961	29.960	(4x2)(6x1)
29.636	26.907	27.082	26.994	24.353	28.743	(5x2)(6x1)
28.111	24.380	24.040	24.210	20.309	29.950	(4x3)(6x1)
28.471	28.160	30.082	29.121	29.771	27.987	(5x3)(6x1)
29.535	25.073	27.155	26.114	22.693	23.653	(5x4)(6x1)
26.243	24.995	30.778	27.887	29.530	26.577	(5x4)(3x2)
26.806	26.028	27.168	26.598	26.391	22.377	(6x4)(3x2)
28.363	21.520	20.218	20.869	13.376	25.673	(6x5)(3x2)
26.936	22.812	30.262	26.537	26.138	27.763	(5x3)(4x2)
28.130	24.520	26.363	25.442	22.753	23.653	(6x3)(4x2)
26.930	27.002	19.603	23.303	19.675	29.630	(6x5)(4x2)
24.658	25.358	28.082	26.720	28.782	21.980	(4x3)(5x2)
29.381	28.493	26.068	27.281	25.181	30.643	(6x3)(5x2)
26.624	26.332	25.597	25.964	25.304	26.520	(6x4)(5x2)
24.924	27.163	25.468	26.316	27.708	23.673	(4x3)(6x2)
26.388	26.637	29.245	27.941	29.493	25.597	(5x3)(6x2)
26.328	27.063	28.725	27.894	29.461	27.923	(5x4)(6x2)
26.464	26.027	25.008	25.518	24.571	30.450	(6x5)(4x3)
26.372	30.593	27.075	28.834	31.297	24.950	(6x4)(5x3)
29.068	24.962	29.917	27.439	25.811	29.627	(5x4)(6x3)

- (1) EMB و (2) EUR و (3) L3 و (4) L6 و (5) L10 و (6) PERE12

جدول (11): معاملات الارتباط بين القيم المشاهدة للهجن الزوجية وقيمها المتوقعة من خمسة طرائق مختلفة لصفات زهرة الشمس.

الصفات	طرق التنبؤ بمواصفات الهجن الزوجية				
	الاولى	الثانية	الثالثة	الرابعة	الخامسة
حبة القرص	0.0024 -	0.1245	0.0036	0.1016	0.0945
البذور بالقرص	*0.1811	0.0356	**0.2802 -	0.1301 -	*0.2004 -
ن 100 بذرة	**0.3924	**0.2505 -	0.0333	*0.1756 -	**0.3087 -
اصل	*0.1764	0.0572 -	**0.2295 -	*0.1971 -	**0.2781 -
ة الزيت	**0.2835	0.0831	0.1118 -	0.0466 -	0.1378 -

(**) و (*) الارتباط معنوي عند مستوى احتمال 1% و 5% على التوالي

جدول (12): افضل المعادلات الانحدارية للتنبؤ بقيم الصفات للهجن الزوجية.

الصفات	معادلة الانحدار التنبؤية	F المحسوبة
حبة القرص	$= 210.656 + 0.178 M1$	2.09
البذور بالقرص	$= 1562.119 - 0.424 M3$	**11.33
	$= 1281.35 + 0.249 M1 - 0.409 M3$	**7.81
ن 100 بذرة	$= - 0.1839 + 1.0096 M1$	**24.21
	$= 1.482 + 1.061 M1 - 0.347 M2$	**19.94
اصل بذور النبات	$= 39.659 + 0.271 M1$	*4.27
ة الزيت	$= 9.805 + 0.618 M1$	**11.62

M1 و M2 و M3 تعني القيم المتوقعة من الطرائق الاولى والثانية والثالثة على التوالي. (**) و (*) معوية عند مستوى احتمال 1% و 5% على التوالي.

المصادر

- 1- الجبوري، عبد الجاسم محيسن جاسم ووجيه مزعل الراوي وضياء بطرس يوسف (1990). استحداث العقم الذكري في محصول عباد الشمس باستخدام حامض الجبرلين. مجلة العلوم الزراعية العراقية، 22(1): 23-30.
- 2- داؤد، خالد محمد (2001). تقدير قوة الهجين والفعل الجيني والتوريث باستعمال التهجين التبادلي في الذرة الصفراء. مجلة جامعة تكريت للعلوم الزراعية، 21(2): 11-5.
- 3- داؤد، خالد محمد وعبد الستار احمد محمد (2003). التنبؤ بإداء الهجن الزوجية في الذرة الصفراء. المجلة العراقية للعلوم الزراعية، 5(1): 65-70.
- 4- الراوي، خاشع محمود (1987). المدخل الى تحليل الانحدار، مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل.
- 5- الراوي، ووجيه مزعل حسن (1998 أ). العقم الذكري السايكوبلازمي وانتاج الاصناف التركيبية والهجن في زهرة الشمس. اطروحة دكتوراه. قسم علوم المحاصيل الحقلية. كلية الزراعة، جامعة بغداد. العراق.
- 6- الراوي، ووجيه مزعل حسن (1998 ب). ارشادات في زراعة زهرة الشمس. نشرة ارشادية رقم (8). الهيئة العامة للإرشاد والتعاون الزراعي. وزارة الزراعة. العراق.
- 7- الراوي، خاشع محمود وعبد العزيز محمد خلف الله (2000). تصميم وتحليل التجارب الزراعية، مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل.
- 8- الزهيري، نزار سليمان علي (2014). التحليل الوراثي الكمي والجزئي لتهجينات فردية وثلاثية وزوجية لسلاسل نقية من الذرة الصفراء (*Zea mays L.*) وامكانية التنبؤ كمياً وجزيئياً بحاصل الهجن الزوجية ومكوناته. اطروحة دكتوراه، كلية الزراعة والغابات، جامعة الموصل، العراق.
- 9- A.A.C.C. (1976). American Association of chemists. Crude fatin grain and stock feeds. AACC method, 20-30, page 10 f1.
- 10- Ahmad, S., M. Noor, Ikramullah, Ihteramullah, F. Ali, W. Murad, Durishahwar and K. Afridi (2012). Potential of Sunflower (*Helianthus annus L.*) Double Cross Hybrid as a commercial production-grain cultivar. International Res. J. of Agric. Sci. and Soil Sci. 2(3): 94-97.
- 11- Balestre, M., R. G. Von Pinho and J. C. Souza (2010). Prediction of maize single-cross performance by mixed linear models

- Electronic J. of Plant Breeding, 1(4): 712-715.
- 22- Nawar, A. A., M. E. Gomaa and M. S. Rady (1980). Heterosis and combining ability in maize. Egypt. J. Genet. Cytol., 9: 255-267.
- 23- Rawlings, J. O. and C. C. Cockerham (1962a). Trialallel analysis. Crop Sci. 2: 228-231.
- 24- Rawlings, J. O. and C. C. Cockerham (1962b). Analysis of double cross hybrid population. Biometrics, 18: 229-244.
- 25- Revilla, P. and W. F. Tracy (1997). Heterosis pattern among open pollinated sweet corn cultivars. J. Amer. Hort. Sci., 12(3): 319-325.
- 26-Schrag, T. A., J. Mohring, H. P. Maurer, B. S. Dhillon (2009). Molecular marker-based prediction of hybrid performance in maize using unbalanced data from multiple experiments with factorial crosses. Theor. Appl. Genet. 118: 741-751.
- 27-Smith, G. A. and R. J. Hecker (1971). Predicting double cross sugar beet hybrid performance. Crop Sci., 11: 106-108.
- 28- Sujiprihati, S.; G. Saleh and EL.T. S. Ali (2003). Performance and yield predictions in double cross hybrids of tropical grain maize. Pertanika J. Trop. Agric. Sci., 26(1):27-33.
- 29 Troyer, A. F. (2009). Development of Hybrid Corn and the Seed Corn Industry. In: Handbook of Maize: Genetics and Genomics (Bennetzen JL and Hake S, eds.). Springer, New York, 87-114. 2009.
- with microsatellite marker information. Genet. Mol. Res. 9: 1054-1068.
- 12- Basra, A.S. (1999). Heterosis and hybrid seed production in sunflower. In: Heterosis and hybrid seed production in agronomic crops. Eds. Virupakshappa, K. and Ranganatha, A.R.G. Food Products Press, An imprint of the Haworth Press Inc., New York, USA. pp. 185-215.
- 13-Cockerham, C. C. (1967). Prediction of double crosses from single crosses. Der Zucher, 37: 160-169.
- 14-Cruz, J. C. and I. A. Pereira Filho (2008). Cultivares de Milho Disponíveis no Mercado de Sementes do Brasil para a Safra 2008/2009. Available at [<http://www.cnpms.embrapa.br/publicacoes/milho/cultivares.htm>]. Accessed November 1,
- 15-Dirrell, D. G. (1983). "Sunflower", in CRC Handbook of processing and utilization in agriculture. Vol. II, Plant Products, ed. I.A. Wolff. 145-156. Boca Raton, FL. CRC Press.
- 16-Doesthale, Y. G. (1972). The sunflower in nutrition. Vol.7, ed. S-C. Balasubramanian. 2-7. Hyderabad. National Institute of Nutrition.
- 17- Eberhart, S. A., W. A. Russell and L. H. Penny (1964). Double cross hybrid production in maize When epistasis is present. Crop Sci., 4: 363-366.
- 18- Eberhart, S. A. and A. R. Hallauer (1968). Genetic effect for yield in single, three-way and double Cross maize hybrids. Crop Sci., 8: 377-379.
- 19- Griffing, B.(1956). Concept of general and specific combining ability in relation to diallel crossing systems, Aust J. Biol. Sci. 9: 463-493.
- 20- Jenkins, M. T. (1934). Methods of estimating the performance of double crosses in corn. J. Am. Soc. Agron. 26: 199-204.
- 21- Kumar, A. (2010). Prediction of double cross hybrid performance in maize (*Zea mays* L.).