

تقدير القدرة على الاتحاد والتأثيرات الجينية في الذرة الصفراء (*Zea mays* L.) باستخدام هجن السلالة x الفاحص تحت ظروف بيئية مختلفة

خالد محمد داود الزبيدي محمد إبراهيم محمد مصطفى العكدي عبد السلام رجب احمد الجميلي
كلية الزراعة والغابات، جامعة الموصل كلية الزراعة-الحويجة، جامعة كركوك مديرية زراعة محافظة صلاح الدين

الخلاصة

تعد تقديرات التأثيرات الجينية والقدرة على الاتحاد خطوات مهمة في تربية الذرة الصفراء، ولهذا الغرض استخدمت في الدراسة الحالية سلالات الذرة الصفراء G17 و Inbreed12 و ZM51 و Th97Allah-K122 و G105 و G54 كأباء مذكرة وهجن مع الفواحص ZM47R و CA21R و ZM49R (آباء مؤنثة) وتم تقييم الآباء والهجن الفردية الناتجة باستخدام تصميم القطاعات العشوائية الكاملة بثلاثة مكررات في ثلاث مواقع (الشرقاط والحويجة والموصل) خلال الموسم الخريفي لعام 2013. وخلال فترة النمو والنضج سجلت البيانات عن صفات موعدي التزهير الذكري والأنثوي وارتفاع النبات وطول العرنوص وقطره وعدد الصفوف وعدد الحبوب فيه ووزن 100 حبة وحاصل الحبوب بالنبات ونسبتي الزيت والبروتين. أظهرت النتائج (كمعدل للمواقع الثلاث) أن متوسط مربعات السلالات والفواحص كان معنوياً عالياً للصفات جميعها ما عدا نسبة الزيت للسلالات، دلالة على أهمية التأثير الجيني الإضافي في السيطرة على وراثتها. كان للسلالتين النقيتين Th97Allah.K122 و G105 تأثير معنوي مرغوب للقدرة العامة على الاتحاد لحاصل الحبوب بالنبات، وكانت السلالة Th97Allah.K122 هي الأفضل لتمييزها بقدرة عامة على الاتحاد معنوية مرغوبة لمعظم الصفات الأخرى، أي أن السلالتين لهما طاقة من التأثيرات الجينية الإضافية لاستخدامها في برامج التربية. وظهر أن للفواحص CA21R تأثيرات جينية إضافية مناسبة لحاصل الحبوب بالنبات وبعض مكوناته والنضج المبكر ونسبة الزيت. أعطى الهجين (Th97Alla-K122 x ZM47R) أعلى حاصل حبوب بالنبات (195.22غم) وتأثير معنوي مرغوب للقدرة الخاصة على الاتحاد، فضلاً عن إظهاره قدرة خاصة على الاتحاد معنوية ومرغوبة لصفات موعدي التزهير الذكري والأنثوي وقطر العرنوص وعدد الصفوف والحبوب فيه ووزن 100 حبة، تلتها الهجن (Inbreed12 x CA21R) و (G54 x CA21R) و (G17 x ZM49R) و (G105 x ZM49R). ظهر أن التباين الوراثي الإضافي كان أكبر من السيادة للصفات جميعها ما عدا قطر العرنوص ونسبة الزيت دلالة على أن التأثيرات الجينية الإضافية كانت أكثر أهمية من التأثيرات السائدة في السيطرة على وراثتها، ولهذا السبب كانت تقديرات التوريث بالمعنى الضيق قريبة من تلك للتوريث الواسع وخاصة لصفات موعدي التزهير الذكري والأنثوي وارتفاع النبات. تراوحت قيم التوريث الضيق بين 0.1229 لنسبة الزيت و 0.6827 لوزن 100 حبة، وكانت عالية لصفات ارتفاع النبات وعدد الصفوف بالعرنوص ووزن 100 حبة ومتوسطة لصفات موعدي التزهير الذكري والأنثوي وطول العرنوص وعدد الصفوف بالعرنوص وحاصل الحبوب بالنبات وواطئة لبقية الصفات، وتفيد التقديرات المتوسطة إلى العالية للتوريث الضيق في الانتخاب للتأثيرات الإضافية بين السلالات قيد الدراسة

كلمات مفتاحية: القدرة على الاتحاد، سلالة نقية، ذرة، فاحص، هجين فردي

ESTIMATION OF COMBINING ABILITY AND GENE EFFECTS IN MAIZE (*Zea mays* L.) USING LINE × TESTER CROSSES UNDER DIFFERENT ENVIRONMENTS

Kh. M. D. Al-Zubaidy* M. I. M. M. Al-Ugady** A. R. A. Al-Jomaily***

*College of Agric. and Forestry, Mosul University, Iraq

**College of Agric., Al-Hawija, Kirkuk University, Iraq

***Agriculture Directorate of Salah Al-Din Governorate, Ministry of Agriculture, Iraq

ABSTRACT

Determination of gene effects and combining abilities is a critical stage in maize hybrid breeding, and for this purpose inbred lines of maize G17, Inbreed12, ZM51, Th97Allah-K122, G105 and G54 were used as male parents in this study and crossed with the testers ZM47R, CA21R and ZM49R as female parents. Parents and the resulting hybrids were evaluated in a randomized complete block design with three replications at three locations (Sharqat, Hawija and Mosul) through autumn season of 2013. During the growing and maturity periods, data were collected for dates of tasseling and silking, plant height, ear length and diameter, number of rows and grains per ear, 100 grain weight, grain yield per plant, oil percent and protein percent. The results (as average of the three locations) showed that mean square of lines and testers were highly significant on all the characters except oil percent for lines indicating the importance of additive gene effect in controlling its inheritance. The two inbred lines Th97Allah.K122 and G105 were identified as good

general combiners for grain yield per plant because they showed significant desired general combining ability effects for this character. Th97Allah.K122 was superior compared with G105 because of significant positive GCA for most other characters, then two lines have potential additive gene effects to be utilized in the breeding programs. CA21R tester showed favorable additive gene effects for grain yield per plant, some of its components, early maturity and oil percent. The highest grain yield per plant (195.22 gm) with significant desirable specific combining ability effect belonged to ZM47R × Th97Alla-K122 combination, in addition to its significant desirable specific combining ability effects for dates of tasseling and silking, ear diameter, number of rows and grains per ear and 100 grain weight, followed by crosses (CA21R x Inbreed12), (CA21R x G54), (ZM49R x G17) and (ZM49R x G105). Additive genetic variance was substantially higher than dominance genetic variance for all characters except ear diameter and oil percent, indicating that additive gene effects were more prominent than dominance effects in controlling its inheritance, therefore, narrow sense heritability estimates closely resembled the broad sense heritability values especially for dates of tasseling silking and plant height. Narrow sense heritability values ranged between 0.1229 for oil percent and 0.6827 for 100 grain weight, and was high for plant height, number of grains per ear and 100 grain yield, medium for dates of tasseling silking, ear length, number of rows per ear and grain yield per plant and low for other characters, and medium to high narrow sense heritability estimates enable to select for favorable additive gene effects among the studied lines.

Keywords: General combining, Inbred line, Maize, Tester, single crosses

المقدمة

معنوية القدرتين العامة والخاصة على الاتحاد لحاصل الحبوب. وأشار (23) من تحليل السلالة x الفاحص (20) إلى معنوية تأثيرات كل من السلالات والفواحص والتي تعد دليلاً على أن الفعل الجيني الإضافي كان أكبر وأكثر أهمية في السيطرة على معظم الصفات قيد الدراسة، ما عدا صفة عدد الأيام للنضج الفسيولوجي التي كان مسيطراً عليها أكثر بالتأثيرات السائدة. وسبق أن حصل (23) أيضاً على نتائج مشابهة لعدد الحبوب بالصف وحاصل الحبوب ووزن 100 حبة وارتفاع العرنوص. وقام (9) بتقييم أنسال هجن السلالة x الفاحص في الذرة الصفراء تحت كثافات نباتية طبيعية وعالية، ولاحظ أن التباين الوراثي الإضافي كان معنوياً لعدد الحبوب بالصف وعدد الصفوف بالعرنوص عند الكثافة النباتية العالية، وللصفات الأخرى بضمنها حاصل الحبوب كان كلا التباينين الإضافي والسائد معنويين في كلتا الكثافتين، وكان معدل درجة السيادة لمعظم الصفات ضمن حدود السيادة الفائقة. واستخدم (4) في دراسته ستة عشر سلالة نقية من الذرة الصفراء بطريقة (السلالة x الفاحص) وفي ظروف بيئية مختلفة واستنتج أن الهجن تباينت في تأثيراتها للقدرة الخاصة على الاتحاد وتميز الهجن (IPA4 x ATSH) بتأثيرات معنوية مرغوبة لصفات مواعيذ التزهير الذكري والأنثوي وارتفاع النبات وعدد أوراق النبات والمساحة الورقية وطول العرنوص ووزن الحبة. وفي نظام تزاوجي عاملي باستخدام خمسة فواحص كأمهات و16 سلالة كآباء مذكورة في الذرة الصفراء في بيئتين، وجد (15) اختلافات معنوية لجميع المكونات. وظهر لصفة حاصل الحبوب أن كل من القدرة الخاصة على الاتحاد وتداخلها مع البيئات كانا أكثر أهمية من القدرة العامة على الاتحاد وتداخلها مع البيئات دلالة على دور الفعل الجيني الإضافي في السيطرة على الصفة.

إن تطوير أصناف هجينة جديدة من الذرة الصفراء يتطلب معلومات عن التركيب الوراثية للسلالات الأبوية وانسالتها. ويمكن اشتقاق هذه المعلومات من خلال استخدام تصاميم تزاوجية مختلفة مثل التهجين التبادلي (11 و 16 و 10) وتهجينات السلالة x الفاحص (17) وأخرى غيرها. فقد استخدم (28) طريقة السلالة x الفاحص لتقييم أنسال 42 تهجين قمي (21 سلالة وفاحصين) بهدف تقليل عدد السلالات في مرحلة الغرلة المبكرة. واستخدمت طريقة السلالة x الفاحص في دراسات مختلفة منها على سبيل المثال تلك التي قام بها (14) و (25) و (22) و (29) و (13) لتقدير تأثيرات القدرتين العامة والخاصة على الاتحاد للسلالات وهجنها قيد الدراسة، إذ استنتج (25) بأن توافقات السلالات بتأثيرات معنوية موجبة أو سالبة للقدرة العامة على الاتحاد يمكن أن تؤدي إلى تأثيرات موجبة ومعنوية للقدرة الخاصة على الاتحاد في هجنها القمية، وأوضح (14) أن الإباء ذوات القدرة العامة على الاتحاد العالية للصفة لا يشترط أن تعطي تأثيرات للقدرة الخاصة على الاتحاد عالية للصفة ذاتها. وصنف (26) السلالات النقية البيضاء للذرة الصفراء إلى مجموعتين قويتين مستخدماً تأثيرات القدرة الاتحادية للحاصل. إن تحليل السلالة x الفاحص يساعد أيضاً في تقدير مكونات التباين الوراثي ونوع التأثيرات الجينية (الزبيدي والجبوري، 2016). فمن خلال استخدام طريقة السلالة x الفاحص وجد (28) فروق معنوية بين السلالات والفواحص والتوافق بينها دلالة على أهمية كل من التباين الوراثي الإضافي وغير الإضافي (السائد) في السيطرة على حاصل الحبوب. وهجن (12) 23 سلالة نقية مع أربعة فواحص تركيبية واسعة الانتشار وقاموا بتقييم الانسال في ستة بيئات، وظهر تحليل التباين

Dendogram حسب طريقة UPGMA (27)، إذ يتم تقدير مسافات تعبر عن درجة التشابه بين معدلات المجاميع من المصفوفة المشار إليها. أدخلت بيانات الصفات جميعها في تحليل إحصائي ووراثي تجميعي للمواقع الثلاث وكما يلي:

- (1) أدخلت بيانات صفات التراكيب الوراثية جميعها (آباء وهجن) والآباء (سلالات وفواحص) والهجن في تحليل إحصائي تجميعي حسب طريقة التصميم التجريبي المستخدم واختبرت الفروقات بين متوسطات كل من المواقع والآباء والهجن بطريقة دنكن المتعدد المدى (17).
- (2) حلت بيانات صفات التراكيب الوراثية جميعها تجميعياً بطريقة السلالة x الفاحص بالطريقة التي شرحها الزبيدي والجبوري (2016).
- (3) قدرت تأثيرات القدرتين العامة على الاتحاد للآباء (سلالات وفواحص) GCA والخاصة على الاتحاد للهجن SCA باعتماد النموذج الثابت من طريقة التحليل واختبرت معنويتها عن الصفر من خلال تقدير الخطأ القياسي (SE).

$$GCA (Lines) = Y_{i..}/ert - Y_{...}/rlt ;$$

$$GCA (Testers) = Y_{.j.}/erl - Y_{...}/erlt$$

$$SCA = Y_{ij.}/er - Y_{i..}/ert - Y_{.j.}/erl + Y_{...}/erlt$$

$$SE (GCA \text{ for line}) = (MSe/ert)^{1/2} ;$$

$$SE (GCA \text{ for tester}) = (MSe/erl)^{1/2} ;$$

$$SE (SCA) = (MSe/r)^{1/2}$$

حيث أن $Y_{i..}$ = مجموع السلالة i و $Y_{.j.}$ = مجموع الفاحص j و $Y_{...}$ = المجموع العام و e و r و l و t = عدد المواقع

والمكررات والسلالات والفواحص على التوالي و MSe = متوسط مربعات الخطأ التجريبي.

- (4) قدرت مكونات التباين المظهري (σ^2P) للصفات جميعها وهي: التباين الوراثي الإضافي (σ^2A) والتباين الوراثي السيادي (σ^2D) والتباين البيئي (σ^2E) من خلال اعتماد العلاقة بين متوسطي المربعات المقدر والمتوقع من تحليل التباين للقدرة على الاتحاد وللصفات جميعها.

$$\sigma^2A = (1/4+F) \sigma^2gca ; \sigma^2D =$$

$$(1/2+F) \sigma^2sca ; \sigma^2E = MSe ; \sigma^2P = \sigma^2A + \sigma^2D + \sigma^2E$$

- (5) بالاعتماد على قيمه: مكونات التباين المظهري للصفات جميعها تم تقدير التوريث بالمعنى الواسع (H^2) [وحدود قيمه حسب (3) أقل من 40% واطنة ومن 40%-60% متوسطة وأكثر ومن 60% عالية] والضيق (h^2) [وحدود قيمه حسب العذاري (1999): أقل من 20% واطنة ومن 20%-50% متوسطة وأكثر من 50% عالية] ومعدل درجة السيادة ($\bar{a}$).

$$h^2 = \sigma^2A / \sigma^2P ; H^2 = (\sigma^2A + \sigma^2D) / \sigma^2P ; \bar{a} = (2 \sigma^2D / \sigma^2A)^{1/2}$$

إن الهدف من الدراسة الحالية تقدير تباينات وتأثيرات القدرتين العامة والخاصة على الاتحاد لحاصل حبوب الذرة الصفراء ومكوناته من الصفات الأخرى باستخدام هجن منتجة من استخدام نظام التهجن (السلالة x الفاحص) تحت ظروف بيئية مختلفة.

مواد وطرق البحث


استخدمت في الدراسة ثلاثة فواحص نقية من الذرة الصفراء (آباء مؤنثة)، (1) ZM47R و (2) CA21R و (3) ZM49R وستة سلالات نقية (آباء مذكرة)، (4) G17 و (5) Inbreed12 و (6) ZM51 و (7) Th97Allah-K122 و (8) G105 و (9) G54 (مصدرها كلية الزراعة بجامعة تكريت وفاكولتي الزراعة والغابات بجامعة دهوك). زرعت التراكيب التسعة خلال الموسم الربيعي لعام 2013 في قضاء الشرفاء وأجريت بينها التهجينات حسب طريقة السلالة x الفاحص (17) وتم الحصول على 18 هجين فردي. زرعت هجن الجيل الأول مع آبائها في ثلاثة مواقع، الأول في قضاء الشرفاء بمحافظة صلاح الدين والثاني قرية الصلاحية بقضاء الحويجة والثالث في حقول كلية الزراعة والغابات (داخل حرم جامعة الموصل) بمحافظة نينوى بتاريخ 17 و 18 و 21 تموز 2013 على التوالي وباستخدام تصميم القطاعات العشوائية الكاملة بثلاثة مكررات. كانت الزراعة على مروز طولها 3 م والمسافة بينها 0.75 م وبين النباتات في الثلث العلوي من الممرز 0.25 م. أجريت عمليات إدارة المحصول والتي اشتملت على إعداد الأرض والرعي ومكافحة الأدغال حسب الحاجة والتوصيات. وأضيف سماد السوبر فوسفات الثلاثي P_2O_5 بمعدل 200 كغم للهكتار على دفعة واحدة عند الزراعة، والبوريا (46% نتروجين) بمعدل 200 كغم للهكتار على دفتين، الأولى عند الزراعة والثانية بعدها بشهر. واتخذت تدابير وقاية النباتات لجعل المحصول خالي من الإصابات الحشرية والمرضية، وذلك بتفجير البذور قبل الزراعة باستخدام مبيدي كروزر للوقاية من حشرة حفار ساق الذرة وفيتا فاكس لتجنب التفحمت في نهاية الموسم. اختبرت عشرة نباتات من كل وحدة تجريبية التي اشتملت على ممرز واحد مع ترك النباتات الطرفية، وسجلت عنها بيانات عن صفات مواعدي التزهير الذكري والأنثوي (يوم) وارتفاع النبات (سم) وطول العرنوص (سم) وقطره (ملم) وعدد الصفوف وعدد الحبوب فيه ووزن 100 حبة (بالغرام بعد تصحيح الوزن على محتوى رطوبي 15.5% في الحبوب) وحاصل الحبوب بالنبات (بالغرام بعد تصحيح الوزن على محتوى رطوبي 15.5% في الحبوب) ونسبتي الزيت (باستخدام Soxhlet وحسب ما ورد في (5) والبروتين بطريقة مايكروكلدال المحورة (8)). وبالاعتماد على متوسطات هذه الصفات في السلالات والفواحص بوصفها آباء للهجن الفردية تم إجراء التحليل العنقودي بهدف وضعها في مجاميع حسب نمط الاستجابة (27)، وكان التحليل على مرحلتين، الأولى تتضمن التحليل بطريقة المكونات الأساسية، والثانية التحليل العنقودي الذي يتضمن عدة خطوات تبدأ بتكوين مصفوفة درجة التشابه بين السلالات النقية (Proximities Matrix) ثم تكوين

التعرف على العلاقة الوراثية بين السلالات النقية بشكل مجاميع Clusters، حيث وزعت السلالات والفواحص في ثلاث مجموعات رئيسية، ويلاحظ أن المجموعة الرئيسية الأولى ضمت السلالة G17 فقط، وضمت المجموعة الرئيسية الثانية الفاحص ZM47R والسلالة ZM51، أما المجموعة الرئيسية الثالثة فقد انقسمت إلى ثلاث مجاميع ثانوية، احتوت كل واحدة على تركيبين وراثيين، إذ ضمت الأولى الفاحص CA21R والسلالة Th97Allah.K122 وضمت الثانية الفاحص ZM49R والسلالة Inbreed12 بينما ضمت الثالثة السلالتين G105 وG54. وتدل هذه النتائج على وجود اختلافات وراثية بين الفواحص والسلالات قيد الدراسة، وعليه فقد أدخلت في برنامج تهجين بطريقة السلالة X الفاحص وتم الحصول على 18 هجين فردي بينها. وقد استخدمت التراكيب الوراثية جميعها (السلالات والفواحص والهجن بينها) في اختبارات القدرة على الاتحاد والفعل الجيني للصفات جميعها، ويتضح من نتائج تحليل التباين في الجدول (1) أن متوسط مربعات كل من المواقع والتراكيب الوراثية جميعها (آباء وهجن) والآباء (سلالات وفواحص) والهجن الاختبارية والآباء ضد الهجن كان

نفذت جميع التحليلات الإحصائية والوراثية من خلال الاستعانة بالبرامج الجاهزة Microsoft Office Excel 2003 وSPSS وSAS (Statistical Analysis System V.9).

النتائج والمناقشة

اعتماداً على متوسطات الصفات قيد الدراسة: مواعي التزهير الذكري والأنثوي وارتفاع النبات وطول العرنوص وقطره وعدد الصفوف وعدد الحبوب فيه ووزن 100 حبة وحاصل الحبوب بالنبات ونسبتي الزيت والبروتين تم إجراء التحليل العنقودي بهدف وضع سلالات وفواحص الذرة الصفراء النقية في مجاميع حسب نمط الاستجابة وتقدير البعد الوراثي بينها بوصفها آباء للهجن الفردية (الشكل 1)، ويلاحظ أن أعلى بعد وراثي بين السلالات النقية بلغ 0.141 بين السلالتين G17 وZM51، ويعود السبب في ذلك إلى امتلاكهما مادة وراثية مختلفة، وبنفس الوقت كان للسلالتين بعد وراثي عالي مع بعض الفواحص والسلالات الأخرى. وكانت الاختلافات واضحة في مدى التباين في الصفات المظهرية التي أبدتها هذه السلالات والفواحص. وبلغ أقل بعد وراثي 0.001 بين الفاحص CA21R والسلالة Th97Alla-K122 لاحتمال تقاربهما في المادة الوراثية التي يمتلكانها. واستناداً إلى قيم البعد الوراثي تم



شكل (1): العلاقات الوراثية ومجاميع سلالات وفواحص الذرة الصفراء النقية والبعد الوراثي بينها

للقدرة العامة على الاتحاد للصفات الأخرى جميعها إلا أنه لم يكن معنوياً لصفتي موعد التزهير الذكري ووزن 100 حبة فقط. وكذلك أظهرت السلالة G105 تأثير معنوي مرغوب لصفات ارتفاع النبات وطول العرنوص وعدد الحبوب بالعرنوص ونسبة البروتين أيضاً. وعليه فإن هاتين السلالتين وخاصة السلالة Th97Allah.K122 تعدان مفيدتان في إنتاج أصناف تركيبية من الذرة الصفراء، وكذلك لأهداف تربية أخرى. وبين الفواحص أظهر CA21R تأثير معنوي مرغوب للقدرة العامة على الاتحاد لصفات مواعي التزهير الذكري والأنثوي وارتفاع النبات وعدد الصفوف والحبوب بالعرنوص وحاصل الحبوب بالنبات ونسبة الزيت، وعليه فإن هذا الفاحص يمتلك جينات إضافية مناسبة لحاصل الحبوب بالنبات وبعض مكوناته وكذلك جينات إضافية للنضج المبكر. وكان للفاحصين ZM47R و ZM49R تأثير معنوي موجب (غير مرغوب) لمواعي التزهير الذكري والأنثوي دلالة على امتلاكهما جينات إضافية للتأخير بالنضج، ومن ناحية أخرى لوحظت تأثيرات معنوية مرغوبة في الفاحص ZM47R لصفات قطر العرنوص وعدد الصفوف والحبوب بالعرنوص ونسبة البروتين والفاحص ZM49R لصفات ارتفاع النبات وطول العرنوص ووزن 100 حبة. إن وجود الاختلافات بين الفواحص في قدرتها العامة على الاتحاد للصفات المختلفة تؤكد أهمية استخدامها في اختبار القدرة العامة على الاتحاد للسلالات الستة الأخرى قيد الدراسة. ويلاحظ أن معظم تأثيرات القدرة العامة على الاتحاد المعنوية والمرغوبة للسلالات والفواحص على الصفات قيد الدراسة رافقتها متوسطات أداء عالية. تظهر في الجدول (5) متوسطات صفات الهجن الفردية كمعدل للمواقع الثلاث، ويلاحظ وجود اختلافات معنوية بين الهجن للصفات جميعها وبلغت أعلى المتوسطات لصفات مواعي التزهير الذكري والأنثوي وارتفاع النبات وطول العرنوص وقطره وعدد الصفوف وعدد الحبوب فيه ووزن 100 حبة وحاصل الحبوب بالنبات ونسبتي الزيت والبروتين 55.44 يوم و 55.33 يوم و 228.56 سم و 20.81 سم و 47.37 ملم و 18.13 صف و 599.76 حبة و 28.50 غم و 195.22 غم و 5.139% و 10.128% في الهجن (G17 x ZM49R) و (G17 x CA21R) و (G17 x ZM49R) و (G17 x ZM49R) و (Th97Alla-K122 x ZM49R) و (G54 x ZM47R) و (Th97Alla-K122 x ZM47R) و (G105 x ZM47R) و (G105 x CA21R) و (Inbreed12 x CA21R) و (Th97Alla-K122 x ZM49R) و (G54 x ZM49R) على التوالي، وفي نفس الوقت كان لجميع هذه الهجن تأثير مرغوب للقدرة الخاصة على الاتحاد ومعنوي في معظمها. ويمكن من خلال الدراسة الحالية اختيار الهجن الواعدة على أساس متوسط أدائها وتأثيراتها للقدرة الخاصة على الاتحاد، وعلى هذا الأساس يلاحظ أن أعلى حاصل حبوب بالنبات بلغ 195.22 غم في الهجين (1 x 7) بفارق معنوي عن جميع التوافق الهجينة الأخرى (الجدول 5). وبنفس الوقت كان لهذا الهجين تأثير معنوي مرغوب للقدرة الخاصة على الاتحاد للصفة

معنوياً عالياً للصفات جميعها باستثناء صفتي طول العرنوص وحاصل الحبوب بالنبات في حالة المواقع ونسبة البروتين في حالة الآباء ضد الهجن (كان غير معنوياً)، وكذلك كان تأثير كل من السلالات والفواحص معنوياً عالياً للصفات جميعها ما عدا نسبة الزيت في حالة السلالات دلالة على وجود اختلافات وراثية بين السلالات والفواحص بتعبيرات القدرة العامة على الاتحاد والتي تشير إلى دور الفعل الجيني الإضافي في السيطرة على وراثتها. وكان متوسط المربعات في الفواحص أعلى منه في السلالات لصفات قطر العرنوص وعدد الصفوف بالعرنوص ونسبتي الزيت والبروتين، بينما كان أقل لبقيّة الصفات. وظهر تداخل السلالة x الفاحص معنوياً عالياً للصفات جميعها دلالة على أن الفعل الجيني السيادي مهماً أيضاً في السيطرة على وراثتها. وأخيراً يبدو أن متوسط المربعات العائد للتداخل الوراثي البيئي كان معنوياً عالياً للصفات جميعها ما عدا عدد الصفوف بالعرنوص دلالة على أن بعض التركيب الوراثية (آباء أو هجن) يتأثر سلوكها بالتغيرات البيئية، ويتضح أن النسبة بين مكونات القدرة العامة إلى الخاصة أكبر من واحد لصفات مواعي التزهير الذكري والأنثوي وارتفاع النبات ووزن 100 حبة دلالة على أن الفعل الجيني الإضافي كان أكثر أهمية في وراثتها، وكانت قريبة من واحد لصفتي طول العرنوص وعدد الحبوب بالعرنوص دليل على تساوي أهمية الفعل الجيني الإضافي وغير الإضافي في وراثتها، بينما يبدو أن الفعل الجيني غير الإضافي أكثر أهمية لبقيّة الصفات لأن النسبة كانت أقل من واحد. وعند مقارنة متوسطات الصفات في مواقع تنفيذ التجربة الثلاث يلاحظ أن حدوث التزهير الذكري والأنثوي في موقع الحويجة كان بعدد أقل من الأيام بفارق معنوي عن الموقعين الآخرين وتلاه موقع الشرفاط فالموصل. وكذلك أعطى موقع الحويجة أعلى المتوسطات للصفات الأخرى جميعها ما عدا نسبة البروتين التي بلغ أعلاها 9.069% في موقع الشرفاط. وتشير هذه النتائج إلى كون موقع الحويجة يمثل بيئة مناسبة لنمو المحصول. أما متوسطات الفواحص والسلالات كمعدل للمواقع الثلاث تظهر في الجدول (3)، ويلاحظ وجود اختلافات معنوية للصفات جميعها، إذ جاء الفاحص ZM47R بأعلى حاصل حبوب بالنبات بلغ 143.01 غم بفارق غير معنوي عن السلالتين G105 و G54 ونسبة زيادة عنهما 4.532% و 8.193% على التوالي و 121.445% عن السلالة G17 التي أعطت أقل حاصل حبوب بالنبات. وتميزت السلالة G17 بأنها أكثر تبكيراً في الإزهار الذكري والأنثوي وبأعلى وزن 100 حبة ونسبة زيت، وأعطت السلالة ZM51 أعلى المتوسطات لصفات قطر العرنوص وعدد الصفوف والحبوب بالعرنوص ونسبة البروتين، بينما جاءت السلالتين G105 و G54 بأعلى طول للعرنوص وارتفاع للنبات على التوالي. وتتضح في الجدول (4) تأثيرات القدرة العامة على الاتحاد لكل من السلالات والفواحص، ويلاحظ أن السلالتين Th97Allah.K122 و G105 كان لها تأثير معنوي مرغوب للقدرة العامة على الاتحاد لحاصل الحبوب بالنبات، وكان للسلالة Th97Allah.K122 تأثير مرغوب

جدول (1): نتائج تحليل التباين التجميعي بطريقة السلالة x الفاحص لصفات الذرة الصفراء قيد الدراسة

الصفات											درجات الحرية	مصادر الاختلاف
نسبة البروتين %	نسبة الزيت %	حاصل الحبوب بالنبات (غم)	وزن 100 حبة (غم)	عدد الحبوب بالعنوص	عدد الصفوف بالعنوص	قطر العنوص (مم)	طول العنوص (سم)	ارتفاع النبات (سم)	موعد التزهير الأنثوي (يوم)	موعد التزهير الذكري (يوم)		
**21.823	**9.756	1013.01	**356.29	**118958.3	**37.536	**344.08	12.009	**216.901.4	**1369.2	**1429.3	2	المواقع (م)
0.374	0.411	4815.25	3.841	150.969	1.564	3.699	6.171	326.244	15.888	13.106	6	القطاعات (م)
**6.107	**2.647	**8592.9	**85.383	**57692.4	**14.935	**42.042	**23.598	**4583.72	**64.848	**63.669	26	التركيب الوراثية
**5.164	**3.679	**6453.9	**60.129	**101634.6	**22.257	**87.693	**38.453	**7944.42	**81.137	**82.563	8	الآباء
0.503	**6.482	**64987.4	**166.89	**258766.1	**17.964	**154.54	**98.849	**6970.33	**148.89	**149.44	1	الآباء ضد الهجن
**6.880	**1.937	**6282.3	**92.472	**25185.8	**11.312	**13.942	**12.180	**2861.82	**52.238	**49.734	17	الهجن
**7.071	1.004	**11184.1	**262.83	**58079.8	**10.491	**9.900	**22.299	**6868.84	**119.99	**109.82	5	السلالة
**17.149	**5.235	**2932.8	**10.544	**10826.4	**34.027	**29.516	**14.492	**5007.80	**57.969	**73.807	2	الفاحص
**4.731	**1.743	**4501.3	**23.681	**11610.7	**7.179	**12.848	**6.659	**429.122	**17.214	**14.877	10	سلالة x فاحص
**8.435	**3.044	**3411.5	**11.449	**9819.8	1.575	**16.327	**4.967	**675.656	**13.279	**13.519	52	التركيب x م
1.704	0.594	582.172	2.169	103.389	1.132	2.404	1.979	56.092	5.008	4.245	156	الخطأ التجريبي
0.721	0.396	0.501	2.052	0.917	0.711	0.336	0.946	4.150	1.932	2.200		مكونات القدرة العامة/الخاصة

جدول (2): متوسطات المواقع الثلاث لصفات الذرة الصفراء قيد الدراسة.

الصفات											المواقع
نسبة البروتين %	نسبة الزيت %	حاصل الحبوب بالنبات (غم)	وزن 100 حبة (غم)	عدد الحبوب بالعنوص	عدد الصفوف بالعنوص	قطر العنوص (مم)	طول العنوص (سم)	ارتفاع النبات (سم)	موعد التزهير الأنثوي (يوم)	موعد التزهير الذكري (يوم)	
8.522 ب	3.781 ب	131.97 أ	20.987 ب	485.18 ب	15.594 ب	42.673 ب	18.144 أ	185.28 ب	61.914 ب	58.819 ب	الموصل
9.069 أ	4.020 ب	125.47 أ	20.240 ج	468.74 ج	15.034 ج	42.478 ب	18.313 أ	139.95 ج	67.167 أ	63.265 أ	الشرقاط
8.032 ج	4.464 أ	131.13 أ	24.188 أ	541.79 أ	16.389 أ	46.141 أ	18.879 أ	243.19 أ	59.062 ج	54.889 ج	الحويجة

جدول (3): متوسطات السلالات والفواحص كمعدل للمواقع الثلاث لصفات الذرة الصفراء قيد الدراسة

الصفات											الآباء	
نسبة البروتين %	نسبة الزيت %	حاصل الحبوب بالنبات (غم)	وزن 100 حبة (غم)	عدد الحبوب بالعنوص	عدد الصفوف بالعنوص	قطر العنوص (ملم)	طول العنوص (سم)	ارتفاع النبات (سم)	موعد التزهير الأنثوي (يوم)	موعد التزهير الذكري (يوم)		
أد 8.387	د 2.904	أ 143.01	ب 23.71	ج 514.76	ب 16.36	أ 45.48	ده 16.51	و 159.73	ب 64.33	أ 60.67	1	م.ع.
أبج 8.586	بجد 3.554	ج 94.36	هـ 18.03	د 444.65	ب 16.01	ج 41.27	هـ 16.18	هـ 166.95	د 61.83	ج 57.50	2	
أبج 8.728	بجد 3.466	ج 98.62	د 20.22	ده 436.06	بجد 15.38	أ 45.90	ج 17.71	ج 193.65	أ 65.44	أ 62.11	3	
أب 9.077	أ 4.786	هـ 64.58	أ 25.69	ز 232.43	هـ 11.70	هـ 36.73	و 13.73	ز 145.48	هـ 56.67	د 52.89	4	سلالات
أ 9.310	أ 4.749	ده 81.22	ج 21.77	و 374.84	د 14.46	ب 42.28	ده 16.89	د 175.13	ج 63.67	ب 59.50	5	
أ 9.420	ج 3.271	ب 113.41	ده 18.94	أ 579.39	أ 17.41	أ 46.49	ب 18.81	د 176.25	أ 66.00	أ 62.06	6	
د 7.250	أب 4.142	ج 93.39	ده 18.64	هـ 422.53	ج 15.33	د 39.92	ده 17.60	هو 162.27	أب 64.78	أ 61.44	7	
بجد 7.914	ج 3.809	أ 136.81	ده 19.18	ج 505.84	ب 15.55	ب 42.83	أ 20.56	ب 225.75	أب 65.44	أ 61.56	8	
ج 7.617	أبج 4.034	أب 132.18	ده 19.53	ب 561.25	بجد 15.40	ب 42.84	أب 19.90	أ 231.870	أ 66.222	أ 62.000	9	

G54 (9) G105 (8) Th97Alla-K122 (7) ZM51 (6) Inbreed12 (5) G17 (4) ZM49R (3) CA21R (2) ZM47R (1)

جدول (4): تأثيرات القدرة العامة للسلالات والفواحص كمعدل للمواقع الثلاث لصفات الذرة الصفراء قيد الدراسة

الصفات											الآباء	
نسبة البروتين %	نسبة الزيت %	حاصل الحبوب بالنبات (غم)	وزن 100 حبة (غم)	عدد الحبوب بالعنوص	عدد الصفوف بالعنوص	قطر العنوص (ملم)	طول العنوص (سم)	ارتفاع النبات (سم)	موعد التزهير الأنثوي (يوم)	موعد التزهير الذكري (يوم)		
0.605	0.211 -	1.934	0.196	7.525	0.680	0.850	0.173 -	11.052 -	0.414	0.367	1	م.ع.
0.511 -	0.358	6.210	0.506 -	8.808	0.193	0.022 -	0.409 -	4.465	1.179 -	1.309 -	2	
0.094 -	0.146 -	8.144 -	0.309	16.333 -	0.873 -	0.728 -	0.582	6.587	0.765	0.941	3	
0.195	0.115	3.597	0.219	1.516	0.159	0.231	0.209	1.019	0.305	0.280	SE	سلالات
0.604 -	0.205 -	2.855	5.614	81.038 -	0.806 -	0.387 -	0.876 -	15.172 -	3.975 -	3.781 -	4	
0.069	0.198	12.750 -	0.114 -	1.353 -	0.339 -	0.599	0.176 -	19.473 -	0.580	0.256	5	
0.670 -	0.020	29.463 -	3.794 -	13.418 -	0.827	0.426 -	1.186 -	3.238 -	1.951	2.127	6	
0.387	0.225	29.277	0.218	27.738	0.638	0.689	1.129	2.838	0.531 -	0.262-	7	
0.346	0.231 -	12.929	0.312 -	55.486	0.294 -	0.765 -	0.690	21.393	0.840	0.775	8	
0.471	0.006 -	2.848 -	1.612 -	12.586	0.026 -	0.288	0.419	13.653	1.135	0.886	9	
0.251	0.148	4.643	0.283	1.957	0.205	0.298	0.271	1.441	0.457	0.397	SE	

G54 (9) G105 (8) Th97Alla-K122 (7) ZM51 (6) Inbreed12 (5) G17 (4) ZM49R (3) CA21R (2) ZM47R (1)

جدول (5): متوسطات الهجن الفردية كمعدل للمواقع الثلاث لصفات الذرة الصفراء قيد الدراسة

الصفات											الهجن
نسبة البروتين %	نسبة الزيت %	حاصل الحبوب بالنبات(غم)	وزن 100 حبة (غم)	عدد الحبوب بالعنوص	عدد الصفوف بالعنوص	قطر العنوص (ملم)	طول العنوص (سم)	ارتفاع النبات (سم)	موعد التزهير الأنثوي(يوم)	موعد التزهير الذكري(يوم)	
8.852أـد	3.777دهو	126.20وـظ	27.50 أ	426.03 ل	15.11وزح	43.99 د	16.67 ح	169.37ل م	60.22 دهـ	55.89 هـ	4 x 1
9.659 أب	3.559 و	103.60طي	20.85 هـ و	578.99 ي	15.90دهو	44.19ج د	18.70بـو	161.83 م	64.67 أ	60.56 أب	5 x 1
8.961أـد	4.331أـو	132.63دـح	20.70 هـ و	534.24 و	16.69بجد	43.94 د	18.36بـو	184.73طي	62.89 أـد	59.78 أب	6 x 1
8.959أـد	4.470أـهـ	195.22 أ	23.75 ب ج	588.55 ب	18.13 أ	46.41 أب	20.21 أب	179.64ي ك	60.78 بـهـ	57.22ج دهـ	7 x 1
9.310أبج	3.640هـ و	156.26بجد	20.92 هـ و	599.76 أ	17.30 أب	44.58ج د	18.86بـهـ	202.59دهو	63.00 أـد	58.89أب ج	8 x 1
9.325أبج	4.178بـو	144.22بـو	21.81 دهـ	547.2 هـ	16.13جـو	47.37 أ	19.55 أـد	195.39وزح	63.89 أ	59.89 أب	9 x 1
7.737 دهـ	4.081بـو	139.01جـز	28.50 أ	424.94 ل	15.30هـوز	44.15ج د	17.31وزح	173.03ك ل	55.33 و	56.11 دهـ	4 x 2
7.85 ج دهـ	5.139 أ	157.55بجد	22.65 ج د	527.72 وز	16.50بجد	44.82بجد	18.14 دـز	179.99ي ك	60.44ج دهـ	56.11 دهـ	5 x 2
7.650 دهـ	4.862 أب	114.68زحط	17.99 و	522.94 ز	17.12أبج	44.50ج د	17.17 زح	197.73هـوز	64.56 أ	60.50 أب	6 x 2
8.379بـهـ	4.683أبج	164.42بج	19.80 و	558.98 د	16.27بـهـ	44.89بجد	19.06بـهـ	205.84جـد	60.44ج دهـ	56.11 دهـ	7 x 2
9.077أـد	3.949جـو	148.62بـو	21.69 دهـ	582.55 ب	15.83دـز	44.11ج د	20.16 أب	213.11ب ج	62.67 أـد	58.78أب ج	8 x 2
7.681دهـ	4.653أـد	159.51بج	20.68 هـ و	565.56 ج	15.32هـوز	43.36 دهـ	19.09بـهـ	216.65 ب	62.44 أـد	58.33ب جد	9 x 2
7.319 هـ	4.138بـو	166.62 ب	28.02 أ	470.83 ك	14.77 زح	43.69 د	20.09 أب	191.86زحط	59.00 هـ	55.44 هـ	4 x 3
8.416بـهـ	4.505أـهـ	123.86وـظ	23.34 ب ج	554.16 دهـ	14.18 زح	45.77ب ج	19.32 أـد	179.55يك	63.11أب ج	59.11أب ج	5 x 3
7.099 هـ	3.479 و	87.55 ي	17.10 ز	467.49 ك	16.26بـهـ	43.26 دهـ	17.61هــج	187.60حيـط	64.89 أ	61.11 أ	6 x 3
9.543 أب	4.133بـو	151.46بـهـ	24.28 ب	500.60 ح	15.09وزح	43.75 د	20.81 أ	202.29دهو	63.67 أ	60.89 أ	7 x 3
8.369بـهـ	4.328أـو	157.55بجد	23.63 ب ج	549.07 هـ	13.58 ط	42.00 هـ	19.75أب ج	228.56 أ	63.33 أب	59.67أب ج	8 x 3
10.128 أ	3.762دهو	110.99أحطي	19.82 و	489.70 ط	16.07جـو	43.12 دهـ	19.30 أـد	208.70بجد	63.56 أب	59.44أب ج	9 x 3

G54 (9) G105 (8) Th97Alla-K122 (7) ZM51 (6) Inbreed12 (5) G17 (4) ZM49R (3) CA21R (2) ZM47R (1)

ربما تعود إلى نتيجة توزيعات الجين المرتبطة بين الآباء، وعليه فإن السيادة الجزئية تظهر كسيادة فائقة (11). ظهر من دراسات سابقة أن كلا التأثيرين الإضافي وغير الإضافي كانا مهمين لارتفاع النبات (18، و 19 و 22) ولنضج الأوراق (15) ولموعد التزهير الأنثوي (24 و 21) ولموعد التزهير الذكري (20 و 22). بينما أشار (6) إلى أن التأثير الجيني الإضافي كان أكثر أهمية في وراثة صفات الحاصل ومكوناته وموعد التزهير الذكري والأنثوي جميعها ما عدا موعد النضج الفسيولوجي. وتم الحصول على تأثيرات غير إضافية أكبر لموعد التزهير الأنثوي من قبل بعض الباحثين (18 و 24)، وكذلك أشار (15) إلى أهمية الفعل الجيني الإضافي لهذه الصفة. وتوصل (25) إلى أهمية الفعل الجيني غير الإضافي في السيطرة على ارتفاع النبات، بينما أشار (15) و (18) إلى سيطرة الفعل الجيني الإضافي على هذه الصفة. والأكثر من ذلك، أوضح (13) إلى الدور الأكبر للتأثير الجيني الإضافي في السيطرة على وراثة صفة موعد التزهير الذكري. إن سبب اختلافات نتائج الدراسات المختلفة ربما يعود إلى الاختلافات في المواد التجريبية المستخدمة والظروف البيئية السائدة أو إلى اعتماد طرق مختلفة في تقدير المعالم الوراثية في الدراسات المختلفة (18).

ذاتها (الجدول 6). ويمكن أن يعود تفوق هذا الهجين في حاصل الحبوب بالنبات إلى تميزه بمتوسطات أداء عالية لطول وقطر العرنوص وعدد الصفوف والحبوب فيه وبعدد أقل من الأيام حتى التزهير الذكري والأنثوي (أي التباين بالنضج)، فضلا عن إظهاره قدرة خاصة على الاتحاد معنوية ومرغوبة لصفات موعد التزهير الذكري والأنثوي وقطر العرنوص وعدد الصفوف والحبوب فيه ووزن 100 حبة. وكذلك لوحظ لصفة حاصل الحبوب متوسط أداء وقدرة خاصة على الاتحاد عاليين في الهجن (2 x 5) و (2 x 9) و (3 x 4) و (3 x 8). وفي الوقت ذاته كان لهذه الهجن قدرة خاصة على الاتحاد معنوية ومرغوبة لصفات أخرى وكما يلي: (2 x 5) لصفات لموعد التزهير الذكري والأنثوي وعدد الصفوف بالعرنوص ووزن 100 حبة ونسبة الزيت و (2 x 9) لصفتي ارتفاع النبات وعدد الحبوب بالعرنوص و (3 x 4) لصفات ارتفاع النبات طول العرنوص وعدد الصفوف والحبوب فيه ونسبة الزيت و (3 x 8) لصفات ارتفاع النبات ووزن 100 حبة ونسبة الزيت. وفي الذرة الصفراء تعد الهجن المبكرة أو المتوسطة التباين مرغوبة للتقليل من إضرار الظروف الجوية في نهاية الموسم وعليه تعد تأثيرات القدرتين العامة والخاصة على الاتحاد السالبة للآباء والهجن على التوالي هي المناسبة، لذا على أساس صفات حاصل الحبوب والنضج فإن الهجينين (1 x 7) و (2 x 5) يعدان واعدين ويفضل إعادة تقييمهما لصفات حاصل الحبوب والصفات المرغوبة الأخرى. تتضح في الجدول (7) تقديرات مكونات التباين وبعض المعالم الوراثية كمعدل للمواقع الثلاث لصفات الذرة الصفراء قيد الدراسة، ويتضح أنه على الرغم من وجود التباين الوراثي السياتي لبعض الصفات يلاحظ أن التباين الوراثي الإضافي كان أكبر من السياتي للصفات جميعها ما عدا قطر العرنوص ونسبة الزيت دلالة على أن التأثيرات الجينية الإضافية كانت أكثر أهمية من التأثيرات السياتية في السيطرة على حاصل الحبوب، ولهذا السبب فإن تقديرات التوريث بالمعنى الضيق قريبة من تلك للتوريث الواسع وخاصة لصفات موعد التزهير الذكري والأنثوي وارتفاع النبات. تراوحت قيم التوريث الضيق بين 0.1229 لنسبة الزيت و 0.6827 لوزن 100 حبة، وكانت عالية لصفات ارتفاع النبات وعدد الحبوب بالعرنوص ووزن 100 حبة ومتوسطة لصفات موعد التزهير الذكري والأنثوي وطول العرنوص وعدد الصفوف بالعرنوص وحاصل الحبوب بالنبات وواطئة لبقية الصفات. وتشير التقديرات المتوسطة إلى العالية للتوريث الضيق إلى إمكانية الانتخاب للتأثيرات الإضافية بين السلالات قيد الدراسة (6). يلاحظ أن قيم معدل درجة السيادة أقل من واحد لصفات موعد التزهير الذكري والأنثوي وارتفاع النبات ووزن 100 حبة، أي أنها ضمن حدود السيادة الجزئية، وكانت صفات طول العرنوص وعدد الصفوف والحبوب بالعرنوص ونسبة البروتين ضمن حدود السيادة التامة لأن قيم معدل درجة السيادة قريبة من واحد، أما قيم السيادة الفائقة الأكبر من واحد لصفات قطر العرنوص وحاصل الحبوب بالعرنوص ونسبة الزيت (1.725 و 1.413 و 1.589 على التوالي)

جدول (6): تأثيرات القدرة الخاصة على الاتحاد للهجن الفردية كمعدل للمواقع الثلاث لصفات الذرة الصفراء قيد الدراسة.

الصفات											الهجن
نسبة البروتين %	نسبة الزيت %	حاصل الحبوب بالنبات (غم)	وزن 100 حبة (غم)	عدد الحبوب بالعنوص	عدد الصفوف بالعنوص	قطر العنوص (مم)	طول العنوص (سم)	ارتفاع النبات (سم)	موعد التزهير الأنثوي (يوم)	موعد التزهير الذكري (يوم)	
0.278	0.010 -	19.676 -	0.701 -	22.098 -	0.626 -	0.706 -	1.180 -	2.339	1.623	0.966	4 x 1
0.413	0.630 -	26.669 -	1.626 -	48.826 -	0.305 -	1.486 -	0.151	0.908 -	1.512	1.596	5 x 1
0.453	0.318	19.065	1.902	18.496	0.682 -	0.711 -	0.822	5.762	1.636 -	1.052 -	6 x 1
0.606 -	0.252	22.922	0.946	31.647	0.951	0.639	0.354	5.403 -	1.265 -	1.219 -	7 x 1
0.214 -	0.121 -	0.308	1.357 -	15.108	1.050	0.264	0.557 -	1.315 -	0.414 -	0.590 -	8 x 1
0.324 -	0.191	4.050	0.836	5.672	0.388 -	1.999	0.410	0.475 -	0.179	0.299	9 x 1
0.278	0.275 -	11.144 -	0.999	24.468 -	0.045	0.231	0.306 -	9.526 -	1.673 -	0.914 -	4 x 2
0.281 -	0.380	23.005	0.875	1.379 -	0.781	0.089 -	0.167 -	1.733	1.117 -	1.173 -	5 x 2
0.257	0.281	3.159 -	0.093 -	5.907	0.238	0.620	0.135 -	3.244	1.623	1.346	6 x 2
0.071 -	0.103 -	12.157 -	2.303 -	0.796	0.421 -	0.103 -	0.559 -	5.282	0.006 -	0.654 -	7 x 2
0.669	0.381 -	11.605 -	0.113	3.381 -	0.070	0.571	0.979	6.007 -	0.846	0.975	8 x 2
0.853 -	0.098	15.059	0.410	22.524	0.713 -	1.230 -	0.187	5.274	0.327	0.420	9 x 2
0.557 -	0.285	30.820	0.298 -	46.565	0.581	0.475	1.486	7.187	0.049	0.052 -	4 x 3
0.132 -	0.250	3.664	0.751	50.205	0.476 -	1.575	0.015	0.825 -	0.395 -	0.423 -	5 x 3
0.710 -	0.598 -	15.906 -	1.809 -	24.403 -	0.444	0.090	0.687 -	9.006 -	0.012	0.293 -	6 x 3
0.677	0.149 -	10.766 -	1.357	32.443 -	0.530 -	0.536 -	0.205	0.122	1.272	1.873	7 x 3
0.455 -	0.502	11.297	1.245	11.728 -	1.120 -	0.835 -	0.422 -	7.322	0.432 -	0.386 -	8 x 3
1.177	0.289 -	19.109 -	1.246 -	28.197 -	1.101	0.770 -	0.597 -	4.799 -	0.506 -	0.719 -	9 x 3
0.435	0.257	8.043	0.491	3.389	0.355	0.517	0.469	2.496	0.746	0.687	SE

G54 (9) G105 (8) Th97Alla-K122 (7) ZM51 (6) Inbreed12 (5) G17 (4) ZM49R (3) CA21R (2) ZM47R (1)

جدول (7): تقديرات مكونات التباين وبعض المعالم الوراثية كمعدل للمواقع الثلاث لصفات الذرة الصفراء قيد الدراسة.

مكونات التباين والمعلم الوراثية						الصفات
معدل درجة السيادة	التوريث الواسع	التوريث الضيق	التباين البيئي	التباين الوراثي السياتي	التباين الوراثي الإضافي	
0.674	0.6005	0.4893	± 4.245 0.338	± 1.181 0.479	± 5.198 2.379	موعد التزهير الذكري (يوم)
0.719	0.5684	0.4515	± 5.008 0.398	± 1.356 0.554	± 5.239 2.494	موعد التزهير الأنثوي (يوم)
0.491	0.8729	0.7791	± 56.092 4.462	± 41.448 13.773	± 344.022 150.969	ارتفاع النبات (سم)
1.028	0.4319	0.2826	± 1.979 0.157	± 0.520 0.214	± 0.984 0.481	طول العنوص (سم)
1.725	0.4466	0.1795	± 2.404 0.191	± 1.160 0.413	± 0.779 0.433	قطر العنوص (مم)
1.186	0.5898	0.3463	± 1.132 0.090	± 0.672 0.230	± 0.956 0.492	عدد الصفوف بالعنوص
1.044	0.9723	0.6293	± 103.389 8.225	± 1278.590 372.415	± 2345.849 1158.520	عدد الحبوب بالعنوص
0.698	0.8490	0.6827	± 2.169 0.173	± 2.390 0.759	± 9.809 5.205	وزن 100 حبة (غم)
1.413	0.5996	0.3000	± 582.172 46.315	± 435.459 144.471	± 436.194 224.735	حاصل الحبوب بالنبات (غم)
1.589	0.2781	0.1229	± 0.594 0.047	± 0.128 0.056	± 0.101 0.071	نسبة الزيت %
1.178	0.3252	0.1919	± 1.704 0.136	± 0.336 0.152	± 0.485 0.265	نسبة البروتين %

المصادر

6-Abadi, J. M., S. K. Khorasani, B. S. Sar, S. Movafeg and M. Golbashy (2011).

Estimation of

combining ability and gene effects in forage maize (*Zea mays* L.) using line $\times$ tester crosses,

J. of Pl. Physiol. and Breed., 1(1):

57-67.

7-Al-Zubaidy, K. M. D. and M. A. H. Al-Falahy (2016). Principles and Procedures of Statistics and

Experimental Designs, Duhok

University Press. Iraq.

8-A.O.A.C. (1980). Association of Official Agriculture Chemists "Official. Methods of Analysis" 13th ed. Washington D.C., U.S.A. Cereal. Chem. 63: 191-193.

9-Chokan, R, (1999). Estimation of combining ability, additive and dominance variances of characters using line $\times$ tester crosses of maize inbred lines. Seed and Plant 15:47-55 (In Farsi with English abstract).

1- الزبيدي، خالد محمد داود وخالد خليل أحمد الجبوري (2016). تصميم وتحليل التجارب الوراثية.

دار الوضاح للنشر، المملكة الأردنية - عمان، مكتبة دجلة للطباعة والنشر والتوزيع، جمهورية العراق - بغداد.

2- العذاري، عدنان حسن محمد (1999).

أساسيات في الوراثة. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. جامعة الموصل.

3- علي، عبده الكامل عبد الله (1999)، الغزارة

الهجينية والفعل الجيني في الذرة الصفراء (*Zea mays* L)، أطروحة دكتوراه، كلية الزراعة والغابات، جامعة الموصل، العراق.

4- مصطفى، محمد إبراهيم محمد (2005). تقدير المعالم الوراثية في الذرة الصفراء (*Zea mays* L.) باستعمال تحليل (السلالة $\times$ الفاحص) في ظروف بيئية مختلفة. رسالة ماجستير. قسم المحاصيل الحقلية. كلية الزراعة. جامعة تكريت. العراق.

5-A.A.C.C. (1976). American Association of Chemists. Crude fat in grain and stock feeds. AACC method, 30-20, page 10 f1.

- agronomic potential for the humid tropics. *Agronomica Meso Americana* 11: 83-88.
- 22-Menkir, A., A. Melake-Berhan, I. Ingelbrecht and A. Adepoju (2004). Grouping of tropical mid-altitude maize inbred lines on the basis of yield data and molecular markers. *Theoretical and Applied Genetics* 108: 1582-1590.
- 23-Mosa, J., S.K. Khorasani, B. S. Sar, S.Movafeg and M.Golbashy (2011). Estimation of combining ability and gene effects in Forage maize (*Zea mays* L.) using line x tester crosses. *J. Of Plant Physiology and Breeding*, 1 (1): 57-67.
- 24-Nestares, G., E. Frutos and G. Eyherabide (1999). Combining ability evaluation in orange flint lines of maize. *Pesquisa Agropecuaria Brasileira* 34: 1399-1406.
- 25-Petrovic, Z. (1998). Combining abilities and mode of inheritance of yield and yield components in maize (*Zea mays* L.). Novi Sad, Yugoslavia, 85p.
- 26-Riboniesa, P. L. and E. M. Efren (2008). Classifying white inbred lines into heterotic groups using yield combining ability effects. *USMR&D Journal* 16: 99-103.
- 27-Sneath, P. H. A. and R. R. Sokai (1973). *Numerical Taxonomy: The Principal and Practice of Numerical Classification*, W. H. Freeman and Co., San Francisco.
- 28-Venkatesh, V., N. N. Singh and N. P. Gupta (2001). Early generation identification and utilization of potential inbred lines in modified single cross hybrids of maize (*Zea mays* L.). *Indian J. of Genet. and Pl. Breed.*, 61: 309-313.
- 29-Wali, M. C., R. M. Kachapur, C. P. Chandrashekhar, V. R. Kulkarni and S. B. Devara Navadagi (2010). Gene action and combining ability studies in single cross hybrids of maize (*Zea mays* L.). *Karnataka J. Agric. Sci.* 23: 557-562.
- 10-Griffing, B. (1956). Concept of general and specific combining ability in relation to diallel crossing system. *Australian Journal of Biological Sciences* 9: 463-493.
- 11-Hayman, B. I. (1954). The theory and analysis of diallel crosses. *Genetics* 39: 789-809.
- 12-Hede, A. R., G. Srinivasan, O. Stolen and S. K. Vasal (1999). Identification of heterotic pattern in tropical inbred maize lines using broad based synthetic testers. *Maydica* 44: 325-331.
- 13-Hefny, M. (2010). Genetic control of flowering traits, yield and its components in maize (*Zea mays* L.) at different sowing dates. *African J. of Crop Sci.*, 2: 236-249.
- 14-Hussain, M. R. & K. Aziz (1998). Study of combining ability in maize line x tester hybridization. *Pakistan J. of Biological Sci.*, 1: 196-198.
- 15-Jha, P. B. & A. S. Khera (1992). Evaluation of maize inbred lines derived from two heterotic population. *Indian J. of Genet. and Pl. Breed.*, 52: 126-131.
- 16-Jinks, J. L. (1954). The analysis of heritable variation in a diallel cross of *Nicotiana rustica* varieties. *Genetics* 39: 767-788.
- 17-Kemphorne, O. (1957). *An Introduction to Genetic Statistics*. John Wiley, New York, pp. 545.
- 18-Konak, C., A. Unay, E. Serter and H. Basal H (1999). Estimation of combining ability effects, heterosis and heterobeltiosis by line x tester method in maize. *Turkish Journal of Field Crops* 4: 1-9.
- 19-Lee, H. S. and Lu. H. Shung (1995). Identification of heterotic patterns with inbred line testers in maize. *J. of Agric. Res. China* 44: 242-250.
- 20-Lopes, U. V., J. D. Galvao and C. D. Cruz (1995). Inheritance of the flowering time in maize. 1. Diallel analysis. *Pesquisa Agropecuaria Brasileira* 30: 1267-1271.
- 21-Mendoza, M., A. Oyervides and A. Lopez (2000). New maize cultivars with