دراسة التغيرات الوراثية الكمية لشكل الجناح وحجمه بين
مجتمعين سكانيين لحشرة دوباس النخيل
Ommatissus lybicus De berg.
(Homoptera: Tropiduchidae)
في مدينة بغداد

رياض علي عكيلي

كلية علوم البيئة، جامعة القاسم الخضراء، العراق

تاريخ الاستلام: 2017 / 12 / 12

تاريخ قبول النشر: 2018 / 1 / 22

Abstract

The Geometric Morphometric of wings techniques was used in order to compare variation in the size and the shape of the wings of some populations of *Ommatissus lybicus* De berg that belong to family Tropiduchidae, The size and the shape of the Right wing for two populations in Baghdad provinces. The average Centroid size of the Right wing were (352.46) μM and (322.12) μM for the specimens that collecting from salman pak and Al zafraniya districts respectively. The results of the statistical analysis by using ANOVA test followed by (T) and (F) tests showed that there were no significant differences in the average of the Centriod size for the wing, this means that the specimens of the two populations belong to the same species.

Key words

Homoptera, Geometric Morphometric, Tropiduchidae.

الخلاصة

أستخدم نظام المقياس الهندسي لشكل وتركيب الجناح Geometric Morphometric of Wing لغرض دراسة تغيرات شكل وحجم الجناح للمقارنة بين بعض المجتمعات السكانية لعائلة Tropiduchidae. اذ تم دراسة شكل وحجم الجناح الأيمن لبالغات حشرة الدوباس *Ommatissus lybicus* De berg والتي جمعت من منطقتين في بغداد. بلغ معدل الحجم المركزي (352.46 Centroid size و 322.12) مايكرون والتي جمعت عيناتها من منطقتين في بغداد (سلمان باك والزعفرانية) على التوالي وأظهرت نتائج التحليل الإحصائي باستخدام تحليل التباين ANOVA متبوعاً بأختباري T و F بعدم وجود فروقات معنوية احصائية في معدل الحجم المركزي للجناح الأيمن لبالغات حشرة الدوباس *Ommatissus lybicus* De berg والتي جمعت من منطقتين في بغداد وانها يعودان لنوع واحد.

الكلمات المفتاحية

متشابهة الأجنحة، هندسية مورفومترية، Tropiduchidae.

1. المقدمة

من قبل [5] ولاحظ ان هذه الذبابة تعود الى نوع واحد ومن الدراسات العالمية التي تضمنت استخدام هذه التقنية للمقارنة بين المجتمعات السكانية للحشرات هي الدراسة التي قام بها [6] حيث تمكن من التمييز بين نوعين من النحل وهما *Sibricobombus varticococcus* and *nive-atus Sibricobombus* وان كلا النوعين ينتميان الى رتبة غشائية الأجنحة *Hymenoptera* وعائلة النحل *Api-dae* وان من الصعوبة التمييز بين هذين النوعين عن طريق الشكل الظاهري ولاحظوا وجود تغير واضح في شكل الجناح عند استخدام المقياس الهندسي لشكل الجناح والمعتمد على المعالم ان الهدف من الدراسة وهو استخدام نظام المقياس الهندسي للشكل الظاهري للجناح *Geometric Morphometric of Wings* لدراسة تغيرات شكل وحجم الجناح بين المجتمعات السكانية لبالغات حشرة الدوباس *Ommatissus lybicus* De berg . والمجموعة من منطقتين في بغداد هما (سلمان باك والزعفرانية) لمعرفة مدى تقاربها أو تباعدها فضلاً عن المقارنة بين أفراد المجموعة السكانية الواحدة.

2. المواد وطرائق البحث

1.2. جمع العينات

استخدم (32) جناح أيمن لبالغات حشرة الدوباس *Ommatissus lybicus* De berg . والمجموعة من منطقتين في بغداد (سلمان باك والزعفرانية) واختيرت هذه المناطق حيث ان المنطقة الأولى تجري فيها مكافحة حشرة الدوباس كونها منطقة زراعية يكثر فيها زراعة أشجار النخيل أما المنطقة الثانية فيه منطقة سكنية لا تجري فيها عمليات مكافحة، ولدراسة تغيرات شكل وحجم الجناح استخدام نظام المقياس الهندسي للجناح *Geometric Morphometric of Wings* وقد اتبعت طريقة [7] في تحضير

تعد نخلة التمر من أشهر الأشجار التي عرفها الإنسان منذ أقدم الجهود وتتفق النصوص الدينية والتاريخية على أضرار النخلة بمظهر الشجرة الموهوبة وكمنبع للبركة والخيرات التي لا يحصرها أي عد، وللدلالة على مكانة النخلة في تاريخ العراق القديم ما تضمنته شريعة حمورابي من أحكام عديدة عن النخلة وغرسها وتلقيحها ومنتوجاتها [1].

تصاب نخلة التمر في العراق بالعديد من الآفات الزراعية المرضية والحشرية وغير الحشرية وتعد حشرة دوباس النخيل واحدة من أهم الآفات التي تصيب أشجار النخيل فهي توجد في مناطق زراعة النخيل جميعها وتزداد الأصابة بها في البساتين القريبة من الأنهر والتي يزرع نخيلها بصورة متقاربة وتصيب حشرة الدوباس أصناف النخيل جميعها [2].

استخدمت مقاييس هندسية لتشخيص شكل وتركيب الجناح *Geometric Morphometric* وهو يعرف بالعلم الذي يقوم بدراسة القياس المتري للتركيب أو الشكل وقياس مدى التغيرات التي تحدث في الشكل أو التركيب وهو يشير الى التحليل الكمي للشكل وتنفيذ هذه التقنية من التحليل بشكل عام على جميع الكائنات الحية ويفيد في تحليل السجل الاحفوري لها ومعرفة الاختلافات بين العوامل البيئية وبين الشكل وان الهدف الرئيس للـ *Geometric Morphometric* وهو الاختبار الاحصائي للفرضيات حول العوامل التي تؤثر على الشكل [3] وان هذه التقنية لا تعتمد على مقاييس المسافات بين المعالم ولكن تعتمد على احداثيات المعالم في الفضاء الذي توضع فيه العينة وان الفائدة الرئيسية لهذه التقنية هو انها تستعمل كل المعلومات المتوفرة حول الشكل من احداثيات المعالم وبالتالي تحديد تغيرات الشكل [4]، تم استخدام تقنية *Geometric Morphometric* للمقارنة بين المجتمعات السكانية لذبابة ثار القرعيات (*Dacus ciliatus* (Loew) في العراق

الاتصالات ما بين المعالم الأحد عشر (11) التي ثبتت على كل جناح تعطي لنا أشكال مضلعة وهذه الأشكال تستخدم في كثير من التحليل ومنها المقارنة بين حجم وشكل الجناح لكل عينة من العينات المستخدمة في الدراسة لتوضيح التغير ما بين المجتمعات السكانية لبالغات حشرة الدوباس -Om-matissus lybicus. ولمنطقتي الجمع وبالأماكن معرفة التغير الحاصل ضمن المجموعة السكانية الواحدة بعد ذلك تنقل المعلومات الى الوحدة التي تليها ضمن البرنامج والمسماة وحدة TET والخاصة بدمج البيانات مع بعضها البعض لكي تتم المقارنة بين المجتمعات السكانية لبالغات حشرة الدوباس Ommatissus lybicus. عن طريق الأجنحة ومعرفة مدى تطابقها أو تغيرها. وبعد الانتهاء من عملية دمج البيانات تنتقل الى وحدة MOG وعن طريق هذه الوحدة تجرى عمليات التحليل على أحداثيات المعالم ومنها الترجمة Translation والقياس Scaling والدوران Rotation وبعد هذه العمليات الثلاث التي أجريت على أحداثيات المعالم لغرض معرفة الحجم المركزي لكل جناح Centroid Size، الأعوجاج الجزئي Partial Warp، الأعوجاج النسبي Relative Warp ومتغيرات الشكل لكل جناح. الحجم المركزي للجناح هو مقدار متساوي القياس من الجناح ويحسب من الجذر التربيعي لمجموع مربعات المسافات بين مركز المضلع وكل معلم من المعالم التي تم وضعها على الجناح [4] واستخدمت للمقارنة بين المجتمعات السكانية لبالغات حشرة الدوباس -Ommatissus lybicus

3.2. تحليل البيانات

استخدم التحليل العاملي للمركبات الأساسية -Principle Component Analysis لمعرفة التغير بين هذه المجتمعات السكانية ولمنطقتي الجمع لمعرفة التغير ضمن

الشرائح الزجاجية للأجنحة حيث عزلت (32) حشرة تابعة الى النوع Ommatissus lybicus في قناني زجاجية شفافة وتركت بدون تغذية الى أن ماتت وجفت وبعد جفافها جيداً نزع الجناح الأيمن من كل عينة بواسطة ملقط دقيق مع المحافظة على الجناح من التكسر وبعد ذلك وضع الجناح بين شريحتين زجاجيتين وربطت حافتي الشريحة بواسطة شريط لاصق بعد ذلك سجلت المعلومات الخاصة بالنموذج على أحد طرفي الشريحة الزجاجية ومن ثم صورت الشرائح الزجاجية بواسطة مجهر رقمي Digital Microscope والذي ربط مع حاسبة مزودة بكاميرا رقمية قوة تكبيرها (3, 1) ميكا بكسل والكاميرا مزودة بأشعة فوق البنفسجية UV وبعد الانتهاء من عملية التصوير حفظت صور اجنحة حشرة الدوباس Ommatissus lybicus ولكل منطقة من منطقتي الجمع في ملف خاص لا كمال عملية التحليل.

2.2. جمع البيانات

بعد أن صورت نماذج لبالغات حشرة الدوباس -Om-matissus lybicus ولمنطقتي الجمع جمعت بيانات كل صورة على حده وذلك باستخدام البرنامج الجاهز والمعروف باسم -Collecting Landmarks for Identification and Characterization وهذا البرنامج يعني بالتحليلات الهندسية للأجنحة والبيانات التي جمعت من صور الأجنحة هي المعالم Landmark والمعالم عبارة عن نقاط تشريحية توضع على الاجنحة عند تقاطعات العروق الطولية مع العروق المستعرضة أو عند نهايات العروق الطولية وتستخدم للتمييز بين فرد وآخر [8] ، حدد في هذا البحث (11) معلم من معالم النوع الأول وهي تقاطعات العروق الطولية مع العروق المستعرضة حيث وضعت نقاط مرقمة بين هذه التقاطعات عن طريق وحدة COO الموجودة ضمن البرنامج وهذه الوحدة خاصة بوضع معالم للإحداثيات، ان

صورة (1و2) الجناح الأيمن لبالغات حشرة الدوباس *Ommatissus lybicus* موضحاً عليه احداثيات المعالم وعن طريق استخدام نظام المقياس الهندسي لشكل أو تركيب الجناح يتمكن من إيجاد التغيرات بين المجتمعات السكانية باختلاف مناطق تواجدها اعتماداً على حجم وشكل الجناح إذ تمت المقارنة بين بالغات حشرة الدوباس للمجتمعات السكانية ومنطقتي الجمع في بغداد (سلمان باك والزعفرانية) عن طريق تحليل المركبات الأساسية -Principal component analysis وكذلك المقارنة بين عينات المجموعة السكانية الواحدة عن طريق التحليل التمييزي -Disseminate analysis ويعين شكل (1) معدل احداثيات المعالم لـ (32) جناح أيمن لبالغات حشرة الدوباس *Ommatissus lybicus* ، إذ يمثل النقاط السوداء المجتمعات السكانية لمنطقة سلمان باك وتمثل النقاط الوردية المجتمعات السكانية لمنطقة الزعفرانية. وعند إجراء عملية تطابق الأجنحة باستخدام نظام المقياس الهندسي لشكل أو تركيب الجناح عن طريق وحدة MOG وكما موضح من الشكل إن أجنحة بالغات حشرة الدوباس *Ommatissus lybicus* ومنطقتي الجمع (سلمان باك والزعفرانية) غير متطابقة تماماً وتتفق النتائج مع ما توصل إليه [6] الذين قاما بدراسة تغيرات شكل الجناح في حشرة (Walker) *Bactrocera tau* ملاحظاً عدم تطابق بعض المعالم الموضوعية على أجنحة الحشرات في تايلند وسبب ذلك يرجع إلى اختلاف الظروف البيئية. ويبين شكل (2) الشكل الانتشاري لتوزيع بالغات حشرة الدوباس *Ommatissus lybicus* لمنطقتي الجمع (سلمان باك والزعفرانية) محافظة بغداد وكما هو واضح إن الأفراد قريبة من بعضها البعض ولعينات منطقتي الجمع مع وجود بعض الأختلافات في توزيع بعض الأفراد وإن سبب تطابق شكل أو حجم الجناح بين الأفراد يرجع إلى تشابه الظروف البيئية

المجموعة السكانية الواحدة استخدم التحليل التمييزي Discriminate Analysis .

4.2. البراجمات

استخدمت الوحدات الموجودة ضمن البرنامج ولكل وحدة من هذه الوحدات لها وظيفة خاصة من هذه الوحدات المستخدمة وحدة COO التي استخدمت لغرض وضع المعالم والنقاط التشريحية على الأجنحة ، ولغرض معرفة بيانات الحجم المركزي Centroid size استخدمت وحدة MOG ، الأوجاج الجزئي Partial Warp ، الأوجاج النسبي Relative Warp وبيانات التحليل العاملي للمركبات الأساسية Principle Component Analysis وكل بيانات التحليل التمييزي Discriminate Analysis حصل عليها من وحدة PAD أما بيانات تحليل التباين للحجم المركزي للجناح حصل عليها من وحدة COV وتم الحصول على بيانات تحليل التماثل لشكل وحجم الجناح من وحدة ASI .

3. النتائج والمناقشة

لدراسة التغيرات الوراثي الكمي لشكل وتركيب جناح بين مجتمعين سكانيين لبالغات حشرة الدوباس *Ommatissus lybicus* . والتي جمعت عيناتها من منطقتين في بغداد (سلمان باك والزعفرانية) استخدم نظام المقياس الهندسي لشكل وتركيب الجناح Geometric Morphometric of Wings ولكون هذا النظام يعتمد على وضع احداثيات للمعالم Landmark Coordinate بين تقاطعات العروق الطولية مع العروق المستعرضة للجناح وعن طريق هذه المعالم حسب الحجم المركزي لكل جناح Centroid Size [9] درست تغيرات شكل وحجم الجناح التي تم تطبيقها على أفراد المجتمعات السكانية الواحدة لمنطقتي الجمع، إذ توضح

الحجم المركزي لمنطقتي الجمع (سلمان باك والزعفرانية) والذي هو (46, 352) و (12, 322) على التوالي.

ويبين شكل (6) التحليل التمييزي للمجتمعات السكانية ويستخدم هذا التحليل للمقارنة بين أفراد المجموعة السكانية الواحدة حيث ان عدد الاجنحة المستخدمة (16) عينة لكل مجموعة وأظهرت نتائج التحليل التمييزي ان معدل الحجم المركزي Centroid size للجنح الأيمن لمنطقة سلمان باك كان (46, 352) μM و لمنطقة الزعفرانية هو (12, 322) μM أي كان التغير في شكل وحجم الجناح في منطقة الزعفرانية أقل من التغير الحاصل في عينات منطقة سلمان باك وانها يعودان الى نوع واحد مع وجود تغير لبعض أفراد المنطقتين وهذا واضح من مقارنة مسافات مهالانوبز $\text{Ma-halanobis Distances}$ للمجتمعات السكانية لبالغات حشرة الدوباس *Ommatissus lybicus* De berg ومن تطابق احداثيات المعالم وكذلك من معدل الحجم المركزي للجناح حيث لا توجد فروق معنوية بين أفراد هذه العينات .

عند استخدام وحدة ASI أظهر الجدولين (3 و 4) نتائج تحليل التباين لتمائل شكل وحجم الجناح الأيمن عدم وجود فروق معنوية بين المجتمعات السكانية لبالغات حشرة الدوباس *Ommatissus lybicus* ولكلا منطقتي الجمع وهناك عدة أسباب منها عدم اجراء عمليات مكافحة حشرة الدوباس في منطقة سلمان باك بصورة مستمرة نتيجة للظروف الراهنة والأمنية بشكل خاص والظروف البيئية حيث هناك تقارب في درجات الحرارة ونسبة الأمطار اضافة الى قرب المسافة بين المنطقتين وانها يقعان على نفس خطوط الطول والعرض وهناك عدة تطبيقات تشير الى ان للظروف البيئية المختلفة ولخطوط الطول والعرض تأثير على التنوع البيولوجي والشكل الظاهري لرتبة غشائية الأجنحة [11,12] وتتفق هذه النتائج مع نتائج

التي جاءت منها هذه الأفراد أما الشكلين (3 ، 4) فيمثلان تغير الحجم المركزي للجنح الأيمن لبالغات حشرة الدوباس *Ommatissus lybicus* تبعاً لمنطقتي الجمع اذ يمثل كل صندوق المجموعة الوسطية موزعة بين الربيع (25 و 75) والربيع (10 و 90) وكما هو واضح وجود تغير بسيط في الحجم المركزي للجنح الأيمن بين عينات بالغات حشرة الدوباس *Ommatissus lybicus* باختلاف منطقتي الجمع اذ بلغ معدل الحجم المركزي للجنح الأيمن (46, 352) μM و (12, 322) μM للمجتمعات السكانية ومنطقتي الجمع في بغداد (سلمان باك والزعفرانية) على التوالي، وقورنت المجتمعات السكانية باستخدام اختباري F و T حيث بلغت قيمتها (2.83 و 1.82) وقيمة P (0, 23) أما قيمة الاختلاف المطلقة $\text{Absolut difference}$ فكانت تساوي (28, 8) حيث لا توجد فروق معنوية بين حشرات هاتين المنطقتين في مقارنة الحجم المركزي للجنح الأيمن جدول (1) وهذا يدل على وجود اختلافات بين منطقتي الجمع ولكنها غير معنوية نتيجة الاختلاف في معدل الحجم المركزي وتتفق هذه الدراسة مع [10] حيث قاموا باستخدام المقياس الهندسي لشكل وتركيب الجناح لدراسة التغير بين المجتمعات السكانية لنحل العسل والمجموعة من مناطق مختلفة في ايطاليا ، كارنيولان وأفريقيا وكان هناك اختلاف في شكل وحجم الجناح ومعدل الحجم المركزي للجناح بين المجتمعات السكانية وعزو سبب هذا الاختلاف الى تباين الظروف البيئية في المناطق الثلاث والمتمثلة بدرجات الحرارة والرطوبة النسبية وكمية الامطار .

ويوضح شكل (5) توزيع بالغات حشرة الدوباس *Ommatissus lybicus* اعتماداً على التحليل العاملي الجزئي وحسب مناطق جمعها باستخدام المقياس الهندسي حيث ان هناك تداخل في توزيع عينات حشرة الدوباس ولكلا المنطقتين اذ يمثل المربع الأسود والرصاصي معدل

صورة رقم (2): صورة الجناح الأيمن لبالغات حشرة الدوباس **O. lybicus** من المجتمع السكاني لمنطقة الزعفرانية / محافظة بغداد تمثل النقاط المؤشرة احداثيات المعالم والتي عددها 11 معلم، قوة التكبير $\times (45)$

شكل (1): معدل احداثيات معالم الأجنحة اليمنى للمجتمعات السكانية لبالغات حشرة الدوباس **O. lybicus** لمنطقتي الجمع (سلمان باك والزعفرانية) محافظة بغداد النقاط السوداء تمثل المجتمعات السكانية لمنطقة سلمان باك والنقاط الوردية تمثل المجتمعات السكانية لمنطقة الزعفرانية.

دراسة (2) حول استخدام التحليل الهندسي لشكل الجناح، والمقارنة بين المجتمعات السكانية لذبابة ثمار القرعيات **Dacus ciliates** (Loew) والعائدة لنوع واحد من الحشرات والمجموعة من مناطق جغرافية مختلفة اعتماداً على تطابق الأجنحة حيث وجد ان التغير في شكل وحجم الجناح في محافظة بغداد أقل من محافظتي ديالى وصلاح الدين، وتتفق هذه النتائج مع نتائج [13] حيث أشارت نتائج هذه الدراسة على ان للظروف البيئية المختلفة تأثير على الشكل المظهري للنحل الأفريقي، أما [14] أشاروا الى ان لخطوط الطول والعرض تأثير واضح على شكل وحجم الجناح والجسم وكذلك على سلة حبوب اللقاح. نستنتج من هذه الدراسة وجود فروقات بسيطة ولكنها غير معنوية احصائياً بين المجتمعات السكانية لبالغات حشرة الدوباس-Omma **tissus lybicus** ولكلا منطقتي الجمع.

صورة رقم (1): صورة الجناح الأيمن لبالغات حشرة الدوباس **Ommatissus lybicus** من المجتمع السكاني لمنطقة سلمان باك / محافظة بغداد، تمثل النقاط المؤشرة احداثيات المعالم والتي عددها 11 معلم، قوة التكبير $\times (45)$.

شكل (4): تباير الحجم المركزي للأجنحة اليمنى للمجتمعات السكانية لبالغات حشرة الدوباس *O. lybicus* لمنطقتي الجمع (سلمان باك والزعفرانية) محافظة بغداد، إذا يمثل كل صندوق في الشكل المجموعة الوسطية موزعة بين الربع 10 والربع 90، الخطوط الزرقاء تحت كل صندوق تمثل الأجنحة، الأرقام 1 و 2 تمثل مناطق جمع الحشرة على الترتيب

شكل (5): توزيع بالغات حشرة الدوباس *O. lybicus* اعتماداً على التحليل العنقودي وحسب مناطق جمعها باستخدام المقياس الهندسي النقاط السوداء تمثل المجتمعات السكانية لمنطقة سلمان باك والنقاط الرصاصية تمثل المجتمعات السكانية لمنطقة الزعفرانية والربع الأسود والرصاصي يمثل معدل الحجم المركزي للجناح الأيمن للمجتمعات السكانية لمنطقتي الجمع (سلمان باك والزعفرانية) والذي هو 46, 352 و 12, 322 على التوالي.

شكل (2): الشكل الانتشاري لتوزيع بالغات حشرة الدوباس *O. lybicus* لمنطقتي الجمع (سلمان باك والزعفرانية) محافظة بغداد على طول التحليلين العاملين الأول والثاني لإحداثيات فضاء الظل المشتقة من أحداثيات المعالم الأصلية والتي عددها 16 معلم لكل جناح، اللون الأحمر يمثل المجتمعات السكانية لمنطقة سلمان باك واللون البنفسجي يمثل المجتمعات السكانية لمنطقة الزعفرانية

شكل (3): تباير الحجم المركزي للأجنحة اليمنى للمجتمعات السكانية لبالغات حشرة الدوباس *O. lybicus* لمنطقتي الجمع (سلمان باك والزعفرانية) محافظة بغداد، إذا يمثل كل صندوق في الشكل المجموعة الوسطية موزعة بين الربع 25 والربع 75، الخطوط الزرقاء تحت كل صندوق تمثل الأجنحة، الأرقام 1 و 2 تمثل مناطق جمع الحشرة على الترتيب

شكل (6): التحليل التمييزي **Discriminant analysis** لاحداثيات معالم الأجنحة اليمنى للمجتمعات السكانية لبالغات حشرة الدوباس *O. lybicus* اللون الأسود تمثل المجتمعات السكانية لمنطقة سلمان باك واللون الرصاصي تمثل المجتمعات السكانية لمنطقة الزعفرانية.

جدول (1): مقارنة الحجم المركزي بين للمجتمعات السكانية لبالغات حشرة الدوباس *O. lybicus* لمنطقتي الجمع (سلمان باك والزعفرانية)

Group	M.CS	St.D	.Va	F	P	T	P	A.D
1	352.46	22.48	505.60	2.83	0.23	1.82	0.09	8.28
2	322.12	37.83	1431.32					

Salman pak , 2 : Al zafraniya , M.CS : Mean Centriod size , St.D : Standard Devia- : 1
tion , Va. : Variance , P : Probability , A.D : Absolut differences

جدول (2): مقارنة مسافات مهالانوبيز **mahalanobis Distances** للمجتمعات السكانية لبالغات حشرة الدوباس *O. lybicus* لمنطقتي الجمع (سلمان باك والزعفرانية)

	(S) 1	(Z) 2
(S) 1	0.00	
(Z) 2	6.44	0.00

جدول (3): تحليل التباين لتمائل حجم الجناح الأيمن للمجتمعات السكانية لبالغات حشرة الدوباس

لمنطقتي الجمع (سلمان باك والزعفرانية) *O. lybicus*

Source	SS	Df	MS	F	Signification
Model	66200.46	3	22066.99	4.33	0.01
Individual	160.32	1	160.32	0.03	0.86
Side	3150.32	1	3150.32	0.62	0.43
Side*i	62890.32	1	62890.32	12.33	0.00
Residue	122417.71	24	245100.78		

جدول (4): تحليل التباين لتمائل شكل الجناح الأيمن للمجتمعات السكانية لبالغات حشرة الدوباس

O. lybicus لمنطقتي الجمع (سلمان باك والزعفرانية)

Source	SS	Df	MS	F	Signification
Model	11260.39	3	3753.46	1.59	0.21
Individual	3235.7	1	3235.75	1.37	0.25
Side	2395.75	1	2395.89	1.01	0.32
Side*i	5628.89	1	5628.89	2.38	0.13
Residue	56816.57	24	2367.35

المصادر

- dae). Ann. Soc. Entomol. Fr. (n. s.), 43(1) : 95-102 , (2007).
- [7] Sangvorn, K. and Nopphaun, R., Differentiation in wing shape in the *Bactrocera tau* (Walker) Complex on a single fruit species of Thailand. *Science Asia* 37: 308-313, (2011).
- [8] Bookstein, F.L. *Morphometric Tools for landmark Data: Geometry and Biology*. Cambridge University press, Cambridge, 435PP, (1991).
- [9] Kitthawee, S. and Rungsri, N. Differentiation in wing shape in the *Bactrocera tau* (Walker) complex on a single fruit fly species of Thailand. *Science Asia*, 37: 308 -313. (2011).
- [10] Marcus, L. F. Chapter 4. Traditional Morphometrics > In *Proceeding of the Michigan Morphometric Workshop*. Special publication No. 2.F.J. Bookstrin. Ann. Arbor MI, the University of Michigan Museum of Zoology. 77-122, (1990).
- [11] Nunes, L. A., De Araújo, E. D., Marchini, L. C. and Moreti, A. C. Variation morphogeometrics of Africanized honey bees (*Apis mellifera*) in Brazil. *Iheringia, Série Zoologia*, Porto Alegre, 102(3):321-326, (2012).
- [12] Owen, R. E. Applications of Morphometrics to the Hymenoptera, particularly Bumble bee (*Bombus*: Apidae). *Morphometrics*. 1-30, (2009)
- [13] Patton , W. S. . Some notes on Indian
- [1] Simon , H., *The Date Palm, Bread of the Desert* .dodd,Mead &Company .New York. 158pp, (1978) .
- [2] عبد الحسين، علي. النخيل والتمور وآفاتهما – جامعة البصرة – كلية الزراعة، (1985).
- [3] Francoy, T. M. ; Prado, P.R.; Goncalves, L. S. ; Costa, L.F. and Jong, D. D. Morphometric differences in a single wing cell can discriminate *Apis mellifera* racial types. *Apidologie* .37: 91 -97. (2006).
- [4] Bookstein, F.L., (1996). Combining the tools of Geometric Morphometric in; L. F. Murcus, M. Loy, G. J. P. Naylor and D. E. Slice (Eds). *Advance in Morphometrics: 131 -152 Nato ASI Series Vol. 284*. Plenum Press, New York Caro – Riano, H.; Jaramillo, N. and Duiardin , J. P. . Growth changes in *Rhodnius pallescens* under simulated domestic and sylvatic conditions. *Infection, Genetics and Evolution* 9(2); 162-168, (2009).
- [5] Al- Qeraqouly , A. A. , Genetic and Cytogenetic Study on *Dacus ciliates* (Loew) (dipteral : Tephritidae) populations Collected from Different Provinces in Iraq.A thesis of philosophy Doctorate in Biology , Coegee Education /Tikrit University / Iraq, (2005).
- [6] Murat, A.; Trezon, M.; Rasmont, P. and Cagatay, N. Landmark based Geometric Morphometric analysis of win shape *Sibiricobombus vogot* (Hymenoptera: Api-

Calliphoridae , Part 11 , Ch. megacephala (Fab.) (dux esch) , The Common Indian Blue Bottle whose Larvae, Occasionally Cause Cutaneous Myiasis in Animal and Ch. nigriceps Sp. Nov., The Common Blue Bottle of the Nilgiris , Indian J . Med. Res., 9: 555 – 560 p. (1922).

- [14] Zeder, M. A., Emswiller, E., Smith, B. D. and Bradley, D. G., Trends in Genetics, 22: 139–155, (2006).