تأثير المخلفات العضوية ومدة التحضين في أطوار الاتزان الكيميائي للفسفور في الترب الجبسية

مهدي عبد الكاظم عبد عبد سراب عبد الجنابي ضياء فليح حسن

الملخص

أجريت تجربة مختبرية لدراسة تأثير المخلفات العضوية والمدد الزمنية في أطوار الاتزان الكيميائي للفسفور لثلاث ترب سطحية تابعة لمناطق جرف الصخر في محافظة بابل والشنافية في محافظة الديوانية والراشدية في محافظة كربلاء حاوية على كميات جيس مختلفة هي (700 ، 140 ، 59) غم.كغم⁻¹ على التوالي طبقت لكل منها ثلاث معاملات شملت تربة لوحدها وتربة مع مخلفات عضوية بنسبة 25% وتربة مع مخلفات عضوية بنسبة 50% وحضنت لخمس مدد زمنية مختلفة هي (1440,720,336,168,24) ساعة .

أظهرت نتائج الدراسة وجود خماسي فوسفات الكالسيوم OCP وثلاثي فوسفات الكالسيوم TCP وهيدروكسي اباتيت HA في معاملة التربة لوحدها و وجود ثنائي فوسفات الكالسيوم DCP و خماسي فوسفات الكالسيوم OCP وثلاثي فوسفات الكالسيوم TCP في معاملة التربة و 25% مادة عضوية ووجود ثنائي فوسفات الكالسيوم المائي DCPD وثنائي فوسفات الكالسيوم DCP إضافة إلى خماسي فوسفات الكالسيوم OCP في معاملة التربة و 50% مادة عضوية .

أظهرت نتائج الدراسة وجود تأثير واضح للعوامل الثلاثة و هي كمية الجبس ومدة التحضين والمادة العضوية في أطوار الاتزان الكيميائي ، إذ كان عامل الزمن وكمية الجبس ذات تأثير سلبي في عملها على زيادة تثبيت الفسفور في التربة وتحوله إلى صيغ أكثر صلابة بينما عملت المادة العضوية على تحول الفسفور إلى صيغ أكثر ذوبانية وبالتالي زيادة جاهزية الفسفور .

المقدمة

تشير معظم الدراسات الى ان الترب الجبسية (gypsiferous soil) تنتشر على مساحة تقدر 100 مليون هكتار في العالم. اما في العراق فتنشر الترب الجبسية في شمال ووسط وغرب العراق وتبلغ مساحتها تقريبا 88 الف كم² تشغل حوالي 20% من مساحة العراق (1). تؤدي وجود نسبة عالية من الجبس في هذه الترب تؤدي الى ترسيب عدد من المغذيات وتحولها من صيغ جاهزة للامتصاص من قبل النبات الى صيغ غير جاهزة (4). ويعد الفسفور أهم العناصر التي تعاني الترب الجبسية من نقصه وقد يعزى ذلك الى قلة المادة العضوية وكون هذا العنصر يعاني مشاكل تثبيت في الترب الجبسية حيث يواجه تحولات عديدة لارتباطه بعنصر الكالسيوم الذي يوجد بتراكيز عالية في الترب الجبسية وقد أكد ذلك العديد من الباحثين Lindsay (31) ويونان (16) وقهرمان (15)، الجنابي (2) وعلوان (13) و Grubb (24). وقد بين Kordlaghari وجماعته (29) ان نسبة الجبس لها تأثير كبير في تحولات الفسفور وامتزازه فقد درس ترب ذات نسبة جبس 0% وترب ذات نسبة جبس 13% وبين إن

كلية الزراعة-جامعة القاسم الخضراء، بابل، العراق.

الكلية التقنية في المسيب، بابل ، العراق.

كلية الزراعة-جامعة القاسم الخضراء، بابل، العراق.

التربة ذات نسبة جبس 13% زادت بكميات كبيرة في نسبة امتزاز الفسفور وبالتالي أعطت صوراً أكثر تثبيت حتى وصلت الى صورة HA . وهناك العديد من الدراسات اجريت لغرض تحديد سرعة تحولات الاورثوفوسفيت وكذلك ذوبانية فوسفات الكالسيوم في الترب الجبسية في العراق والعالم باستعمال مخططات الاذابة (5، 25). لقد درس السلامة (7) سلوك الفسفور المضاف إلى نماذج مختلفة من الترب و وجد إن تثبيت الفسفور يزداد مع الزمن للترب الجبسية بكميات أكبر مما عنه في الترب الكلسية. عند وجود الجبس إلى جانب الكلس في التربة كما هو واقع الحال في الترب الجبسية فان فعالية ايون الكالسيوم في محلول التربة يكون اعلى عند مقارنته مع فعالية ايون الكالسيوم في الترب الكلسية وتبعاً لذلك فان ذوبان مركبات فوسفات الكالسيوم في الترب بوجود الجبس سيكون اقل مما هو مع الكلس فقط، وعليه فان من المتوقع جدا أن يكون مستوى الذوبان أو الجاهزية للفسفور في الترب الجبسية أدنى من الترب الكلسية (13).

إن زمن التفاعل بين الفسفور والتربة له تأثير كبير في خفض جاهزية الفسفور إذ أشارت نتائج الدراسة التي قام بها الزبيدي وجماعته (4) إلى انخفاض عالي المعنوي للفسفور بعد ثلاثة أيام من إضافة المعاملات السمادية وهو انخفاض سريع يتبعه انخفاض تدريجي لغاية أسبوع ومن ثم الوصول إلى حالة التوازن الظاهري التي تستمر حتى نهاية فترة التحضين. وقد أشار Ryain وجماعته (39) و راهي والراوي (12) والشوك وجماعته (8) إلى إن ميكانيكية حجز وترسيب الفوسفات تكون سريعة في البداية ولكنها تصبح بطيئة بعد أيام قلائل وتستمر مدة زمنية طويلة وان استمرارية تفاعل السماد الفوسفاتي مع مكونات التربة يتحول فيها الفسفور إلى صور اقل ذوباناً.

كما تؤثر المادة العضوية في جاهزية الفسفور بشكل إيجابي بطرق شتى وقد بين Ohno وجماعته (35) إن تحليل المادة العضوية في التربة بفعل الأحياء الدقيقة يؤدي إلى زيادة الكاربون العضوي الذائب وهذا يؤدي إلى خفض كمية الفسفور الممتز في التربة ، وان هناك علاقة موجبة وعالية المعنوية إحصائياً بين تركيز الكاربون العضوي الذائب وتركيز الفسفور الذائب في محلول التربة ، وان إضافة المخلفات العضوية يؤدي الى زيادة جاهزية الفسفور الحيوية عن طريق تكاثر الأحياء المجهرية في التربة التي عند موتها وتحللها يزداد الكاربون العضوي الذائب الذي ينعكس ايجابياً على زيادة جاهزية الفسفور في التربة. كما بين Gowariker وجماعته (22) ان الإضافات العالية من المواد العضوية مثل (سماد الحقل وبقايا النباتات والمحاصيل التي تزرع كسماد اخضر) إلى الترب ذات الـ pH المرتفع لا تزود فقط بالفسفور ولكن في أثناء عملية تحليلها تزود التربة بالمركبات الحامضية التي تزيد من توفير الأشكال المعدنية للفسفور في التربة. وأشار كل من Wandruszka بريسم (11) والحسيني (3) إلى إن إضافة المادة العضوية إلى التربة أدى إلى زيادة الفسفور الجاهز في التربة وان المادة العضوية هي مصدر مهم للفسفور .

إن هدف البحث هو لبيان تأثير كل من عوامل الزمن (مدة التحضين) ومحتوى التربة من الجبس والمادة العضوية المضافة في توفر الفسفور بصيغته الذائبة والجاهزة للنبات لأن عنصر الفسفور يعد ثاني أهم عنصر ومن العناصر الكبرى الضرورية لنمو النبات .

المواد وطرائق البحث

نماذج التربة :

تم جلب عينات التربة من مناطق جرف الصخر في محافظة بابل والشنافية في محافظة الديوانية والرشيديّة في محافظة كربلاء وبعمق (0-30 سم) وتم طحنها لتمر في أثناء منخل فتحاته 2 ملم وقد وضحت بعض صفاتها الكيميائية والفيزيائية في جدول 1 .

جدول 1: بعض الصفات للتربة والمخلفات العضوية

مخلفات عضوية	تربة الرشدية	تربة الشنافية	تربة جرف صخر	الوحدة	الصفة
6.80	7.45	8.10	7.26		pH
10.10	4.24	27.50	4.30	ديسيمنز.م ⁻¹	EC
17.89	0.40	0.17	0.03	ملغم. كغم ⁻¹	الفسفور الذائب
402.6	5.10	4.00	1.60	غم. كغم ⁻¹	المحتوى العضوي
22.10	10.50	57.90	19.10	ملي مول . لتر ⁻¹	Ca ⁺² الذائب
19.22	5.90	44.90	0.55	ملي مول . لتر ⁻¹	Mg ⁺² الذائب
25.79	19.55	34.65	20.90	ملي مول . لتر ⁻¹	SO ₄ ⁻² الذائب
11	59	140	700	غم. كغم ⁻¹	الجبس
180	15.70	13.90	5.90	سنتمول شحنة . كغم ⁻¹	CEC
	694	272	820	غم. كغم ⁻¹	رمل
	104	424	14	غم. كغم ⁻¹	غرين
	204	304	166	غم. كغم ⁻¹	طين
	SCL	L	SL		صنف نسجة التربة

تم اخذ وزن و بواقع 10غم لكل عينة ووضعت في أطباق بتري واضيف لكل تربة ثلاثة مستويات من المادة العضوية (0%، 25%، 50%) ورمز لها (M2,M1,M0) على التوالي المبين بعض صفاتها في جدول 1 أيضا . بعد ان تم طحنها جيدا وامرارها من منخل قطر فتحاته 2 ملم . حضنت العينات لفتترات زمنيته مختلفة هي (1440,720,336,168,24) ساعة ورمز لها (T5,T4,T3,T2,T1) على التوالي عند درجة حرارة 25°م ورطوبه مقدارها 20% بالمتابعة وأيضال التربة دائما الى حدود السعة الحقلية. و بواقع ثلاث مكررات لكل معاملة .
تهيئة المادة العضوية:

تمت تهيئة المخلفات العضوية من خلط كوالح الذرة المجروشة ومخلفات الدواجن ونشارة الخشب ومخلفات المدن الصلبة بنسبة "5:15:10:7" على التوالي بعد ترطيبها مع التقليب المستمر لحين اكتمال عملية التحلل.

الأيصاليه الكهربائيه Electrical Conductivity و درجة التفاعل pH

تم قياس الايصاله الكهربائيه ودرجة التفاعل في مستخلص العجينة المشبعة باستعمال جهاز Black (20) وحسب الطرق المذكورة في (MARTIN Instrument (Mi180 Bench metter

الجبس Gypsum

تم تقدير الجبس بطريقة الاسيتون Lagaerwarff والموصى بها من قبل الزبيدي وجماعته (4)

الماده العضويه Organic Matter

قدرت النسبة المئوية للمادة العضوية بطريقة الهضم الرطب وحسب طريقة كل من (Walkely and Black) الموصوفه حسب Jackson (27).

الفسفور الذائب

قدر الفسفور الذائب في الماء بمستخلص 1:5 بطريقة كل من Murphy and Riley تم التقدير بواسطة جهاز الامتصاص الطيفي (Spectrophotometer) وعلى طول موجي 882 وكما جاء في Page (36).

تقدير الأيونات الموجبة والسالبة الذائبة

تم تقدير الأيونات الموجبة والسالبة الذائبة في مستخلص العجينة المشبعة وحسب ما ورد في Richards (38) وعلى النحو الآتي :-

- 1- الكاربونات: بالتسحيح مع (0.01 N H₂SO₄) بوجود دليل الفينولفثالين .
- 2- البيكاربونات: بالتسحيح مع (0.01 N H₂SO₄) بوجود دليل المثيل البرتقالي .
- 3- الكلورايد: بالتسحيح مع (0.005 N AgNO₃) بوجود كرومات البوتاسيوم
- 4- الكبريتات: باستعمال (0.02N BaCl₂) لغرض الترسيب ومن ثم التسحيح مع محلول فرسينيت 0.01N.
- 5- الكالسيوم والمغنيسيوم: بالتسحيح مع (0.01N Na₂-EDTA) وبوجود دليل الميروكسايد عند تقدير الكالسيوم ودليل EBT عند تقدير (Ca+Mg) معاً.

بعد انتهاء كل مدة تحضين تستخرج الأطباق من الحاضنة اضيف إليها 50 مل من الماء المقطر الى العينات المذكورة جميعها ورجت لمدة ساعتين ثم رشحت . وجرى لها قياس كل من الأيضية الكهربائية (EC) ودرجة النفاذ (pH) مباشرة، كما تم تقدير كل من الكالسيوم والمغنسيوم والفسفور الذائب في المستخلصات لغرض حساب بعض القيم الثرموديناميكية الضرورية في دراسات الأتزان الكيميائي و قد تم حساب القوة الأيونية من قيم الأيضية الكهربائية وحسب معادلة Griffin and Jurinak (23) . كما تم حساب معامل الفعالية للأيونات حسب معادلة (Debye-Hckel) , بعدها تم تقدير الفعالية الأيونية .

1.4.3. القوة الأيونية Ionic Strength

حسبت القوة الأيونية باستعمال معادلة Griffin and Jurinak (23) المذكورة في Sposito (40)

$$I = Ec \times 0.013 \text{-----} (1)$$

$$I = \text{القوة الأيونية}$$

$$EC = \text{الايضاليه الكهربائيه}$$

2.4.3. معامل الفعالية الأيونية Activity Coefficient

حسبت معامل الفعالية الأيونية حسب معادلة (Debye-Hckel) Extended التي نصها

$$-\log f_i = \frac{AZ_i^2 \sqrt{I}}{1 + Bd\sqrt{I}} \text{.....} (2)$$

أذ أن = اللوغارتم السالب لمعامل الفعالية الأيونية .

$$-\log f_i = Z_i^2 = \text{مربع شحنة الايون .}$$

$$\sqrt{I} = \text{الجذر التربيعي للقوة الأيونية .}$$

$$A = \text{ثابت مقداره } 0.509$$

$$B = \text{ثابت مقداره } 0.328$$

$$d = \text{نصف قطر الايون}$$

3.4.3. الفعالية الأيونية Activity

حسبت الفعالية الأيونية حسب المعادله التاليه

$$a_i = c_i \times f_i \text{.....} (3)$$

اذ أن

$$a_i = \text{تعبر عن الفعالية الأيونية مول. لتر}^{-1}$$

$$c_i = \text{تعبر عن تركيز الايون المقاس مول. لتر}^{-1}$$

$$f_i = \text{معامل الفعالية الأيونية}$$

استخدم البرنامج المعد من قبل Wolt (43) لحساب الفعالية الايونية النهائية كما استخدمت الطريقة المشار إليها في Lindsay (32) لتشخيص مركبات فوسفات الكالسيوم باستعمال مخططات الإذابة (Solubility digram) ذات المتغيرات ثنائية الدالة وتم رسم المعادلات الكيميائية على شكل متغيرات ثنائية الدالة بعد تحديد المحور الصادي في مخططات الإذابة للمتغير الثنائي المشترك (LogH₂PO₄-pH) وتحديد المحور السيني للمتغير الثنائي الدالة (LogCa+2pH). تم رسم الخطوط الممثلة بالمعادلات واعتماداً على القيم العليا والدنيا للمحورين الأشكال (1 و 2 و 3)

Dicalcium phosphate dihydrate

Dicalcium phosphate

Octacalcium phosphate

Tricalcium phosphate

Hydroxyapatite

النتائج والمناقشة

لقد استخدمت قيم الأس اللوغاريتمي للكالسيوم والفسفور في رسم مخططات الإذابة افي تقدير ذوبانية الفسفور باستخدام منحنيات الذوبان وتم رسم مخططات DCPD و DCP و TCP و HA بالاستعانة بقيم ثوابت التوازن Logk .

اظهرت نتائج تحضين تربة الرشدية لوحدها شكل (1-أ) مدة التحضين 24 ساعة عند الإشباع للطور DCPD إلا إنه عند مدة التحضين الثانية بعد مرور 168 ساعة أدى الى الشيع بنثائي فوسفات الكالسيوم DCP وعند زيادة مدة التحضين الى 336 ساعة ظهرت عند التشيع للطور OCP اما مدة التحضين 720 ساعة فقد كانت مابين الطورين TCP و OCP الى ان وصلت عند نهاية فترة التحضين 1440 ساعة الى مستوى تحت الاشباع للطور TCP .بينما بين شكل (1-ب) نتائج الدراسة عند معاملة التربة نفسها بنسبة 25% مادة عضوية الى تواجد فوق التشيع للطور DCPD لمدتي التحضين (24 ، 168) ساعة إلا إنه وجدت مدة التحضين 336 ساعة عند التشيع للطور DCPD أما عند زيادة مدة التحضين الى 720 ساعة فقد تواجدت فوق التشيع للطور DCP الى ان وصلت مابين الطورين TCP و OCP عند نهاية فترة التحضين 1440 ساعة. كما اشارت ايضا نتائج الدراسة عند اضافة 50% مادة عضوية الى التربة في الشكل (1-ج) تواجد الفسفور بشكل ذائب لفترات زمنية اطول اذ

تواجدت الفترات (24 ، 168 ، 336 ، 720 ، 1440 ساعة) فوق التشبيح للطور DCPD اما فترة التحضين 720 ساعة فقد كانت عند التشبيح للطور DCPD بينما وجدت فترة التحضين الاخيرة 1440 ساعة مابين الطورين OCP و DCP. وبذلك يتبين ان المادة العضوية قد ادت الى المحافظه على الفسفور بشكله الذائب مع الزمن وزيادة مدة التحضين، اذ حافظت الاضافة 25% مادة عضوية على ذوبانية للفسفور لمدة اسبوعين بينما حافظت اضافة المادة العضوية بنسبة 50% على الذوبانية لفترة شهر، اما موقع قيم الذوبان لفترة التحضين الاخيرة 1440 ساعة فقد وجدت بين الطورين HA و TCP عند تحضين التربة لوحدها.

شكل 1 تأثير مدد الحضانه واطراف الماده العضويه في اطوار فوسفات الكالسيوم لتربة الرشدية S1

أما عند اضافة 25% مادة عضويه فقد وجدت مابين الطورين TCP و OCP وعند اضافة 50% مادة عضويه للتربة فقد وجدت بين الطورين OCP و DCP .

لقد أظهرت النتائج في باقي الترب انها أخذت الإتجاه نفسه بانتقال مدة التحضين الى طور او موقع أكثر ذوبانية بزيادة المادة العضوية إذ يلاحظ من الشكل (2-أ) التابع لتربة الشنافية انه عند تحضين التربة لوحدها وجدت مدة التحضين 24 ساعة عند التشيع للطور OCP وتم انتقال مدة التحضين 168 ساعة الى تحت التشيع لنفس الطور وهكذا انتقال مدد التحضين بزيادة المدة الى مواقع أكثر صلابة مع زيادة مدة التحضين الى ان وصلت تحت الأشباع للطور TCP عند مدة التحضين الأخيرة 1440 ساعة ، بخصوص شكل (2-ب) فيوضح مواقع الذوبان لمدد التحضين عند اضافة 25% المادة العضوية اذ وجدت مدة التحضين 24 ساعة و 168 ساعة عند التشيع للطور DCPD وانتقلت الى ان وجدت في نهاية مدة التحضين الى ما فوق التشيع للطور OCP ، ويوضح الشكل (2-ج) قيم مواقع الذوبان لمدد التحضين عند اضافة 50% مادة عضويه للتربة فتبين أنها حافظت على الذوبانية أكثر لمدد تحضين أطول بحيث تواجدت فترة التحضين 24 ساعة و 168 ساعة و 336 ساعة للطور DCPD وانتقلت الى ان وجدت مدة التحضين الأخيرة تحت الأشباع للطور DCP.

شكل 2 تأثير مدد الحضانه واطافات المادة العضويه في أطوار فوسفات الكالسيوم لتربة الشنافية S2

وأيضاً تربة جرف الصخر فقد انتقلت فيها مواقع قيم الذوبان الى مواقع أكثر صلابة مع زيادة مدة التحضين الى مواقع أكثر اذابة مع زيادة نسبة المادة العضوية المضافة اذ يوضح شكل (3-ا) مواقع قيم الذوبان لمدد التحضين المختلفة عند تحضين التربة لوحدها اذ كان موقع قيم الذوبان عند الاشباع للطور OCP بعد مرور 24 ساعة ليصبح مابين الطورين TCP و OCP بعد مرور 168 ساعة من التحضين اما مدة التحضين 336 ساعة فقد وجدت فوق الأشباع للطور TCP وانتقلت الى تحت الاشباع للطور نفسه عند مدة التحضين 720 ساعة وقد تواجدت فترة التحضين الأخيرة 1440 ساعة بين الطورين HA و TCP ، فيما يخص شكل (3-ب) فيوضح مدد التحضين ومواقع اذابتها بخصوص الأطوار الصلبة عند اضافة 25% المادة العضوية للتربة نفسها اذ وجد مدد التحضين 24 ساعة عند الأشباع للطور DCPD ثم وجدت مدة التحضين 168 ساعة عند الأشباع للطور DCP الى ان وصلت عند نهاية مدة التحضين الى ما فوق الأشباع للطور TCP. كما يوضح شكل (3-ج) اضافة 50% مادة عضوية للتربة اذ وجدت مواقع الذوبان لمدد التحضين 24 ساعة و 168 ساعة فوق الأشباع للطور DCPD الى ان وصلت في نهاية مدة التحضين 1440 ساعة عند الطور OCP .

شكل 3: تأثير مدد الحضانه وأضافات المادة العضوية في أطوار فوسفات الكالسيوم لتربة جرف الصخر S3

من خلال ماسبق وما اوضحته الاشكال (1,2,3) يتبين ان هناك عوامل كثيرة أثرت في ذوبانية الفسفور منها سلبية وهي زيادة مدة التحضين ومحتوى التربة الأصلي من الجبس ومنها ايجابي وهي اضافة المادة العضوية وزيادة نسبتها .

فيما يخص زيادة مدة التحضين ،فإن له تأثيراً كبيراً في التقليل من ذوبانية الفسفور، اذ كانت تنتقل مواقع قيم الذوبان الى أطوار أكثر صلابة مع زيادة مدة التحضين فعندما كانت عند الأشباع للطور DCPD بعد مرور 24 ساعة اصبحت الى مابين الطورين HA و TCP بعد 1440 ساعة بخصوص تربة الرشدية أما تربة الشنافية فقد انتقلت من عند التشبيح للطور OCP بعد مرور 24 ساعة الى ان وصلت الى الطور تحت الاشباع للطور TCP عند نهاية فترة التحضين 1440 ساعة وفيما يخص تربة جرف الصخر فقد كانت عند الأشباع للطور OCP بعد مرور 24 ساعة ووصلت الى بين الطورين HA و TCP بعد مرور 1440 ساعة وقد وقعت مواقع الذوبان لمدد التحضين (168 و 336 و 720) ساعة مابين الأطوار المذكورة آنفا لبداية ونهاية مدة التحضين وللترب جميعها لأن الفسفور يعاني تحولات مع الزمن الى أطوار أقل ذوبانية ويعزى سبب التحول والانخفاض في كمية الفسفور الذائب هذه مع زيادة مدة التحضين الى عملية الترسب الذي يتعرض إليها فسفور التربة الذائب، اذ يتحول الفسفور مع الزمن من صيغة الى أخرى أكثر ثباتا الى ان يدخل ضمن التركيب البلوري (Hydroxyapatite) باتحاده مع الكالسيوم (1، 14، 19، 18، 21، 24، 37). ويتضح ان الفسفور الذائب ينخفض في ضمن ثلاث مراحل أولها الانخفاض السريع لمدة يوم واحد التي يسببها أمتزاز الفوسفات على اسطح الطين والمرحلة الثانية الانخفاض التدريجي وسببها الترسب والاتحاد مع الكالسيوم المتحرر وتستمر لغاية اسبوع والمرحلة الثالثة هي حالة التوازن الظاهري وهي مرحلة التبلور وتكوين فوسفات الكالسيوم وتستمر حتى نهاية فترة التحضين (21، 5، 13)

و يتضح مما سبق ايضا التأثير الأيجابي الواضح للمادة العضوية في المحافظة على ذوبانية الفسفور لمدد زمنية أكثر مع زيادة أضافتها وانتقال قيم مواقع الذوبان لأطوار أكثر اذابة، اذ حافظت الاضافة 25% مادة عضوية على الفسفور بشكل ذائب الى ما فوق الاشباع للطور DCPD لفترة استمرت 336 ساعة في تربة الراشدية واستمرت الأذابة للطور نفسه لمدة 136 ساعة لتربة الشنافية واستمرت لمدة 24 ساعة لتربة جرف الصخر أما عند اضافة 50% مادة عضوية الى التربة فقد استمرت الأذابة لمدة 720 يوما لتربة الراشدية و336 يوما لتربة الشنافية ولمدة 168 لتربة جرف الصخر، وهذا يعود الى عمل المادة العضوية الكبير في خلبها لأيونات الكالسيوم بسبب امتلاك الدبال شحنة سالبة ولتكوينها معقدات مع أيونات الكالسيوم مما يقلل من ترسيبه على شكل فوسفات الكالسيوم إضافة إلى إن المادة العضوية ويسبب امتلاكها للشحنة السالبة فإنها تتنافس مع الفسفور في الأمتزاز على المواقع نفسها التي يمتز عليها الفسفور وبالتالي التقليل من كمية الممتز منه كما إن المادة العضوية نفسها تعتبر مصدر مهم للفسفور إذ عند تحليلها تعطي كميات عالية من الفسفور وهذا ما جاء متفق مع ماتوصل إليه كل من (Sieling و Stuthers (41) Ohno وجماعته (35)، Wandruszka (44) العزاوي (9) الحسيني (3) .

اما العامل الآخر المؤثر في ذوبانية الفسفور فهو محتوى التربة من الجبس وهو ذو تأثير سلبي فقد تبين من خلال مخططات الاذابه ان قيم مواقع الذوبان لتربة جرف الصخر ذات المحتوى الجبسي 700 غم. كغم⁻¹ اقل ذوبانية من تربة الشنافيه ذات المحتوى الجبسي 140 غم. كغم⁻¹ في حين كانت مواقع قيم الذوبان لتربة الرشديه ذات المحتوى الجبسي 59 غم. كغم⁻¹ الأكثر ذوبانية. وقد يعود السبب في ذلك الى كون الجبس ذا ذوبانية عالية نسبيا في الماء مما يؤدي الى رفع درجة التوصيل الكهربائي من جهة وزيادة القوه الايونيه من جهة اخرى كما ان ذوبان الجبس يؤدي الى تحرر أيونات الكالسيوم والكبريتات مما يقلل من ذوبانية الفوسفات نتيجة تاثير الايون المشترك (Common ion effect) كذلك باتحاد الكالسيوم الناتج من اذابة الجبس مع الفسفور يترسب بهيئة فوسفات

الكالسيوم وينتج عنه أطوار صلبة ويتفق هذا مع ماتوصل إليه Volkweiss وجماعته (42) قهرمان (15) الجنابي (2) و Grubb وجماعته (24).

جدول 2 : قيم الأيضية الكهربائية ودرجة التفاعل والفسفور والكالسيوم المستخدمة في رسم أطوار الأتزان

فسفور ملغم.كغم ⁻¹	Ca Mmol.L ⁻¹	pH	ECe ديسيسيمنز.م ⁻¹	العينة
31.25	4.15	7.27	1.26	S1M0T1
15.54	3.86	7.33	1.13	S1M0T2
7.10	3.26	7.36	1.03	S1M0T3
1.78	2.77	7.39	0.99	S1M0T4
0.76	2.30	7.37	0.94	S1M0T5
48.69	6.5	6.97	3.71	S1M1T1
31.11	6.17	7.05	3.62	S1M1T2
12.48	5.78	7.13	3.51	S1M1T3
6.58	5.36	7.19	3.32	S1M1T4
2.04	4.87	7.26	3.23	S1M1T5
66.47	6.98	6.93	5.95	S1M2T1
45.66	6.62	6.99	5.80	S1M2T2
25.20	6.46	7.06	5.67	S1M2T3
12.74	6.26	7.12	5.50	S1M2T4
4.33	6.17	7.18	5.40	S1M2T5
24.57	13.20	7.62	5.49	S2M0T1
11.94	12.67	7.69	5.42	S2M0T2
5.71	12.25	7.81	5.38	S2M0T3
1.26	11.87	7.85	5.27	S2M0T4
0.33	11.65	7.91	5.24	S2M0T5
38.39	14.10	7.32	7.01	S2M1T1
22.47	13.72	7.56	6.94	S2M1T2
9.66	13.40	7.66	6.87	S2M1T3
5.46	13.07	7.70	6.76	S2M1T4
1.54	12.67	7.81	6.70	S2M1T5
50.66	17.00	7.11	8.36	S2M2T1
32.90	16.50	7.30	8.27	S2M2T2
19.47	15.90	7.47	8.20	S2M2T3
8.53	15.45	7.56	8.09	S2M2T4
2.80	15.00	7.66	7.99	S2M2T5
15.55	19.73	6.88	2.49	S3M0T1
7.19	19.51	6.90	2.39	S3M0T2
2.56	19.03	6.95	2.32	S3M0T3
0.98	18.47	7.00	2.19	S3M0T4
0.21	18.15	7.04	2.13	S3M0T5
23.71	20.22	6.89	4.71	S3M1T1
11.74	19.86	6.92	4.63	S3M1T2
6.56	19.45	6.94	4.53	S3M1T3
2.36	19.07	6.98	4.43	S3M1T4
0.59	18.63	7.06	4.31	S3M1T5
32.65	22.13	6.82	7.23	S3M2T1
16.07	21.67	6.86	7.12	S3M2T2
8.35	21.16	6.88	7.02	S3M2T3
4.25	20.66	6.93	6.87	S3M2T4
2.40	20.21	6.99	6.76	S3M2T5

الأستنتاجات

- 1- ان زيادة محوى التربة من الجبس يقلل من جاهزية عنصر الفسفور للتربة لاحتوائه على عنصر الكالسيوم الذي يتحد بدوره مع الفسفور ويعمل على تثبيته
- 2- ان زيادة مدة التحضين اي زيادة مدة نمو النبات بالمقابل ستعاني التربة من نقص الفسفور لتثبيته مع مرور الزمن .
- 3- ان اضافة المادة العضوية تعمل على زيادة جاهزية عنصر الفسفور للتربة لعمل المادة العضوية كمادة مخلبية تعمل على منع اتحاد عنصر الكالسيوم مع الفسفور وبالتالي تثبيته ، كما تعد المادة العضوية مصدرا للفسفور ، كما تنتج المادة العضوية عناصر سالبة تنافس الفسفور بالاتحاد مع الكالسيوم وبالتالي تقلل من اتحاد الكالسيوم مع الفسفور.

المصادر

- 1- البرزنجي، عبد العزيز فاتح (1986). توزيع الترب الجبسية في العراق. ندوة الترب الجبسية وتأثيرها على المنشآت والزراعة، 4-6 تشرين الثاني 1986، وزارة الزراعة والري، بغداد، العراق.
- 2- الجنابي، عبد سراب حسين (1990). استعمال فوسفات وكربونات الامونيوم كمصلحات للترب الجبسية واثر ذلك على نمو ونتاجية الذرة الصفراء. اطروحة دكتوراه. كلية الزراعة، جامعة بغداد، العراق.
- 3- الحسيني، أياد كاظم علي (2010). وراثة وتطور آفاق الكسب لبعض ترب شمالي العراق. اطروحة دكتوراه، كلية الزراعة، جامعة بغداد، العراق .
- 4- الزبيدي، احمد حيدر (1992). استصلاح الاراضي-الاسس النظرية والتطبيقية، مطبعة دار الحكمة، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جامعة بغداد، العراق.
- 5- الزبيدي، احمد حيدر وسعيد اسماعيل السليفاني (1997). المقارنة بين بعض معادلات الامتزاز لوصف امتزاز الارثو والبايروفوسفات في بعض الترب العراقية.
- 6- الزبيدي، احمد حيدر؛ ايمان عبد المهدي الجنابي وموفق سعيد نعوم (2004). دراسة كفاءة الاسمدة الفوسفاتية في تربة كلسية باستعمال الحركيات الكيميائية.مجلة العلوم الزراعية العراقية، 35 (3):1-6.
- 7- السلامة ، ياسر جمعة (2008). سلوك الفسفور المضاف لنماذج مختلفة من الترب في محافظة دير الزور - سوريا . مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية، 30(5):193-201.
- 8- الشوك، اركان وعبد سراب حسين الجنابي وسنا قاسم (2013). اثر استخدام الاوساط العضويه على اطوار الاتزان الكيميائي للفسفور للتربة العراقية.
- 9- العزاوي، كاظم مكي ناصر (2010). تأثير المادة العضوية والتركيب الايوني لمحللول التوازن في سلوك وحركة الفسفور في التربة. اطروحة دكتوراه. كلية الزراعة. جامعة بغداد، العراق.
- 10- اميدي، بيار محمد سعيد (2000). مؤشرات الجاهزية والمعايير الثرموديناميكية للامتزاز وانطلاق الفوسفات في الترب الكلسية. رسالة ماجستير، كلية الزراعة، جامعة دهوك.
- 11- بريسم ، ترف هاشم (2006). تأثير مستويات من الحمأة ونوعية مياه الري في سلوكية بعض العناصر في التربة وحاصل الذرة الصفراء. اطروحة دكتوراه، كلية الزراعة، جامعة بغداد، العراق.
- 12- راهي، حمد الله سليمان وظافر فخري الراوي (1994). مقارنة كفاءة الاسمدة الفوسفاتية في تجهيزها للفسفور لنبات الذرة الصفراء. مجلة العلوم الزراعية العراقية، 25(1):46-57 .
- 13- علوان، طه أحمد (2011). إدارة الترب الجبسية، دار الهلال للطباعة والنشر بيروت، لبنان.

- 14- علي، نورالدين شوقي (1997). العلاقات المتداخلة بين حركيات الفسفور في التربة والفسفور الممتص من قبل النبات، اطروحة دكتوراه. كلية الزراعة. جامعة بغداد، العراق.
- 15- قهرمان، ليلي محمد (1989). دراسة تحولات بعض المركبات الفوسفاتية في الترب الجبسية والكلسية وجاهزيتها للنبات. رسالة ماجستير. كلية الزراعة والغابات، جامعة الموصل، العراق.
- 16- يونان، تغريد فرح (1986). تأثيرات اضافة اوكلزلات البوتاسيوم واوكلزلات وكاربونات الامونيوم وكلوريد الباريوم على ذوبان الجبس في التربة. رسالة ماجستير. قسم التربة، كلية الزراعة، جامعة بغداد، العراق.
- 17- Abed.Mahdi, A.; A. Al-Janabi and D.F. Hassan (2013). effect of organic waste and phosphate fertilizer on the phases of chemical equilibrium of gypsum soils. *Euphrates Journal of Agriculture Science*
- 18- Al-khateeb, I.K.; M.J. Raiham and S.R. Asker (1986). Phase equilibrium kinetics of orthophosphate in some Iraqi soils. *Soil Sci.* 141: 31-37.
- 19- Awad, K.M. and N.I. Ashoor (1986). Phosphorus in calcareous soils. II. Correlation between indices of soil phosphate availability and barley growth parameters. *Zanco.* 4:77-92
- 20- Black, G.R. (1965). Bulk density . In . CA . Black et al . (Eds) . Methods of soil analysis , part 1. *Agron.* 9 : 371 – 373 . Am. soc. Agron. Madison. USA.
- 21- Cheung, K.C. Cheung and T.H. Venkitachalam (2006). Kinetic studies on phosphorus sorption by selected soil amendments for septic tank effluent renovation . *Environmental Geochemistry and Health* (2006) 28:121–131
- 22- Gowariker, V.; V.N. Krishnamurthy; S. Gowariker; M. Dhanorkar and K. Paranjape (2009). *The Fertilizer Encyclopedia*.publi.by john and wiley sons,Inc.Hobken.New Jersey.
- 23- Griffin, R.A. and J.J. Jurinuk (1973). The interaction of phosphate with calcite. *Soil. Sci.Soc. Am.Proc.*37:75-79.
- 24- Grubb, Karen L.; J. M. McGrath; C.J. Penn and R. Bryant (2012). Effect of Land Application of Phosphorus- Saturated Gypsum on Soil Phosphorus in a Laboratory Incubation. *Applied and Environmental Soil Science.* Volume 2012, Article ID 506951, 7 pages
- 25- Hassan, D.F. (2013). Effect of organic matter in transformations phosphorus additive for gypsum soils by using some thermodynamic standards. MA Thesis, college of Agriculture, University of Babylon.
- 26- Hassan, D.F. Hassan; R.J. Mohammed; A.A. Jaafer and R.A. Al-Hassnawi (2017). Effect of adding rice husk as organic matter in the physical and chemical properties of saline soil and millet growth (*Panicum meliaceum L*), *AlBahir journal*.
- 27- Jackson, M.L. (1958). *Soil chemical analysis*, Prentice Itall-IncEnglewood 28-Cliffs, N.J.; S. Jenson (1981). Design and operation of farm sprinkler irrigation ,*Trans., ASAE*, 24:820-524.
- 29- Kordlaghari, M. P. K. and D.L. Rowell (2006). The role of Gypsum in the reactions of Phosphate with soils . *Geoderma.* 132:105-115
- 30- Lagerwerff, J.V.; G.W. Akin and S.W. Moses (1965). Detection and determination of gypsum in soils. *Soil sci. Amer. Proc.* 29:535-540.
- 31- Lindsay, W.L. (1979). *Chemical Equilibria in Soils*. John Weily and Sons. Inc. New York.

- 32- Lindsay, W.L. and J.D. De Ment (1961). Effectiveness of some iron phosphates as sources of phosphorous for plant. *Plant and soil* 14: 118-126.
- 33- McDowell, R.W.; N. Mahien; P.C. Brookes; P.R. poulton, (2003). Mechanisms of phosphorus solubilisation in a limed soil as a function of PH. 51: 685-692.
- 34- Mohammed, R.J. (2014). Effect of gypsum content in some of the properties of the soils the Middle Euphrates region. MA, college of Agriculture, University of Babylon.
- 35- Ohno , Tsutomu ; Timothy , S. Griffin ; Matt Liebman and George , A. Porter . (2005). Chemical characterization of soil phosphorus and organic matter in different cropping systems in Maine , U.S.A. *Agriculture , Ecosystems and Environment*. 105 : 625-634.
- 36- Page, A.L.; R.H. Miller and D.R. Kenney (1982). *Methods of soil analysis. Part 2. Chemical and Biological Properties*. Amer. Soc. Agron. Inc. Publisher , Madison , Wisconsin.
- 37- Paul, N.C. Murphy and R.J. Stevens (2010). Lime and Gypsum as Source Measures to Decrease Phosphorus Loss from Soils to Water . *Water Air Soil Pollut* (2010) 212:101–111
- 38- Richards, L.A. (1954). *Diagnosis and improvement of Saline and Alkaline soils*. USDA. Hand book 60. USDA., Washington , DC.
- 39- Ryan, J.; Hassan, H.M.; M. Buasiri and H.S. Tabbara (1985). Availability and transformation of applied phosphorus in calcareous Lebanese soils. *Soil Sci. Soc. Amer. J.* 49 : 1212-1220.
- 40- Sposito, G. (1989). *The chemistry of soils* Oxford Univ. Press New York.
- 41- Struthers, P.H.; D.H. Seiling (1950). Effect of some organic anions on phosphate precipitation by iron and aluminium as influenced by pH. *Soil Sci.* 69: 205-14
- 42- Volkweiss, S.J.; W.P. Robarge and R.B. Corey (1973). Effect of associated cation on phosphate sorption by minerals and soils .*Agron Abst* . p. 87.
- 43- Wolt, J. (1988). *Soil solution (soilsoiln , Bas)* University of Tennessee , KNOXVILLE .
- 44- Wandruszka, R.V. (2006). Phosphorus retention in calcareous soils and the effect of organic matter on its mobility. *Geochemical Transactions*. 7 (6) : 1-8.

EFFECT OF ORGANIC WASTE AND THE INCUBATION PERIOD ON THE PHASES OF CHEMICAL EQUILIBRIUM OF PHOSPHORUS IN GYPSIFEROUS SOIL

M.A. Abed*

A.S. Hussein

D.F. assan*

ABSTRACT

A laboratory experiment was conducted to study the effect of organic waste and Incubation periods on the phases of chemical equilibrium phases for three surface soils in the areas of Jurf Al-Sakhar, Shanaffiya and Rushdiya , having different gypsum amounts (700, 140, and 59) mg Gypsum. kg⁻¹ soil, respectively for incubation period of Applied each three transactions included soil alone and soil with organic waste by 25% and soil with organic waste by 50% and incubated for five different time periods are (24,168,336,720,1440) hour.

The results of the study revealed that Octacalcium phosphate (OCP) and Tricalcium phosphate (TCP) and Hydroxyapatite (HA) , when the soil is treated alone, and Di-calcium phosphate (DCP) , Octacalcium phosphate (OCP), and Tricalcium phosphate (TCP) are present in the event of treating the soil with 25% organic substance, while Dicalciumphosphate dihydrate (DCPD), Octacalcium phosphate (OCP), and Tricalcium phosphate (TCP) are present in the event of treating the soil with 50% organic substance.

Have shown the results of the study and a clear effect of three factors is the amount of gypsum, the incubation period, the organic matter in chemical equilibrium phases..

* Agric. College, Al-Qasim Green Univ., Babylon, Iarq.

** Al-Musaib Technical College, Babylon, Iarq.

*** Water Resources Engineering. College, Al-Qasim Green Univ., Babylon,