



تقييم مستويات بعض الفيتامينات وبعض المعايير الوبائية للمصابين بداء اللشمانيا الجلدية في مدينة

سامراء

حذيفة خليل إبراهيم

أ.م.د. مروة جاسم محمد

أ.م.د. وسن عبدالمنعم طه

المخلص

يتناول هذا البحث دراسة تقييمية لمستويات عدد من الفيتامينات لدى مرضى داء اللشمانيا الجلدية في مدينة سامراء، وذلك بهدف تسليط الضوء على العلاقة المحتملة بين حالة المصاب التغذوية ومدى استجابته للمرض. تم جمع عينات دم من 60 مريضاً شخصت إصابتهم إكلينيكيًا ومخبريًا باللشمانيا الجلدية، إضافة إلى مجموعة ضابطة مكونة من 30 شخصاً سليماً من نفس الفئة العمرية والجنس. وقد خضعت العينات لاختبارات بيوكيميائية لقياس تراكيز الفيتامينات (C, E, D3) باستخدام تقنيات الامتصاص الطيفي والإنزيم المرتبط المناعي (ELISA). أظهرت النتائج وجود انخفاض معنوي ($P < 0.05$) في متوسط تراكيز الفيتامينات C و E لدى المصابين مقارنة بالأصحاء، بينما لوحظ وجود ارتفاع في مستوى فيتامين D3. وتشير هذه المعطيات إلى أن الإجهاد التأكسدي وضعف المناعة قد يكونان من العوامل المساعدة على تفاقم الإصابة، ما يعزز فرضية ارتباط الحالة التغذوية بتطور المرض. كما كشفت الدراسة عن وجود علاقة ارتباط عكسي بين شدة الإصابة (عدد وحجم الآفات الجلدية) ومستويات الفيتامينات المضادة للأكسدة. توصي الدراسة بضرورة إدراج التقييم الغذائي ضمن البروتوكولات العلاجية لمرضى اللشمانيا الجلدية، خاصة في المناطق الموبوءة، والعمل على دعم المصابين بمكملات غذائية تحتوي على مضادات أكسدة لتعزيز مناعتهم وتحسين استجابتهم للعلاج. كما تقترح إجراء دراسات أوسع على عناصر غذائية أخرى وعلاقتها بالأمراض الطفيلية.

الكلمات المفتاحية: داء اللشمانيا الجلدية، فيتامين C، فيتامين E، فيتامين D3، سامراء، الإجهاد التأكسدي.

Evaluation of some vitamin levels and some epidemiological criteria in patients with cutaneous leishmaniasis in Samarra city

Hudhayfah Khalil Ibrahim

Asst. Prof. Dr. Marwa Jassim Mohammed

Asst. Prof. Dr. Wassan Abdel Moneim Taha

Abstract

This study aims to evaluate the levels of selected vitamins in individuals diagnosed with cutaneous leishmaniasis in Samarra City, with a focus on exploring potential correlations between nutritional status and disease severity. Blood samples were collected from 60 patients clinically and parasitologically diagnosed with cutaneous leishmaniasis, along with 30 healthy age- and sex-matched individuals as a control group. Biochemical assays were performed to determine serum concentrations of vitamins, C, E, and D3 using spectrophotometric and ELISA techniques. The findings revealed a statistically significant decrease ($P < 0.05$) in the mean levels of vitamins A, C, and E in infected patients compared to the healthy controls. Vitamin D3 levels were high. These results suggest that oxidative stress and impaired immunity may play a role in disease progression, highlighting a possible link between micronutrient deficiency and the pathophysiology of leishmaniasis. An inverse correlation was



also observed between the severity of lesions and the levels of antioxidant vitamins. The study recommends incorporating nutritional assessment into the clinical management of cutaneous leishmaniasis, especially in endemic regions, and providing affected individuals with antioxidant vitamin supplementation to enhance immune response and therapeutic outcomes. It also suggests the need for broader investigations into the role of other nutritional elements in parasitic diseases.

Keywords: Cutaneous leishmaniasis, Vitamin C, Vitamin E, Vitamin D3, Samarra, Nutritional status, Oxidative stress.

المقدمة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الانبياء والمرسلين ، نبينا محمد (ﷺ) .

اما بعد :

تُعدّ الأمراض الطفيلية الجلدية من التحديات الصحية المستمرة في كثير من دول العالم النامي، لا سيّما داء اللشمانيا الجلدية الذي يُمثّل إحدى أبرز القضايا الصحية والاجتماعية في المناطق المتأثرة به. وتتميّز مدينة سامراء، بوصفها واحدة من المناطق المستوطنة لهذا الداء في العراق، بارتفاع معدلات الإصابة خلال السنوات الأخيرة، مما يسلّط الضوء على ضرورة دراسة الأبعاد الحيوية والبيئية والعلاجية المرتبطة به.

إن التفاعل المعقّد بين الطفيلي ومضيفه لا يتوقف عند حدود الاستجابة المناعية التقليدية، بل يتداخل مع الوضع التغذوي للمصاب، وخاصة مستويات الفيتامينات ذات الوظيفة المناعية ومضادة الأكسدة، مثل فيتامينات C، E، و D3. وقد أظهرت دراسات سابقة وجود صلة وثيقة بين نقص هذه العناصر الدقيقة وضعف المناعة وتفاقم الأعراض الجلدية الناتجة عن الطفيليات، إلا أن الدراسات المحلية، خاصة في العراق، ما تزال محدودة في هذا السياق، وتفتقر إلى معالجة تحليلية تربط بين التقييم التغذوي وسيروية المرض.

من هنا تنبع أهمية هذا البحث في كونه يسعى لسد فجوة علمية ومعرفية تتعلق بالجانب التغذوي المناعي في حالات داء اللشمانيا الجلدية، ويقدم بيانات ميدانية حديثة من واقع محلي يمثّله سكان مدينة سامراء، مما يعزّز البعد التطبيقي في العمل البحثي، ويفتح آفاقاً جديدة في سبل التشخيص والدعم العلاجي الشامل.

وقد جاء اختيار هذا الموضوع نتيجة ملاحظة الباحث لارتفاع حالات الإصابة بين فئات عمرية متعددة، مع غياب الاهتمام بجانب التقييم التغذوي للمصابين، خاصة ما يتعلق بالفيتامينات التي تمثّل خط الدفاع الأول ضد التأثيرات الخلوية للطفيلي.

ويهدف هذا البحث إلى:

1. تقييم تراكيز الفيتامينات C، E، و D3 في الدم لدى المصابين بداء اللشمانيا الجلدية في مدينة سامراء.
2. مقارنة النتائج مع مجموعة ضابطة من الأصحاء لتحديد الفروق الدالة إحصائياً.
3. علاقة الإصابة بطفيلي اللشمانيا الجلدية على بعض المعايير الوبائية للمصابين في مدينة سامراء
4. الخروج بتوصيات علاجية وتغذوية قد تُسهم في تحسين الاستجابة المناعية لدى المرضى



المقدمة

تشتمل على عرض عام لموضوع البحث، أهمية الدراسة، أهدافها، مشكلة البحث، فرضياته، ومنهجيته العلمية، مع تحديد حدود البحث الزمانية والمكانية والموضوعية.

المبحث الأول: الإطار النظري العام لداء اللشمانيا الجلدية

المطلب الأول: التعريف بداء اللشمانيا – الأنواع والأشكال السريرية

المطلب الثاني: دورة حياة الطفيلي وآلية انتقاله

المبحث الثاني: دور الفيتامينات في الوظائف المناعية ومقاومة الأمراض الطفيلية

المطلب الأول: الفيتامينات كمضادات أكسدة وتأثيرها المناعي

المطلب الثاني: الغذاء وعلاقته بقابلية الإصابة بالطفيليات

المطلب الثالث: مراجعة دراسات سابقة عن الفيتامينات وداء اللشمانيا

المبحث الثالث: الإطار العملي للدراسة (الجانب التطبيقي)

المطلب الأول: تصميم الدراسة – نوعها، عيّنتها، موقعها الزمني والمكاني

المطلب الثاني: طرق جمع البيانات وتحليلها

المطلب الثالث: الأجهزة و المواد المستخدمة

المبحث الرابع: نتائج الدراسة وتحليلها

المطلب الأول: مستويات الفيتامينات ، C ، E ، D3 لدى المصابين

المطلب الثاني: المقارنة الإحصائية بين المصابين والأصحاء

المطلب الثالث: العلاقة بين شدة الإصابة ومستوى الفيتامينات

المبحث الخامس: الوضع الوبائي لداء اللشمانيا في العراق – مدينة سامراء المطلب الأول:

الوبائية حسب الشهر

المطلب الثاني: الوبائية حسب نوع القرحة

الخاتمة

المبحث الأول: الإطار النظري العام لداء اللشمانيا الجلدية

يعد داء اللشمانيا leishmaniasis احد الأمراض الطفيلية واسعة الانتشار والمتوطنة في أكثر من 92 دولة ، بما فيها العراق ، سوريا ، السودان ، أفغانستان ، إيران ، البرازيل ، الهند و بنغلاديش وتسجل منظمة الصحة العالمية أكثر من مليون حالة أصابه بداء اللشمانيا سنوياً (WHO (2020 كما اوضحت ان حوالي 350 مليون شخص مهددة حياتهم بخطر الإصابة بداء اللشمانيا وعلى وجه الخصوص الاشخاص الذين يسكنون الدول النامية، وقد سجل وجود أكثر من 30 نوع من اللشمانيا حتى عام 2007 منهم 21 نوع يصيب الانسان وأكثر هذه الانواع اهمية من الناحية الطبية والبيطرية (WHO, 2010) .

المطلب الأول: التعريف بداء اللشمانيا – الأنواع والأشكال السريرية

إنّ المسبب المرضي لداء اللشمانيا leishmaniasis هي طفيليات وحيدة الخلية من جنس اللشمانيا *Leishmania* والتي تنتقل عن طريق لسعة حشرة ذبابة الرمل *Sandfly* من جنس *Phlebotomus* في مناطق الشرق الاوسط و البحر الأبيض المتوسط و جنس *Lutzomyia* في أمريكا الجنوبية والوسطى ، حيث يمثل هذا المرض (5 - 10%) من أمراض السائحين العائدين من المناطق الاستوائية (Bastola et al.,2020; Gregorio et al.,2019)

ولداء اللشمانيا انواعاً عديدة تختلف في الوبائية و الاعراض السريرية و التي توجد في العالمين القديم و الحديث وتقسم الى ثلاثة أشكال سريرية و هي كل من اللشمانيا الجلدية Cutaneous Leishmaniasis و اللشمانيا الجلدية المخاطية Mucocutaneous Leishmaniasis و اللشمانيا الحشوية Visceral Leishmaniasis



(2024)، CDC، بالإضافة الى انها تمتلك اسماء عديدة منها البثرة الشرقية ، حبة بغداد وحبة حلب ، فضلاً عن أسماء أخرى حسب المناطق التي تحصل فيها؛ ويوجد في العراق نوعان مسببان لداء اللشمانيا الجلدية هما *Leishmania tropica* و *Leishmania major* ويكونان متشابهين في دورة الحياة، ويعيش الطفيلي في خلايا الجهاز البطني الشبكي في الجلد و لاسيما الخلايا البلعمية التي ينمو ويتضاعف داخلها مسبباً ظهور القرحة الجلدية (Ghosh, 2018; Schmidt et al, 2005)

المطلب الثاني: دورة حياة الطفيلي وآلية انتقاله

وتكتمل دورة حياة طفيلي الجنس *Leishmania* بطورين، يسمى الطور الاول بالطور عديم السوط Amastigote والذي يتطفل داخل خلايا البلاعم الكبيرة للمضيف الفقري المتمثل بالإنسان والثدييات (القوارض ، القطط ، العائلة الكلبية)، اما الطور الثاني فهو يتمثل بالطور أمامي السوط Promastigote والذي يتواجد في المضيف اللاقري الذي يتمثل بالحرشرة الناقلة (انثى ذبابة الرمل Sandfly) من جنس *Phlebotomus* (Jamal et al., 2020)

عند اختراق الطفيلي (promastigote stage) للجسم يحفز كل من المناعة الذاتية والخلطية للمضيف ويتم ابتلاعها من قبل البلاعم الكبيرة Macrophages وتستغرق عملية البلعمة (4-8) ساعات حيث يتم ارتباط مقدمة الطفيلي الأمامية بسطح الخلية البلعمية ثم تصبح محاطة بكاملها وتلتهم بواسطة الاقدام الكاذبة pseudopodia وبهذا تكون محاطة بفجوة حالة phagosome وعندها تتحول الى طور عديم السوط Amastigote stage (Parham, 2014) بعد ذلك يبدأ الطور عديم السوط بالانشطار الثنائي حتى تمتلئ الخلايا البلعمية بالطفيلي ومن ثم تنفجر وتحرر العديد من الأطوار عديمة السوط مع العديد من انواع البيروكسيدات والجذور الحرة كبقايا للطفيلي والتي يتم ابتلاعها من قبل خلايا بلعمية أخرى وهكذا تستمر العملية حتى ظهور الأعراض المرضية والفترة ما بين دخول الطفيلي الى حين ظهور الأعراض المرضية تسمى بفترة الحضانة Incubation period (Adamczick et al., 2018) .

وقد ثبت أن الفجوات الحالة phagosome التي تحتوي على طفيليات اللشمانيا تلتحم بالاجسام الحالة Lysosome ولا تؤثر هذه العملية فيما يبدو على الطفيلي الذي يستمر بالتكاثر داخل الجسيمات الفجوات الحالة phagolysosome الناتجة عن هذا الاندماج (Pinkovich et al. 2019)

المبحث الثاني: دور الفيتامينات في الوظائف المناعية ومقاومة الأمراض الطفيلية

تلعب الفيتامينات دوراً مهماً في مقاومة الامراض الطفيلية و دعم الوظائف المناعية ، حيث يُعدّ (VC) ضرورياً لآلية دفاع قوية وفعالة. ومن المعروف أن فيتامين سي يُحسّن وظائف المناعة. وقد أدى علاج الأفراد الأصحاء بفيتامين سي إلى زيادة نشاط الخلايا المناعية الفطرية، وتكاثر الخلايا الليمفاوية، والانجذاب الكيميائي في الدراسات السريرية (Mousavi et al., 2019)

اما (VE) يُعزز ويحسن الاستجابة المناعية Th1 ، كما انه يعمل على حماية دهون الأغشية من التلف التأكسدي ، انخفاض إنتاج عوامل تثبيط المناعة، مثل PGE 2 في الخلايا البلعمية وهذا يعني أن فيتامين E ضروري للاستجابات المناعية الفطرية والتكيفية المثلى للعدوى، وللحفاظ على الوظيفة المناعية الطبيعية للجلد (Wrenger, et al 2013)

يُعد (VD) أحد هذه الجزيئات التي تنظم كلاً من المناعة الفطرية و المكتسبة ، يُعرف (VD) أيضاً باسم هرمون تعديل المناعة. وقد أثبتت الدراسات أن Dihydroxyvitamin D-1,25 ، وهو الشكل النشط لـ (VD) له تأثيرات مناعية على العديد من عناصر الجهاز المناعي الفطري والتكيفي، بالإضافة إلى سلامة الغشاء البطني (Hewison, 2011)



المطلب الأول: الفيتامينات كمضادات أكسدة وتأثيرها المناعي

تلعب الفيتامينات أدواراً مهمة كمضادات أكسدة، حيث تساعد في حماية الخلايا والأنسجة من الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة التي تزداد خلال العدوى الطفيلية.

يعد فيتامين C من مضادات الأكسدة القابلة للذوبان في الماء، ويعمل على تحييد الجذور الحرة، كما يعيد تجديد فيتامين E بعد استهلاكه في التفاعل مع الجذور الحرة، والذي يعزز من الفعالية التراكمية لمضادات الأكسدة داخل الجسم. (Mousavi et al., 2019)

إن الجذور الحرة وأكسدة الدهون مثبطة للمناعة، ويعد فيتامين E من مضادات الأكسدة الذائبة في الدهون وبفضل نشاطه القوي كمضاد للأكسدة، فقد ثبت أنه يُحسن الاستجابة المناعية. (Wintergerst., et al 2007)

وفيما يخص فيتامين D فإنه لا يعد مضاد أكسدة ولكن له تأثير غير مباشر على تقليل الإجهاد التأكسدي وذلك من عن طريق تنظيم التعبير الجيني لبعض الانزيمات المضادة للأكسدة مثل كلوتاثيون بيروكسيداز و سوبر اوكسيد ديمستيز (Crauwels., et al 2019).

ويعد تعاون هذه الفيتامينات على تقليل الإجهاد التأكسدي مهم في مجرى الأمراض الطفيلية

المطلب الثاني: الغذاء وعلاقته بقابلية الإصابة بالطفيليات

يُحسن تناول المكملات الغذائية نشاط مضادات الميكروبات والخلايا القاتلة الطبيعية، والانجذاب الكيميائي، وتكاثر الخلايا الليمفاوية، استجابة Th1.

وفي دراسة أجراها (2004)، Garg et al. أدى إعطاء فيتامين C وقائياً بجرعات 250 و 100 و 50 ملغم/كغم لمدة 15 يوماً إلى زيادة مقاومة الحيوانات نسبياً لعدوى الليشمانيا اللاحقة، حيث انخفض ترسُّخ الطفيليات بشكل ملحوظ مقارنةً بالمجموعة الضابطة غير المعالجة

وأدى تناول مكملات (VE) إلى زيادة تكاثر الخلايا الليمفاوية، وزيادة إنتاج IL-2، وتعزيز نشاط NK cell cytotoxic، وزيادة نشاط البلعمة بواسطة الخلايا البلعمية، وتسبب في زيادة المقاومة ضد العوامل المعدية، مما يشير إلى أن زيادة تناول (VE) يُعزز ويحسن الاستجابة المناعية Th1،

المطلب الثالث: مراجعة دراسات سابقة عن الفيتامينات وداء الليشمانيا

يعد الاتزان في مستوى الفيتامينات وخاصة D, C, E ضرورياً عند الإصابة بداء الليشمانيا حيث تساهم هذه الفيتامينات في تحسين مناعة الجسم ضد طفيلي الليشمانيا و تدعم فعالية العلاج التقليدي و تقلل الالتهابات و التلف الخلوي نتيجة الاستجابة المناعية ويساهم في سرعة العلاج

كما اقترحت بعض الدراسات ان استخدام المكملات الغذائية المدعمة بالفيتامينات تساعد في تحسين النتائج السريرية في حالات الليشمانيا، ولا يزال الامر بحاجة الى دراسة اوسع لتأكيد فعاليته (

Wintergerst., et al 2007)

المبحث الثالث: الإطار العملي للدراسة (الجانب التطبيقي)

المطلب الأول: تصميم الدراسة – نوعها، عيّنتها، موقعها الزمني والمكاني

أنجزت الدراسة الحالية في مدينة سامراء و القرى و النواحي التابعة لها وتم جمع العينات بصورة عشوائية من الوافدين الى المستشفيات الحكومية وبعض العيادات الطبية الخاصة، بمختلف الاعمار وذلك خلال الفترة الزمنية من شهر تشرين الاول الى شهر نيسان .



المطلب الثاني: طرق جمع البيانات وتحليلها

جمعت 90 عينة من الدم وذلك عن طريق سحب 5 ml من الدم الوريدي وذلك عن طريق محقنة طبية معقمة سعة 5 ml ثم وضع في أنابيب بلاستيكية وترك بدرجة حرارة الغرفة ليتجلط ثم نبذ بجهاز الطرد المركزي بسرعة 3000 دورة /دقيقة لمدة 5 دقائق لغرض فصل المصل. اذ فصل الدم واخذ مصل واجري اختبار الكشف السريع Rapid test للتحري عن وجود IgG , IgM ووزعت الامصال في 5 انابيب ابندروف سعة 1.5 ml ثم حفظت العينات بدرجة حرارة -20 م لحين اجراء الاختبارات اذ أنجزت الاختبارات على المجموع الكلي لعدد الاصابات و المقارنة مع مجموعة السيطرة وتم تجميد الكمية المتبقية من المصل لاجل استعمالها في الاختبارات الكيموحيوية .

تم جمع البيانات الوبائية للمصابين لمعرفة مدى بيان تأثير الإصابة بداء اللشمانيا على (اشهر السنة و نوع القرحة) .

المطلب الثالث: الاجهزة و المواد المستخدمة

الاجهزة	الشركة	بلد المنشأ
جهاز الطرد المركزي	Universal	Germany
ثلاجة	Ishtar	Iraq
جهاز قراءة (الليزا)	Humareader	Germany
ماصات دقيقة باحجام مختلفة	Labnet	Germany
رؤوس ماصات	Nipgon	Canadian
انابيب جل	AFMA-DISPO	Jordan
انابيب ابندروف	Epp endrof	Germany
محاقن	Medjecte	Volac
كفوف مطاطية	semper med Latex	Turkey

تم استخدام الاجهزة المختبرية المبينة في الجدول (1-3)

جدول (1-3) الاجهزة المستخدمة

العدد التي تم استخدامها كما موضحة في الجدول (2-3)

جدول (2-3) العدد المستخدمة

العدد	الشركة المصنعة	بلد المنشأ
عدة قياس فيتامين سي VC	ELK biotechnology	U.S.A
عدة قياس فيتامين هـ VE	Elabscience	U.S.A
عدة قياس فيتامين د VD	Elabscience	U.S.A

المبحث الرابع: نتائج الدراسة وتحليلها

المطلب الأول: مستويات الفيتامينات ، C ، E ، D3 لدى المصابين



اظهرت نتائج الدراسة الحالية وجود انخفاض في تركيز VC لدى الاشخاص المصابين باللشمانيا حيث كانت النسبة عند الاشخاص المصابين (245.174 ± 29.522) pg/ml


Groups Parameters	Mean $\pm$ SD		P-value
	Positive	Negative	
VC	245.174 $\pm$ 29.522	621.026 $\pm$ 56.616	<0.05*

وكذلك بينت نتائج الدراسة الحالية وجود انخفاض في تركيز (VE) لدى الاشخاص المصابين بداء اللشمانيا اذ كانت النسبة عند الاشخاص المصابين (9.987 ± 1.030) pg/ml

في حين اظهرت نتائج الدراسة الحالية وجود ارتفاع في تركيز (VD) لدى المصابين بداء اللشمانيا حيث كانت النسبة عند الاشخاص المصابين (20.625 ± 3.902) pg/ml
المطلب الثاني: المقارنة الإحصائية بين المصابين والأصحاء

اظهرت نتائج الدراسة الحالية وجود انخفاض فرق معنوي في تركيز VC عند مستوى احتمالية $P < 0.05$ لدى الاشخاص المصابين باللشمانيا حيث كانت النسبة عند الاشخاص المصابين (245.174 ± 29.522) pg/ml وهو ذو دلالة احصائية بالمقارنة مع قيمته لدى الاشخاص السليمين حيث بلغت نسبته (621.026 ± 56.616) pg/ml، كما هو مبين في الجدول (4- 1) والشكل (4- 1).

جدول (4-1) تركيز VC (pg/ml)



الشكل (4- 1) تأثير الإصابة باللشمانيا على VC




بينت نتائج الدراسة الحالية وجود انخفاض معنوي في تركيز (VE) عند مستوى احتمالية ($P < 0.05$) لدى الاشخاص المصابين بداء اللشمانيا اذ كانت النسبة عند الاشخاص المصابين (9.987 ± 1.030)

P-value	المعدل $\pm$ الانحراف المعياري		المجموعة المتغير
	المصابين	السيطرة	
$<0.05^*$	9.987 ± 1.030	17.077 ± 1.496	VE

pg/ml وهو ذو دلالة احصائية بالمقارنة مع قيمته لدى الاشخاص السليمين حيث بلغت نسبته (17.077 ± 1.496) pg/ml، كما هو مبين في الجدول (4-2) والشكل (4-2).

جدول (4-2) تركيز VE (pg/ml)




الشكل (4-2) تأثير الإصابة باللشمانيا على VE

اظهرت نتائج الدراسة الحالية وجود ارتفاع معنوي في تركيز (VD) عند مستوى احتمالية ($P < 0.05$) لدى المصابين بداء اللشمانيا حيث كانت النسبة عند الاشخاص المصابين (20.625 ± 3.902) pg/ml وهو ذو دلالة احصائية بالمقارنة مع قيمته لدى الاشخاص السليمين حيث بلغت نسبته (8.651 ± 1.279) pg/ml، كما هو مبين في الجدول (4-3) والشكل (4-3)

جدول (4- 3) تركيز VD (pg/ml)

P-value	المعدل $\pm$ الانحراف المعياري		المجموعة المتغير
	المصابين	السيطرة	
<0.05*	20.625 $\pm$ 3.902	8.651 $\pm$ 1.279	VD



الشكل (4- 14) تأثير الإصابة باللشمانيا على VD

المطلب الثالث: العلاقة بين شدة الإصابة ومستوى الفيتامينات

اشارت الادلة العلمية المتزايدة الى الفيتامينات المضادة للاكسدة و خصوصاً فيتامينات C,E,D تؤثر في شدة الإصابة بداء اللشمانيا حيث يعد فيتامين C من اهم مضادات الاكسدة و الذي يعزز فعالية الخلايا البلعمية التي تحتوي على طفيلي اللشمانيا و بالتالي يؤدي انخفاض مستوى فيتامين C الى ضعف في الاستجابة المناعية وزيادة تكاثر الطفيلي (Silva-Almeida *et al.* , 2012)

ويحمي فيتامين E اغشية الخلايا المناعية من الاكسدة التي تنتج عن الالتهاب ، بالاضافة الى انه يساعد في استقرار الوظائف المناعية . ويؤدي نقصه الى تلف الانسجة التي تحيط بموقع الإصابة و الذي يؤدي الى تفاقم المرض (Lewis *et al.* , 2019)

يحفز (VD) إنتاج الببتيدات المضادة للميكروبات التي تعمل بشكل رئيسي عن طريق تحفيز الدفاع المناعي ضد العوامل المعدية ، يرتبط LL-37 المُحَفِّز بالكالسيتريول ببروماستيغوتات اللشمانيا، مما يؤدي إلى القضاء عليها ، حيث تبين ان المرضى الذين يعانون من نقصه قد اظهروا استجابات مناعية اضعف (Crauwels., *et al* 2019) .

وتدل هذه النتائج على أن مراقبة وتصحيح النقص في مستوى هذه الفيتامينات يشكل جزء من الاستراتيجية المساعدة لعلاج داء اللشمانيا، وخصوصاً في الحالات المزمنة أو المنتشرة



المبحث الخامس: الوضع الوبائي لداء اللشمانيا في العراق – مدينة سامراء

سجلت الدراسة الحالية فحص 90 عينة في الفترة من شهر تشرين الأول إلى شهر آذار باستخدام Rapid test ، 60 عينة موجبة بنسبة 66.67 % من مجموع العينات المفحوصة ، و 30 عينة سالبة بنسبة 33.33 % من المجموع الكلي للعينات المفحوصة كما في الجدول (1-5) كانت نتائج الدراسة تشير الى انتشار المرض في غالب اشهر السنة و بنوعيتها الرطب و الجاف .

جدول (1-5)


المجاميع	العدد	%
+ve المصابين	60	66.67
-ve السيطرة	30	33.33
المجموع الكلي	90	100

المطلب الأول: الوبائية حسب الشهر

بينت نتائج الدراسة الحالية وجود اختلاف في نسب الإصابة بداء اللشمانيا خلال اشهر السنة اذ سجلت اعلى عدد للإصابة في شهر شباط بنسبة 31.7% ، بينما سجلت اوطأ عدد اصابات في شهر تشرين الاول بنسبة (5 %) وهذا يدل على وجود علاقة بين الإصابة باللشمانيا الجلدية خلال اشهر السنة كما موضح في الجدول (2-5) والشكل (1-5):

الشهر	عدد المصابين	%
تشرين الأول	3	5
تشرين الثاني	12	20
كانون الأول	10	16.7
كانون الثاني	12	20
شباط	19	31.7
آذار	4	6.6
المجموع	60	100

جدول (2-5) توزيع الإصابات حسب الشهر



الشكل (1-5) انتشار الاصابة باللشمانيا حسب الشهر

وقد يعود السبب في اختلاف توزيع الاصابات خلال مختلف اشهر السنة الى تأثير الظروف المناخية من الرطوبة و درجة الحرارة والذان يمثلان عاملان مهمان واساسيان في انتشار المضيف الناقل ذبابة الرمل، اذ ان ذبابة الرمل يزداد انتشارها ونشاطها خلال فصل الصيف، حيث يزداد احتياج انثى الحشرة الى الدم للنضوج وتطور البيض واكمال دورة الحياة و الذي تحصل عليه من خلال لسعها للاشخاص وخلالها تحقن الاطوار المعديّة ثم بعد فترة حضانة تمتد بين (2-6) اشهر تبدأ الاعراض بالظهور على المصابين (الخرجي، 2005).

المطلب الثاني: الوبائية حسب نوع القرحة


بينت نتائج الدراسة الحالية ان هنالك أن هنالك اختلافاً في النسب المئوية تبعا لنوع القرحة الموجودة في الجسم ، حيث بلغت نسبة الإصابات بالقرحة الرطبة 60 % في حين بلغت الإصابة بالقرحة الجافة 40% مما يشير الى ارتفاع الإصابة بالنوع الرطب كما هو موضح في الجدول (3-5) والشكل (2-5):

الجدول (3-5): توزيع الإصابات حسب نوع القرحة

نوع الإصابة	العدد	%
رطبة	36	60



40	24	جافة
100	60	المجموع



الشكل (2-5) انتشار الاصابة باللشمانيا استناداً الى نوع القرحة

ويعود السبب في تكون القرحة الرطبة الى وجود إصابة ثانوية في منطقة القرحة و التي تؤدي الى تحفيز خلايا الدم البيضاء لقتل العدوى الثانوية وبالتالي تكوّن القيح الذي يعطي الشكل المظهري لقرحة، بالإضافة الى أنّ التشخيص السريري المبكر للمرض له دور في عدم تحول القرحة الرطبة الى الجافة بمرور الوقت. (Rahi et al., 2019)

الخاتمة

- بينت نتائج الدراسة الحالية وجود انخفاض في مستوى (VC,VE,GSH) لدى المصابين بداء اللشمانيا الجلدية بالمقارنة مع مجموعة السيطرة
- أظهرت نتائج الدراسة الحالية ارتفاعاً في مستوى تركيز فيتامين D لدى الاشخاص المصابين بداء اللشمانيا بالمقارنة مع مجموعة السيطرة .
- ان معدل انتشار المرض يكون في اعلى مستوياته في شهر (شباط) وان اقل معدل انتشار في شهر (تشرين الاول) ويعود السبب في ذلك الى التغيرات في المناخ من درجات الحرارة و رطوبة و التي تؤثر بدورها على الحشرة الناقلة ، بالإضافة الى ان انتشار الاصابات من النوع الرطب اكثر من النوع الجاف
- ان استخدام المكملات الغذائية المدعمة بالفيتامينات تساعد في تحسين النتائج السريرية في حالات اللشمانيا

المصادر

الخرجي ، زينب علاء (2005) . تأثير مستخلص حشيشة الليمون والابخليا في طفيلي اللشمانيا . رسالة ماجستير ، كلية العلوم / جامعة بغداد.



- WHO (World Health Organization) (0202). Report of WHO regional office for East. Mediterr. Health J..2: 7-132.
- WHO (World Health Organization) (2010). WHO Technical report 949. Control of leishmaniasis Report of a meeting of the WHO Expert committee on the control of leishmaniasis, Geneva, 22-26 March 2010.
- Bastola, A., Shrestha, M., Lamsal, M., Shrestha, S., Prajapati, S., Adhikari, A. Chalise, B. S. (2020). A case of high altitude cutaneous leishmaniasis in a non-endemic region in Nepal. *Parasitology international*, 74, 101991.
- Gregorio, A., Vasconcellos, M., Enokihara, M., Guerra, J., Nonogaki, S., & Tomimori, J. (2019). Cutaneous schistosomiasis and leishmaniasis coinfection: a case report. *Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology*, 33(9), 1781-1783.
- CDC. (2024). National Center for Emerging and Zoonotic Infectious Diseases (NCEZID), Division of Parasitic Diseases and Malaria
- Ghosh, S. (ed.), (2018). Paniker's textbook of medical parasitology. Jaypee, The Health Sciences Publisher, New Delhi: 256pp
- Schmidt, G. D.; Roberts, L. S. and Dalton, D. (2005). leishmaniasis : An in vitro and Animal study .93(6). *Foundations of parasitology* 7d ed. MC. Graw Hill, companies , America.
- Jamal, Q.; Shah, A.; Rasheed, S. B. and Adnan, M. (2020). In vitro assessment and characterization of the growth and life cycle of *Leishmania tropica*. *Pakistan Journal of Zoology*, 52(2): 447-455.
- Parham, P. (2014). *The immune system*: Garland Science
- Adamczick, C.; Dierig, A.; Welzel, T.; Schifferli, A.; Blum, J. and Ritz, N. (2018). Double trouble: visceral leishmaniasis in twins after traveling to Tuscany—a case report. *BMC infectious diseases*, 18(1), 495.
- Pinkovich, A. G.; Kannan, S.; Nitzan-Koren, R.; Puri, M.; Bar-Avraham, Y.; McDonald, J. and Myler, P. J. (2019). The hunger games: sensing host arginine is essential for *Leishmania* parasite virulence. *bioRxiv*, 751610.
- Mousavi S, Bereswill S, Heimesaat MM (2019) Immunomodulatory and antimicrobial effects of vitamin C. *Eur J Microbiol Immunol (Bp)* 9(3):73–79. <https://doi.org/10.1556/1886.2019.00016>



- Wrenger C, Schetttert I, Liebau E. Oxidative Stress in Human Infectious Diseases—Present and Current Knowledge About Its Druggability. In: El-Shemy HA, eds. Drug Discovery. INTECH, 2013:227–50.
- Hewison M (2011) Vitamin D and innate and adaptive immunity. *Vitam Horm* 86:23–62.
- Mousavi S, Bereswill S, Heimesaat MM (2019) Immunomodulatory and antimicrobial effects of vitamin C. *Eur J Microbiol Immunol (Bp)* 9(3):73–79. <https://doi.org/10.1556/1886.2019.00016>
- Wintergerst ES, Maggini S, Hornig DH (2007). Contribution of selected vitamins and trace elements to immune function. *Ann Nutr Metab*,51(4):301-23.
- Crauwels P, Bank E, Walber B, Wenzel UA, Agerberth B, Chan yalew M, Abebe M, König R, Ritter U, Reiling N, van Zandbergen G (2019) Cathelicidin contributes to the restriction of leishmania in human host macrophages. *Front Immunol* 10:2697.
- Garg R, Singh N, Dube A (2004) Intake of nutrient supplements affects multiplication of leishmania donovani in hamsters. *Parasitology* 129(Pt 6):685–691.
- Rahi, A. A., Jasim, S. E., & Abed, F. A. (2019). Clinical picture of cutaneous leishmaniasis in Wasit, Iraq. *EAS. J. Orthop. Physiother*, 1(3), 29-32
- Silva-Almeida, M., Pereira, B. A. S., Ribeiro-Guimarães, M. L., & Alves, C. R. (2012). Proteinases as virulence factors in *Leishmania* spp. infection in mammals. *Parasites & vectors*, 5, 1-10.
- Lewis, E. D., Meydani, S. N., & Wu, D. (2019). Regulatory role of vitamin E in the immune system and inflammation. *IUBMB life*, 71(4), 487-494.