



ISSN: 1817-6798 (Print)

Journal of Tikrit University for Humanities

available online at: [www.jtuh.org/](http://www.jtuh.org/)**Ahmed Hassan Ali Hamoud**

University of Tikrit / College of Education for Humanities- Department of Geography

**Ali Mukhlef Sabaa Al-Subaihi**

University of Tikrit / College of Education for Humanities- Department of Geography

\* Corresponding author: E-mail :  
07712011105  
[alahbarya046@gmail.com](mailto:alahbarya046@gmail.com)

**Keywords:**

Monitoring land cover changes  
monitoring water changes  
monitoring agricultural lands  
land cover indicators  
biocrust index

**ARTICLE INFO****Article history:**

Received 1 Mar 2025  
Received in revised form 25 Mar 2025  
Accepted 2 May 2025  
Final Proofreading 30 Nov 2025  
Available online 30 Nov 2025

E-mail [t-jtuh@tu.edu.iq](mailto:t-jtuh@tu.edu.iq)

©THIS IS AN OPEN ACCESS ARTICLE  
UNDER THE CC BY LICENSE

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>



## Analysis and Monitoring of Changes in Land Cover and Land Uses in Al-Dhuluiyah District for the Period (2001-2024)

**A B S T R A C T**

This study aims to analyze and monitor changes in land cover and land use in the Al-Dhuluiyah district, providing a detailed picture of desertification. This study utilizes map design and modern GIS technologies for the period (2001-2024). Using geographic techniques and satellite imagery, and using wave classification, four indicators were designed for the study area (vegetation cover index, soil salinity index, biological crust index, and soil degradation index). The period under study reveals a decline and deterioration in land cover. This is due to the study area suffering from drought, and the poor practices that have led to large areas of green land being cut down. The analysis results showed a significant decline in vegetation cover due to drought on one hand, and incorrect human practices on the other, such as the removal of natural vegetation for urban expansion. An increase in residential areas was also observed compared to previous periods, indicating the impact of natural factors and human activities on land degradation and the expansion of desertification

© 2025 JTUH, College of Education for Human Sciences, Tikrit University

DOI: <http://doi.org/10.25130/jtuh.32.11.2.2025.10>

تحليل ومراقبة التغيرات في الغطاء الأرضي واستعمالات الأرض في قضاء الضلوعية للمدة ما بين  
(٢٠٠١-٢٠٢٤)

أحمد حسن علي حمود/ جامعة تكريت / كلية التربية للعلوم الانسانية  
علي مخلف سبع الصبيحي/ جامعة تكريت / كلية التربية للعلوم الانسانية

## الخلاصة:

تهدف هذه الدراسة الى تحليل ومراقبة التغيرات الحاصلة في الغطاء الارضي واستعمالات الارض لقضاء الضلوعية , لاعطاء صورة تفصيلية عن موضوع التصحر , من خلال تصميم خرائط واستخدام التقنيات الحديثة RS,GIS للمدة (٢٠٠١-٢٠٢٤) ,ومن خلال التقنيات الجغرافية والمرئيات الفضائية وبأستخدام التصنيف الموجه تم تصميم اربعة مؤشرات في منطقة الدراسة ( مؤشر الغطاء النباتي, مؤشر تملح التربة, مؤشر القشرة البايولوجية, ومؤشر تدهور التربة ) وتبين من خلال المدة المدروسة ,هناك تراجعاً وتدهوراً في الغطاء الارضي , سبب ذلك ان منطقة الدراسة تعاني من الجفاف من ناحية , والممارسات الخاطئة التي تتعرض لها مساحات واسعة من الاراضي الخضراء الى قطع من ناحية اخرى. وقد اظهرت نتائج التحليل ان المنطقة شهدت تراجعاً ملحوظاً في الغطاء النباتي نتيجة الجفاف من جهة والممارسات البشرية الخاطئة من جهة اخرى , مثل ازالة الغطاء النباتي الطبيعي والاراضي الزراعية لصالح التوسع العمراني , كما لوحظت زيادة في المساحات السكنية مقارنة بالفترات السابقة مما يدل على تأثير المعطيات الطبيعية والانشطة البشرية في تدهور الاراضي واتساع رقعة التصحر

## **الكلمات المفتاحية :**

مراقبة تغيرات الغطاء الارضي , مراقبة تغيرات المياه , مراقبة الاراضي الزراعية , مؤشرات الغطاء الارضي , مؤشر القشرة البايولوجية , مؤشر تدهور التربة

## **المقدمة :**

تتجلى أهمية أستعمال نظم المعلومات الجغرافية وتقنيات الاستشعار عن بعد والوسائل الحديثة في دراسة تحليل ومراقبة التغيرات البيئية وظاهرة التصحر. ويتم ذلك من خلال تحليل ومعالجة البيانات الفضائية، وإجراء المقارنات لتحديد المناطق المتأثرة بهذه الظواهر. تساهم تقنيات الاستشعار عن بعد في إنشاء قاعدة بيانات معلوماتية تعتمد على المرئيات الفضائية لتمثيل الخرائط عبر فترات زمنية ومكانية مختلفة، مما يتيح رصد التغيرات بدقة عالية. وفي هذا البحث، سيتم التركيز على دراسة تحليل ومراقبة التغيرات في الغطاء الأرضي واستخداماته للمدة (٢٠٠١-٢٠٢٤) ، مع التركيز على تطور ظاهرة التصحر في منطقة الدراسة بهدف فهمها وإيجاد الحلول المناسبة لمعالجتها.

تعد منطقة قضاء (الضلوعية) من المناطق المتأثرة بشدة بظاهرة التصحر لأنها إحدى المناطق التي تتعرض إلى مظاهر التصحر، لأعطاء صورة تفصيلية عن موضوع التصحر ورسم خرائط لدرجات التصحر، ومخاطرة اعتماداً على الطبقات التي سيتم تصميمها بناءً على المعايير المسببة لهذه المشكلة، وتصميم خرائط مراقبة التغيرات الحاصلة لمنطقة الدراسة من خلال استخدام التقنيات الحديثة .RS ,GIS

## **مشكلة البحث :**

تتبع مشكلة البحث في الإجابة على السؤال الآتي:  
ما هي طبيعة التغيرات التي طرأت على الغطاء الأرضي واستعمالات الأرض في قضاء الضلوعية للمدة ما بين (٢٠٠١-٢٠٢٤).

### فرضية البحث :

يفترض البحث أن التغيرات التي طرأت على الغطاء الأرضي واستعمالات الأرض في قضاء الضلوعية بين عامي ( ٢٠٠١-٢٠٢٤ ) ناتجة بدرجة كبيرة عن التوسع العمراني والنشاط البشري غير المخطط، وأنه يمكن الحد من آثار هذه التغيرات من خلال تطبيق نظم مراقبة حديثة، وتبني سياسات تخطيط عمراني وبيئي مستدامة.

### هدف الدراسة :

تحليل ومراقبة التغيرات في الغطاء الأرضي واستعمالات الأرض في قضاء الضلوعية للمدة ما بين (٢٠٠١-٢٠٢٤)

### اهمية الدراسة :

تبرز اهمية الدراسة إلى مراقبة التغيرات الحاصلة في الغطاء الارضي بمرور الزمن من خلال تحليل ومعالجة البيانات الفضائية واجراء المقارنات لتحديد تلك المناطق المتأثرة بهذه التغيرات عن طريق تقنيات الاستشعار عن بعد من خلال انشاء قاعدة بيانات معلوماتية تعتمد على المرئيات الفضائية لتمثيل الخرائط عبر فترات زمنية ومكانية مختلفة.


### منهجية الدراسة:

لإثبات صحة فرضية الدراسة والتوصل إلى النتائج المرجوة، تم الاعتماد على مجموعة من المناهج العلمية، أبرزها المنهج التحليلي الذي يستند إلى تحليل المرئيات الفضائية باستخدام أسلوب المركب اللوني لتصنيف منطقة الدراسة، والمنهج الكمي الذي يعتمد على البيانات الرقمية في تحليل الظواهر للوصول إلى نتائج دقيقة.

### موقع منطقة الدراسة :

تقع منطقة الدراسة في الجزء الجنوبي الشرقي للمحافظة وتتحصر بين ، دائرتي عرض (٠، ٥٩<sup>-</sup> و٣٣<sup>٠</sup>) و(٠، ٠٩<sup>-</sup> ، ٣٤<sup>٠</sup>) شمالاً , وخطي طول(٠، ١٩<sup>-</sup>، ٤٤<sup>٠</sup>) و(٠، ٣١<sup>-</sup> ، ٤٤<sup>٠</sup>) شرقاً يحدها من جهة الشمال قضاء الدور ومن جهة الجنوب ناحية يثرب وقضاء بلد ومن جهة الغرب قضاء سامراء ومن جهة الشرق محافظة ديالى تبلغ مساحة منطقه الدراسة (٧٧٦) كم٢، كما موضح في الخريطة (١) .

خريطة (١) حدود موقع منطقة الدراسة



المصدر: (١) جمهورية العراق، وزارة الموارد المائية، الهيئة العامة للمساحة، شعبة انتاج الخرائط، خريطة العراق الإدارية،

بمقياس، بمقياس 1/1000000 ، وبرنامج (ARC GIS V10.3) (٢٠٢٣ م.

(٢) خريطة صلاح الدين الادارية ، بمقياس ١: ٢٥٠,٠٠٠، ٢٠٠٩.


مراقبة التغيرات الحاصلة في الغطاء الارضي واستعمالات الارض في قضاء الضلوعية للمدة ما بين (٢٠٠١-٢٠٢٤)

تتجلى أهمية استخدام نظم المعلومات الجغرافية وتقنيات الاستشعار عن بعد والوسائل الحديثة في دراسة ومراقبة التغيرات البيئية وظاهرة التصحر. ويتم ذلك من خلال تحليل ومعالجة البيانات الفضائية، وإجراء المقارنات لتحديد المناطق المتأثرة بهذه الظواهر. تساهم تقنيات الاستشعار عن بعد في إنشاء قاعدة بيانات معلوماتية تعتمد على المرئيات الفضائية لتمثيل الخرائط عبر فترات زمنية ومكانية مختلفة، مما يتيح رصد التغيرات بدقة عالية. وفي هذا الفصل، سيتم التركيز على دراسة ومراقبة التغيرات في الغطاء الأرضي واستخداماته للمدة (٢٠٠١-٢٠٢٤)، مع التركيز على تطور ظاهرة التصحر في منطقة الدراسة بهدف فهمها وإيجاد الحلول المناسبة لمعالجتها.

١-١ مراقبة تغيرات الغطاء الأرضي في منطقة الدراسة:


يتناول هذا التحليل دراسة نتائج خلايا المرئيات الفضائية، حيث تتكون المرئية الرقمية من صفوف وأعمدة تعكس خصائص كل مَعْلَم وفقاً لانعكاسيته. ويهدف هذا التحليل إلى رصد التطورات التي طرأت على الغطاء الأرضي واستعمالاته في منطقة الدراسة، إذ تعود هذه التغيرات إلى تطور الموارد الطبيعية في ظل الاستغلال الجائر الناتج عن الأنشطة البشرية المتنوعة، إضافة إلى الزيادة السكانية المتسارعة. ويتضح ذلك من خلال الخرائط المستخرجة من بيانات المرئيات الفضائية، مثل مرئية (Land sat 5) وMSS بتاريخ ٢٠٠١/٣/١٢ ومرئية (Land sat 8 OLI) بتاريخ ٢٠٢٤/٣/١٤، إضافة إلى الخرائط (٢) و(٣) التي تم تصنيفها تصنيفاً موجَّهاً باستخدام برنامج (Arc Map 10.3) وقد جرى تعميم خرائط

الغطاء الأرضي وتوزيع استعمالات الأرض في منطقة الدراسة خلال الفترة (٢٠٠١-٢٠٢٤) أي على مدار (٢٣) عامًا، كما هو موضح في الخريطين (٢) و(٣) والجدول (١).  
خريطة (٢) التصنيف الموجة للغطاء الارضي في منطقة الدراسة لسنة (٢٠٠١)



المصدر: من الباحث اعتماداً على المرئية الفضائية (Land sat 5 Etm) ومخرجات برنامج (Arc Gis10.3)، بتاريخ (١٢/٣/٢٠٠١)

خريطة (٣) التصنيف الموجة للغطاء الارضي في منطقة الدراسة لسنة (٢٠٢٤)



المصدر: من الباحث اعتماداً على المرئية الفضائية (Land sat 8 oli) ومخرجات برنامج (Arc Gis10.3)، بتاريخ (١٤/٣/٢٠٢٤).

جدول (١) مساحة التغيرات لاصناف الغطاء الارضي والنسب المئوية للمدة (٢٠٠١-٢٠٢٤)

مساحة ونسبة التغير بين(٢٠٠١-٢٠٢٤)		(٢٠٢٤)		(٢٠٠١)		ت	صنف الغطاء الارضي
النسبة %	المساحة / كم <sup>٢</sup>	النسبة %	المساحة / كم <sup>٢</sup>	النسبة %	المساحة / كم <sup>٢</sup>		
- ٠,٦٠	- ٧,٦٨	٠,٦٢	٥,٠٣	١,٥٨	١٢,٧١	١	مياه
- ٠,٣٧	- ٩٨,٦٤	٢٠,٦٥	١٦٦,٢	٣٢,٩٠	٢٦٤,٨٤	٢	نبات طبيعي
١١,٩٣	٥٧,١٢	٧,٧٠	٦١,٩٥	٠,٦٠	٤,٨٣	٣	مستقرات بشرية
٠,١٩	٦,٢٧	٤,٨٧	٣٩,٢	٤,٠٩	٣٢,٩٣	٤	كثبان رملية
٠,٦٩	٣٠,٣٤	٩,٢١	٧٤,١٢	٥,٤٤	٤٣,٧٨	٥	اراضي زراعية
- ٠,٧٧	١٢,٥٩	٥٦,٩٥	٤٥٨,٤٢	٥٥,٣٩	٤٤٥,٨٣	٥	اراضي جرداء
		١٠٠,٠٠	٨٠٤,٩٢	١٠٠,٠٠	٨٠٤,٩٢		المجموع

المصدر: اعتماد الباحث على بيانات المرئيتين الفضائيتين (٢) و (٣) وبرنامج (Arc Gis 10.3).

#### ٢-١ مراقبة تغيير المياه في منطقة الدراسة:

تُعد متابعة التغيرات التي تطرأ على المسطحات المائية في منطقة الدراسة عملية أساسية ترتبط بجميع العمليات الحيوية التي يعتمد عليها الإنسان، إذ تسهم في تقدير كميات المياه المتوفرة والمستهلكة، وتُمكن من التنبؤ بحالات الشح وإدارة الموارد المائية بشكل أمثل.

يتضح من البيانات المعروضة في الخارطتين (٢) و(٣) والجدول (١) أن المساحات المائية تُشكل أقل نسبة من كافة فئات الغطاء الأرضي في المنطقة. ففي عام ٢٠٠١ كانت مساحة المياه تُقدَّر ( ١٢.٧١ ) كم<sup>٢</sup> وبنسبة ( ١.٥٨ )% من إجمالي مساحة الدراسة، بينما تراجعت في عام ٢٠٢٤ لتصل إلى ( ٥.٠٣ ) كم<sup>٢</sup> وبنسبة بلغت ( ٠.٦٢ )% . في حين كانت مساحة التغير للمياه مابين المدة (٢٠٠١-٢٠٢٤) (-٧,٦٨) كم<sup>٢</sup> وبنسبة (-٦٠,٤٢)% يرجع هذا التناقص في المساحات المائية بشكل رئيسي إلى قلة الأمطار وسيادة الجفاف، مما يجعل هذا التراجع مؤشراً هاماً على احتمالية حدوث جفاف وتصحر في المنطقة، إذ تتوزع المياه عند نهر دجلة الذي ينحدر من الاجزاء الغربية حتى جنوب منطقة الدراسة , والذي يعد نبض الحياة لقضاء الضلوعية كذلك نهر العظيم الذي ينحدر من الجزء الشمال الشرقي لمنطقة الدراسة الذي له اهمية كبيرة للمناطق التي يمر خلالها .

#### ٣-١ مراقبة النبات الطبيعي في منطقة الدراسة:

يُعد رصد التغيرات التي طرأت على النباتات الطبيعية في منطقة الدراسة خلال الفترة بين عامي (٢٠٠١-٢٠٢٤) ذا أهمية بالغة، لما لها من دور أساسي في تكوين النظم البيئية. ففي عام ٢٠٠١، بلغت مساحة المناطق المغطاة بالنبات الطبيعي حوالي ( ٢٦٤.٨٤ ) كم<sup>٢</sup>، أي ما يمثل نسبة ( ٣٢.٩٠ )% من إجمالي مساحة الدراسة، فيما تراجعت هذه المساحة لتصل عام ٢٠٢٤ إلى حوالي ( ١٦٦.٢ ) كم<sup>٢</sup> ، و بنسبة ( ٢٠.٦٥ )% . إذ سجل الغطاء النباتي مساحة تغير (٩٨,٩٤) كم<sup>٢</sup> وبنسبة (-٣٧,٢٤) وبهذا قد تعرضت النباتات الطبيعية في منطقة الدراسة خلال السنوات الأخيرة لتراجع ملحوظ يعود ذلك إلى ارتفاع معدلات الجفاف بالإضافة إلى الضغوط البشرية، مثل الرعي الجائر وظاهرة الاحتطاب والتوسع العمراني، مما أسفر عن القضاء على مساحات واسعة من النباتات الطبيعية.

#### ٤-١ مراقبة تغيير المستقرات البشرية في منطقة الدراسة:

تُعد مراقبة تغير المستقرات البشرية في قضاء الضلوعية خلال المدة الممتدة بين عامي (٢٠٠١ - ٢٠٢٤) مسألة أساسية، إذ تسهم في تحديد مدى التوسع العمراني على حساب الأراضي الزراعية

والمراعي. فقد بلغت مساحة المناطق المخصصة للمستقرات البشرية عام ٢٠٠١ حوالي (٤.٨٣) كم<sup>٢</sup>، أي ما يعادل (٠.٦٠) % من إجمالي مساحة منطقة الدراسة، ثم شهدت زيادة ملحوظة لتصل في عام ٢٠٢٤ إلى (٦١.٩٥) كم<sup>٢</sup>، ما يمثل نسبة (٧.٧٠) % من المساحة الكلية. إذ بلغت مساحة التغير للمدة (٢٠٠١-٢٠٢٤) (٥٧,١٢) كم<sup>٢</sup> وبنسبة (١١,٨٢) اي زيادة موجبة. وقد نتج هذا التوسع عن تضاعف أعداد السكان، مما أدى إلى انتشار المستقرات البشرية بشكل عشوائي وغير منظم على حساب الأراضي الزراعية. كما ساهمت الظروف الأمنية المضطربة، لا سيما بعد أحداث عام ٢٠٠٣، في ازدياد أعداد المهجرين من داخل المنطقة وخارجها، مما دفع إلى استغلال المزيد من الأراضي المنتجة للتوسع العمراني.

#### ٥-١ مراقبة زحف الكثبان والمسطحات الرملية في منطقة الدراسة:

من خلال النظر إلى المرئيتين الفضائيتين السابقتين لعامي (٢٠٠١-٢٠٢٤) تبين لنا تغير الكثبان الرملية في منطقة الدراسة نسبة قليلة خلال تلك المدة، إذ كانت مساحة الكثبان الرملية لعام (٢٠٠١) تشكل (٣٢.٩٣) كم<sup>٢</sup> من المساحة الكلية من منطقة الدراسة أي بنسبة (٤.٠٩) %، أما في عام (٢٠٢٤) فقد بلغت مساحتها (٣٩.٢) كم<sup>٢</sup> من المساحة الكلية من منطقة الدراسة أي بنسبة (٤.٨٧) % . كذلك بلغت مساحة التغير بين عامي (٢٠٠١-٢٠٢٤) (٦,٢٧) كم<sup>٢</sup> وبنسبة (٠,١٩) % , ويعود سبب ذلك إلى فترة الجفاف التي تنتاب المنطقة فضلاً إلى ذلك أثر الرياح الشمالية الغربية السائدة أدت إلى حدوث الكثبان الرملية في الأجزاء الشمالية الغربية من منطقة الدراسة، إذ تزداد الكثبان الرملية في مقاطعات ( عيثة الواليد , المرات ) من اسباب توسع الكثبان الرملية هو استعمال الرعي الجائر الذي يكون سبباً في تدهور الغطاء الوافي لسطح الأرض , كذلك الاحتطاب وقطع الأشجار الذي ينعكس سلباً على سطح الأرض

#### ٦-١ مراقبة الأراضي الزراعية في منطقة الدراسة:

تُعد متابعة التغيرات التي طرأت على الأراضي الزراعية في منطقة الدراسة أمراً محورياً لفهم مستجدات الفترة بين عامي (٢٠٠١ - ٢٠٢٤). ففي عام ٢٠٠١ كانت مساحة الأراضي الزراعية تُقدَّر بـ(٤٣.٧٨) كم<sup>٢</sup>، أي بنسبة (٥.٤٤) % من إجمالي مساحة المنطقة، بينما ازدادت في عام (٢٠٢٤) لتصل إلى حوالي (٧٤.١٢) كم<sup>٢</sup>، بما يمثل نسبة (٩,٢١) % . إذ بلغت مساحة التغير بين عامي (٢٠٠١-٢٠٢٤) (٣٠,٣٤) كم<sup>٢</sup> وبنسبة (٠,٦٩) % , ويرجع هذا التزايد في مساحة الأراضي الزراعية إلى الدعم الحكومي للقطاع الزراعي واتباع سياسة زراعية واضحة.

#### ٧-١ مراقبة الاراضي الجرداء في منطقة الدراسة :

إن الأراضي الجرداء تتميز بقدرتها العالية على عكس الإشعاع عند تحليل الصور الفضائية الملونة أو الصور بالأبيض والأسود، نظراً لخلو أسطحها من الغطاء النباتي باستثناء كميات ضئيلة جداً، وندرة مظاهر الحياة فيها. ويوضح الجدول (١) أن مساحة الأراضي الجرداء في منطقة الدراسة بلغت عام (٢٠٠١) نحو (٤٤٥.٨٣) كم<sup>٢</sup>، اي بنسبة (٥٥.٣٩) % من إجمالي المساحة. وفي عام (٢٠٢٤) بلغت مساحة الاراضي الجرداء (٤٥٨,٤٢) وبنسبة (٥٦,٩٥) % ، إذ بلغت مساحة التغير للأراضي الجرداء بين عامي (٢٠٠١-٢٠٢٤) (١٢,٥٩) كم<sup>٢</sup> وبنسبة (٠,٧٧) %، ويعزى هذا التغير الى زيادة ظاهرة التصحر وبنسبة واضحة .

#### مؤشرات الغطاء الأرضي واستخداماتها في منطقة الدراسة:

تُعد المؤشرات الانعكاسية من الأساليب المهمة لدراسة تغير الغطاء الأرضي واستخداماته في منطقة الدراسة. وقد تم تطبيق اربع مؤشرات، وهي (مؤشر الغطاء النباتي، ، ومؤشر تلمح التربة , مؤشر القشرة البايولوجية , مؤشر تدهور التربة )، تُحسب هذه المؤشرات باستخدام معادلات محددة تعتمد

على قنوات الطيف الخاصة بكل مؤشر، وفقاً لاختلاف الطول الموجي وأهميته في دراسة الظاهرة المستهدفة، وذلك على النحو التالي :

## ١-٢ مؤشر الغطاء النباتي (Normalized Difference Vegetation Index):

إن مؤشر اختلاف الغطاء النباتي (NDVI) يشير إلى كثافة الغطاء النباتي بدرجاته المتنوعة، وهذا المؤشر (NDVI) يتم احتسابه من خلال المعادلة الآتية :-

$$NDVI = \frac{NIR - RED}{NIR + RED}$$

إذ إن:

NDVI = مؤشر معامل اختلاف الغطاء النباتي.

NIR = هو انعكاس عالي يقع ضمن نطاق الخاص بالأشعة تحت الحمراء.


RED = هو انعكاس منخفض يقع ضمن نطاق الأشعة الحمراء من الطيف.

وفي حالة بيانات القمر الصناعي لاندسات(8) (Land4 و Land5)، إذ يشير(B3) إلى الجزء الخاص بالطيف الاحمر، بينما يشير(B4) إلى الجزء الخاص بالطيف القريب من الأشعة تحت الحمراء، باستخدام المعادلة الآتية :-

$$NDVI = \frac{(Band4 - Band3)}{(Band4 + Band3)}$$


أما بالنسبة إلى الجانب النظري فيأخذ قيم (NDVI) التي تتراوح ما بين (+1، -1)، وعموماً تشير القيم الموجبة إلى وجود غطاء نباتي كثيف، وبينما تشير القيم السالبة إلى عدم وجود غطاء نباتي، وتشتمل هذه المناطق الواقعة ضمن هذه القيم إلى الأراضي الجرداء والمستقرات البشرية والمساحات المائية، وقد تم تطبيق حساب المؤشر (NDVI) من خلال المرئيات الفضائية لمنطقة الدراسة لعام (٢٠٠١) (TM) لعام (٢٠٢٤) (OLI) واستخدام المتوسط والقيم العليا والدنيا التي وجدت فيها، وكما مبين في الخريطين (٣) و(٤)، والجدول

## خريطة (٤) مؤشر الغطاء النباتي في منطقة الدراسة لسنة (٢٠٠١)



المصدر : من عمل الباحث اعتماداً على المرئية الفضائية (land sat.5 Tm) ومخرجات برنامج (Arc Gis10.3) بتاريخ (٢٠٠١/٣/١٢)

خريطة (٥) مؤشر الغطاء النباتي في منطقة الدراسة لسنة (٢٠٢٤)



المصدر : من عمل الباحث اعتماداً على المرئية الفضائية (land sat.5 Tm) ومخرجات برنامج (Arc Gis10.3) بتاريخ (٢٠٢٤/٣/١٤).

نلاحظ من خلال الجدول هنالك مساحة تغير بين عامي (٢٠٢٤-٢٠٠١) لصنف النباتي الكثيف (٣٨,١١) كم<sup>٢</sup> ونسبة (١٩٧,٣) % , في حين بلغت مساحة صنف النبات المتوسط (١٠٦,٣٦) كم<sup>٢</sup> ونسبة (٢٧٩,٧) % , اما الغطاء الخفيف بلغت مساحته (٩١٤,٦) كم<sup>٢</sup> ونسبة (٦٠٥,٤) % , اما مساحة المنطقة الخالية من النبات الطبيعي (٦٥٨,٢) كم<sup>٢</sup> ونسبة (٩٩,٤٦) % .

نلاحظ مما سبق من خلال معطيات الخريطين (٤) و(٥) والجدول (٢) هنالك تغير في مساحة ونسبة الغطاء النباتي للمدة (٢٠٢٤-٢٠٠١) اذ أن المساحات الخالية من الغطاء النباتي تفوق بكثير المساحات ذات الغطاء النباتي الكثيف، ويرجع ذلك إلى الممارسات البشرية الخاطئة، مثل الرعي الجائر والاحتطاب، بالإضافة إلى التغيرات المناخية التي شهدتها منطقة الدراسة في السنوات الأخيرة، والتي أدت إلى تفاقم الجفاف وأسهمت بشكل كبير في تدهور الغطاء النباتي. وبناءً على ذلك، يُعد مؤشر معامل الاختلاف في الغطاء النباتي من أهم المؤشرات المستخدمة في مراقبة ظاهرة التصحر في منطقة الدراسة.

جدول (٢) مؤشر الغطاء النباتي في منطقة الدراسة للمدة (٢٠٢٤-٢٠٠١)

ت	٢٠٢٤		٢٠٠١		اصناف الغطاء النباتي
	المساحة /كم <sup>٢</sup>	النسبة %	المساحة /كم <sup>٢</sup>	النسبة %	
١	٣٨,١١	١٩٧,٣	٥٧,٤	٢,٤٠	غطاء كثيف
٢	١٠٦,٣٦	٢٧٩,٧	١٤٤,٣٨	٤,٧٢	متوسط


٦٠٥,٤	٩١٤,٦	٧٤.٤٩	٥٩٩.٦	١٠,٦٧	٨٥,٠	خفيف	٣
-٩٩,٤٦	-٦٥٨,٢	٠.٤٤	٣.٥١	٨٢,٢١	٦٦١,٧١	خالية من الغطاء النباتي	٤
		١٠٠.٠٠	٨٠٤.٨٩	١٠٠,٠٠	٨٠٤,٩٢	المجموع	

المصدر : اعتماداً على المرئيتين الفضائيتين ( ٣-٤ ) و ( ٤-٤ ) وبرنامج ( Arc Gis10.3 ).

## ٢-٢ مؤشر تملح التربة في منطقة الدراسة:


يُعدّ رصد التملح من أبرز التغيرات التي شهدتها منطقة الدراسة خلال الفترة الممتدة بين عامي (٢٠٠١-٢٠٢٤)، حيث يوفّر هذا الرصد صورة واضحة عن تزايد نسبة الأملاح في التربة وبمساحة ونسبة تغير مابين عامي (٢٠٢٤-١٠٠١) كما موضح في الجدول ادناه. إذ بلغت نسبة التغير لمؤشر درجة الملوحة للمدة (٢٠٢٤-٢٠٠١) للاراضي ذات الملوحة القليلة جدأبمساحة (٦,٨٨ - ) كم<sup>٢</sup> وبنسبة تغير(٥٨,٧٨-%) , اما الاراضي ذات الملوحة القليلة كانت مساحة التغير(٠,١١) كم<sup>٢</sup> وبنسبة (١١,٩٤) %، فيما بلغت مساحة التغير للاراضي المتوسطة الملوحة (٠,١٠) كم<sup>٢</sup> وبنسبة (١٠,١١) ، اما الاراضي ذات الملوحة العالية بلغت مساحتها (٠,٢٢) كم<sup>٢</sup> وبنسبة (٢٢,٩٣) % فيما بلغت مساحة الاراضي ذات الملوحة العالية جداً (٠,٠٤) كم<sup>٢</sup> وبنسبة (٤,٣٤) % . ويُعزى تفاقم مشكلة التملح في منطقة الدراسة إلى تداخل العوامل الطبيعية والبشرية. فمن الناحية البيئية، أسهمت الظروف المناخية، مثل تراجع معدلات الأمطار وارتفاع درجات الحرارة وما يرافقه من زيادة معدلات التبخر، في رفع مستوى المياه الجوفية عبر الخاصية الشعرية، مما أدى إلى تراكم الأملاح الذائبة في منطقة جذور النبات أو على سطح التربة. أما من الناحية البشرية، فقد ساهمت شحّ الموارد المائية وسوء استغلالها، إلى جانب اتباع أساليب ري تقليدية وعدم الالتزام بالدورات الزراعية الملائمة، في تفاقم المشكلة، مما أثر سلبيًا على خصوبة التربة وزيادة نسبة الأملاح فيها. كما موضح في خريطة (٦) و(٧) و(٣).

## خريطة (٦) مؤشرات درجة ملوحة التربة لمنطقة الدراسة (٢٠٠١)



المصدر : من الباحث اعتماداً على المرئية الفضائية (Land sat 5 Tm) ومخرجات برنامج (Arc Gis10.4)، بتاريخ (٢٠٠١/٣/١٢)

خريطة (٧) مؤشرات درجة ملوحة التربة لمنطقة الدراسة (٢٠٢٤)



المصدر: من الباحث اعتماداً على المرئية الفضائية (Land sat 5 Tm) ومخرجات برنامج (Arc Gis10.4)، بتاريخ (٢٠٢٤/٣/١٤).

جدول (٣) مؤشر درجة الملوحة (مساحة/كم<sup>٢</sup>) و(النسبة%) لمنطقة الدراسة (٢٠٠١-٢٠٢٤)

مساحة ونسبة التغير (بين ٢٠٠١-٢٠٢٤)		٢٠٢٤		٢٠٠١		درجات الملوحة	ت
النسبة %	مساحة/كم <sup>٢</sup>	النسبة (%)	مساحة (كم <sup>٢</sup> )	النسبة (%)	مساحة (كم <sup>٢</sup> )		
٥٨,٧٨	-٦,٨٨	٠,٨٥	٦,٨٣	٧,٣٠	٥٨,٧٨	أراض ذات ملوحة قليلة جداً	1
١١,٩٤	٠,١١	٢٠,٣٥	١٦٣,٨١	١٨,١٨	١٤٦,٣٣	أراض ذات ملوحة قليلة	2
١٠,١١	-٠,١٠	٢٢,٣٧	١٨٠,٠٦	٢٤,٨٩	٢٠٠,٣٢	أراض ذات ملوحة متوسطة	3
٢٢,٩٣	٠,٢٢	٣٠,٧٠	٢٤٧,١٣	٢٤,٩٨	٢٠١,٠٣	أراض ذات ملوحة عالية	4
٤,٣٤	٠,٠٤	٢٥,٧٣	١٠٧,٠٩	٢٤,٦٦	١٩٨,٤٦	أراض ذات ملوحة عالية جداً	5
		١٠٠,٠٠	٨٠٤,٩٢	١٠٠,٠٠	٨٠٤,٩٢	المجموع	

المصدر: اعتماداً على بيانات المرئيتين الفضائيتين (٦) و (٧) وبرنامج Arc Gis.10.3.

٢-٣ مؤشر القشرة البايولوجية (CL) (Crust Index):

تم تطوير مؤشر (CL) وفقاً لمعيار محدد يعتمد على الاختلاف في القيم الطيفية للقناة المرئية، لا سيما في نطاقَي الأحمر والأزرق. وقد تم تطبيق هذا المؤشر في مناطق الكثبان الرملية، حيث استُخدم للكشف عن الوحدات الأرضية في المناطق المغطاة بالتربة الجافة، بالإضافة إلى استنباطها وتحليلها باستخدام المعادلة التالية:

$$CL = 1 - \frac{(Red - Blue)}{(Red + Blue)}$$

إذ إن:


$CL =$  مؤشر القشرة البايولوجية.

$Red =$  هي القناة الطيفية التي تقع ضمن النطاق الطول الموجي المرئي الأحمر.

$Blue =$  هي القناة الطيفية التي تقع ضمن النطاق الطول الموجي المرئي الزرقاء.


إن قيم المؤشر ( $CL$ ) التي تتراوح ما بين (+١، -١) كلما اقترب من القيم الموجبة تشير إلى المناطق الرطبة، وبينما تشير القيم السالبة والصفر إلى المناطق الجافة وشبه الجافة، وقد تم تطبيق حساب هذا المؤشر من خلال المرئية الفضائية لمنطقة الدراسة لعام (٢٠٠١-٢٠٢٤) لتمييز اصناف القشرة الارضية من حيث مساحتها ونسبتها في منطقة الدراسة، وكما مبين في الخريطين (٨) و(٩) والجدول (٤).

### خريطة (٨) مؤشر القشرة البايولوجية في منطقة الدراسة (٢٠٠١)



المصدر: من الباحث اعتماداً على المرئية الفضائية (Land sat 5 Tm) ومخرجات برنامج (Arc Gis10.4)، بتاريخ (٢٠٠١/٣/١٢).

خريطة (٩) مؤشر القشرة البايولوجية في منطقة الدراسة (٢٠٢٤)



المصدر: من الباحث اعتماداً على المرئية الفضائية (Land sat 5 Tm) ومخرجات برنامج (Arc Gis10.4)، بتاريخ (٢٠٢٤/٣/١٤).

جدول (٤) مؤشر القشرة البايولوجية في منطقة الدراسة للمدة (٢٠٠١-٢٠٢٤)

مساحة ونسبة التغير بين (٢٠٢٤-٢٠٠١)		القشرة البايولوجية ٢٠٢٤		القشرة البايولوجية ٢٠٠١		المنصف	ت
النسبة %	المساحة كم <sup>٢</sup>	النسبة %	المساحة كم <sup>٢</sup>	النسبة %	المساحة كم <sup>٢</sup>		
- ٩٦,٤٣	- ٠,٩٦	٥,٧٨	٤٦,٥٥	١١,٣٦	٩١,٤٤	أراضي ذات قشرة غنية جداً	1
- ٤٦,١٩	- ٠,٤٦	٩,٦٤	٧٧,٥٩	١٧,٩١	١٤٤,٢	أراضي ذات قشرة غنية	2
- ١١,٠٨	- ٠,١١	٢٠,٩٢	١٦٨,٣٦	٢٣,٥٢	١٨٩,٣٤	أراضي ذات قشرة متوسطة	3
٤,٦٤	٠,٠٤	٢٧,٦١	٢٢٢,٢	٢٦,٣٨	٢١٢,٣٣	أراضي ذات قشرة فقيرة	4
٧٣,١٢	٠,٣٧	٣٦,٠٥	٢٩٠,١٧	٢٠,٨٢	١٦٧,٦١	أراضي ذات قشرة فقيرة جداً	5
		١٠٠,٠٠	٨٠٤,٨٧	١٠٠,٠٠	٨٠٤,٩٢	المجموع	

المصدر : اعتماداً على بيانات المرئيتين الفضائيتين (٨) و (٩) وبرنامج Arc Gis.10.3.

تشير نتائج الجدول (٤) من مخرجات الخريطين (٨) و (٩) إلى تقييم حالة اراضي القشرة

البايولوجية ومالها

من انعكاس في منطقة الدراسة خلال المدة (٢٠٠١ - ٢٠٢٤), بلغت مساحة التغير في مناطق القشرة الغنية جداً (٠,٩٦ -) كم<sup>٢</sup>, وبنسبة (- ٩٦,٤٣) %. أما الاراضي ذات القشرة الغنية بلغت مساحة التغير

( ٠,٤٦ - ) كم٢ وبنسبة (٤٦,١٩ -) % ، اما الاراضي ذات القشرة المتوسطة بلغت مساحة التغير (٠,١١ -) كم٢ وبنسبة بلغت (١١,٠٨ -) % ، فيما بلغت مساحة تغير الاراضي ذات القشرة الفقيرة ( ٠,٠٤ -) كم٢ وبنسبة بلغت (٤,٦٤) % ، اما الاراضي ذات القشرة الفقيرة جداً بلغت تغير مساحتها (٠,٧٣) كم٢ وبنسبة (٧٣,١٢) % .

ان الاراضي ذات القشرة الغنية جداً تتوزع في الاجزاء الجنوبية من منطقة الدراسة في مقاطعات ( الضلوعية ٢٥ ، حاوي البوفراج ٣٠ ، حيال وجزر ٢٩ العابرية) تتميز بقشرة بايولوجية جيدة ذات تربة جيدة تصلح لانتاج محاصيل متنوعة وتختلف مساحتها ونسبها للمدة مابين (٢٠٠١-٢٠٢٤) ، اما الاراضي ذات القشرة الغنية فتتوزع في الاجزاء الشرقية والغربية من منطقة الدراسة في مقاطعات (٤٠ الكرية وابو حامة، ٣٨ تلول شكر ، ٣٢ الضباعي والمسطح ، ٣٥ حاوي كليعة ، ٣٦ حاوي الخزل ) ، تكون هذه القشرة بشكل اقل من سابقتها ايضا تختلف مابين المدة (٢٠٠١-٢٠٢٤) ، اما الاراضي ذات قشرة متوسطة تتوزع في جزء محدودة من القسم الشمالي من منطقة الدراسة في مقاطعة (٤١ عيثة الوليد ، ٤٠ المرات ) واجزاء مبعثرة بنسب قليلة في الاجزاء الشمال الغربي والاجزاء الغربية من منطقة الدراسة .

اما الاراضي ذات القشرة الفقيرة تتوزع بمساحات واسعة في الاجزاء الشمالية والوسطى من منطقة الدراسة ، في حين تتوزع الاراضي ذات قشرة فقيرة جداً في الاجزاء الشمالية والوسطى من منطقة الدراسة وتختلف من حيث المدة (٢٠٠١-٢٠٢٤) .


## ٢-٤ مؤشر تدهور التربة (LDI) في منطقة الدراسة :

يعد مؤشر تدهور التربة (LDI) من المؤشرات المهمة لمعرفة مساحة ونسبة التدهور الحاصل في التربة من خلال استخدام المرئيات الفضائية مابين سنة (٢٠٠١-٢٠٢٤) اذ بلغت مساحة تغير الاراضي الخالية من التدهور ( ٠,١٥ -) كم٢ وبنسبة (١٥,٢٨ -) % ، اما الاراضي ذات التدهور الطفيف بلغ مساحة التغير فيها (٠,٠١) كم٢


وبنسبة (١,٨٧) ، في حين بلغت تغير مساحة الاراضي ذات التدهور المتوسط (٠,٠١٠ -) كم٢ وبنسبة (١٠,٢٣) % ، اما الاراضي ذات التدهور الشديد قد بلغت مساحة التغير (٠,٠٩) كم٢ وبنسبة (٩,٥٢) % ، في حين ان الاراضي ذات التدهور الشديد جدا بلغت مساحتها التغير (٠,٠٩) كم٢ وبنسبة (٩,١٤) % . من خلال الخريطين (١٠) (١١) جدول (٥) و، نلاحظ هناك اختلاف في درجات تدهور التربة (LDI) للمدة (٢٠٠١-٢٠٢٤) مما له اثر في تفاقم ظاهرة التصحر في منطقة الدراسة .

اذ هنالك اراضي خالية من التدهور تتوزع في الاجزاء الجنوبية من منطقة الدراسة في مقاطعات (٢٤ بيشكان ، ٢٥ الضلوعية ، ٢٧ حاوي البوفراج ، ٢٨ ديوم خزر ج ، ٢٦ حاوي الخزل ، ٣٢ الضباعي والمسطح ) ، اما الاراضي ذات التدهور الطفيف فتتوزع في الاجزاء الشرقية مقاطعة (٣٨ تلول شكر ، ٤٠ الكرية وابو حامة ) اما الاراضي ذات تدهور متوسط تتوزع في مساحة بسيطة في القسم الشمالي من منطقة الدراسة والاجزاء الشرقية ، اما اراضي ذات تدهور شديد تتوزع في شمال شرق وشمال غرب ووسط منطقة الدراسة ، في حين تتوزع اراضي ذات تدهور شديد في مقاطعات (٤١ ابوحليج ، ٤٣ طالعة غصيريفة ، ٥٥ حاوي السيد مرعي ) ، ويمكن ان تتغير المساحة والنسب خلال المدة (٢٠٠١-٢٠٢٤) .

خريطة (١٠) مؤشر تدهور التربة في منطقة الدراسة لسنة ٢٠٠١



خريطة (١١) مؤشر تدهور التربة في منطقة الدراسة لسنة ٢٠٢٤



جدول (٥) مؤشر تدهور التربة (مساحة/كم<sup>٢</sup>) و(النسبة%) في منطقة الدراسة (٢٠٠١-٢٠٢٤)

مساحة ونسبة التغير بين (٢٠٠١-٢٠٢٤)		تدهور تربة ٢٠٢٤		تدهور تربة ٢٠٠١		درجات تدهور التربة (LDI)	ت
النسبة %	المساحة/كم <sup>٢</sup>	النسبة %	مساحة/كم <sup>٢</sup>	النسبة %	مساحة/كم <sup>٢</sup>		
- ١٥,٢٨	- ٠,١٥	١١,٣١	٩١,٠٤	١٣,٣٥	١٠٧,٤٧	اراض خالية من التدهور	1
١,٨٧	٠,٠١	١٩,٥٧	١٥٧,٤٩	١٩,٢١	١٥٤,٥٩	اراض ذات تدهور طفيف	2
١٠,٢٣	- ٠,١٠	٢١,٢١	١٧٠,٧١	٢٣,٦٣	١٩٠,١٨	اراض ذات تدهور متوسط	3
٩,٥٢	٠,٠٩	٢٧,١٥	٢١٨,٥٢	٢٤,٧٩	١٩٩,٥٢	اراض ذات تدهور شديد	4
٩,١٤	٠,٠٩	٢٠,٧٧	١٦٧,١٦	١٩,٠٣	١٥٣,١٦	اراض ذات تدهور شديد جداً	5
		١٠٠,٠٠	٨٠٤,٩٢	١٠٠,٠٠	٨٠٤,٩٢	المجموع	

المصدر: من الباحث اعتماداً على المرئية الفضائية (Land sat 5 Tm) ومخرجات برنامج (Arc Gis10.4).

### الاستنتاجات :

١. اهتمت هذه الدراسة في مراقبة التغيرات الحاصلة للغطاء الارضي للمدة الواقعة بين (٢٠٠١-٢٠٢٤) من خلال المرئيتين الفضائيتين (٢) و(٣) التي اثبتت وجود تغير في مساحات الغطاء النباتي.
٢. ركزت هذه الدراسة اهمية دور المرئيات الفضائية في كشف هذه المخاطر البيئية المحتمل حدوثها في المنطقة
٣. اظهرت هذه الدراسة اربع مؤشرات انعكاسية لدراسة تغير الغطاء الارضي واستعمالاتها (الغطاء النباتي, تملح التربة, القشرة البايولوجية, مؤشر تدهور التربة).

### التوصيات :

١. اثبت استخدام التكنولوجيا الحديثة لنظم المعلومات الجغرافية والمرئيات الفضائية في الدراسة نجاحاً فائقاً لكونها توفر كم هائل من المعلومات الدقيقة والسريعة عن المخاطر البيئية والتنبؤ لها .
٢. بناء مركز لمكافحة التصحر في منطقة الدراسة وتزويده بالاجهزة اللازمة لمراقبة مظاهر التصحر والاستفادة من المؤتمرات العلمية التي تهتم بمشكلة التصحر.
٣. تفعيل دور الدوائر الحكومية التي لها علاقة بمشكلة التصحر في قضاء الضلوعية, كمديرية الزراعة ومديرية الموارد المائية ودائرة البيئة .

البحوث العلمية والدوريات والمنشورات

١. شهاب , احمد طة , التحليل المكاني لزحف الكثبان الرملية في منطقة العيث التابعة لمحافظة صلاح الدين , مجلة جامعة تكريت للعلوم الانسانية , المجلد (١٩) , العدد (٧) , ٢٠١٢ .
- ٢ . العزاوي , علي عبد عباس , محمود حمادة صالح الجبوري , الجفاف المناخي وتأثيراته البيئية في منطقة الجزيرة العراقية , مجلة تكريت للعلوم الانسانية , العدد (٢) المجلد (١٢) تكريت , ٢٠٠٥ .

Second: Scientific Research, Periodicals and Publications

1. Shihab, Ahmed Taha, Spatial Analysis of Sand Dune Encroachment in the Al-Aith Area of Salah Al-Din Governorate, Tikrit University Journal for .Humanities, Volume (19), Issue (7), 2012
2. Al-Azzawi, Ali Abdul Abbas, Mahmoud Hamada Saleh Al-Jabouri, Climatic Drought and its Environmental Impacts in the Al-Jazeera Region of Iraq, Tikrit .Journal for Humanities, Issue (2), Volume (12), Tikrit, 2005

**References:**

- 1.(Dhinwa. P .S, Pathan, S. K., 1992. Land use changing analysis of 13 Bharatpur District ) using GIS, Journal of Indian Society of Remote Sensing, Vol 20 .
- 2.Ayad Abdullah Khalaf, Jasem Khalaf Shallal. "Calculation of( NDVI) and Vegetation Indices to Assess Rangeland Degradation Using Remote Sensing Techniques." Tikrit University Journal for Agricultural Sciences, Vol. 13, No. 1, 2013.
3. Ati. Alaa Salih, Ibrahim Abdulghafour, Jubair Amel Radhi, Relationship between the North Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) and Some Soil Characteristics in IOSR-JAVS), Volume 7, Issue ) of Iraq, IOSR Journal of Agriculture and Veterinary Science 10 Ver, PP40.
4. Dunya Abdul Jabbar Naji Al-Khazraji. "Geographical Analysis of Desertification Phenomenon in Al-Mahawil District." Unpublished Master's Thesis, College of Education for Human Sciences, University of Tikrit, 2014.
- 5.Mohammed Abdel-Fattah Al-Qassas. *Desertification: Land Degradation in Arid Regions*. Alam Al-Ma'rifah Series, National Council for Culture, Arts and Letters, Kuwait, No. 242, 1999.
- 6.Al-Shawawrah, Ali Salem Ahmidan. *Desertification and Its Risks*. 1st ed., Dar Safaa for Publishing and Distribution, Amman, Jordan, 2012.